



รายงานการวิจัย

ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของการเจริญเติบโตและผลผลิต
ในการผสมระหว่างแตงไทย กับแตงแคนตาลูป ระยะที่ 2
**Genetic Variation in Growth and Yield of Crosses between
Thai Melon (*Cucumis melo* L. var. *conomon*) and Cantalope
(*Cucumis melo* L. var. *reticularis* Naudin) Phase II**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการวิจัยแต่เพียงผู้เดียว



รายงานการวิจัย

ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของการเจริญเติบโตและผลผลิต
ในการผสมระหว่างแตงไทย กับแตงแคนตาลูป ระยะที่ 2
**Genetic Variation in Growth and Yield of Crosses between
Thai Melon (*Cucumis melo* L. var. *conomon*) and Cantaloupe
(*Cucumis melo* L. var. *reticularis* Naudin) Phase II**

คณะผู้วิจัย

หัวหน้าโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารักษ์ ชีร์อำพน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ 2557

ผลงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการวิจัยแต่เพียงผู้เดียว


2 ตุลาคม 2560

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยครั้งนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ 2557 ในกรณีนี้ ขอขอบคุณฟาร์มมหาวิทยาลัย และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ได้เอื้อเฟื้อบุคลากร พื้นที่ทำการทดลอง และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และขอขอบคุณทีมผู้ช่วยนักวิจัย อันได้แก่ นางวันดี ชีรอำพน นางสาวชิรพร ทองดีนอก และ นางสาวนัญญา นิตยวัฒน์กุล ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการวิจัยอย่างเต็มกำลังความสามารถ จนทำให้การดำเนินงานของโครงการวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์

อารักษ์ ชีรอำพน

ตุลาคม 2560



บทคัดย่อ

ในปัจจุบันแตงไทยเป็นพืชที่ได้รับความนิยมต่ำ เนื่องจากมีเปลือกบาง เนื้อนิ่ม กลิ่นไม่หอม รสจืด และอายุการเก็บรักษาสั้น ทำให้ไม่เป็นที่นิยมบริโภค ขณะที่แคนตาลูปเป็นที่นิยมในตลาดสูงกว่า เพราะมีรสหวาน กรอบ และเก็บรักษาได้นานกว่า ซึ่งลักษณะของผลมีผลต่อคุณภาพผลผลิต ดังนั้น การศึกษาทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปฏิกิริยาของยีนที่ควบคุมลักษณะของผล อัตราพันธุกรรมแนวกว้าง ความดีเด่นของลูกผสม สหสัมพันธ์ และหาความเชื่อมโยงลักษณะทางฟีโนไทป์ระหว่างลักษณะของลูกผสมระหว่างแตงไทย (*Cucumis melo* L. var. *conomon*; P₁) 1 พันธุ์ กับแคนตาลูป (*Cucumis melo* L. var. *reticularis* Naudin; P₂) 2 พันธุ์ จำนวน 2 คู่ผสม คือ RML1 x KML370 และ RML1 x PI148 ทำการปลูกทดลองที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จากการศึกษาพบว่า (1) แตงไทย และแคนตาลูปที่ใช้เป็นพันธุ์พ่อแม่มีความแตกต่างทางสถิติในทุกลักษณะ และมีความสม่ำเสมอภายในพันธุ์สูง (2) ค่าเฉลี่ยลักษณะของผลใน 6 ประชากร (P₁, P₂, F₁, F₂, BC₁P₁ และ BC₁P₂) มีความแตกต่างระหว่างประชากรในลักษณะที่ศึกษา (3) การศึกษาปฏิกิริยาการทำงานของยีนที่ควบคุมลักษณะของผล โดยวิธีวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของชั่ว (generation mean analysis) พบว่า คู่ผสมที่ 1 RML1 x KML370 มีการแสดงปฏิกิริยาของยีนแบบข่ม และข่มข้ามคู่ และคู่ผสมที่ 2 RML1 x PI148 มีการแสดงปฏิกิริยาแบบบวก และข่มข้ามคู่ ในลักษณะน้ำหนักผล และทั้ง 2 คู่ผสม แสดงปฏิกิริยาแบบบวก ข่ม และข่มข้ามคู่ ในลักษณะความหนาเนื้อ ความกว้างผล และเปอร์เซ็นต์เนื้อ (4) อัตราพันธุกรรมแนวกว้าง พบว่าคู่ผสมที่ 1 มีอัตราพันธุกรรมสูงในลักษณะน้ำหนักผล ความหนาเนื้อ ดัชนีรูปร่างผล และความหวาน และในคู่ผสมที่ 2 มีอัตราพันธุกรรมสูงในลักษณะความหนาไส้ เปอร์เซ็นต์เนื้อ และความแน่นเนื้อ (5) ความดีเด่นเหนือค่าเฉลี่ยของพ่อแม่ (heterosis) ลูกผสมที่ได้มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่ ในลักษณะความหนาเปลือก ความแน่นเนื้อ และความหวาน ลูกผสมที่ได้จะมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่ ในลักษณะดัชนีรูปร่างผล นอกจากนี้ผลของลูกผสมที่มีความดีเด่นเหนือค่าเฉลี่ยของพ่อหรือแม่ที่ดีกว่า (heterobeltiosis) ทั้ง 2 คู่ผสมพบว่าทุกลักษณะมีความแปรปรวนไปในแต่ละคู่ผสม โดยในทุกลักษณะ มีค่าคิดลบแสดงให้เห็นว่าลูกผสมที่ได้จะมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อหรือแม่ที่ดีกว่า (6) ลักษณะน้ำหนักผลมีสหสัมพันธ์ในทางบวกกับเส้นรอบวงผล ความหนาเนื้อ ความหนาไส้ ความกว้างผล เปอร์เซ็นต์เนื้อ และความยาวผล ของทั้ง 2 คู่ผสม และทุกลักษณะมีสหสัมพันธ์ทางลบกับดัชนีรูปร่างผล และ (7) จากการศึกษาโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อเชื่อมโยงลักษณะผลนั้น พบว่าไม่สามารถทำการเชื่อมโยงได้เนื่องจากพันธุ์พ่อแม่ที่นำมาใช้ในการทดลองเป็นพันธุ์ผสม

เปิด ความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ต่ำ และมีแถบดีเอ็นเอที่แตกต่างกันภายในพันธุ์แดงไทยและพันธุ์แคนตาลูปที่ใช้เป็นพ่อแม่ ดังนั้นอาจต้องมีการคัดเลือกพันธุ์พ่อแม่ที่เป็นพันธุ์แท้ในการศึกษา และเพิ่มจำนวนไพรมอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทดลอง จากข้อมูลการศึกษาเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับแนวทางการคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์แดงลูกผสมให้เป็นพืชที่มีคุณภาพทางเศรษฐกิจในอนาคต

คำสำคัญ : การปรับปรุงพันธุ์ แดงเทศ แดงแคนตาลูป แดงไทย เครื่องหมายโมเลกุล



Abstract

At present, Thai Melon is not popular because it has a soft shell, no smell, no taste, and a short shelf life, making it unpopular. While cantaloupe is more popular in the market because it has a sweet taste and has a longer shelf life, which affects the nature of the quality of the output. The objectives of this study were to 1) examine the genetic effects on the fruit traits, 2) determine the broad-sense heritability, 3) assess and compare the ability of hybrid cultivars on heterosis and heterobeltiosis, 4) evaluate the correlation of fruit traits of the hybrid cultivars, and 5) study the link between fruit traits and hybrid melon's fruit traits for Thai Melon (*Cucumis melo* L. var. *conomon*; P₁) and Cantaloupe (*Cucumis melo* L. var. *reticularis* Naudin.; P₂) including RML1 x KML370 and RML1 x PI148 were cultivated according to standard method at Farm Suranaree University of Technology during October, 2013-November, 2016 and studied. The results indicated the following. 1) The parent lines have high fruit traits varieties between lines and very high uniformity within the line; 2) The average of the fruit trait six populations (P₁, P₂, F₁, F₂, BC₁P₁ and BC₁P₂) from two melon crosses were highly significant ($P < 0.01$) for all fruit traits; 3) The generation mean analysis of the six populations showed a variety of gene actions. In RML1 x KML370, the dominant and epistasis genes effects were the key regulator and RML1 x PI148, the additive and epistasis genes effects. Furthermore, the fruit flesh thickness, fruit diameter and pulp percentage traits were regulated by additive, dominant and epistasis gene effects in all crosses; 4) Broad-sense heritability. The fruit perimeter, fruit weight, peel thickness and fruit diameter showed high percentages in RML1 x KML370 and areola width, pulp percentage and fruit firmness in RML1 x KML370. 5) The heterosis of all crosses of the peel thickness, fruit firmness and total soluble solid were highly

significant ($P < 0.01$). Moreover, the heterobeltiosis in all hybrid cultivars was observed. The variation of the two crosses showed all fruit traits were highly significant ($P < 0.01$); 6) A fruit weight positive correlation was detected for the fruit diameter, fruit thickness, areola width, fruit width, pulp percentage and fruit length, but a negative correlation between the fruit shape index was observed; and 7) Based on a molecular marker study to obtain results not analysis using morphological traits because an open pollinated variety low pure and DNA band parent line is different in Thai melon and cantaloupe. These results together with the previous observation suggested that hybrid melon's fruit shape is polygenic and highly heritable. This information could be used for the selection and improvement in the breeding program of potentially commercial cultivars in the near future.

Key words : Breeding Melon Cantaloupe, *Cucumis melo* L. Snake melon Molecular marker



สารบัญ

หน้า

กิตติกรรมประกาศ.....	ก
บทคัดย่อ (ภาษาไทย).....	ข
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ).....	ง
สารบัญ	ฉ
สารบัญตาราง.....	ช
สารบัญภาพ	ญ

บทที่

1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	2
1.3 สมมติฐานการวิจัย	3
1.4 ขอบเขตการวิจัย.....	3
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3

2 ปรัชญ่วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความสำคัญของแดงไทย และแคนตาลูป	4
2.2 ลักษณะทั่วไปและลักษณะทางทางพฤกษศาสตร์	5
2.3 ลักษณะทางพันธุกรรมบางประการของ <i>Cucumis melo</i> L.	7
2.4 พันธุกรรมและลักษณะการแสดงออกของยีน	8
2.5 พันธุศาสตร์กับการปรับปรุงพันธุ์พืช.....	10
2.6 การใช้เครื่องหมายโมเลกุล	17

3 วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 วัสดุอุปกรณ์	22
3.2 ระยะเวลาการทดลอง.....	23
3.3 สถานที่ทำการทดลอง.....	22

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.4 วิธีการทดลอง	22
3.5 การบันทึกข้อมูล.....	24
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล.....	25
4 ผลการทดลองและวิจารณ์	
4.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของแดงไทยและแคนตาลูปที่ใช้เป็นพันธุ์พ่อแม่ และวิเคราะห์ความสม่ำเสมอภายในพันธุ์.....	33
4.2 การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของลักษณะของผลในลูกผสมระหว่าง แดงไทยและแคนตาลูป	34
4.3 การศึกษาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อเชื่อมโยงลักษณะทางฟีโนไทป์ ของผลใน ลูกผสมระหว่างแดงไทยและแคนตาลูป	51
5 สรุปผลการทดลอง.....	55
เอกสารอ้างอิง	57
ภาคผนวก.....	62
ประวัติผู้เขียน.....	72

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.1 ลำดับนิวเคลียสไอโซโทปของไพรมอร์ และอุณหภูมิแอนเนลลิง (Annealing temperature) ที่ใช้.....	31
4.1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยลักษณะผลของพันธุ์แดงไทยและแคนตาลูป	34
4.2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยลักษณะของผลจากประชากรทั้ง 6 ประชากร กลุ่มผสมที่ 1 RML1 (<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>conomon</i> ; P ₁) กับ KML370 (<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>cantalupensis</i> ; P ₂).....	35
4.3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยลักษณะของผลจากประชากรทั้ง 6 ประชากรในกลุ่มผสมที่ 2 RML1 (<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>conomon</i> ; P ₁) กับ PI148 (<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>cantalupensis</i> ; P ₂).....	36
4.4 Scaling test ของลักษณะของผล จากการศึกษาประชากรทั้ง 6 ประชากร (P ₁ , P ₂ , F ₁ , F ₂ , BC ₁ P ₁ and BC ₁ P ₂) ในกลุ่มผสมที่ 1 RML1 (<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>conomon</i> ; P ₁) กับ KML370 (<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>cantalupensis</i> ; P ₂).....	38
4.5 Scaling test ของลักษณะของผล จากการศึกษาประชากรทั้ง 6 ประชากร (P ₁ , P ₂ , F ₁ , F ₂ , BC ₁ P ₁ and BC ₁ P ₂) ในกลุ่มผสมที่ 2 RML1 (<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>conomon</i> ; P ₁) กับ PI148 (<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>cantalupensis</i> ; P ₂).....	38
4.6 ผลของยีนที่ควบคุมลักษณะของผล จากการศึกษาประชากรทั้ง 6 ประชากร (P ₁ , P ₂ , F ₁ , F ₂ , BC ₁ P ₁ and BC ₁ P ₂) ในกลุ่มผสมที่ 1 RML1 (<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>conomon</i> ; P ₁) กับ KML370 (<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>cantalupensis</i> ; P ₂).....	40
4.7 ผลของยีนที่ควบคุมลักษณะของผล จากการศึกษาประชากรทั้ง 6 ประชากร (P ₁ , P ₂ , F ₁ , F ₂ , BC ₁ P ₁ and BC ₁ P ₂) ในกลุ่มผสมที่ 2 RML1 (<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>conomon</i> ; P ₁) กับ PI148 (<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>cantalupensis</i> ; P ₂).....	41
4.8 อัตราพันธุกรรมของลักษณะของผล ในกลุ่มผสมระหว่างแดงไทยกับแคนตาลูป 2 กลุ่มผสม โดยคำนวณจากวาเรียนซ์ของประชากร	42

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.9 ความดีเด่นเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่ (heterosis) ของลักษณะของผล ในกลุ่มผสมระหว่างแดงไทยกับแคนตาลูป 2 กลุ่มผสม.....	43
4.10 ความดีเด่นเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อหรือแม่ที่ดีกว่า (heterobeltiosis) ของลักษณะของผล ในกลุ่มผสมระหว่างแดงไทยกับแคนตาลูป 2 กลุ่มผสม.....	44
4.11 วิเคราะห์ปฏิกริยาการแสดงออกของยีน อัตราพันธุกรรมแนวกว้าง และความดีเด่นของลูกผสมของลักษณะของผล ในกลุ่มผสมระหว่างแดงไทย กับแคนตาลูป 2 กลุ่มผสม	46
4.12 สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของผล จากการศึกษาประชากรชั่วที่ F ₂ กลุ่มผสมที่ 1 RML1 (<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>conomon</i> ; P ₁) กับ KML370 (<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>cantalupensis</i> ; P ₂)	50
4.13 สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของผล จากการศึกษาประชากรชั่วที่ F ₂ กลุ่มผสมที่ 2 RML1 (<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>conomon</i> ; P ₁) กับ PI148 (<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>cantalupensis</i> ; P ₂)	50

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
4.1	ดีเอ็นเอแดงไทยพันธุ์ RML1 แคนตาลูปพันธุ์ PI148 แคนตาลูปพันธุ์ KML370 คู่ผสมที่ 1 RML1 x PI148 และคู่ผสมที่ 2 RML x KML370 ที่ถูกนำไปเพิ่ม ปริมาณชิ้นดีเอ็นเอด้วยไพรเมอร์ ISSR_(GA) ₈ YG ใน 3% agarose gel.....52
4.2	ดีเอ็นเอแดงไทยพันธุ์ RML1 แคนตาลูปพันธุ์ PI148 แคนตาลูปพันธุ์ KML370 คู่ผสมที่ 1 RML1 x PI148 และคู่ผสมที่ 2 RML x KML370 ที่ถูกนำไปเพิ่ม ปริมาณชิ้นดีเอ็นเอด้วยไพรเมอร์ ISSR_(ATG) ₆ ใน 3% agarose gel53
4.3	ดีเอ็นเอแดงไทยพันธุ์ RML1 แคนตาลูปพันธุ์ PI148 แคนตาลูปพันธุ์ KML370 คู่ผสมที่ 1 RML1 x PI148 และคู่ผสมที่ 2 RML x KML370 ที่ถูกนำไปเพิ่ม ปริมาณชิ้นดีเอ็นเอด้วยไพรเมอร์ RAPD_OPL07 ใน 3% agarose gel.....54

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

แคนตาลูป (Cantaloupe) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Cucumis melo* L. var. *cantalupensis* อยู่ในตระกูล คิวเคอร์บิตาซีอี (cucurbitaceae) ซึ่งเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับแตงกวา ฟักทอง และแตงไทย มีจำนวนโครโมโซม $2n = 24$ เป็นพืชผสมข้ามโดยแมลงและลม แต่มีการผสมตัวเองสูงในพันธุ์ที่มีดอกสมบูรณ์เพศ (จานุลักษณะ, 2541) เป็นพืชเถาเลื้อย ลำต้นมีลักษณะกลม มีขนรอบลำต้น บริเวณข้อแต่ละข้อจะแตกกิ่งแขนงย่อยระหว่างลำต้นและซอกใบ กิ่งแขนงย่อยเหล่านั้นเป็นที่เกิดของดอก และที่ซอกใบจะเป็นที่เกิดของมือเกาะ ใบแคนตาลูปมีลักษณะฐานใบเว้า ขอบใบมีลักษณะหยักเป็นคลื่น ผิวใบไม่เรียบ การเรียงตัวของใบเป็นแบบสลับ ใบเกิดตรงข้อ ข้อละ 1 ใบ ก้านใบกลม มีขนขนาดเล็กที่ก้านใบ ลักษณะการออกดอกเป็นได้ทั้งแบบที่มีดอกเพศผู้และดอกสมบูรณ์เพศอยู่บนต้นเดียวกัน (andromonoecious) และแบบที่มีทั้งดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่บนต้นเดียวกัน (monoecious) ดอกเพศผู้เกิดตรงบริเวณซอกใบตำแหน่งเดียวกับแขนงย่อย ดอกมีสีเหลืองลักษณะคล้ายดอกแตงทั่วไป ส่วนดอกเพศเมียและดอกสมบูรณ์เพศจะเกิดบนแขนงย่อยข้อแรก ดอกมักเกิดเกือบทุกแขนงย่อย ผลเกิดอยู่บนแขนงย่อย ผลมีลักษณะแตกต่างกัน บางพันธุ์มีตาข่ายร่างแหปกคลุมอยู่ทั่วผล บางพันธุ์ไม่มีตาข่ายร่างแหปกคลุม บางพันธุ์มีร่องเป็นทางยาวตลอดแนวของผล รูปทรงของผลมีลักษณะค่อนข้างกลม และสีของเนื้อแตกต่างกันตามลักษณะของพันธุ์ (คำนึ่ง, มปป.)

แตงไทย (pickling melon) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Cucumis melo* L. var. *conomon* อยู่ในตระกูลคิวเคอร์บิตาซีอี (cucurbitaceae) (Nath, 1976) เช่นเดียวกับแตงกวา แคนตาลูป และฟักทอง (Purseglove, 1968) มีจำนวนโครโมโซม $2n = 24$ เป็นพืชผสมข้ามโดยแมลงและลม (จานุลักษณะ, 2541) ลักษณะโดยทั่วไปของแตงไทยใกล้เคียงกับแคนตาลูป (วรรณช, 2536) ออกดอกเดี่ยวสีเหลือง ใบเดี่ยวทรงเหลี่ยมมีเว้าเล็กน้อย (เพ็ญนภา, 2547) ผลค่อนข้างยาวและกลมรี มีลาย (strip) ตามความยาวของผล ผลสุกมีเปลือกบาง มีกลิ่นหอม มีรสจืด ทำให้ไม่นิยมรับประทานสด พันธุ์แตงไทยที่ใช้ปลูกส่วนใหญ่จะมีการติดผลระหว่าง 1-4 ผลต่อต้น (วรรณช, 2536)

จากการศึกษาเบื้องต้นพบรายงานวิจัย ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของการเจริญเติบโตและผลผลิตในการผสมระหว่างแตงไทยและแคนตาลูป โดย อารักษ์ (2555) พบว่ามีการศึกษาการแสดงออกของยีนลักษณะผลในแตงไทยกับแคนตาลูป อัตราพันธุกรรม ความดีเด่นของลูกผสม และค่าสหสัมพันธ์ จากแตงไทย 2 พันธุ์ และแคนตาลูป 2 พันธุ์ ซึ่งมีฐานพันธุกรรมเบื้องต้นอยู่ และรายงานวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนทางพันธุกรรมกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ

แดงไทยและแดงเทศ จากเทคนิค ISSR โดย อารักษ์ (2558) พบว่ามีการศึกษาข้อมูลทางสัณฐานวิทยา และสรีรวิทยา ร่วมกับเครื่องหมายโมเลกุลในการจำแนกความแตกต่าง และวิเคราะห์ความใกล้ชิดทาง พันธุกรรมของพันธุ์แดงไทย และแดงเทศ 25 สายพันธุ์ จากรายงานวิจัยทั้ง 2 มีความต้องการนำพันธุ์ แดงไทย แคนตาลูป และลูกผสมมาศึกษาการแสดงออกของยีนลักษณะผล อัตราพันธุกรรม ความ ดีเด่นของลูกผสม และค่าสหสัมพันธ์ พร้อมทั้งใช้เครื่องหมายโมเลกุลเชื่อมโยงลักษณะแดงไทย และ แคนตาลูปต่อไป

การปรับปรุงพันธุ์แคนตาลูปและแดงไทยในประเทศไทยยังมีไม่มากนัก ปัญหาของการ ปรับปรุงพันธุ์แคนตาลูปในประเทศไทย ส่วนใหญ่ดำเนินการโดยทั้งภาคเอกชน รวมถึงเกษตรกรหัว ก้าวหน้าที่มีความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์ ทำการคัดเลือกพันธุ์ของตนเอง เพื่อปลูกจำหน่ายผลผลิตสด และผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมจำหน่ายโดยตรง มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือระบุว่า บ่อยครั้งที่เมล็ดพันธุ์ ที่จำหน่ายโดยสวนเกษตรขนาดใหญ่เป็นแคนตาลูปสายพันธุ์เดียวกัน มาจากแหล่งเดียวกัน แต่ถูก นำไปตั้งชื่อให้แตกต่างกัน บ่อยครั้งจะพบเชื้อโรคติดมากับเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์แดงเทศที่จำหน่ายใน ท้องตลาดอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเป็นสายพันธุ์ลูกผสม เกษตรกรไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ต่อ ได้ และราคาเมล็ดพันธุ์แดงเทศมีราคาแพง ส่วนปัญหาในการปรับปรุงพันธุ์แดงไทย คือ พื้นฐานทาง พันธุกรรมแคบ หรือความหลากหลายทางพันธุกรรมน้อย ดังนั้น โอกาสในการปรับปรุงพันธุ์ใหม่จึง ทำได้ยาก อย่างไรก็ตาม แดงไทยมีข้อดี คือ มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี การผลิตเมล็ด พันธุ์ทำได้ง่าย เนื่องจากแดงไทยเป็นพืชเมืองร้อนมีปลูกอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ยุพงค์, 2542) ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการผสมระหว่างแดงไทยกับแคนตาลูป เพื่อศึกษาการแสดงออกของยีนที่ ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะผล อัตราพันธุกรรม สหสัมพันธ์ของลักษณะต่างๆ ของลูกผสม และ การศึกษาเครื่องหมายโมเลกุลที่เหมาะสมสำหรับการติดตามยีนที่สนใจได้ ซึ่งผลที่ได้จะเป็นองค์ ความรู้ใหม่เกี่ยวกับพันธุกรรมของแคนตาลูปที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในโครงการปรับปรุงพันธุ์ และการศึกษาต่อเนื่องในอนาคตต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.2.1 เพื่อศึกษาการแสดงออกของยีนที่ควบคุมลักษณะผล อัตราพันธุกรรม และ ความสัมพันธ์ของลักษณะต่างๆ ของลูกผสมระหว่างแดงไทยกับแคนตาลูป

1.2.2 เพื่อศึกษาเครื่องหมายโมเลกุล RAPD และ ISSR เชื่อมโยงกับลักษณะผลบางลักษณะ อย่างน้อย 1 ลักษณะ

1.3 สมมติฐานการวิจัย

1.3.1 ทราบปฏิบัติการทำงานของยีน อัตราพันธุกรรม และสหสัมพันธ์ของลูกผสมระหว่างแตงไทย และแคนตาลูป

1.3.2 ใช้เครื่องหมายโมเลกุล RAPD และ ISSR เชื่อมโยงกับลักษณะผลบางลักษณะอย่างน้อย 1 ลักษณะ

1.4 ขอบเขตการวิจัย

1.4.1 ปลูกประชากรทั้ง 6 ประชากร (P_1 , P_2 , F_1 , F_2 , BC_1P_1 และ BC_1P_2) เพื่อศึกษาปฏิบัติการทำงานของยีน อัตราพันธุกรรม และสหสัมพันธ์ของลักษณะของผล

1.4.2 วิเคราะห์เครื่องหมายโมเลกุล RAPD และ ISSR ที่สามารถหาความเชื่อมโยงระหว่างเครื่องหมายโมเลกุลกับลักษณะผลบางลักษณะอย่างน้อย 1 ลักษณะ

***หมายเหตุ: ใช้เมล็ดพันธุ์แตงเทศประชากรต่างๆ จากโครงการ “ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของการเจริญเติบโตและผลผลิตในการผสมระหว่างแตงไทยกับแตงแคนตาลูป ระยะที่ 1 (อารักษ์, 2555)”

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 มีฐานข้อมูลจากการศึกษาปฏิบัติการของยีนที่ควบคุมลักษณะผลอัตราพันธุกรรม ความดีเด่นของลูกผสม และสหสัมพันธ์ของแต่ละลักษณะ เพื่อใช้ในการคัดเลือกพันธุ์หรือเป็นเชื้อพันธุกรรม โดยการผสมระหว่างแตงไทยกับแคนตาลูป เพื่อสร้างฐานพันธุกรรมให้กว้างขึ้นด้วยวิธีสร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรมของสายพันธุ์พืชทั้งสองชนิด เพื่อการคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์ในอนาคต

1.5.2 สามารถได้เครื่องหมายโมเลกุลที่จำเพาะและมีความสอดคล้องกับลักษณะที่ปรากฏทางฟีโนไทป์ เพื่อจำแนกลักษณะเด่นทางฟีโนไทป์ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพันธุ์แตงไทย และแคนตาลูปต่อไป

บทที่ 2

ปรัทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความสำคัญของแตงไทย และแคนตาลูป

แคนตาลูปหรือแตงเทศ (melon, *Cucumis melo* L. var. *cantalupensis*) และแตงไทย (pickling melon, *Cucumis melo* L. var. *conomon*) จัดอยู่ในประเภทผัก อายุปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 80 ถึง 130 วัน (เมืองทอง และสุริรัตน์, 2532) มีจำนวนโครโมโซม $2n = 24$ เป็นพืชผสมข้ามโดยแมลงและลม (จานุรักษ์, 2541) แต่แคนตาลูปมีการผสมตัวเองสูงในพันธุ์ที่มีดอกสมบูรณ์เพศ (จานุรักษ์, 2541) ลักษณะการออกดอกเป็นได้ทั้งแบบที่มีดอกเพศผู้และดอกสมบูรณ์เพศอยู่บนต้นเดียวกัน (andromonoecious) และแบบที่มีทั้งดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่บนต้นเดียวกัน (monoecious) ผลของแคนตาลูปมีลักษณะแตกต่างกัน บางพันธุ์มีตาข่ายร่างแหปกคลุมอยู่ทั่วผล บางพันธุ์ไม่มีตาข่ายร่างแหปกคลุม บางพันธุ์มีร่องเป็นทางยาวตลอดแนวของผล รูปทรงของผลมีลักษณะค่อนข้างกลมและรี สีของเนื้อแตกต่างกันตามลักษณะของพันธุ์ (คำนิง, 2536) ขณะที่ลักษณะโดยทั่วไปของแตงไทย (Thai Melon, pickling melon) ใกล้เคียงกับแตงแคนตาลูป รูปทรงของผลค่อนข้างยาวและกลมรี มีลาย (strip) ตามความยาวของผล พันธุ์แตงไทยที่ใช้ปลูกส่วนใหญ่จะมีการติดผลระหว่าง 1-4 ผลต่อต้น (วรบุษ, 2536) อายุการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวหลังปลูก 55-60 วัน (ยุพยงษ์, 2524) แตงไทยมีความทนทานต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลงค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับแตงเศรษฐกิจอื่น ๆ การผลิตเมล็ดพันธุ์ทำได้ง่าย (แสงเดือน, 2555) เนื่องจากแตงไทยเป็นพืชเมืองร้อนมีการปลูกมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แตงไทยเมื่อเทียบกับแคนตาลูปพบว่า มีลักษณะที่คล้ายคลึงหลายอย่าง เช่น เปลือกบาง เนื้อนุ่ม กลิ่นไม่หอม รสจืด และอายุการเก็บรักษาสั้น ทำให้ไม่เป็นที่นิยมบริโภค ในปี พ.ศ.2559 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกแตงไทยประมาณ 2,210 ไร่ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ประมาณ 3,410,610 กิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 2,099 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 10.39 บาท พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดชัยภูมิ พิจิตร และนครพนม (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559)

แคนตาลูปเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย มีการนำแคนตาลูปเข้ามาปลูกครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 การทดลองปลูกในระยะแรกไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากมีถิ่นกำเนิดต่างประเทศ ในแถบถึงอบอุ่นและเขตร้อนทางทิศตะวันตกของประเทศแอฟริกา (จานุรักษ์, 2541) แคนตาลูปสามารถปรับตัวเจริญเติบโตได้ดีในเขตที่มีอากาศร้อนและแห้ง มีแสงแดดเต็มที่ตลอดวัน และด้วยรสชาติหวาน หอม และราคาแพง จึงเป็นที่ต้องการของตลาด ในปี 2558 มี

ปริมาณการส่งออกเมล็ดพันธุ์แตงเทศจำนวน 31.98 ตัน คิดเป็นมูลค่า 99.63 ล้านบาท (สำนักควบคุมพืชและวัสดุเกษตร, 2558) และ ในปี พ.ศ.2559 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกแคนตาลูปประมาณ 6,040 ไร่ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ประมาณ 9,387,710 กิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 2,035 กิโลกรัมต่อไร่ พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี จันทบุรี และนครราชสีมา (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559) ราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30 บาท (ตลาดไทย, 2560) แม้ว่าแคนตาลูปสามารถปลูกได้ในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย แต่การปลูกแคนตาลูปให้ได้คุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภคไม่เป็นเรื่องง่าย เพราะแคนตาลูปอ่อนแอต่อโรค-แมลงศัตรูพืช และสภาพแวดล้อม จึงมีวิธีการปลูก ดูแลรักษา ซึ่งต่างกับพืชอื่นอยู่หลายขั้นตอน และยังต้องการการดูแลเอาใจใส่มากกว่าพืชอีกหลายชนิด (อารักษ์, 2559)

2.2 ลักษณะทั่วไปและลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของแตงไทย และแคนตาลูป

แคนตาลูป (Cantaloupe) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Cucumis melo* L. var. *cantaloupensis* อยู่ในตระกูลคิวเคอร์บิตาซีอี (Cucurbitaceae) (Nath, 1976) ซึ่งเป็นพืชกลุ่มใหญ่มีประมาณ 90 จีนัส (genus) และมีมากกว่า 700 ชนิด (species) (Daryono et al, 2003) เป็นพืชตระกูลเดียวกับแตงไทย (pickling melon) ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Cucumis melo* L. var. *conomon* ลักษณะโดยทั่วไปของแตงไทยใกล้เคียงกับแคนตาลูป (วรนุช, 2536) มีจำนวนโครโมโซม $2n = 24$ เป็นพืชผสมข้าม (จานุลักษณะ, 2541)

ลำต้น มีลักษณะกลม เป็นเถาเลื้อยยาวประมาณ 3 เมตร ความยาวช่วงข้อประมาณ 15-20 เซนติเมตร มีหนามขนาดเล็กคล้ายขนรอบลำต้น ข้อแต่ละข้อจะแตกกิ่งแขนงย่อยระหว่างลำต้นและซอกใบ กิ่งแขนงย่อยจะเป็นที่เกิดของดอก และที่ซอกใบจะเป็นที่เกิดของมือเกาะ หรือที่เรียกว่า “หนวด” หนวดของแคนตาลูปค่อนข้างแข็ง มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะต่ำ (คำนึ่ง, 2536)

ใบ มีลักษณะคล้ายใบผักทอง หรือใบแตงกวา ฐานใบเว้า ขอบใบหยักเป็นคลื่น ผิวใบหยาบ ใบมีขนาดเล็กลงที่ริมขอบใบ ใต้ใบมีขนาดเล็กลงอย่างหนาแน่น เมื่อใบมีอายุมากขึ้นขนใต้ใบจะลดลง การเรียงตัวของใบเป็นแบบสลับ ใบจะเกิดตรงข้อ ข้อละ 1 ใบก้านใบกลาง ยาว 5-10 เซนติเมตร มีขนาดเล็กลงที่ก้านใบ ก้านใบมีขนาดเล็กลงกว่าลำต้นเล็กน้อย (คำนึ่ง, 2536)

ดอก เป็นได้ทั้งแบบที่มีดอกเพศผู้ และดอกสมบูรณ์เพศอยู่บนต้นเดียวกัน (andromonoecious) และแบบที่มีทั้งดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่บนต้นเดียวกัน (monoecious) ส่วนใหญ่จะออกดอกแบบ andromonoecious ดอกเพศผู้เกิดตรงบริเวณซอกใบตำแหน่งเดียวกับแขนงย่อย ออกดอกหลังจากแตกแขนงย่อย ดอกมีสีเหลืองลักษณะคล้ายดอกแตงทั่วไป ดอกเพศผู้มีกลีบเลี้ยง

และกลีบดอก 5 กลีบ อับละอองเกสรตัวผู้ 3 อับ มีก้านชูเกสรสั้น ออกดอกอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีอายุประมาณ 28 วันขึ้นไป ดอกเพศเมีย และดอกสมบูรณ์เพศจะเกิดบนแขนงย่อยข้อแรก ดอกสมบูรณ์เพศมีกลีบเลี้ยงสีเขียว และกลีบดอกสีเหลือง 5 กลีบ อับละอองเกสรตัวผู้ 3 อับ ล้อมรอบยอดเกสรตัวเมียที่แยกเป็น 3-5 แฉก รังไข่มีลักษณะกลม ยาว 2-4 เซนติเมตร และมี 3-5 ห้อง การเกิดดอกสมบูรณ์เพศมักเกิดเกือบทุกแขนงย่อย เมื่ออายุ 30 วันขึ้นไป ที่ฐานดอกสมบูรณ์เพศจะมีรังไข่เป็นที่เกิดของผล (คำนึ่ง, 2536)

ละอองเกสรของแตงเทศจะเหนียว ไม่สามารถแพร่กระจายด้วยลมหรือผสมตัวเอง จำเป็นต้องใช้แมลงช่วยผสม ในฤดูฝนหรือในช่วงที่อุณหภูมิและช่วงแสงต่ำ จะมีปัญหาในการผสมด้วยแมลง จึงควรใช้คนช่วยผสมเกสร โดยใช้ดอกตัวผู้ และแกะกลีบดอกออก นำไปแตะบนยอดเกสรตัวเมีย การช่วยผสมจะช่วยให้สามารถติดดอกในข้อที่ต้องการสม่ำเสมอ ซึ่งจะสะดวกในการดูแลรักษา อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเปิดของอับละอองเกสรอยู่ระหว่าง 17-18 องศาเซลเซียส หลังการผสม 5-7 วัน เลือกลงที่มีการเจริญเติบโตดี 1 ผลต่อเถา (นิพนธ์, 2550)

ผล จะเกิดอยู่บนแขนงย่อย มีลักษณะทรงกลมหรือกลมยาว (รูปไข่) ผิวเรียบ หรือรอยแตกขรุขระ หรือมีลายนูนแบบร่างแห ผิวสีเหลือง น้ำตาลหรือเขียวปนเหลือง เนื้อจะมีสีส้ม สีเขียวหรือขาว เนื้อมีทั้งนุ่มและกรอบ กลิ่นมีทั้งชนิดที่มีกลิ่นหอมและไม่กลิ่น ตามลักษณะของพันธุ์ (คำนึ่ง, 2536) ขนาดผลเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 13 ถึง 15 เซนติเมตร เมล็ดมีสีน้ำตาลเหลือง (จานุลักษณ์, 2541)

การจำแนกกลุ่มของ *Cucumis melo* L. ตามที่ Naudin เสนอไว้มีดังนี้ (นิพนธ์, 2550)

1. กลุ่ม *reticulates* เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า musk melon, netted melon หรือ nutmeg melon เปลือกผิวสีฟาง มีลายตาข่ายสานกันแน่น ผลมีขนาดปานกลาง กลิ่นหอม เนื้อแดงละเอียด สีส้ม รสหวาน

2. กลุ่ม *cantaloupensis* เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า cantaloupe เปลือกผิวสีฟางหรือน้ำตาลแข็งและหยาบ มีลายตาข่ายห่างมากหรือแทบไม่มีเลย มีร่องตามความยาวของผลคล้ายฟักทอง ผลขนาดปานกลาง กลิ่นหอม เนื้อหยาบ มีเส้นใยมาก สีส้ม รสค่อนข้างหวาน

3. กลุ่ม *inodoros* บางครั้งเรียกว่า winter melon หรือ casaba melon เปลือกผิวสีขาวสีเขียวอ่อน สีครีม ผิวเรียบไม่มีลายตาข่าย ไม่มีร่องตามความยาวของผล ผลมีขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่ค่อยมีกลิ่นหอม เนื้อแข็ง กรอบ แต่ละเยื่อ สีเขียว รสหวาน เป็นแดงพันธุ์หนัก

4. กลุ่ม *flexosus* บางครั้งเรียก snake melon ผลยาวเรียว กว้าง 1-3 นิ้ว ยาว 18-36 นิ้ว ส่วนมากแล้วผลจะโค้ง หักงอ

5. กลุ่ม dudaim ผลมีขนาดเล็กเท่าผลส้มเกลี้ยง เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ลักษณะผลกลมหรือรูปไข่ อายุเก็บเกี่ยวสั้น ผิวเปลือกมีหลายสีน้ำตาลคล้ายหินอ่อน มีกลิ่นมาก

6. กลุ่ม chito บางครั้งเรียก mango melon หรือ lemon cucumber ผลมีขนาดเล็กเท่าผลมะนาว ผิวเรียบ มีหลายสี เนื้อมีรสเปรี้ยว นิยมใช้ดอง

7. กลุ่ม conomon บางครั้งเรียก oriental pickling melon ผลขนาดใหญ่ รูปร่างต่าง ๆ กัน ผิวเรียบ อาจมีร่องตามความยาวของผล เปลือกผิวสีเขียวซีด สีส้มแดง สีเหลือง สีเขียว สีขาวเทาอมเขียว สีน้ำตาลเขียวปนเหลือง เนื้อแตงซุยและสีส้มจาง กลิ่นหอมปานกลางถึงกลิ่นฉุนแบบแตงไทยพันธุ์พื้นเมือง รสจัดออกเปรี้ยว

2.3 ลักษณะทางพันธุกรรมบางประการของ *Cucumis melo* L.

จากการรายงานของ Sagaret (1826) (อ้างถึงใน Nonnecke, 1922) ได้ทำการผสมระหว่าง muskmelon เพื่อศึกษาการแสดงออกของลูกผสมชั่วที่หนึ่ง (F1) พบว่า ลักษณะสีผิวของผล (skin color) สีเหลือง ควบคุมด้วยยีนเด่น สีขาวควบคุมด้วยยีนด้อย ลักษณะผิวเปลือกของผล (epidermis) ผิวขรุขระมีตาข่ายร่างแหควบคุมด้วยยีนเด่น ผิวเรียบไม่มีตาข่ายร่างแหควบคุมด้วยยีนด้อย ลักษณะร่องที่ผล (sutures) ร่องลึกควบคุมด้วยยีนเด่น ร่องตื้นควบคุมด้วยยีนด้อย รสชาติ (flavor) รสเปรี้ยว ควบคุมด้วยยีนเด่น รสหวานควบคุมด้วยยีนด้อย

จากการรายงานของ Lumsden (1914) (อ้างถึงใน Nonnecke, 1922) ได้ทำการผสมระหว่าง muskmelon เพื่อศึกษาการแสดงออกของลูกผสมชั่วที่สอง (F2) พบว่า ลักษณะสีผิวของผล (skin color) สีเหลืองควบคุมด้วยยีนเด่น สีเขียวควบคุมด้วยยีนด้อย ลักษณะผิวเปลือกของผล (epidermis) ผิวขรุขระมีตาข่ายร่างแหควบคุมด้วยยีนเด่น ผิวเรียบไม่มีตาข่ายร่างแหควบคุมด้วยยีนด้อย ลักษณะรูปร่างผล (fruit shape) รูปร่างกลมควบคุมด้วยยีนเด่น รูปร่างกลมรีและรูปไข่ควบคุมด้วยยีนด้อย ขนาดของผล (size of fruit) ผลขนาดใหญ่ควบคุมด้วยยีนเด่น ผลขนาดเล็กควบคุมด้วยยีนด้อย และขนาดเมล็ด (seed size) เมล็ดขนาดใหญ่ควบคุมด้วยยีนเด่น เมล็ดขนาดเล็กควบคุมด้วยยีนด้อย

2.4 พันธุกรรมและลักษณะการแสดงออกของยีน

ลักษณะของสิ่งมีชีวิตสามารถแบ่งตามพื้นฐานทางพันธุศาสตร์ได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะทางคุณภาพ (Qualitative traits) เป็นลักษณะที่ควบคุมด้วยยีนน้อยคู่โดยแต่ละคู่จะแสดงออกอย่างเด่นชัด การกระจายตัวของยีนในรุ่นลูกชั่วต่างๆ สามารถจัดเป็นกลุ่มได้อย่างชัดเจน โดย

สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการแสดงออกน้อย เช่น ลักษณะสีเนื้อ สีผลและความต้านทานโรค เป็นต้น และลักษณะทางปริมาณ (Quantitative traits) เป็นลักษณะที่ควบคุมด้วยยีนหลายตัว โดยแต่ละตัวจะแสดงลักษณะออกไม่เด่นชัด การกระจายตัวของยีนในรุ่นลูกชั่วต่างๆ ไม่สามารถจัดเป็นกลุ่มได้อย่างชัดเจน ซึ่งสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการแสดงออกมาก เช่น น้ำหนักผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ และความหนาเนื้อผลของแคนตาลูป เป็นต้น (บุญหงษ์, 2548) (อ้างอิงใน คเชนทร์, 2551)

แคนตาลูปมีการแสดงออกของเพศดอกแตกต่างกันไป ซึ่งเพศดอกที่แสดงออกถูกควบคุมด้วยยีนสองคู่ ได้แก่ ยีน *A* และยีน *G* ซึ่งจีโนไทป์แบบ *A_ G_*, *aa G_*, *A_ gg* และ *aa gg* ให้ดอกแบบ monoecious, andromonoecious, gynomonoecious และ hermaphrodite ตามลำดับ (Kalloo and Bergh, 1993) Wall (1967) ซึ่งศึกษาพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะรูปร่างผลของแคนตาลูป พบว่า ลักษณะผลรูปไข่ควบคุมด้วยยีนข่ม (*O*) ต่อลักษณะผลกลม Lumsden (1914) (อ้างอิงใน คเชนทร์, 2551) พบว่า ลักษณะผลกลมแบบผลส้ม (spherical) ถูกควบคุมด้วยยีน *sp* ซึ่งข่มไม่สมบูรณ์ต่อลักษณะผลกลมป้าน (obtusate) ในด้านสีของผล Hagiwara and Kamimura (1936) (อ้างอิงใน คเชนทร์, 2551) รายงานว่า มียีน *Y* ที่ควบคุมลักษณะผิวเปลือกสีเหลืองซึ่งข่มต่อลักษณะผิวเปลือกสีขาว ส่วน Hughes (1948) รายงานว่า ในพันธุ์ Honeydew และพันธุ์ Smith's Perfect มียีน *w* ที่ควบคุมลักษณะผิวเปลือกสีขาวซึ่งเป็นลักษณะด้อยต่อลักษณะผิวเปลือกสีเขียวเข้ม พบว่ายีน 2 ยีนที่ควบคุมตาข่ายร่างแหบนเปลือกผล ได้แก่ ยีน *N* ควบคุมผลที่มีตาข่ายร่างแห และยีน *n* ควบคุมผลที่มีผิวเรียบ (Ramaswamy *et al.*, 1997) จากการทดลองของ Kubicki (1962) พบว่า เมื่อผลยังไม่สุกสีผิวเปลือกจะถูกควบคุมด้วยยีน *Wi* ทำให้เปลือกผลมีสีขาว ซึ่งข่มต่อลักษณะผิวเปลือกสีเขียว นอกจากนี้ที่ผิวเปลือกยังมีการแสดงออกของแถบ (striped epicarp) ซึ่งเป็นลักษณะด้อยและถูกควบคุมด้วยยีน *st* (Hagiwara and Kamimura, 1936) (อ้างอิงใน คเชนทร์, 2551) และลักษณะผิวเป็นร่องตื้นๆ ของแคนตาลูปถูกควบคุมด้วยยีน *ri* ซึ่งเป็นยีนด้อย (Takada *et al.*, 1975) (อ้างอิงใน คเชนทร์, 2551) จากการทดลองของ Hughes (1948) (อ้างอิงใน คเชนทร์, 2551) รายงานว่า ยีนที่ควบคุมลักษณะเนื้อสีเขียว (*gf*) ถูกข่มด้วยยีนที่ควบคุม ลักษณะเนื้อสีส้ม (*gf+*) ใน Honeydew พันธุ์ Smith's Perfect ส่วน Clayberg (1992) พบว่า มียีนที่ควบคุมลักษณะเนื้อสีขาว (*wf*) ซึ่งเป็นลักษณะด้อยต่อลักษณะเนื้อสีส้ม (*wf+*) ขณะที่ Ganesan (1988) รายงานว่ายีนที่ควบคุมลักษณะเนื้อละเอียด (*Me+*) ข่มต่อลักษณะเนื้อกรอบ (*Me*) ส่วนกลิ่นและรสชาติของแคนตาลูปมียีนที่ควบคุมกลิ่นหอมซึ่งข่มต่อกลิ่นที่ไม่หอม (*Mu*) ส่วนยีนที่ควบคุมความเปรี้ยว (*So+*) ข่มต่อยีนควบคุมปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ (*So*) (Kubicki, 1962) และจากรายงานของ Zheng and Wolff (2000) พบว่า เมล่อนกลุ่มเนื้อสีส้มมีการผลิตเอทิลีนมากและอัตราการเน่าเสียมากกว่าเมล่อนกลุ่มเนื้อสีเขียวหรือขาว

2.4.1 ความดีเด่นของลักษณะ

ความดีเด่นของลักษณะคือ ลักษณะที่ลูกผสมมีความแข็งแรง ให้ผลผลิต ด้านทานต่อโรคและแมลง และให้ลักษณะอื่นๆ ดีกว่า หรือสูงกว่าลักษณะนั้นของพันธุ์พ่อแม่ ความดีเด่นของลักษณะอาจเกิดจากการที่พืชอยู่ในสภาพลูกผสมหรือเฮเทอโรไซกัส (heterozygous) จึงพบความดีเด่นระดับสูงในลูกผสม F_1 ของลูกผสมระหว่างสายพันธุ์ของพืชผสมข้าม ความดีเด่นของลูกผสมในพืชชนิดเดียวกันนั้น อาจมีความแตกต่างกัน ถ้าพันธุ์หรือสายพันธุ์ที่นำมาผสมมีความแตกต่างกัน ยิ่งกว่านั้นแม้เป็นลูกผสมชุดเดียวกัน แต่อัตราความดีเด่นในช่วงรุ่นต่างๆ จะแตกต่างกัน การวัดความดีเด่นของลูกผสมอาจวัดได้ 2 วิธีคือ 1) ความดีเด่นเหนือค่าเฉลี่ยของพ่อแม่หรือที่เรียกว่า เฮเทอโรซิส (heterosis) วัดโดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่ คือวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของลูกต่อค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่ การวัดโดยวิธีนี้แสดงให้เห็นว่าลักษณะดังกล่าวมีการแสดงออกของยีนในลักษณะข่ม และ 2) วัดโดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อหรือแม่ที่ดีกว่า การวัดวิธีนี้เป็น การวัดคุณสมบัติในด้านการใช้ประโยชน์ คือนำค่าเฉลี่ยของลูกไปเปรียบเทียบกับพันธุ์พ่อหรือแม่ที่ให้ลักษณะที่ดี เรียกวิธีการวัดแบบนี้ว่า เฮเทอโรเบลติอซิส (heterobeltiosis) (ไพศาล และคณะ, 2546)

จากรายงานของสุรชาติ (2554) และอารักษ์ (2555) ศึกษาความดีเด่นของลูกผสมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะของผลในลูกผสมระหว่างแดงไทยกับแคนตาลูป พบว่า ความดีเด่นของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อหรือแม่ที่ดีกว่ามีความผันแปรไปในแต่ละคู่ผสมโดยลักษณะน้ำหนักผลพบในคู่ผสม RML1 x KML370 และ LML1 x KML370 ความยาวผลพบในคู่ผสม RML1 x KML370 และ RML1 x PII48 และดัชนีรูปร่างผลพบในคู่ผสม RML1 x KML370 และความดีเด่นของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อหรือแม่ที่ดีกว่ามีค่าเป็นบวก แสดงให้เห็นว่าลูกผสมในช่วงที่ 1 มีความดีเด่นของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อหรือแม่ที่ดีกว่า ในขณะที่ความกว้างผล ความหนาเนื้อ และความหวาน มีความดีเด่นของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อหรือแม่ที่ดีกว่ามีค่าเป็นลบ แสดงให้เห็นว่าลูกผสมในช่วงที่ 1 ให้ค่าเฉลี่ยในลักษณะอื่นๆ ต่ำกว่าพันธุ์พ่อหรือแม่ที่ดีที่สุด และจากรายงานของ Casals *et al.* (2012) พบว่า การประเมินความแตกต่าง (heterogeneity) ของมะเขือเทศกลุ่ม Penjar อาจเป็นผลมาจากอัลลีล *alc* ในพันธุ์พื้นเมืองที่แตกต่างกัน พันธุกรรมของอายุการเก็บรักษาประกอบด้วยยีนการกลายพันธุ์ *alc* มีความสัมพันธ์เชิงลบกับขนาดของผล ได้แก่ น้ำหนัก ความกว้าง ความยาว ดังนั้นลักษณะผลที่เล็กภายในสายพันธุ์ที่น่าจะใช้คัดเลือกอายุการเก็บรักษาให้ยาวนาน ส่วนของ Ayub *et al.* (1996) ได้ศึกษาการลดระดับการแสดงออกของเอทิลีน โดยใช้ยีนสัมพันธ์กับการสังเคราะห์ของเอทิลีน และการลดความไวต่อแสงของเอทิลีน ซึ่งยีนที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะทำการลดการส่งสัญญาณของเอทิลีน

โดยเปลี่ยนจากยีนตัวรับที่มีอยู่เดิม *ETRI* และ *ERSI* เป็น *CM-ETRI* และ *CM-ERSI* จากธนาคารยีน ทำให้เมล็ดอ่อนมีอายุการเก็บรักษาผลผลิตได้นานขึ้น

2.4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ (correlation) คือลักษณะต่างๆ ของพืชที่สัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์อาจเป็นไปได้ในทิศทางบวกหรือลบ ความสัมพันธ์นี้อาจเกิดจากการที่ลักษณะเหล่านี้ควบคุมโดยยีนกลุ่มเดียวกัน หรือการพัฒนาของลักษณะหนึ่งขึ้นอยู่กับพัฒนาของอีกลักษณะหนึ่ง คือ ลักษณะที่สัมพันธ์เพิ่มหรือลดด้วยกัน หรือลักษณะหนึ่งเพิ่มอีกลักษณะหนึ่งลด อาจเลือกความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะมาเป็นตัวช่วยในการคัดเลือกการปรับปรุงพันธุ์พืช ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของพืช วัดได้โดยใช้ค่าที่เรียกว่า สหสัมพันธ์ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ ความสัมพันธ์ทางลักษณะภายนอก (phenotypic correlation) ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (genetic correlation) และ ความสัมพันธ์ทางสภาพแวดล้อม (environmental correlation) (ไพศาล และคณะ, 2546)

จากรายงานของ Liu *et al.* (2004) พบว่า อายุการเก็บรักษาของผลเมล็ดอ่อนมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของเนื้อ ขนาดของเมล็ดและผล การหลุดร่วงของก้านดอก ระยะเวลาการพัฒนาของพืชและผล การเปลี่ยนสีเหลืองอย่างรวดเร็วของผิวที่ระยะการสุกแก่ ความหวาน สีของเนื้อ และผิวผล ซึ่งลักษณะเหล่านี้สังเกตเห็นโดยทั่วไปในกลุ่ม *saccharinus* และ *inodorus* ส่วนรายงานของ Koli and Murthy (2013) พบว่า เมล็ดอ่อนกลุ่ม *acidulus* และ *momordica* มีรูปร่างผล น้ำหนักผล สีเนื้อ คุณภาพของเนื้อ ความแน่นเนื้อ มีความสัมพันธ์อย่างมากกับอายุการเก็บรักษา ขณะที่ Manohar and Murthy (2012) พบว่า อายุการเก็บรักษาของผลในกลุ่ม *acidulous* มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของเนื้อ ความแน่นเนื้อ รูปร่างผล ความหนาเนื้อ สีเนื้อและความแข็งเปลือก ผลในกลุ่ม *momordica* และสำหรับสมเกียรติ และอารักษ์ (2558) พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ของน้ำหนักผล และความกว้างผล มีผลทางลบกับอายุการเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวระหว่างลูกผสมแต่งไทยกับแคนตาลูป ซึ่งถ้าใช้ลักษณะทั้งสองในการคัดเลือกจะทำให้มีอายุการเก็บรักษาลดลง

2.5 พันธุศาสตร์กับการปรับปรุงพันธุ์พืช

2.5.1 ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์พืช

การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ประสบความสำเร็จนั้น นักปรับปรุงพันธุ์พืชต้องมีการวางแผนการวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชโดยตั้งวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการปรับปรุงพันธุ์ จากนั้นจึงทำการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ธรรมชาติของพืชที่จะปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ ลักษณะการ

ผสมพันธุ์ ความหลากหลายทางพันธุกรรม ลักษณะทางการเจริญทั้งทางลำต้นและการเจริญในช่วงระยะเวลาสืบพันธุ์ การออกดอกกรติดผลและการเจริญเติบโตของผล การติดเมล็ด ข้อมูลทางพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เป็นลักษณะคุณภาพหรือลักษณะปริมาณ มียีนควบคุมที่คู่ การแสดงออกของยีน ค่าเสตเทอโรซิส อัตราพันธุกรรม ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงพันธุ์พืชได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทำให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ (วีรพันธ์ และสุทัศน์, 2554)

2.5.2 วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืช

การปรับปรุงพันธุ์พืชมีหลายวิธี มีทั้งวิธีการที่ง่าย เช่น การคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์ในพืชผสมตัวเอง และการคัดเลือกรวมในพืชผสมข้าม ไปจนถึงวิธีการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมพันธุ์แล้วนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการดำเนินงาน เช่น การตัดต่อยีนและการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก (molecular marker assisted selection; MAS) ซึ่งแต่ละวิธีการต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการพัฒนาหรือปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อให้พืชมีพันธุกรรมที่แสดงออกในลักษณะที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ หรือแสดงลักษณะที่ต้องการได้สูงที่สุด (วีรพันธ์ และสุทัศน์, 2554)

2.5.3 การเลือกใช้วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชที่เหมาะสม

เมื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชมีขั้นตอนของงานปรับปรุงพันธุ์ที่ชัดเจน มีข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วน ขั้นตอนต่อไปที่มีความสำคัญมากเช่นกัน คือ การเลือกใช้วิธีการปรับปรุงพันธุ์ให้มีความเหมาะสมกับพืชและระยะเวลา ดังนั้นการเลือกใช้วิธีการคัดเลือกจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ ในกรณีของพืชผสมตัวเองต้องการพันธุ์ที่มีความคงตัวของยีน จึงมักสร้างพันธุ์แท้ (pure line) โดยการปรับปรุงพันธุ์ให้บริสุทธิ์ จึงเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ การคัดเลือกแบบต้นต่อแถว รวงต่อแถว ฝักต่อแถว หรือใช้การผสมกลับเพื่อปรับปรุงบางลักษณะ ดังนั้นนักปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเองจึงให้ความสำคัญกับพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนแบบผลบวก (additive gene) มากกว่าแบบอื่น ส่วนการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมข้ามมักใช้ประโยชน์ของยีนทั้งแบบผลบวกและไม่เป็นผลบวก (non-additive gene) ในการปรับปรุงพันธุ์แบบคัดรวม (bulk) การสร้างพันธุ์ผสม (composite) การสร้างพันธุ์สังเคราะห์ (synthetic) และการสร้างพันธุ์ลูกผสม (hybrid) (วีรพันธ์ และสุทัศน์, 2554)

2.5.4 การผสมพันธุ์ในพืชชนิดเดียวกัน (intraspecific cross) หรือการผสมข้ามสายพันธุ์

การผสมพันธุ์ในพืชชนิดเดียวกัน (intraspecific cross) เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างฐานพันธุกรรมให้กับนักปรับปรุงพันธุ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในแผนงานปรับปรุงพันธุ์ ตัวอย่างเช่น การถ่ายยีน S-alleles ซึ่งเป็นยีนเด่นจากคะน้าเข้าสู่กะหล่ำดาว การคัดเลือกสายพันธุ์ที่ผสมตัวเองดี (self-compatible) ของลูกผสมกะหล่ำดอก การสร้างลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ “Calabrese-like line” ซึ่งเกิดจากการผสมข้ามระหว่างกะหล่ำดอกกับบร็อกโคลี (Inner, 1983) การถ่ายทอดลักษณะความยาวปล้อง รูปทรงใบ และลักษณะความเป็นพืชฤดูเดียว ในการผสมระหว่างกะหล่ำปลีกับบร็อกโคลี (Pelofske and Baggett, 1980) การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของลูกผสมในกลุ่ม Brassica oleracea ประกอบด้วยกะหล่ำปลี กะหล่ำดอก กะหล่ำปม กะหล่ำดาว คะน้าฝรั่ง และบร็อกโคลี (Yeager, 1943) สำหรับการศึกษาและการใช้ประโยชน์ในประเทศไทย เช่น การศึกษาความแปรปรวนแปรทางพันธุกรรมของการเจริญเติบโตและลักษณะฝักในการผสมระหว่างถั่วฝักยาวกับถั่วพุ่ม (สุภาพร, 2535) การศึกษาความแปรปรวนแปรทางพันธุกรรมในลักษณะผลและองค์ประกอบในผลผลิตของมะระ (พรรณเพ็ญ, 2532) การศึกษาการถ่ายทอดทางพันธุกรรมบางประการของมะเขือจาน 4 สายพันธุ์ (จรัสศรี, 2527) จากตัวอย่างข้างต้นสายพันธุ์พ่อแม่ที่ใช้เป็นสายพันธุ์บริสุทธิ์ (pure line) หรือสายพันธุ์แท้ (inbred line) และใช้วิธีวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยประชากร (generation mean analysis) ซึ่งทำให้ทราบถึงปฏิกริยาการทำงานของยีน ที่ควบคุมลักษณะต่างๆ ตลอดจนใช้วิธีวิเคราะห์ความดีเด่นของลูกผสม อัตราการถ่ายทอดทางพันธุกรรม และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพันธุ์ต่อไป สำหรับการทดลองที่ใช้พันธุ์พ่อแม่เป็นพันธุ์ผสมเปิด (open pollinated variety) เช่น การถ่ายทอดลักษณะรากและใบในลูกผสมระหว่างผักกาดหัวกับผักขี้หูด (กมล, 2521) ความแปรปรวนแปรทางพันธุกรรมของการเจริญเติบโตและผลผลิต ในการผสมระหว่างบร็อกโคลีกับคะน้าจีน (อารักษ์, 2538) ซึ่งใช้วิธีวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของชั่ว (generation mean analysis) ที่สามารถอธิบายปฏิกริยาของยีนที่ควบคุมลักษณะต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกัน

2.5.5 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของชั่ว (Generation mean analysis; GMA)

ในการปรับปรุงลักษณะปริมาณนั้น ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นที่ต้องทราบ คือวิธีการแสดงออกของยีน (gene action) ที่ควบคุมลักษณะนั้นๆ ว่าเป็นแบบบวก แบบข่ม หรือข่มข้ามคู่มากร้อยเพียงใด ทั้งนี้เพราะวิธีการแสดงออกของยีนจะเป็นตัวกำหนดวิธีการปรับปรุงลักษณะนั้นๆ วิธีการศึกษาการแสดงออกของยีนที่นิยมกันวิธีหนึ่งคือการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของชั่ว (ไพศาล และคณะ, 2546) เป็นการประมาณค่าการกระทำของยีนแบบต่าง ๆ 6 ค่า ได้แก่ mean (m), additive (d), dominance (h), additive x additive (i), additive x dominance (j) และ dominance x dominance (l)

โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยของประชากรอย่างน้อย 6 ประชากร (population) ได้แก่ ประชากรรุ่นแม่ (P_1), รุ่นพ่อ (P_2), รุ่นลูกผสมชั่วที่ 1 (F_1), รุ่นลูกผสมชั่วที่ 2 (F_2), รุ่นลูกผสมชั่วแรกกลับไปหาแม่ (BC_1P_1) และรุ่นลูกผสมชั่วแรกกลับไปหาพ่อ (BC_1P_2) หรืออาจเพิ่มประชากรอื่น ๆ อีกเช่น F_3 , BC_1P_1s , BC_1P_2s เพื่อให้มีการทดสอบ perfect fitted model ในทางสถิติได้อย่างเหมาะสมและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

สุรชาติ (2554) และอารักษ์ (2555) ได้รายงานการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยลักษณะของผลของประชากรทั้ง 6 ประชากร ใน 4 คู่ผสม พบว่ามีความแตกต่างระหว่างชั่วรุ่นทุกลักษณะที่ศึกษา แสดงถึงความแปรปรวนทางพันธุกรรมระหว่างลูกผสมกับพันธุ์พ่อแม่ ซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นพ่อแม่ไปยังรุ่นลูก ส่วนรายงานของ สมเกียรติ (2557) ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยลักษณะของผลของประชากรทั้ง 6 ในคู่ผสมระหว่างแดงไทย RML1 กับ แคนดาลูป KML370 พบว่า น้ำหนักผล ความกว้างผล ความยาวผล และเปอร์เซ็นต์ความหวานสูงในลูกผสมชั่วที่ 1 ขณะที่ผลการรายงานของ คเชนทร์ (2551) พบว่า ประชากรลูกชั่วที่ 1 และ 2 ของ Apple Melon พันธุ์กรีนเฟิร์ส มีค่าเฉลี่ยของลักษณะปรากฏที่สำคัญต่างๆ ใกล้เคียงกัน และมีค่าความแปรปรวนของลักษณะปรากฏที่สำคัญต่างๆ ที่ต่ำและใกล้เคียงกัน และมีรายงานของสุกัญญา (2553) พบว่าประชากรลูกชั่วที่ 2 ของพันธุ์ Red sweet และ Bauh belwen มีค่าความแปรปรวนของลักษณะต่างๆ ที่ศึกษาสูงที่สุด ดัชนีผลลักษณะเปลือก ความแน่นเนื้อ ความหนาเนื้อ และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้

2.5.6 การกระทำของยีน (gene action)

2.5.6.1 แบบผลบวก (additive gene action)

ปฏิกริยาของยีนแบบผลบวก นั้นเป็นการเกิดจากยีนเด่นแบบบวกสะสม (cumulative) ทำให้เกิดความดีเด่นของลูกผสมที่อยู่เหนือขอบเขตของพ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่ เรียกว่า เกิด transgressive segregation ในประชากรชั่ว F_2 ซึ่งทำให้ นักปรับปรุงพันธุ์พืชสามารถทำการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีเด่นได้ตั้งแต่ในชั่วแรกๆ ทำให้เกิดความก้าวหน้าในการคัดเลือก และพันธุกรรมจะเข้าสู่ความสมดุล (equilibrium) หรือมีความคงตัว (fixed) ได้อย่างรวดเร็ว จึงเหมาะสำหรับการคัดเลือกพืชผสมตัวเองที่ต้องการพันธุ์แท้ซึ่งจะมีความคงตัวของยีนในตำแหน่งต่างๆ จากรุ่นสู่รุ่น และยังแสดงผลที่คงที่ในสภาพแวดล้อมต่างๆ อีกด้วย (วีรพันธ์ และสุทัส, 2554)

จากรายงานของ Rodriguez *et al.* (2010) พบว่า อายุการเก็บรักษาผลพบความแปรปรวนของยีนแบบบวกแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เช่นเดียวกันกับลักษณะคุณภาพอื่นๆ ในแต่ละการผสม ส่วนรายงานของสมเกียรติ (2557) เรื่องการศึกษาปฏิกริยาการทำงานของยีนที่ควบคุมลักษณะผลที่สัมพันธ์กับอายุการเก็บรักษาผลหลังการเก็บเกี่ยว พบว่า การแสดงออกของยีนแบบบวกและ

แบบข้ามควบคุมลักษณะนำหน้าผลที่ลดลง ไม่พบการแสดงออกของยีนแบบบวกกับแบบบวกควบคุม ลักษณะนำหน้าผลที่ลดลง และการแสดงออกของยีนแบบบวกกับแบบบวกมีแนวโน้มที่ควบคุม ลักษณะความแน่นเนื้อผล สำหรับปราโมทย์ และพรทิพย์ (2551) ได้ทำการศึกษาผลทางพันธุกรรมใน ลักษณะรูปร่างผลของแตงไทย พบว่า รูปร่างผลแบบ กลม:กลมรี:ยาว ของแตงไทยควบคุมโดยยีน 1 ตำแหน่ง และมีปฏิกริยาของยีนในแบบบวก

2.5.6.2 แบบไม่เป็นผลบวก (non-additive gene action)

ปฏิกริยาของยีนแบบไม่เป็นผลบวกเป็นปฏิกริยาของยีนที่ไม่มีความ ต่อเนื่องกันต่างจากปฏิกริยาของยีนแบบบวกสะสม ซึ่งรุ่นลูกจะมีความโดดเด่นแตกต่างจากรุ่นพ่อแม่ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะชั่วรุ่นแรก ๆ (early generation) จึงเป็นการยากที่จะคาดการณ์ความก้าวหน้า จากผลการคัดเลือก เนื่องจากในชั่วรุ่นถัดไป (late generation) ลักษณะเด่นเหล่านี้จะค่อย ๆ หายไปใน ระหว่างการคัดเลือก เช่น การคัดเลือกสายพันธุ์ให้มีลักษณะพันธุ์เบา (early variety) ลักษณะพันธุ์เบา จะแสดงออกมากในช่วงแรกๆ เมื่อคัดเลือกต่อในช่วงหลังๆ ลักษณะพันธุ์เบาจะค่อย ๆ หายไป ทำให้ได้ ได้ลักษณะพันธุ์หนัก (late variety) แทนเป็นต้น ปฏิกริยาของยีนแบบไม่เป็นผลบวกมีทั้งการกระทำ ของยีนในตำแหน่งเดียวกัน (dominance) และการกระทำของยีนที่ต่างตำแหน่งกัน (epistasis) (วีร พันธุ์ และสุทัศน์, 2554)

2.5.6.3 แบบข้าม (dominance)

ปฏิกริยาของยีนแบบข้าม เกิดจากยีนเด่น (dominance gene) ไปข้ามการ แสดงออกของยีนด้อย (recessive gene) ทำให้เกิดการแสดงออกของยีนเด่นเพียงอย่างเดียว และจะไม่ คงที่จากรุ่นพ่อแม่ไปยังรุ่นลูก ถ้าพบปฏิกริยาของยีนเช่นนี้นักปรับปรุงพันธุ์จะต้องใช้ความ ระวังระมัดระวังในการคัดเลือก โดยไปในช่วงหลังๆ เพื่อให้พันธุกรรมที่ควบคุมมีการคงตัวก่อน นอกจากนี้ การกระทำของยีนแบบข้ามมีโอกาสที่จะเกิดความดีเด่นของลูกผสม ซึ่งนักปรับปรุงพันธุ์พืชสามารถ ใช้ประโยชน์โดยการสร้างลูกผสม (วีรพันธุ์ และสุทัศน์, 2554)

จากรายงานของปราโมทย์ และคณะ (2555) ได้ประเมินการแสดงออกของยีนที่ควบคุม ลักษณะผลของแตงไทย 2 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ 'R-(S5)' ผลทรงกลม กับสายพันธุ์ 'S-(S5)' ผล ทรงกระบอก พบว่า ยีนแบบข้ามมีอิทธิพลในลักษณะอายุออกดอกตัวผู้ อายุเก็บเกี่ยวผลแรก ความยาว ผล ความยาวโพรงผล และความหนาเนื้อผล และมีอิทธิพลมากกว่ายีนแบบบวก (additive) ส่วน รายงานของ Sagaret (1826) (อ้างถึงใน Nonnecke, 1922) ได้ทำการผสมระหว่าง muskmelon เพื่อ ศึกษาการแสดงออกของลูกผสมชั่วที่หนึ่ง (F₁) พบว่า ลักษณะสีผิวของผล (skin color) สีเหลือง ควบคุมด้วยยีนเด่น สีขาวควบคุมด้วยยีนด้อย ลักษณะผิวเปลือกของผล (epidermis) ผิวขรุขระมีตา

ขำยร่างแหควคุมด้วยยีนเด่น ผิวเรียบไม่มีตาขำยร่างแหควคุมด้วยยีนด้อย ลักษณะร่างที่ผล (sutures) ร่างลึกควคุมด้วยยีนเด่น ร่างตื้นควคุมด้วยยีนด้อย รสชาติ (flavor) รสเปรี้ยวควคุมด้วยยีนเด่น รสหวานควคุมด้วยยีนด้อย และจากรายงานของ Lumsden (1914) (อ้างถึงใน Nonnecke, 1922) ได้ทำการผสมระหว่าง muskmelon เพื่อศึกษาการแสดงออกของลูกผสมชั่วที่สอง (F_2) พบว่า ลักษณะสีผิวของผล (skin color) สีเหลืองควคุมด้วยยีนเด่น สีเขียวควคุมด้วยยีนด้อย ลักษณะผิวเปลือกของผล (epidermis) ผิวขรุขระมีตาขำยร่างแหควคุมด้วยยีนเด่น ผิวเรียบไม่มีตาขำยร่างแหควคุมด้วยยีนด้อย ลักษณะรูปร่างผล (fruit shape) รูปร่างกลมควคุมด้วยยีนเด่น รูปร่างกลมรีและรูปไข่ควคุมด้วยยีนด้อย ขนาดของผล (size of fruit) ผลขนาดใหญ่ควคุมด้วยยีนเด่น ผลขนาดเล็กควคุมด้วยยีนด้อย และขนาดเมล็ด (seed size) เมล็ดขนาดใหญ่ควคุมด้วยยีนเด่น เมล็ดขนาดเล็กควคุมด้วยยีนด้อย

2.5.6.4 แบบข่มขำมคู่ (epistasis)

ปฏิกริยาของยีนแบบข่มขำมคู่ เกิดจากอิทธิพลของยีนที่อยู่ต่างตำแหน่งที่ควคุมลักษณะเดียวกันมากกว่า 1 คู่ ยีนคู่หนึ่งไปมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของยีนคู่อื่นอีกคู่หนึ่งในลักษณะเดียวกันหรือตำแหน่งเดียวกัน ทำให้สิ่งมีชีวิตแสดงลักษณะทางฟีโนไทป์ ที่แตกต่างจากการอธิบายแบบอื่น ๆ ปฏิกริยาของยีนแบบข่มขำมคู่ ของยีน 2 คู่ มี 3 รูปแบบคือ แบบบวกับแบบบวก แบบบวกับแบบข่ม และ แบบข่มกับแบบข่ม ผลจากปฏิกริยาของยีนแบบข่มขำมคู่นี้ทำให้ค่าเฉลี่ยของประชากรชั่วต่าง ๆ ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยการประมาณค่าจาก additive dominance model ได้ (วีรพันธ์ และสุทัศน์, 2554)

จากรายงานของ ปราโมทย์ และคณะ (2555) พบว่า ปฏิกริยาร่วมระหว่างยีนต่างตำแหน่งในลักษณะความกว้างผล ความยาวผล ความยาวโพรงผลและความหนาเนื้อผล โดยผลของปฏิกริยาของยีนแบบข่ม x แบบข่ม มีอิทธิพล มากที่สุดในการควคุมลักษณะดังกล่าว

2.5.7 อัตราพันธุกรรม

อัตราพันธุกรรม (heritability) คือ อัตราส่วนของวาเรียนซ์ที่เกิดจากผลของยีนหรืออัตราส่วนของความแปรปรวนแปร จัดเป็นค่าทางสถิติชนิดหนึ่ง และมีการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เป็นค่าที่ชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ อัตราพันธุกรรมสามารถแบ่งได้ 2 ชนิดดังนี้ อัตราพันธุกรรมแนวกว้าง (broad sense heritability) คือ อัตราส่วนของความแปรปรวนแปร ที่เกิดมาจากการแสดงผลของยีนทุกรูปแบบ และอัตราพันธุกรรมแนวแคบ (narrow sense heritability) คือ อัตราส่วนของความแปรปรวนแปร ที่เกิดจากยีนที่แสดงผลในแบบบวก อัตราพันธุกรรมอย่างแคบนี้จะชี้ให้เห็นถึงอัตราการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่ไปยังลูกหลาน (ไพศาล และคณะ, 2546)

จากรายงานของ Iathet and Piluek (2006) ซึ่งได้ทำการผสมระหว่างแดงไทย 2 สายพันธุ์ คือ RM1 และ LM2 เพื่อศึกษาอัตราพันธุกรรม พบว่าความกว้างผล ความยาวผล ดัชนีรูปร่างผลและน้ำหนักผลในลูกผสมมีอัตราพันธุกรรมแนวแคบสูงที่ระดับ 0.60, 0.68, 0.55 และ 0.71 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าอัตราการถ่ายทอดลักษณะความกว้างผล ความยาวผล ดัชนีรูปร่างผลและน้ำหนักผล จากพ่อแม่ไปยังลูกหลานได้สูง ส่วนสุรชาติ (2554) ได้ศึกษา อัตราพันธุกรรมแนวกว้างที่ได้จาก วาเรียนซ์ ของแต่ละประชากรทั้ง 4 กลุ่ม พบว่า น้ำหนักผล ความยาวผล และความหนาเนื้อ มีอัตราพันธุกรรมแนวกว้างค่อนข้างสูงระหว่าง 61.44-69.80, 43.09-75.94 และ 39.83-77.59 เปอร์เซนต์ตามลำดับ

2.5.7 ความดีเด่นของลักษณะ

ความดีเด่นของลักษณะ หมายถึง ปรากฏการณ์ที่ลูกผสมมีความแข็งแรง เจริญเติบโตให้ผลผลิต ด้านทานต่อโรคและแมลง ทนแล้ง และให้ลักษณะอื่น ๆ ดีกว่า หรือสูงกว่าลักษณะนั้นในพันธุ์พ่อแม่ ความดีเด่นของลักษณะอาจเกิดจากการที่พืชอยู่ในสภาพพันธุ์ทางหรือเฮเทอโรไซกัส (heterozygous) ดังนั้น จึงพบความดีเด่นระดับสูงในลูกผสม F_1 ของลูกผสมระหว่างสายพันธุ์ของพืชผสมข้าม ความดีเด่นของลูกผสมในพืชชนิดเดียวกัน อาจมีระดับแตกต่างกัน ถ้าพันธุ์หรือสายพันธุ์ที่นำมาผสมแตกต่างกัน ยิ่งกว่านั้นแม้เป็นลูกผสมชุดเดียวกัน แต่อัตราความดีเด่นในช่วงต้นต่าง ๆ จะแตกต่างกัน การวัดความดีเด่นของลูกผสมอาจวัดได้ 2 วิธีคือ 1) วัดโดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่ คือวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของลูกต่อค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่ การวัดวิธีนี้เรียกว่า ความดีเด่นเหนือค่าเฉลี่ยของพ่อแม่ หรือที่เรียกว่า เฮเทอโรซิส (heterosis) การวัดโดยวิธีนี้แสดงให้เห็นว่าลักษณะดังกล่าวมีการแสดงออกของยีนในลักษณะข่ม (ไพศาล และคณะ, 2546) และ 2) วัดโดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่ที่คิดว่า การวัดวิธีนี้เป็นการวัดคุณสมบัติในการใช้ประโยชน์ คือนำค่าเฉลี่ยของลูกไปเปรียบเทียบกับพันธุ์พ่อแม่ที่ให้ลักษณะที่ดี เรียกว่าวิธีการวัดแบบนี้ว่า เฮเทอโรเบลไตโอซิส (heterobeltiosis) (ไพศาล และคณะ, 2546)

จากรายงานของ Iathet and Piluek (2006) ซึ่งได้ทำการผสมระหว่างแดงไทย 2 สายพันธุ์ คือ RM1 และ LM2 เพื่อศึกษาอัตราพันธุกรรม ความดีเด่นของลูกผสม และสหสัมพันธ์ของลักษณะผลกับผลผลิต พบว่าจำนวนผลต่อต้นให้ค่าเฮเทอโรเบลไตโอซิสเท่ากับ 12.71% และผลผลิตรวมต่อต้นให้ค่าเฮเทอโรซิสเท่ากับ 8.20% แสดงให้เห็นว่าลูกผสมระหว่างแดงไทย 2 สายพันธุ์ให้จำนวนผลต่อต้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อหรือพันธุ์แม่ที่คิดว่า และให้ผลผลิตรวมต่อต้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่

2.5.8 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ (correlation) หมายถึงลักษณะต่าง ๆ ของพืชที่สัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์อาจเป็นไปในทางบวกหรือลบ คือ ลักษณะที่สัมพันธ์เพิ่มหรือลดด้วยกัน หรือลักษณะหนึ่งเพิ่มอีกลักษณะหนึ่งลด ความสัมพันธ์นี้อาจเกิดจากการที่ลักษณะเหล่านี้ควบคุมโดยยีนกลุ่มเดียวกัน หรือการพัฒนาของลักษณะหนึ่งขึ้นอยู่กับการพัฒนาของอีกลักษณะหนึ่ง อาจใช้ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะมาช่วยในการปรับปรุงพันธุ์พืช คือสามารถคัดเลือกทางอ้อม เช่น ถ้าผลผลิตสัมพันธ์กับจำนวนเมล็ดต่อต้น ก็ทำการคัดเลือกต้นที่มีเมล็ดมาก ๆ เพราะการคัดเลือกผลผลิตโดยตรงนั้นทำได้ยาก เนื่องจากมีอัตราพันธุกรรมต่ำ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของพืช วัดได้โดยใช้ค่าที่เรียกว่า สหสัมพันธ์ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ ความสัมพันธ์ทางลักษณะภายนอก (phenotypic correlation) ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (genetic correlation) และความสัมพันธ์ทางสภาพแวดล้อม (environmental correlation) (ไพศาล และคณะ, 2546) จากรายงานของ Iathet and Piluek (2006) ซึ่งได้ทำการผสมระหว่างแดงไทย 2 สายพันธุ์ คือ RM1 และ LM2 เพื่อศึกษาอัตราพันธุกรรม ความดีเด่นของลูกผสม และสหสัมพันธ์ของลักษณะผลกับผลผลิต พบว่าความกว้างผลมีสหสัมพันธ์ในทางลบกับความยาวผลและดัชนีรูปร่างผล รูปร่างผลและขนาดผลไม่มีสหสัมพันธ์กับจำนวนผลต่อต้นและผลผลิต ในขณะที่จำนวนผลต่อต้นมีสหสัมพันธ์ในทางบวกสูงกับผลผลิตต่อต้น แสดงให้เห็นว่าสหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะสามารถนำมาช่วยในการปรับปรุงพันธุ์พืช โดยการคัดเลือกทางอ้อมอาจจะทำการคัดเลือกทีละลักษณะ หรือทำการคัดเลือกทีละหลายลักษณะพร้อมกัน โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาสหสัมพันธ์

2.6 การใช้เครื่องหมายโมเลกุล (molecular marker)

ลักษณะบางลักษณะของพืช เช่นสีดอกอาจถูกควบคุมด้วยยีนเพียงยีนเดียวแต่ลักษณะอื่นๆ ที่มีความซับซ้อนเช่น ความสูง ความหวาน เปอร์เซ็นต์เนื้อหรือความหนาเนื้อ อาจควบคุมด้วยยีนหลายยีน ซึ่งนักปรับปรุงพันธุ์จะต้องคัดเลือกจากลักษณะภายนอกเพื่อนำมาวิเคราะห์ เรียกว่า ฟีนোটป์ (phenotype) โดยการคัดเลือกลักษณะที่มีความซับซ้อนนั้นค่อนข้างมีความยุ่งยาก ใช้เวลานาน มีค่าใช้จ่ายสูง และยังมีผลของสภาพแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้อง

ในปัจจุบันเครื่องหมายโมเลกุลได้ถูกนำมาวิเคราะห์ตรวจสอบความแตกต่างของลำดับที่จำเพาะของสิ่งมีชีวิต การวิเคราะห์เครื่องหมายโมเลกุลถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดการจำแนกความแตกต่างของสิ่งมีชีวิต ภายในชนิด (species) ประชากร (population) และพันธุ์ (varieties)

ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และสามารถคัดเลือกลักษณะที่ต้องการได้โดยตรง ซึ่งเครื่องหมายโมเลกุลที่ใช้ในปัจจุบันมีหลายชนิดในการปรับปรุงพันธุ์พืช เครื่องหมายโมเลกุล (Molecular marker) แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

2.4.1 เครื่องหมายโมเลกุลระดับโปรตีนหรือที่เรียกว่า เครื่องหมายโปรตีน (protein marker) เช่น โปรตีนที่สะสมในเมล็ด (seed storage protein) ซึ่งอาจตรวจสอบความแตกต่างโดยใช้วิธีอิเล็กโทรโฟรีซิส (electrophoresis) หรือไอโซไซม์ (isozyme) ซึ่งหมายถึงเอนไซม์ (enzyme) ที่ทำปฏิกิริยาเดียวกันแต่มีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบอาจมีขนาดหรือประจุต่างกัน ซึ่งสามารถแยกออกจากกันได้ด้วยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซิส และมักตรวจสอบโดยใช้ substrate ที่เปลี่ยนสีเมื่อเร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์ (ไพศาล และคณะ, 2546)

2.4.2 เครื่องหมายโมเลกุลระดับดีเอ็นเอหรือที่เรียกว่า เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA marker) ซึ่งเป็นดีเอ็นเอที่อยู่บนตำแหน่งเฉพาะในจีโนม (genome) โดยไม่จำเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของยีน เนื่องจากดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตแต่ละหน่วยอาจมีความแตกต่างกันของลำดับเบส จากการแทนที่ของเบส (base substitution) การขาดหายไปของดีเอ็นเอ (deletion) การเพิ่มขึ้นของดีเอ็นเอ (insertion) การเปลี่ยนแปลงกลับทิศทางของดีเอ็นเอ (inversion) หรือการย้ายสลับที่ของดีเอ็นเอระหว่างโครโมโซมที่ต่างคู่กัน (translocation) จึงทำให้เกิดความหลากหลายหรือความแตกต่าง (polymorphism) (ไพศาล และคณะ, 2546)

การตรวจสอบในระดับดีเอ็นเอทำได้โดยใช้ 2 วิธีการหลักคือ

1) วิธีการที่อาศัยหลัก nucleic acid hybridization

Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) หมายถึงความแตกต่างของขนาดท่อนดีเอ็นเอที่เกิดจากการตัดโดยเอนไซม์ตัดจำเพาะ (restriction enzyme) เป็นเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดแรกที่ยังนิยมใช้อยู่แพร่หลาย การตัดโมเลกุลดีเอ็นเอของจีโนมด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ เช่น EcoRI จะให้กลุ่มของท่อนดีเอ็นเอที่มีขนาดต่าง ๆ กันจำนวนมาก หลังจากแยกท่อนดีเอ็นเอโดยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซิส จะเห็นเป็นปื้นยาว (smear) ของท่อนดีเอ็นเอที่มีความยาวต่อเนื่องจากนั้นจะสามารถตรวจหาเฉพาะท่อนดีเอ็นเอที่ต้องการศึกษาที่ตำแหน่งเฉพาะในจีโนมได้โดยใช้ southern blot analysis และโพรบที่ต้องการ ในสิ่งมีชีวิตแต่ละหน่วยอาจมีความแตกต่างของลำดับเบสที่บริเวณหรือรอบบริเวณที่โพรบจับตัว ซึ่งอาจทำให้เกิดความแตกต่าง (polymorphism) ของขนาดท่อนดีเอ็นเอที่ตรวจสอบ (ไพศาล และคณะ, 2546)

Single Nucleotide Polymorphism (SNP) หมายถึงความแตกต่างของดีเอ็นเอที่ 1 นิวคลีโอไทด์ที่เกิดจากการกลายพันธุ์แบบ point mutation พบ SNPs จำนวนมากกระจายอยู่ทั่วจีโนม ซึ่งสามารถใช้โพรบดีเอ็นเอ (DNA probe) ที่เฉพาะเจาะจงกับอัลลีล (allele-specific oligonucleotides; ASO) เพื่อ

ตรวจสอบความแตกต่างนี้ ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม ASO จะ hybridize กับดีเอ็นเอที่มีลำดับเบสเป็นคู่สมกับ ASO ทุกเบสเท่านั้น จะไม่ hybridize กับดีเอ็นเอที่มีนิวคลีโอไทด์ต่างไปแม้เพียง 1 นิวคลีโอไทด์ ดังนั้นการนำ ASO ของแต่ละอัลลีลมาตรวจสอบ จะทำให้ทราบว่าดีเอ็นเอตัวอย่างประกอบด้วยอัลลีลใดบ้าง (ไพศาล และคณะ, 2546)

2) วิธีการที่อาศัยหลักปฏิกิริยาลูกโซ่ (polymerase chain reaction; PCR)

Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) ใช้หลักการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของจีโนมด้วยวิธี PCR โดยใช้ไพรเมอร์ความยาวประมาณ 10 คู่เบส ที่มีลำดับเบสตามที่กำหนดขึ้นมาไม่จำเพาะเจาะจงกับดีเอ็นเอบริเวณใด (arbitrary primer) เนื่องจากไพรเมอร์มีขนาดสั้น โอกาสเกิดลำดับเบสที่เป็นคู่สมกับไพรเมอร์มีประมาณ $(1/4)^{10}$ จึงทำให้เกิดการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเออย่างสุ่มพร้อมกันที่หลายตำแหน่งในจีโนม (multi locus) ทำให้ได้ท่อนดีเอ็นเอที่มีขนาดแตกต่างกัน ซึ่งแยกขนาดดีเอ็นเอได้โดยวิธีอิเล็กโตรโฟรีซิส ถึงมีชีวิตต่างยีนไทป์ สปีชีส์ จินัส ซึ่งมีความแตกต่างกันที่ระดับดีเอ็นเอ อาจให้รูปแบบของแถบดีเอ็นเอ (จำนวนและขนาด) ที่ต่างกัน (ไพศาล และคณะ, 2546)

Sequence Characterized Amplified Region (SCAR) หมายถึงท่อนดีเอ็นเอที่ตำแหน่งหนึ่งในจีโนม ซึ่งได้จากการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยวิธี PCR ด้วยไพรเมอร์ที่จำเพาะเจาะจง SCAR อาจได้รับการดัดแปลงมาจาก RAPD โดยการตัดแถบ RAPD ที่สนใจเพียง 1 แถบจากเจล นำมาหาลำดับเบสจากท่อนดีเอ็นเอนั้น แล้วจึงนำลำดับเบสที่ได้มาสร้างเป็นไพรเมอร์ขนาดยาวขึ้น เพื่อให้เฉพาะเจาะจงขึ้น จึงใช้เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอที่เพียงตำแหน่งเดียวในจีโนม (single locus) ได้ ให้แถบดีเอ็นเอเพียงแถบเดียว สังเกตความแตกต่างได้ว่าการมีหรือไม่มีแถบดีเอ็นเอ และขนาดของแถบดีเอ็นเอ ทำให้สามารถอ่านและแปลผลง่ายขึ้น (ไพศาล และคณะ, 2546)

Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP) อาศัยหลักการตรวจสอบความแตกต่างของท่อนดีเอ็นเอที่เกิดจากการตัดโดยเอ็นไซม์ตัดจำเพาะเช่นเดียวกับ RFLP แต่มีการประยุกต์นำเทคนิค PCR มาใช้ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้โพรบในการตรวจสอบ และสามารถตรวจสอบความแตกต่างที่หลายตำแหน่งในจีโนม (multilocus) เป็นวิธีการที่ไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับลำดับเบส และใช้ไพรเมอร์จำนวนจำกัด แต่ได้ผลที่เชื่อถือได้ (ไพศาล และคณะ, 2546)


Simple Sequence Repeat (SSR) หมายถึง ดีเอ็นเอขนาด 1 ถึง 6 นิวคลีโอไทป์ ที่เรียงตัวซ้ำๆ ต่อกัน (tandem repeats) พบได้ทั่วไปในจีโนมของพืช โดยเฉพาะส่วนที่เป็น intron และ 5, flanking region ของยีน บางครั้งเรียก SSR ว่า STR (short tandem repeats) หรือ microsatellite SSR มีวิวัฒนาการเร็วกว่าดีเอ็นเอที่อยู่ใกล้เคียง เนื่องจากไม่มีแรงกดดันจากการคัดเลือก ทำให้มีความแตกต่างกันมาก

(highly polymorphic) โดยเฉพาะที่จำนวนซ้ำของ repeats ในขณะที่ดีเอ็นเอที่อยู่ด้านข้างทั้ง 2 ด้านของ SSR ในแต่ละตำแหน่งนั้นมีลำดับเบสคงเดิม (conserved) ทำให้สามารถนำมาใช้สร้างไพรเมอร์ ที่มีลำดับเบสเป็นคู่สมกับบริเวณปลายทั้ง 2 ด้านของ repeats นั้นได้ หลังจากทำปฏิกิริยา PCR จะให้ท่อนดีเอ็นเอที่มีขนาดแตกต่างกันตามจำนวน repeats และแยกขนาดได้โดยวิธีอิเล็กโตรโฟเรซิส (ไพศาล และคณะ, 2546)

Inter-Simple Sequence Repeats (ISSR) ใช้หลักการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอที่อยู่ระหว่าง SSR โดยใช้ไพรเมอร์ที่เป็นคู่สมกับลำดับเบสของ SSR เนื่องจากมี SSR ที่มีลำดับเบสเหมือนกันอยู่หลายแห่ง จึงเพิ่มปริมาณพร้อมกันที่หลายตำแหน่งในจีโนม ได้ท่อนดีเอ็นเอที่มีขนาดแตกต่างกันตามระยะห่างระหว่าง SSR นั้นๆ เมื่อนำมาแยกขนาดโดยวิธีอิเล็กโตรโฟเรซิส จะพบจำนวนและขนาดแถบดีเอ็นเอที่ต่างกัน วิธีนี้ไพรเมอร์ที่ใช้แต่ละคู่สามารถตรวจสอบความแตกต่างที่หลายตำแหน่งในจีโนม (multilocus) (ไพศาล และคณะ, 2546)

ซึ่งเป็นเครื่องหมายโมเลกุลที่ใช้จำแนกความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตได้ดี เนื่องจากความแปรปรวนของจำนวนซ้ำสูง หรือมีความหลากหลายของจำนวนอัลลีลและมีอยู่มากมายหลายตำแหน่งในจีโนม (Weising *et al.*, 1998) inter-simple sequence repeat (ISSR) จึงเป็นเครื่องหมายโมเลกุลที่มีระดับความแตกต่างสูง เทคนิค ISSR วิธีการนี้ได้นำมาใช้ทำการทดลองและมีรายงานการทดลองกับพืชหลากหลายชนิด เช่น ใช้ในการจำแนกความหลากหลายทางของสายพันธุ์ชา (Mondal, 2002) ใช้ในการจำแนกความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์ถั่ว (Ajibade *et al.*, 2000) ใช้ในการจำแนกความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์แอปเปิ้ล (Goulao and Oliveira, 2001) ใช้ในการจำแนกความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์มะเขือเทศ (Tikunov *et al.*, 2003) นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคนิค ISSR ในการหาเครื่องหมายโมเลกุลของยีนความหอมในข้าว (สุกัญญา และปรียา, 2547) จากรายงานของ Behera *et al.* (2008) ซึ่งได้ทำการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมใน Indian bitter gourd (*Momordica charantia* L.) จำนวน 38 พันธุ์ โดยใช้เทคนิค ISSR-PCR พบว่าเทคนิค ISSR-PCR มีประสิทธิภาพสูงในการจำแนกและวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช จากรายงานของ Stepansky *et al.* (1999) ซึ่งได้ทำการศึกษาการจำแนกและจัดกลุ่ม melon (*Cucumis melo* L.) จำนวน 54 พันธุ์ จาก 23 ประเทศ โดยใช้ลักษณะที่ปรากฏทางฟีโนไทป์ (phenotypic) และลักษณะที่ปรากฏในระดับโมเลกุล (molecular) โดยใช้เทคนิค ISSR-PCR พบว่าเทคนิค ISSR-PCR มีประสิทธิภาพในการจำแนกและวิเคราะห์ความใกล้ชิดทางพันธุกรรมของแตงเทศ และรายงานของ อารักษ์ (2558) ได้ทำการศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมและลักษณะสัณฐานวิทยาโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลของแตงเทศและแตงไทย จำนวน 25 พันธุ์ เป็นแตงเทศ 22 พันธุ์ และแตงไทย 3

พันธุ์ พบว่า เมื่อนำข้อมูลทางสัณฐานวิทยามาวิเคราะห์ความใกล้ชิดทางพันธุกรรมของแตงเทศและแตงไทย สามารถจัดได้ 9 กลุ่ม แต่ยังไม่สามารถแบ่งกลุ่มของแตงได้อย่างชัดเจน แต่เมื่อใช้เครื่องหมายโมเลกุล ISSR และ RAPD มาวิเคราะห์ข้อมูล สามารถจำแนกแตงได้เพียง 2 กลุ่มคือ กลุ่มของแตงเทศ และกลุ่มแตงไทย ซึ่งพบว่า มีเพียง 3 ไซโทรเมอร์ คือ ISSR_(GA)₈YG ISSR_(ATG)₆ และ RAPD_OPL07 จากทั้งหมด 13 ไซโทรเมอร์ เนื่องจากการจำแนกโดยใช้ลักษณะที่ปรากฏทางฟีโนไทป์ อาจมีความคลาดเคลื่อน ในกรณีที่แตงเทศ มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมสูงการใช้เครื่องหมายโมเลกุลเข้ามาเป็นตัวช่วยในการจำแนกหรือบ่งบอกความใกล้ชิดทางพันธุกรรมจึงทำให้งานทดลองมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วยิ่งขึ้น



บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปฏิกิริยาการทำงานของยีนที่ควบคุมลักษณะของผล และศึกษาเครื่องหมายโมเลกุล ที่สามารถแยกความแตกต่างของลักษณะผล แดงไทย และแคนตาลูป

3.1 วัสดุอุปกรณ์

1. เมล็ดพันธุ์แดงไทยพันธุ์ผสมเปิด คือ พันธุ์ RML1 เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะผลกลม มีลายตามความยาวของผล สีผลเมื่อแก่มีสีเหลืองเข้ม สีเนื้อในผลมีสีเขียวอมส้ม
2. เมล็ดพันธุ์แคนตาลูปพันธุ์ผสมเปิด 2 พันธุ์ คือ
 - 2.1 พันธุ์ KML370 เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะผลกลม มีลายเป็นตาข่ายร่างแหที่ผิวของผล สีผลเมื่อแก่มีสีเขียวอ่อน สีเนื้อในผลมีสีเขียวอมเหลือง
 - 2.2 พันธุ์ PI148 เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะผลรี มีลายตามความยาวของผล สีผลเมื่อแก่มีสีเหลืองส้ม สีเนื้อในผลมีสีส้ม รวมไปถึงประชากร F_1 , F_2 , BC_1 และ BC_2 จาก 2 คู่ผสมคือ RML1 x KML370 และ RML1 x PI148 (สนับสนุนเมล็ดพันธุ์จากโครงการวิจัยความแปรปรวนทางพันธุกรรมของการเจริญเติบโตและผลผลิตในการผสมระหว่างแดงไทยกับแดงแคนตาลูป, 2555)
3. ปู่ยไฮโดรโปรนิคส์
4. สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
5. เชือกฟาง
6. สายน้ำหยดระยะน้ำหยด 20 เซนติเมตร
7. ลวดสำหรับทำค้ำแต่ง
8. อุปกรณ์สำหรับวางระบบน้ำและการให้ปุ๋ยทางน้ำ
9. สมุดเทียบมาตรฐานสีของตัวอย่างพืช (Munsell Plant Tissue Colour Chart)
10. เครื่องดูดสารละลายปรับปริมาตร (Adjustable pipette)
11. เครื่องเขย่าสาร (Shaker)
12. เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge)
13. เครื่องผสมสารละลาย (Vortex mixer)
14. เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง และ 4 ตำแหน่ง

15. เครื่องส่องดูจุลภายใต้แสงอัลตราไวโอเล็ต (Ultraviolet transilluminator) พร้อมเครื่องบันทึกภาพลงแผ่นดิสก์

16. เครื่องแยกขนาดดีเอ็นเอแนวนอน (Horizontal gel electrophoresis apparatus)

17. เครื่องแยกขนาดดีเอ็นเอแนวตั้ง (Vertical/sequencing gel electrophoresis apparatus)

18. เครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ (Thermal cycler)

19. อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

3.2 ระยะเวลาการทดลอง

ตุลาคม พ.ศ. 2556 – พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

3.3 สถานที่ทำการทดลอง

ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาคารเครื่องมือ 3 (F3) และ 10 (F10) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3.4 วิธีการทดลอง

การทดลองที่ 1 : การเปรียบเทียบความแตกต่างของพันธุ์แดงไทย และแคนตาลูปที่ใช้เป็นพันธุ์พ่อแม่ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในพันธุ์

ก. แผนการทดลอง

การปลูกทดสอบ 6 ประชากร วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) โดยนำเมล็ดพันธุ์จากพันธุ์แม่ พันธุ์พ่อ ลูกผสมชั่วที่หนึ่ง (F_1) ลูกผสมชั่วที่สอง (F_2) ลูกผสมกลับไปยังพันธุ์แม่ (BC_1) และลูกผสมกลับไปยังพันธุ์พ่อ (BC_2) ไปปลูกดังนี้

พันธุ์แม่	ปลูก	4	แปลงย่อย รวม	40	ต้น
พันธุ์พ่อ	ปลูก	4	แปลงย่อย รวม	40	ต้น
ลูกผสมชั่วที่หนึ่ง (F_1)	ปลูก	8	แปลงย่อย รวม	80	ต้น
ลูกผสมชั่วที่สอง (F_2)	ปลูก	20	แปลงย่อย รวม	200	ต้น
ลูกผสมกลับไปยังพันธุ์แม่ (BC_1)	ปลูก	6	แปลงย่อย รวม	60	ต้น
ลูกผสมกลับไปยังพันธุ์พ่อ (BC_2)	ปลูก	6	แปลงย่อย รวม	60	ต้น

โดยแต่ละแปลงย่อยมีจำนวนต้นทั้งหมด 10 ต้น รวมจำนวนต้นที่ใช้เก็บข้อมูลทั้งหมด 960 ต้น

ข. การปลูกและการดูแลรักษา

การปลูกและการดูแลรักษา เตรียมวัสดุปลูก กลบ :ขุยมะพร้าว:ทราย ที่อัตราส่วน 2:1:1 โดยปริมาตร วางระบบน้ำหยดกลางร่อง ระยะน้ำหยด 20 เซนติเมตร และใช้ระยะปลูก 50 เซนติเมตร

หลังย้ายกล้า 14 วัน โดยสารละลายธาตุอาหารสูตร SUT NS5 (ภาคผนวก) หลังย้ายกล้า 45 วัน เลือกไว้ผลที่สมบูรณ์ 1 ผลต่อต้น กำจัดแมลงศัตรูพืช และโรคพืชตามการระบาด และอาการของโรค

3.5 การบันทึกข้อมูล ทำการบันทึกข้อมูลดังนี้

3.5.1 น้ำหนักผล บันทึกข้อมูลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต ชั่งน้ำหนักผล โดยใช้เครื่องชั่งหน่วยวัดเป็น กิโลกรัม

3.5.2 เส้นรอบวงผล บันทึกข้อมูลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยใช้สายวัดวัดรอบผล หน่วยวัดเป็น เซนติเมตร

3.5.3 ความหนาเปลือก บันทึกข้อมูลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยใช้เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ หน่วยวัดเป็น เซนติเมตร

3.5.4 ความหนาเนื้อ บันทึกข้อมูลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยใช้เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ หน่วยวัดเป็น เซนติเมตร

3.5.5 ความหนาไส้ บันทึกข้อมูลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยใช้เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ หน่วยวัดเป็น เซนติเมตร

3.5.6 ความกว้างผล บันทึกข้อมูลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยใช้ไม้บรรทัด หน่วยวัดเป็น เซนติเมตร

3.5.7 เปอร์เซ็นต์เนื้อ = ((ความกว้างผล-ความหนาเปลือก-ความหนาไส้)/ความกว้างผล) x100 หน่วยเป็น เปอร์เซ็นต์

3.5.8 ความยาวผล บันทึกข้อมูลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยใช้ไม้บรรทัด หน่วยวัดเป็น เซนติเมตร

3.5.9 ดัชนีรูปร่างผล บันทึกข้อมูลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยนำความยาวผลหารกับความกว้างผล

3.5.10 ความแน่นเนื้อ บันทึกข้อมูลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยใช้เครื่องวัดความแน่นเนื้อผลไม้ หน่วยวัดเป็น กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

3.5.11 ความหวาน บันทึกข้อมูลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยนำน้ำคั้นจากเนื้อผลมาวัดค่า Brix ด้วย hand refractometer หน่วยวัดเป็นเปอร์เซ็นต์

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

3.6.1 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยลักษณะผลของพันธุ์แดงไทยและแคนตาลูป โดยใช้โปรแกรมสถิติ SPSS v. 13.0

3.6.2 การวิเคราะห์ผลทางพันธุกรรม

3.6.2.1 การทำ scaling test เพื่อตรวจสอบว่าลักษณะนั้นๆ มีปฏิริยาสัมพันธ์ของยีนต่างตำแหน่งหรือไม่ Mather and Jinks (1982) ได้กำหนดตัวทดสอบไว้ 3 ตัว (A, B, C) โดยใช้ “ค่าเฉลี่ย” ของประชากรแต่ละชั่วรุ่นมาวิเคราะห์

1. คำนวณค่าตัวทดสอบ

$$A = 2\bar{B}_1 + \bar{P}_1 + \bar{F}_1$$

$$B = 2\bar{B}_2 + \bar{P}_2 + \bar{F}_1$$

$$C = 4\bar{F}_2 + 2\bar{F}_1 + \bar{P}_1 + \bar{P}_2$$

โดยหากว่าผลของยีนเป็นแบบบวกและแบบข่ม และไม่มีการยิดเกาะของยีน (linkage) และไม่มีปฏิริยาระหว่างยีนต่างตำแหน่ง ค่าทั้ง 3 จะได้เท่ากับ 0 หากทดสอบแล้วค่าของทั้ง A, B และ C มีค่าเท่ากับ 0 ก็จะวิเคราะห์ผลทางพันธุกรรมเฉพาะผลของยีนแบบบวกและข่มเท่านั้น (additive-dominance model) แต่หากว่ามีเพียงตัวใดตัวหนึ่งแตกต่างจาก 0 จะวิเคราะห์ผลทางพันธุกรรมของทั้งผลของยีนแบบบวก แบบข่ม และปฏิริยาสัมพันธ์ของยีนทั้ง 2 แบบ (non-allelic interaction model) โดยที่การทดสอบว่า A, B และ C มีค่าเท่ากับ 0 หรือไม่ ทดสอบโดยใช้ t-test

2. คำนวณค่าความแปรปรวนและค่า S.E. ของ A, B และ C

$$V_A = 4V(\bar{B}_1) + V(\bar{P}_1) + V\bar{F}_1$$

$$V_B = 4V(\bar{B}_2) + V(\bar{P}_2) + V(\bar{F}_1)$$

$$V_C = 16V\bar{F}_2 + 4V\bar{F}_1 + V\bar{P}_1 + V\bar{P}_2$$

ดังนั้น

$$S.E.(A) = (V_A)^{1/2}$$

$$S.E.(B) = (V_B)^{1/2}$$

$$S.E.(C) = (V_C)^{1/2}$$

3. การคำนวณค่า t และการทดสอบนัยสำคัญ

$$t_{(A)} = A/S.E.(A)$$

$$t_{(B)} = B/S.E.(B)$$

$$t_{(C)} = C/S.E.(C)$$

นำค่า t ที่คำนวณมาเปรียบเทียบกับค่า t ตาราง โดยที่ค่า df ในการทดสอบ ค่า A , B และ C ได้มาจากผลรวมของ df ของความแปรปรวนของประชากรและชั่วรุ่นที่นำมาใช้ในการคำนวณค่า A , B และ C ตามลำดับ

3.6.2.2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของชั่วรุ่นกรณีที่เป็น additive-dominance model วิเคราะห์ตามวิธีการของ Mather and Jinks (1982) โดยใช้วิธีการถ่วงน้ำหนัก (weighted least square method) และใช้เมทริกซ์แอลจีบรา (algebra matrix) ในการแก้สมการเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ของ additive-dominance model โดยมีการให้สัญลักษณ์ ดังนี้

m = ค่าเฉลี่ยประชากร

d = ผลของยีนแบบบวก (additive effect)

h = ผลของยีนแบบข่ม (dominance effect)

และค่าความแปรปรวนของพารามิเตอร์ดังกล่าวโดยมีสมการอยู่ในรูปของเมทริกซ์ ดังนี้

$$M = [B_1' \times B]^{-1} \times [B_1' \times C]^{-1}$$

$$V = D \times V_1$$

โดยที่ M คือ เมทริกซ์ของพารามิเตอร์

B คือ เมทริกซ์ของสัมประสิทธิ์ของพารามิเตอร์

B_1 คือ เมทริกซ์ของค่าถ่วงน้ำหนัก (weighted)

B_1' คือ transpose ของเมทริกซ์ B_1

C คือ เมทริกซ์ของค่าเฉลี่ยของประชากรทั้ง 6 ชั่วรุ่น

V คือ เมทริกซ์ของค่าความแปรปรวน (variance) ของพารามิเตอร์

V_1 คือ เมทริกซ์ของค่าความแปรปรวน (variance) ของประชากรทั้ง 6 ชั่วรุ่น

D คือ เมทริกซ์ของค่ายกกำลังสองแต่ละค่าในเมทริกซ์

$$[B_1' \times B]^{-1} \times B_1'$$

ซึ่งใช้โปรแกรมสถิติ SPSS v. 13.0 คำนวณวิธีการถ่วงน้ำหนัก (weighted least square method) และใช้เมทริกซ์แอลจีบรา (matrix algebra) ในการแก้สมการเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ของ additive-dominance model (m , d , h) และค่าความแปรปรวนของพารามิเตอร์ (V_m , V_d , V_h) ดังนี้

$$S.E.(m) = (V_m)^{1/2}$$

$$S.E.(d) = (V_d)^{1/2}$$

$$S.E.(h) = (V_h)^{1/2}$$

การคำนวณค่า t และการทดสอบนัยสำคัญ

$$t_{(m)} = m/S.E.(m)$$

$$t_{(d)} = d/S.E._{(d)}$$

$$t_{(h)} = h/S.E._{(h)}$$

ค่า t จากตารางที่ $df = \infty$ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และ 0.01 = 1.960 และ 2.576 ตามลำดับ

3.6.2.3 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของชั่วรุ่นกรณีที่เป็น non-allelic interaction model ในกรณีนี้อิทธิพลของยีนที่มีผลต่อลักษณะนอกจากจะมีอิทธิพลของยีนแบบบวกและแบบข่มแล้ว ยังมีอิทธิพลร่วมระหว่างยีนต่างตำแหน่งของยีนแบบบวกและแบบข่มดังกล่าว โดยมีการให้สัญลักษณ์ของอิทธิพลหรือผลของยีนรูปแบบต่างๆ ดังนี้

m = ค่าเฉลี่ยประชากร

d = ผลของยีนแบบบวก (additive effect)

h = ผลของยีนแบบข่ม (dominance effect)

i = ผลร่วมกันระหว่างยีนแบบบวกกับแบบบวก (additive x additive type of gene interaction)

j = ผลร่วมกันระหว่างยีนแบบบวกกับแบบข่ม (additive x dominance type of gene interaction)

l = ผลร่วมกันระหว่างยีนแบบข่มกับแบบข่ม (dominance x dominance type of gene interaction)

วิเคราะห์ตามวิธีการของ Mather and Jinks (1982) โดยใช้เมทริกซ์ แอลจีบรา (algebra matrix) ในการแก้สมการเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ของ non-allelic interaction model (m, d, h, i, j, l) และค่าความแปรปรวนของพารามิเตอร์ดังกล่าว โดยมีสมการที่อยู่ในรูปของเมทริกซ์ดังนี้

$$M = B^{-1} \times C$$

$$V = E \times V_1$$

โดยที่ M คือเมทริกซ์ของพารามิเตอร์

B คือ เมทริกซ์ของสัมประสิทธิ์ของพารามิเตอร์

B^{-1} คือ inverse ของเมทริกซ์ B

C คือ เมทริกซ์ของค่าเฉลี่ยของประชากรทั้ง 6 ชั่วรุ่น

V คือ เมทริกซ์ของค่าความแปรปรวน (variance) ของพารามิเตอร์

V_1 คือ เมทริกซ์ของค่าความแปรปรวน (variance) ของประชากรทั้ง 6 ชั่วรุ่น

E คือ เมทริกซ์ของค่ายกกำลังสองแต่ละค่าในเมทริกซ์ B^{-1}

ซึ่งใช้โปรแกรมสถิติ SPSS v. 13.0 คำนวณวิธีการถ่วงน้ำหนัก (weighted least square method) และใช้เมทริกซ์แอลจีบรา (algebra matrix) ในการแก้สมการเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ของ non-

allelic interaction model (m, d, h, i, j, l) และค่าค่าความแปรปรวนของพารามิเตอร์ ($V_m, V_d, V_h, V_i, V_j, V_l$) ดังนี้

$$S.E.(m) = (V_m)^{1/2}$$

$$S.E.(d) = (V_d)^{1/2}$$

$$S.E.(h) = (V_h)^{1/2}$$

$$S.E.(i) = (V_i)^{1/2}$$

$$S.E.(j) = (V_j)^{1/2}$$

$$S.E.(l) = (V_l)^{1/2}$$

การคำนวณค่า t และการทดสอบนัยสำคัญ

$$t_{(m)} = m/S.E.(m)$$

$$t_{(d)} = d/S.E.(d)$$

$$t_{(h)} = h/S.E.(h)$$

$$t_{(i)} = m/S.E.(i)$$

$$t_{(j)} = d/S.E.(j)$$

$$t_{(l)} = h/S.E.(l)$$

ค่า t จากตารางที่ $df = \infty$ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และ 0.01 = 1.960 และ 2.576 ตามลำดับ

3.6.3 การศึกษาอัตราพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะของผล นำข้อมูล วาเรียนซ์ของพันธุ์พ่อ พันธุ์แม่ ลูกผสมชั่วที่ 1 และลูกผสมชั่วที่ 2 ที่ได้ไปวิเคราะห์อัตราพันธุกรรมแนวกว้าง (broad sense heritability) เพื่อศึกษาอัตราพันธุกรรมแนวกว้าง ตามวิธีที่เสนอโดย Burton (1951)

$$h_b^2 = \left[\frac{V_{F_2} - \left(\frac{V_{P_1} + V_{P_2} + V_{F_1}}{3} \right)}{V_{F_2}} \right] \times 100$$

เมื่อ V_{P_1} คือค่า mean square ของ P_1

V_{P_2} คือค่า mean square ของ P_2

V_{F_1} คือค่า mean square ของ F_1

V_{F_2} คือค่า mean square ของ F_2

3.6.4 การศึกษาความดีเด่นของลูกผสมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะของผล นำข้อมูล พันธุ์พ่อ พันธุ์แม่ และลูกผสมชั่วที่ 1 ที่ได้ไปวิเคราะห์ความดีเด่นของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์

พ่อแม่ (heterosis) และวิเคราะห์ความดีเด่นของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อหรือพันธุ์แม่ที่ดีกว่า (heterobeltiosis) เพื่อศึกษาความดีเด่นของลูกผสม ตามวิธีที่เสนอโดย Falcorner (1981) ความดีเด่นของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่

$$\text{Heterosis (\%)} = \left(\frac{\bar{F}_1 - \overline{MP}}{\overline{MP}} \right) \times 100$$

เมื่อ \bar{F}_1 คือค่าเฉลี่ยของลูกผสมชั่วที่ 1

\overline{MP} คือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่

การทดสอบนัยสำคัญโดยการเปรียบเทียบค่า t-statistics ดังนี้

$$t_{(MP)} = \frac{\bar{F}_1 - \overline{MP}}{S_1}$$

$$S_1 = \sqrt{\frac{(n_{P_1} - 1)MS_{P_1} + (n_{P_2} - 1)MS_{P_2} + MS_{F_1}}{(n_{P_1} + n_{P_2})[(n_{P_1} - 1) + (n_{P_2} - 1)] + n_{F_1}}}$$

โดยที่ MS_{P_1} คือค่า mean square ของพันธุ์แม่

MS_{P_2} คือค่า mean square ของพันธุ์พ่อ

MS_{F_1} คือค่า mean square ของลูกผสมชั่วที่ 1

n คือจำนวนต้นในชั่วนั้น ๆ

ความดีเด่นของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อหรือพันธุ์แม่ที่ดีกว่า

$$\text{Heterobeltiosis (\%)} = \left(\frac{\bar{F}_1 - \overline{HP}}{\overline{HP}} \right) \times 100$$

เมื่อ \bar{F}_1 คือค่าเฉลี่ยของลูกผสมชั่วที่ 1

\overline{HP} คือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อหรือพันธุ์แม่ที่ดีกว่า

การทดสอบนัยสำคัญโดยการเปรียบเทียบค่า t-statistics ดังนี้

$$t_{(HP)} = \frac{\bar{F}_1 - \overline{HP}}{S_2}$$

$$S_2 = \sqrt{\frac{MS_{F_1} + MS_{HP}}{n_{F_1} + n_{HP}}}$$

เมื่อ MS_{F_1} คือค่า mean square ของลูกผสมชั่วที่ 1

MS_{HP} คือค่า mean square ของพันธุ์พ่อหรือพันธุ์แม่ที่ดีกว่า

n คือจำนวนต้นในชั่วนั้น ๆ

3.6.5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของผล นำข้อมูลลูกผสมชั่วที่ 2 ที่ได้ไปวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ (phenotypic correlation) เพื่อศึกษาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ ตามวิธีที่เสนอโดย Briggs and Knowles (1967)

$$r = \sqrt{\frac{\sum X_i Y_i - \frac{(\sum X_i)(\sum Y_i)}{n}}{\left[\sum X_i^2 - \frac{(\sum X_i)^2}{n} \right] \left[\sum Y_i^2 - \frac{(\sum Y_i)^2}{n} \right]}}$$

โดยที่ X_i คือค่าสังเกตของลักษณะ X ที่ i

Y_i คือค่าสังเกตของลักษณะ Y ที่ i

เมื่อ $i = 1, 2, 3, \dots, n$ ($n =$ จำนวนค่าสังเกต)

3.6.6 การศึกษาปฏิบัติการทำงานของยีนที่ควบคุมลักษณะของผล วิเคราะห์ตามวิธีการ Chi-square (Mather, 1957) เพื่อหาความสอดคล้องระหว่างสัดส่วนของค่าคาดหวังกับค่าจริงที่ได้ การหาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อแยกลักษณะเด่นทางฟีโนไทป์ ของประชากรในแต่ละชั่ว

การสกัดสารพันธุกรรมดีเอ็นเอจากใบแดง เก็บตัวอย่างใบแดงประชากรทั้ง 6 (P_1, P_2, F_1 และ F_2) อายุ 14 วัน จำนวน 4-6 ใบ จากนั้นทำการบดใบแดงให้เป็นผงละเอียดในไนโตรเจนเหลว 3 รอบ แล้วนำไปเก็บที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส ในหลอดโพลีเอธิลีน

การเตรียมสารสกัดบัฟเฟอร์ (extraction buffer) ทำการเตรียมสารสกัดบัฟเฟอร์ในหลอด โพลีโพรพิลีนขนาด 50 มิลลิลิตร โดยดวงสารละลายสารสกัด (extraction solution; 0.1 M Tris-HCl pH 8.5, 0.5% sarcosil, 1.4 M NaCl, 20 mM EDTA, 2.5 % CTAB) ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ลงในหลอด จากนั้นเติมโพลีไวนิลโพลีไพร์โรลิโดน (polyvinyl-polypyrrolidone; PVPP) ปริมาณ 250 มิลลิกรัม แล้วนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10-15 นาที ผสมให้เข้ากัน หลังจากนั้นเติม 2 เปรอร์เซนต์ เบต้าเมอร์แคปโตเอทานอล (β -mercaptoethanol) แล้วนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ก่อนนำไปใช้

การสกัดดีเอ็นเอ ทำการสกัดดีเอ็นเอตามวิธีการของ Gusmini *et al.*, 2004 แต่มีการปรับแต่งวิธีการเล็กน้อย โดยเริ่มจากการนำผงตัวอย่าง ปริมาณ 50-100 มิลลิกรัม ใส่ในหลอดแต่ละหลอดไมโครเซนติฟิวจ์ขนาด 1.5 มิลลิลิตร แล้วเติมสารสกัดบัฟเฟอร์ปริมาตร 700 ไมโครลิตร และผสมให้เข้ากัน จากนั้นนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที โดยเขย่าหลอดทดลองทุก ๆ 10 นาที หลังจากนั้นเติมสารละลายคลอโรฟอร์ม:ไอโซเอมิลแอลกอฮอล์ (24:1) ปริมาตร 500 ไมโครลิตร เขย่าให้เข้ากันจนสีของสารละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกัน (สีเขียวอ่อน) แล้วเปิดฝาหลอดทดลองเพื่อให้แก๊สระเหยออกไป จากนั้นนำไปปั่นเหวี่ยงเป็นเวลา 5 นาที ที่ความเร็ว 12,500 รอบต่อนาที ดูดสารละลายชั้นบนใส่ในหลอดไมโครเซนติฟิวจ์หลอดใหม่ จากนั้นเติมไอโซโพรพานอลแช่เย็นลงไปเท่ากับปริมาตรสารละลายที่ดูมาแล้วผสมให้เข้ากันด้วยการพลิกหลอดไปมาและนำไปแช่ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที จากนั้นนำมาปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 12,500 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที เติสารละลายไอโซโพรพานอลแล้วล้างตะกอนด้วย 70% เอทานอล ปริมาตร 500

ไมโครลิตร แล้วนำไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 12,500 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นเทส่วนใสทิ้งแล้วปล่อยให้แห้งที่อุณหภูมิห้องแล้วค่อยละลายตะกอนด้วยบัฟเฟอร์ 1X TE ปริมาตร 100 ไมโครลิตร เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส สำหรับใช้เป็นแม่แบบในการทำพีซีอาร์ เพื่อเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอต่อไป

การเพิ่มปริมาณชิ้นดีเอ็นเอด้วยวิธีพีซีอาร์ นำตัวอย่างดีเอ็นเอมาทำการเจือจางให้ได้ 20 เท่า จากนั้นนำดีเอ็นเอที่ได้ไปใช้เป็นดี-เอ็นเอแม่แบบในการเพิ่มจำนวนชิ้นดีเอ็นเอด้วยไพรเมอร์ดังตารางที่ 1 ตามสภาวะพีซีอาร์ต่าง ๆ โดยภายในแต่ละหลอดพีซีอาร์จะมีปริมาตรสุดท้าย 50 ไมโครลิตร ประกอบด้วยดีเอ็นเอแม่แบบ, 0.4 ไมโครโมลาร์ สำหรับ ISSR และ RAPD ไพรเมอร์, 0.2 ไมโครโมลาร์ dNTPs, 2 ไมโครโมลาร์ MgCl₂, 1x บัฟเฟอร์ที่ไม่มี MgCl₂ (promega) และ 1.0 ไมโครลิตร Taq DNA polymerase โดยมีสภาวะพีซีอาร์ของขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: 1 รอบ ที่อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เวลา 5 นาที

ขั้นตอนที่ 2: 35 รอบ ที่อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เวลา 30 วินาที, 37 องศาเซลเซียส (ขึ้นอยู่กับแต่ละไพรเมอร์ดังตารางที่ 1) เวลา 45 วินาที และ 72 องศาเซลเซียส เวลา 2 นาที

ขั้นตอนที่ 3: 1 รอบ ที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เวลา 5 นาที

จากนั้นนำมาวิเคราะห์บน 3 เปอร์เซ็นต์ เจลอะกาโรส ในสารละลายบัฟเฟอร์ 1x TAE และเปรียบเทียบกับขนาดค้ำดีเอ็นเอมาตรฐาน (DNA mass ladder 100 bp, Promega) แล้วย้อมด้วย เอธิเดียมโบรไมด์ (EtBr) ความเข้มข้น 0.1 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นเวลา 5 นาที และล้างด้วยน้ำ 20 นาที


ตารางที่ 3.1 ลำดับนิวคลีโอไทด์ของไพรเมอร์ และอุณหภูมิแอนเนลลิง (Annealing temperature) ที่ใช้

Reference	Primer name*	Sequence (3'---->5')	Annealing Temp. (°C)
Stepansky <i>et al.</i> , 1999	ISSR_(GA) ₈ YG	GAGAGAGAGAGAGAYG	47.9
	ISSR_(ATG) ₆	ATGATGATGATGATGATG	46.9
UBC primer set	RAPD_OPL07	AGGCGGGAAC	37.0

การให้คะแนนแถบดีเอ็นเอ ให้คะแนน “1” เมื่อปรากฏแถบดีเอ็นเอเหมือนพันธุ์พ่อ และให้คะแนน “0” เมื่อปรากฏแถบดีเอ็นเอเหมือนพันธุ์แม่ ในพันธุ์พ่อแม่และระหว่างกลุ่มของดีเอ็นเอที่ทำการเปรียบเทียบ

3.6.7 การวิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลสัดส่วนของการปรากฏหรือไม่ปรากฏของแถบดีเอ็นเอ ไปวิเคราะห์ตามวิธีการ Chi-square เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของค่าคาดหมายกับค่าจริง ที่ได้ โดยเทียบกับสัดส่วน 3:1 เมื่อเป็น dominant marker

3.6.8 หาความเชื่อมโยงระหว่างเครื่องหมายโมเลกุลกับลักษณะสีเปลือก สีเนื้อ และรูปร่าง ผล โดยการวิเคราะห์ single regression ระหว่างแต่ละเครื่องหมายโมเลกุลบน linkage group กับ ลักษณะที่สนใจ หากเครื่องหมายโมเลกุลใดแสดงนัยสำคัญทางสถิติแสดงว่ามีความเชื่อมโยงกับ พันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะนั้น และวิเคราะห์ multiple regression เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มเครื่องหมายโมเลกุลกับลักษณะแสดงออกที่สนใจ โดยใช้โปรแกรม โปรแกรมสถิติ SPSS v. 13.0 ในการวิเคราะห์ทั้ง 2 ขั้นตอน



บทที่ 4

ผลการทดลองและวิจารณ์

4.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของแดงไทยและแคนตาลูปที่ใช้เป็นพันธุ์พ่อแม่ และวิเคราะห์ความสม่ำเสมอภายในพันธุ์

พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของแดงไทยและแคนตาลูปที่ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ทุกลักษณะที่ทำการศึกษามีอย่างน้อยสองพันธุ์ที่ให้ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยเชิงทางสถิติ (ตารางภาพผนวกที่ 1) โดยแดงไทยพันธุ์ RML1 ให้ค่าเฉลี่ยของลักษณะน้ำหนักเนื้อ ความหนาเนื้อ ความหนาไส้ ความกว้างผล และเปอร์เซ็นต์เนื้อ สูงกว่าแคนตาลูปทั้ง 2 พันธุ์ แดงไทยพันธุ์ RML1 และแคนตาลูปพันธุ์ KML370 ให้ค่าเฉลี่ยของลักษณะเส้นรอบวงผล ความหนาเปลือก และความแน่นเนื้อใกล้เคียงกัน และสูงกว่าแคนตาลูปพันธุ์ PI148 ในขณะที่แคนตาลูปพันธุ์ PI148 ให้ค่าเฉลี่ยของลักษณะความยาวผล และดัชนีรูปร่างผล สูงกว่าแดงไทยพันธุ์ RML1 และแคนตาลูปพันธุ์ KML370 ในขณะที่แคนตาลูปพันธุ์ KML370 ให้ค่าเฉลี่ยของลักษณะความหวานสูงสุด ซึ่งเหมาะต่อการศึกษาคความแปรปรวนทางพันธุกรรม และปฏิกิริยาของยีนที่ควบคุมลักษณะต่างๆ จากค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในแต่ละพันธุ์ มีค่าต่ำทุกลักษณะแสดงให้เห็นถึงความสม่ำเสมอภายในพันธุ์ (แสดงในตารางที่ 4.1)

ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยลักษณะผลของพันธุ์แดงไทย (*Cucumis melo* L. var. *conomon*) และแคนตาลูปกับ (*Cucumis melo* L. var. *reticularis* Naudin.)

พันธุ์	น้ำหนักผล (kg)	เส้นรอบวงผล (cm)	ความหนาเปลือก (cm)	ความหนาเนื้อ (cm)	ความหนาไส้ (cm)
	$\bar{X} \pm SE$	$\bar{X} \pm SE$	$\bar{X} \pm SE$	$\bar{X} \pm SE$	$\bar{X} \pm SE$
RML1	1.05±0.03 ^{a1}	39.19±0.59 ^a	0.50±0.01 ^a	2.46±0.08 ^a	6.43±0.17 ^a
KML370	0.61±0.03 ^b	31.55±0.49 ^a	0.50±0.00 ^a	1.73±0.05 ^b	5.52±0.11 ^b
PI148	0.82±0.04 ^b	30.51±0.59 ^b	0.42±0.02 ^b	1.61±0.08 ^b	5.70±0.08 ^b
CV (%)	27.65	10.49	13.39	22.62	13.53

¹ ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรที่ต่างกันมีความแตกต่างทางสถิติในระดับ 0.01 จากการเปรียบเทียบโดยวิธี Duncan's New Multiple Range Test (DMRT)

ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยลักษณะผลของพันธุ์แดงไทย (*Cucumis melo* L. var. *conomon*) และแคนตาลูปกับ (*Cucumis melo* L. var. *rectularis* Naudin.) (ต่อ)

พันธุ์	ความกว้างผล	%เนื้อ	ความยาวผล	ดัชนี	ความแน่นเนื้อ	ความหวาน
	(cm)	(%)	(cm)	รูปร่างผล	(kg/cm ³)	(%Brix)
	$\bar{X} \pm SE$	$\bar{X} \pm SE$	$\bar{X} \pm SE$	$\bar{X} \pm SE$	$\bar{X} \pm SE$	$\bar{X} \pm SE$
RML1	12.37±0.17 ^{a1}	43.97±1.11 ^a	12.81±0.37 ^b	1.05±0.04 ^c	1.05±0.08 ^a	5.82±0.25 ^b
KML370	9.92±0.17 ^b	39.50±0.67 ^b	11.98±0.51 ^b	1.21±0.05 ^b	1.04±0.12 ^a	8.49±0.57 ^a
PI148	9.74±0.20 ^b	36.79±0.97 ^c	15.99±0.29 ^a	1.67±0.04 ^a	0.64±0.05 ^b	5.32±0.20 ^b
CV (%)	10.53	14.80	18.77	21.75	62.78	35.57

¹ ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรที่ต่างกันมีความแตกต่างทางสถิติในระดับ 0.01 จากการเปรียบเทียบโดยวิธี Duncan's New Multiple Range Test (DMRT)

4.2 การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของลักษณะของผลในลูกผสมระหว่างแดงไทยและแคนตาลูป

1. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยลักษณะของผลในประชากรทั้ง 6 ประชากร

กลุ่มสมที่ 1 RML1 x KML370 (แสดงในตารางที่ 4.2) พบว่า ค่าเฉลี่ยลักษณะน้ำหนักรวมผล เส้นรอบวงผล ความหนาเปลือก ความหนาเนื้อ ความหนาไส้ ความกว้างผล เปอร์เซ็นต์เนื้อ ความยาวผล ดัชนีรูปร่างผล ความแน่นเนื้อ และความหวาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และค่าเฉลี่ยของลักษณะความหนาเปลือกไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งพบค่าเฉลี่ย F_1 ที่มีค่าสูงกว่าพันธุ์พ่อและแม่ในลักษณะน้ำหนักรวมผล (1.07 กิโลกรัม) เปอร์เซ็นต์เนื้อ (43.86%) ความยาวผล (14.22 เซนติเมตร) และดัชนีรูปร่างผล (1.23) จากผลการทดลองแสดงให้เห็นแนวโน้มของปฏิกริยาของยีนแบบบวกจากค่าเฉลี่ยของ F_1 ที่มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่ ในลักษณะเส้นรอบวงผล ความหนาไส้ ความกว้างผล และความหวาน และมีแนวโน้มของปฏิกริยาของยีนแบบข่มจากค่าเฉลี่ยที่มากกว่า หรือน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่ ในลักษณะน้ำหนักรวมผล ความหนาเนื้อ เปอร์เซ็นต์เนื้อ ความยาวผล ดัชนีรูปร่างผล และความแน่นเนื้อ

กลุ่มสมที่ 2 RML1 x PI148 (แสดงในตารางที่ 4.3) พบว่า ค่าเฉลี่ยน้ำหนักรวมผล เส้นรอบวงผล ความหนาเปลือก ความหนาเนื้อ ความหนาไส้ ความกว้างผล เปอร์เซ็นต์เนื้อ ความยาวผล ดัชนีรูปร่างผล ความแน่นเนื้อ และความหวาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยค่าเฉลี่ยของ F_1 มีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่ในทุกลักษณะ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นแนวโน้มของปฏิกริยาของยีนแบบบวกจากค่าเฉลี่ยของ F_1 ที่มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่ ใน

ลักษณะความหนาเนื้อ ความหนาไส้ ความกว้างผล เปอร์เซ็นต์เนื้อ ความยาวผล และดัชนีรูปร่างผล และมีแนวโน้มของปฏิกิริยาของยีนแบบข่ม จากค่าเฉลี่ยที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่ ในลักษณะ น้ำหนักผล เส้นรอบวงผล ความหนาเปลือก ความแน่นเนื้อ และความหวาน

ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยลักษณะของผลจากประชากรทั้ง 6 ประชากร กลุ่มสมที่ 1 RML1 (*Cucumis melo* L. var. *conomon* ; P₁) กับ KML370 (*Cucumis melo* L. var. *reticularis* Naudin. ; P₂)

พันธุ์	น้ำหนักผล (kg) $\bar{X} \pm SE$	เส้นรอบวงผล (cm) $\bar{X} \pm SE$	ความหนาเปลือก (cm) $\bar{X} \pm SE$	ความหนาเนื้อ (cm) $\bar{X} \pm SE$	ความหนาไส้ (cm) $\bar{X} \pm SE$
P ₁	1.05±0.05 ^{a1}	39.19±0.75 ^a	0.50±0.01	2.46±0.08 ^a	6.43±0.15 ^a
P ₂	0.61±0.05 ^c	31.55±0.75 ^d	0.50±0.01	1.73±0.08 ^c	5.52±0.15 ^c
F ₁	1.07±0.03 ^a	36.42±0.53 ^b	0.50±0.00	2.38±0.05 ^a	6.09±0.11 ^{ab}
F ₂	0.77±0.02 ^b	34.35±0.34 ^c	0.50±0.00	2.00±0.03 ^b	5.94±0.07 ^b
BC ₁ P ₁	0.97±0.03 ^a	37.16±0.53 ^b	0.50±0.00	2.47±0.05 ^a	6.03±0.11 ^b
BC ₁ P ₂	1.02±0.05 ^a	35.49±0.75 ^{bc}	0.49±0.01	2.18±0.08 ^b	5.99±0.15 ^b
F-test	**	**	ns	**	**

¹ ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรที่ต่างกันมีความแตกต่างทางสถิติในระดับ 0.01 จากการเปรียบเทียบโดยวิธี Duncan's New Multiple Range Test (DMRT), ** แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ $P < 0.01$ และ ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ

ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยลักษณะของผลจากประชากรทั้ง 6 ประชากรในกลุ่มผสมที่ 1 RML1 (*Cucumis melo* L. var. *conomon* ; P₁) กับ KML370 (*Cucumis melo* L. var. *reticularis* Naudin. ; P₂) (ต่อ)

พันธุ์	ความกว้างผล	%เนื้อ	ความยาวผล	ดัชนีรูปร่าง	ความแน่นเนื้อ	ความหวาน
	(cm)	(%)	(cm)	ผล	(kg/cm ³)	(%Brix)
	$\bar{X} \pm SE$	$\bar{X} \pm SE$	$\bar{X} \pm SE$	$\bar{X} \pm SE$	$\bar{X} \pm SE$	$\bar{X} \pm SE$
P ₁	12.33±0.21 ^{a1}	43.80±0.92 ^a	12.88±0.48 ^{cd}	1.06±0.04 ^c	1.05±0.14 ^{a-c}	5.82±0.36 ^c
P ₂	9.96±0.22 ^d	39.14±0.96 ^c	11.93±0.50 ^d	1.20±0.05 ^b	1.12±0.15 ^{ab}	8.49±0.37 ^a
F ₁	11.69±0.15 ^b	43.86±0.66 ^a	14.22±0.35 ^b	1.23±0.03 ^b	0.82±0.10 ^{bc}	6.84±0.25 ^b
F ₂	10.97±0.10 ^c	41.10±0.42 ^{bc}	12.42±0.22 ^{cd}	1.14±0.02 ^{bc}	1.14±0.06 ^{ab}	7.47±0.16 ^b
BC ₁ P ₁	11.85±0.15 ^{ab}	44.90±0.66 ^a	13.50±0.35 ^{bc}	1.15±0.03 ^{bc}	0.75±0.10 ^c	6.85±0.26 ^b
BC ₁ P ₂	11.37±0.21 ^{cd}	42.61±0.92 ^{ab}	16.16±0.48 ^a	1.45±0.04 ^a	1.23±0.14 ^a	5.90±0.36 ^c
F-test	**	**	**	**	**	**

¹ ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรที่ต่างกันมีความแตกต่างทางสถิติในระดับ 0.01 จากการเปรียบเทียบโดยวิธี Duncan's New Multiple Range Test (DMRT), ** แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ $P < 0.01$

ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยลักษณะของผลจากประชากรทั้ง 6 ประชากรในกลุ่มผสมที่ 2 RML1(*Cucumis melo* L. var. *conomon* ; P₁) กับ PI148 (*Cucumis melo* L. var. *reticularis* Naudin.; P₂)

พันธุ์	น้ำหนักผล	เส้นรอบวงผล	ความหนาเปลือก	ความหนาเนื้อ	ความหนาไส้
	(kg)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)
	$\bar{X} \pm SE$	$\bar{X} \pm SE$	$\bar{X} \pm SE$	$\bar{X} \pm SE$	$\bar{X} \pm SE$
P ₁	1.05±0.04 ^{a1}	39.19±0.63 ^a	0.50±0.01 ^a	2.46±0.07 ^a	6.43±0.13 ^a
P ₂	0.82±0.04 ^{bc}	30.51±0.63 ^d	0.42±0.01 ^b	1.61±0.07 ^d	5.70±0.13 ^b
F ₁	0.85±0.03 ^b	32.48±0.45 ^c	0.50±0.01 ^a	1.87±0.05 ^c	5.99±0.09 ^b
F ₂	0.87±0.02 ^b	33.26±0.28 ^c	0.48±0.00 ^a	1.97±0.03 ^c	5.76±0.06 ^b
BC ₁ P ₁	0.96±0.03 ^a	37.37±0.45 ^b	0.49±0.01 ^a	2.23±0.05 ^b	6.30±0.09 ^a
BC ₂ P ₂	0.74±0.03 ^c	30.94±0.45 ^d	0.49±0.01 ^a	1.53±0.05 ^d	5.84±0.09 ^b
F-test	**	**	**	**	**

¹ ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรที่ต่างกันมีความแตกต่างทางสถิติในระดับ 0.01 จากการเปรียบเทียบโดยวิธี Duncan's New Multiple Range Test (DMRT), ** แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ $P < 0.01$

ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยลักษณะของผลจากประชากรทั้ง 6 ประชากรในกลุ่มผสมที่ 2 RML1 (*Cucumis melo* L. var. *conomon*; P₁) กับ PI148 (*Cucumis melo* L. var. *reticularis* Naudin.; P₂) (ต่อ)

พันธุ์	ความกว้างผล	%เนื้อ	ความยาวผล	ดัชนีรูปร่าง	ความแน่นเนื้อ	ความหวาน
	(cm)	(%)	(cm)	ผล	(kg/cm ³)	(%Brix)
	$\bar{X} \pm SE$	$\bar{X} \pm SE$	$\bar{X} \pm SE$	$\bar{X} \pm SE$	$\bar{X} \pm SE$	$\bar{X} \pm SE$
P ₁	12.37±0.20 ^{a1}	43.97±0.92 ^a	12.81±0.40 ^c	1.05±0.05 ^d	1.05±0.08 ^a	5.88±0.27 ^{bc}
P ₂	9.74±0.20 ^d	36.79±0.92 ^d	15.99±0.40 ^a	1.67±0.05 ^a	0.64±0.08 ^b	5.40±0.27 ^c
F ₁	10.70±0.14 ^c	39.13±0.65 ^c	14.04±0.28 ^b	1.33±0.03 ^c	0.58±0.05 ^b	7.08±0.19 ^a
F ₂	10.66±0.09 ^c	41.21±0.41 ^b	14.74±0.18 ^b	1.39±0.02 ^{bc}	0.62±0.03 ^b	6.43±0.12 ^b
BC ₁ P ₁	11.73±0.14 ^b	41.90±0.65 ^b	13.12±0.28 ^c	1.13±0.03 ^d	0.67±0.05 ^b	6.03±0.19 ^{bc}
BC ₂ P ₂	9.87±0.14 ^d	35.80±0.65 ^d	14.44±0.28 ^b	1.47±0.03 ^b	0.89±0.05 ^a	5.74±0.19 ^c
F-test	**	**	**	**	**	**

¹ ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรที่ต่างกันมีความแตกต่างทางสถิติในระดับ 0.01 จากการเปรียบเทียบโดยวิธี Duncan's New Multiple Range Test (DMRT), ** แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ $P < 0.01$

2. การศึกษาปฏิริยาการทำงานของยีนที่ควบคุมลักษณะของผล

การตรวจสอบปฏิริยาสัมพันธ์ของยีน

การทดสอบ scaling test ตามวิธีของ Mather (1949) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ additive-dominance model ในการตรวจสอบลักษณะของผล ว่ามีปฏิริยาสัมพันธ์ของยีนต่างตำแหน่งหรือไม่ จากการศึกษาประชากรทั้ง 6 ประชากร (P₁, P₂, F₁, F₂, BC₁P₁ และ BC₁P₂) ในกลุ่มผสมที่ 1 RML1 กับ KML370 และกลุ่มผสมที่ 2 RML1 กับ PI148 พบว่าค่า A, B และ C ของทั้ง 2 กลุ่มผสมในทุกลักษณะผลนั้นมีค่า A, B และ C มากกว่า 0 และมีค่า t ของ A, B และ C อย่างน้อย 1 ค่าที่ให้ความแตกต่างทางสถิติ ($P < 0.01$; ตารางที่ 4.4 และ 4.5) ผลทางพันธุกรรมของยีนเป็นแบบบวก แบบข่ม และปฏิริยาสัมพันธ์ของทั้ง 2 แบบ (non-allelic interaction model) โดยสังเกตจากค่าใดค่าหนึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติ หรือมีนัยสำคัญทางสถิติทั้ง 3 ค่า แสดงว่าเป็น non-allelic interaction model

ตารางที่ 4.4 Scaling test ของลักษณะของผล จากการศึกษาประชากรทั้ง 6 ประชากร (P_1 , P_2 , F_1 , F_2 , BC_1P_1 and BC_1P_2) ในกลุ่มผสมที่ 1 RML1 (*Cucumis melo* L. var. *conomon* ; P_1) กับ KML370 (*Cucumis melo* L. var. *reticularis* Naudin. ; P_2)

Scaling test	น้ำหนักผล	เส้นรอบวงผล	ความหนาเปลือก	ความหนาเนื้อ	ความหนาไส้
A	-0.18±0.00	-1.29±1.08	-0.001±0.00	0.11±0.01**	-0.46±0.04
B	0.35±0.00**	3.01±1.09**	-0.03±0.00	0.24±0.01**	0.37±0.06**
C	3.57±0.01**	139.49±1.59**	1.99±0.00**	8.59±0.02**	23.96±0.08**

** แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ $P < 0.01$

ตารางที่ 4.4 Scaling test ของลักษณะของผล จากการศึกษาประชากรทั้ง 6 ประชากร (P_1 , P_2 , F_1 , F_2 , BC_1P_1 and BC_1P_2) ในกลุ่มผสมที่ 1 RML1 (*Cucumis melo* L. var. *conomon* ; P_1) กับ KML370 (*Cucumis melo* L. var. *reticularis* Naudin. ; P_2) (ต่อ)

Scaling test	ความกว้างผล	%เนื้อ	ความยาวผล	ดัชนีรูปร่างผล	ความแน่นเนื้อ	ความหวาน
A	-0.38±0.07	2.67±2.63	-0.30±0.38	-0.01±0.00	-0.41±0.02	1.05±0.14**
B	0.94±0.15**	1.42±1.78	5.67±0.54**	0.44±0.01**	0.60±0.03**	-3.58±0.36
C	44.90±0.13**	170.10±3.67**	53.27±0.85**	4.73±0.01**	3.87±0.06**	29.56±0.47**

** แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ $P < 0.01$

ตารางที่ 4.5 Scaling test ของลักษณะของผล จากการศึกษาประชากรทั้ง 6 ประชากร (P_1 , P_2 , F_1 , F_2 , BC_1P_1 and BC_1P_2) ในกลุ่มผสมที่ 2 RML1 (*Cucumis melo* L. var. *conomon* ; P_1) กับ PI148 (*Cucumis melo* L. var. *reticularis* Naudin. ; P_2)

Scaling test	น้ำหนักผล	เส้นรอบวงผล	ความหนาเปลือก	ความหนาเนื้อ	ความหนาไส้
A	0.03±0.00**	3.08±0.56**	-0.02±0.00	0.13±0.01**	0.18±0.03**
B	-0.19±0.00	-1.10±0.69	0.06±0.00**	-0.43±0.01	-0.01±0.03
C	3.32±0.00**	128.32±1.33**	2.02±0.00**	7.52±0.02**	22.91±0.06**

** แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ $P < 0.01$

ตารางที่ 4.5 Scaling test ของลักษณะของผล จากการศึกษาระชากรทั้ง 6 ประชากร (P_1 , P_2 , F_1 , F_2 , BC_1P_1 and BC_1P_2) ในกลุ่มผสมที่ 2 RML1 (*Cucumis melo* L. var. *conomon*; P_1) กับ PI148 (*Cucumis melo* L. var. *reticularis* Naudin.; P_2) (ต่อ)

Scaling test	ความกว้างผล	%เนื้อ	ความยาวผล	ดัชนีรูปร่างผล	ความแน่นเนื้อ	ความหวาน
A	0.39±0.06**	0.69±1.48	-0.60±0.21	-0.12±0.00	-0.29±0.01	-0.89±0.11
B	-0.69±0.07	-4.31±1.26	-1.14±0.22	-0.06±0.00	0.56±0.01**	-1.00±0.12
C	41.94±0.13**	162.34±2.84**	58.24±0.47**	5.50±0.01**	1.96±0.02**	28.60±0.22**

** แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ $P < 0.01$

3. การศึกษาปฏิกริยาการทำงานของยีนที่ควบคุมลักษณะของผล

กลุ่มผสมที่ 1 RML1 กับ KML370 พบว่าค่าเฉลี่ยของชั่วจากประชากรทั้ง 6 ประชากร (แสดงในตารางที่ 4.6) ในลักษณะน้ำหนักผล เส้นรอบวงผล ความกว้างผล ความยาวผล และดัชนีรูปร่างผล มีการแสดงออกของยีนแบบข่ม และข่มข้ามคู่ ในการแสดงออกของยีนแบบข่มข้ามคู่ พบปฏิกริยาระหว่างยีนแบบบวกกับแบบบวก ลักษณะความหนาเนื้อ และเปอร์เซ็นต์เนื้อ มีการแสดงออกของยีนแบบบวก แบบข่ม และข่มข้ามคู่ ในการแสดงออกของยีนแบบข่มข้ามคู่ พบปฏิกริยาระหว่างยีนแบบบวกกับแบบบวก ลักษณะความหวาน มีการแสดงออกของยีนแบบบวก และข่มข้ามคู่ ในการแสดงออกของยีนแบบข่มข้ามคู่ พบปฏิกริยาระหว่างยีนแบบบวกและแบบข่ม และแบบข่มกับแบบข่ม

กลุ่มผสมที่ 2 RML1 กับ PI148 พบว่า ค่าเฉลี่ยของชั่วจากประชากรทั้ง 6 ประชากร (แสดงในตารางที่ 4.7) ในลักษณะน้ำหนักผล เส้นรอบวงผล ความหนาเนื้อ และความกว้างผล มีการแสดงออกของยีนแบบบวก และข่มข้ามคู่ ในการแสดงออกของยีนแบบข่มข้ามคู่ พบปฏิกริยาระหว่างยีนแบบบวกกับแบบข่ม ลักษณะความหนาไส้ มีการแสดงออกของยีนแบบบวก แบบข่ม และข่มข้ามคู่ ในการแสดงออกของยีนแบบข่มข้ามคู่ พบปฏิกริยาระหว่างยีนแบบบวกกับแบบบวก ลักษณะเปอร์เซ็นต์เนื้อ มีการแสดงออกของยีนแบบบวก และข่มข้ามคู่ ในการแสดงออกของยีนแบบข่มข้ามคู่ พบปฏิกริยาระหว่างยีนแบบบวกกับแบบข่ม และแบบข่มกับแบบข่ม ความยาวผล ดัชนีรูปร่างผล และความหวาน มีการแสดงออกของยีนแบบข่มข้ามคู่ ในการแสดงออกของยีนแบบข่มข้ามคู่ พบปฏิกริยาระหว่างยีนแบบข่มกับแบบข่ม ความแน่นเนื้อ มีการแสดงออกของยีนแบบข่มข้ามคู่ ในการแสดงออกของยีนแบบข่มข้ามคู่ พบปฏิกริยาระหว่างยีนแบบบวกกับแบบบวก

ค่าเฉลี่ยของชั่วจากประชากรทั้ง 6 ประชากร ที่ไม่พบการแสดงออกของยีนทุกรูปแบบในกลุ่มผสมที่ 1 RML1 กับ KML370 ในลักษณะ ความหนาเปลือก ความหนาไส้ และความแน่นเนื้อ และ

ในกลุ่มผสมที่ 2 RML1 กับ PI148 ในลักษณะความหนาเปลือก ซึ่งลักษณะดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมในการคัดเลือกไว้สำหรับโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์

ตารางที่ 4.6 ผลของยีนที่ควบคุมลักษณะของผล จากการศึกษาประชากรทั้ง 6 ประชากร (P_1 , P_2 , F_1 , F_2 , BC_1P_1 and BC_1P_2) ในกลุ่มผสมที่ 1 RML1 (*Cucumis melo* L. var. *conomon*; P_1) กับ KML370 (*Cucumis melo* L. var. *reticularis* Naudin; P_2)

ผลของยีน	น้ำหนักผล (kg)	เส้นรอบวงผล (cm)	ความหนาเปลือก (cm)	ความหนาเนื้อ (cm)	ความหนาไส้ (cm)
[m]	0.77±0.03**	34.35±0.38**	0.50±0.00**	2.00±0.05**	5.93±0.09**
[d]	-0.05±0.05	1.67±0.93	0.01±0.01	0.30±0.10*	0.04±0.19
[h]	1.11±0.15**	8.94±2.41**	-0.03±0.02	1.58±0.25**	0.40±0.49
[i]	0.87±0.14**	7.90±2.33**	-0.03±0.02	1.29±0.24**	0.29±0.47
[j]	-0.27±0.06	-2.15±1.00	0.01±0.01	-0.07±0.11	-0.41±0.22
[l]	-1.03±0.25	-9.62±4.11	0.06±0.04	-1.65±0.45	-0.19±0.86

*, ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ $P < 0.05$, $P < 0.01$

[m], [d], [h], [i], [j] และ [l] คือ ค่ากึ่งกลางระหว่าง homozygous recessive กับ homozygous dominance, การแสดงผลของยีนแบบบวก, แสดงผลของยีนแบบข่ม, ปฏิกริยาระหว่างยีนแบบบวกกับแบบบวก, แบบบวกกับแบบข่ม และ แบบข่มกับแบบข่ม ตามลำดับ

ตารางที่ 4.6 ผลของยีนที่ควบคุมลักษณะของผล จากการศึกษาประชากรทั้ง 6 ประชากร (P_1 , P_2 , F_1 , F_2 , BC_1P_1 and BC_1P_2) ในกลุ่มผสมที่ 1 RML1 (*Cucumis melo* L. var. *conomon*; P_1) กับ KML370 (*Cucumis melo* L. var. *reticularis* Naudin; P_2) (ต่อ)

ผลของยีน	ความกว้างผล (cm)	%เนื้อ (%)	ความยาวผล (cm)	ดัชนีรูปร่างผล	ความแน่นเนื้อ (kg/cm ³)	ความหวาน (%Brix)
[m]	10.92±0.13**	41.10±0.84**	12.26±0.37**	1.13±0.03**	1.09±0.08**	7.62±0.21**
[d]	0.56±0.29	2.86±1.19*	-2.57±0.59	-0.30±0.05	-0.50±0.12	0.89±0.36*
[h]	3.24±0.72*	15.14±3.13**	12.29±1.62**	0.76±0.14**	-0.75±0.39	-5.14±1.05
[i]	2.64±0.69**	12.30±2.92**	10.17±1.53**	0.66±0.13**	-0.50±0.37	-4.69±0.94
[j]	-0.66±0.32	0.63±1.36	-2.99±0.66	-0.22±0.06	-0.51±0.14	2.31±0.47**
[l]	-3.20±1.28	-16.39±5.49	-15.54±2.72	-1.09±0.24	0.32±0.59	7.21±1.72**

*, ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ $P < 0.05$, $P < 0.01$

[m], [d], [h], [i], [j] และ [l] คือ ค่ากึ่งกลางระหว่าง homozygous recessive กับ homozygous dominance, การแสดงผลของยีนแบบบวก, แสดงผลของยีนแบบข่ม, ปฏิกริยาระหว่างยีนแบบบวกกับแบบบวก, แบบบวกกับแบบข่ม และ แบบข่มกับแบบข่ม ตามลำดับ

ตารางที่ 4.7 ผลของยีนที่ควบคุมลักษณะของผล จากการศึกษาประชากรทั้ง 6 ประชากร (P_1 , P_2 , F_1 , F_2 , BC_1P_1 and BC_1P_2) ในกลุ่มผสมที่ 2 RML1 (*Cucumis melo* L. var. *conomon*; P_1) กับ PI148 (*Cucumis melo* L. var. *reticularis* Naudin; P_2)

ผลของยีน	น้ำหนักผล (kg)	เส้นรอบวงผล (cm)	ความหนาเปลือก (cm)	ความหนาเนื้อ (cm)	ความหนาไส้ (cm)
[m]	0.87±0.03**	33.26±0.40**	0.48±0.00**	1.97±0.05**	5.76±0.10**
[d]	0.23±0.03**	6.43±0.61**	0.00±0.01	0.70±0.06**	0.46±0.13**
[h]	-0.16±0.10	1.22±1.79	0.05±0.03	-0.52±0.18	1.16±0.37**
[i]	-0.08±0.09	3.59±1.66	0.01±0.02	-0.35±0.17	1.23±0.34**
[j]	0.11±0.04*	2.09±0.74*	-0.04±0.01	0.28±0.08**	0.09±0.16
[l]	0.24±0.16	-5.56±2.92	-0.05±0.04	0.65±0.31	-1.40±0.62

*, ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ $P < 0.05$, $P < 0.01$

[m], [d], [h], [i], [j] และ [l] คือ ค่ากึ่งกลางระหว่าง homozygous recessive กับ homozygous dominance, การแสดงผลของยีนแบบบวกร, แสดงผลของยีนแบบข่ม, ปฏิกริยาระหว่างยีนแบบบวกรกับแบบบวกร, แบบบวกรกับแบบข่ม และ แบบข่มกับแบบข่ม ตามลำดับ

ตารางที่ 4.7 ผลของยีนที่ควบคุมลักษณะของผล จากการศึกษาประชากรทั้ง 6 ประชากร (P_1 , P_2 , F_1 , F_2 , BC_1P_1 and BC_1P_2) ในกลุ่มผสมที่ 2 RML1 (*Cucumis melo* L. var. *conomon*; P_1) กับ PI148 (*Cucumis melo* L. var. *reticularis* Naudin; P_2) (ต่อ)

ผลของยีน	ความกว้างผล (cm)	%เนื้อ (%)	ความยาวผล (cm)	ดัชนีรูปร่างผล	ความแน่นเนื้อ (kg/cm ³)	ความหวาน (%Brix)
[m]	10.66±0.16**	41.21±0.49**	14.74±0.25**	1.39±0.03**	0.62±0.03**	6.43±0.14**
[d]	1.85±0.18**	6.10±0.84**	-1.32±0.36	-0.34±0.05	-0.22±0.08	0.29±0.28
[h]	0.19±0.53	-10.68±2.52	-4.18±1.07	-0.40±0.13	0.35±0.22	-0.74±0.79
[i]	0.54±0.48	-9.44±2.30	-3.83±1.00	-0.37±0.13	0.62±0.21*	-2.18±0.75
[j]	0.54±0.23*	2.50±1.12*	0.27±0.43	-0.03±0.06	-0.42±0.10	0.06±0.32
[l]	-0.24±0.90	13.05±4.11**	5.57±1.74**	0.55±0.22*	-0.88±0.38	4.07±1.31**

*, ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ $P < 0.05$, $P < 0.01$

[m], [d], [h], [i], [j] และ [l] คือ ค่ากึ่งกลางระหว่าง homozygous recessive กับ homozygous dominance, การแสดงผลของยีนแบบบวกร, แสดงผลของยีนแบบข่ม, ปฏิกริยาระหว่างยีนแบบบวกรกับแบบบวกร, แบบบวกรกับแบบข่ม และ แบบข่มกับแบบข่ม ตามลำดับ

4. การศึกษาอัตราพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะของผล

พบว่า อัตราพันธุกรรมแนวกว้างที่ได้จากวาเรียนซ์ของแต่ละประชากร (แสดงในตารางที่ 4.8) พบว่า ทั้ง 2 คู่ผสมมีค่าอัตราพันธุกรรมแนวกว้างของลักษณะน้ำหนักผล ความแน่นเนื้อ และความหนาสูง ลักษณะความหนาไส้ เปอร์เซ็นต์เนื้อ และดัชนีรูปร่างผลต่ำ ลักษณะเส้นรอบวงผล ความหนาเปลือก และความยาวผล คู่ผสมที่ 1 RML1 x KML370 มีค่าอัตราพันธุกรรมแนวกว้างสูง แต่คู่ผสมที่ 2 RML1 x PI148 มีค่าอัตราพันธุกรรมแนวกว้างต่ำ และลักษณะความหนาเนื้อ และความกว้างผล คู่ผสมที่ 2 RML1 x PI148 มีค่าอัตราพันธุกรรมแนวกว้างสูง แต่คู่ผสมที่ 1 RML1 x KML370 มีค่าอัตราพันธุกรรมแนวกว้างต่ำ

ตารางที่ 4.8 อัตราพันธุกรรมของลักษณะของผล ในคู่ผสมระหว่างแดงไทยกับแคนตาลูป 2 คู่ผสม โดยคำนวณจากวาเรียนซ์ของประชากร

คู่ผสม	อัตราพันธุกรรม (%)				
	น้ำหนักผล	เส้นรอบวงผล	ความหนาเปลือก	ความหนาเนื้อ	ความหนาไส้
RML1 x KML370	45.12	52.28	79.66	0.67	18.56
RML1 x PI148	54.22	13.95	11.70	52.54	8.51

ตารางที่ 4.8 อัตราพันธุกรรมของลักษณะของผล ในคู่ผสมระหว่างแดงไทยกับแคนตาลูป 2 คู่ผสม โดยคำนวณจากวาเรียนซ์ของประชากร (ต่อ)

คู่ผสม	อัตราพันธุกรรม (%)					
	ความกว้างผล	%เนื้อ	ความยาวผล	ดัชนีรูปร่างผล	ความแน่นเนื้อ	ความหวาน
RML1 x KML370	25.49	17.05	30.54	15.71	53.65	37.77
RML1 x PI148	40.98	14.48	22.45	17.77	33.16	40.53

5. การศึกษาความดีเด่นของลูกผสมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะของผล

การวิเคราะห์ความดีเด่นของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่ (heterosis)

คู่ผสมที่ 1 RML1 x KML370 (แสดงในตารางที่ 4.9) พบความดีเด่นของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่ใน ลักษณะความหนาเปลือก มีค่าเฉลี่ยแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ลักษณะเส้นรอบวงผล ความหนาไส้ ดัชนีรูปร่างผล ความแน่นเนื้อ และความหวาน มีค่าเฉลี่ยแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งลักษณะความหนาเปลือก (-0.25 เปอร์เซ็นต์) ความแน่นเนื้อ (-23.65 เปอร์เซ็นต์) และความหวาน (-6.16 เปอร์เซ็นต์) มีค่าติดลบแสดงให้เห็นว่าลูกผสมที่ได้จะมีค่าเฉลี่ยต่ำหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่ แตกต่างจากลักษณะดัชนีรูปร่างผล (9.54 เปอร์เซ็นต์)

มีค่าเป็นบวกแสดงให้เห็นว่าลูกผสมที่ได้จะมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่ และไม่พบความผิดปกติของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่ในลักษณะน้ำหนักผล (28.84 เปอร์เซ็นต์) ความหนาเนื้อ (13.84 เปอร์เซ็นต์) ความกว้างผล (5.40 เปอร์เซ็นต์) เปอร์เซ็นต์เนื้อ (6.81 เปอร์เซ็นต์) และความยาวผล (17.15 เปอร์เซ็นต์)

กลุ่มผสมที่ 2 RML1 x PI148 (แสดงในตารางที่ 4.9) พบความผิดปกติของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่ในลักษณะน้ำหนักผล เส้นรอบวงผล ความหนาเนื้อ ความหนาไส้ ความกว้างผล เปอร์เซ็นต์เนื้อ ความยาวผล ดัชนีรูปร่างผล และความแน่นเนื้อ มีค่าเฉลี่ยแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ซึ่งลักษณะน้ำหนักผล (-8.56 เปอร์เซ็นต์) เส้นรอบวงผล (-6.78 เปอร์เซ็นต์) ความหนาเนื้อ (-8.31 เปอร์เซ็นต์) ความหนาไส้ (-1.16 เปอร์เซ็นต์) ความกว้างผล (-3.19 เปอร์เซ็นต์) เปอร์เซ็นต์เนื้อ (-3.09 เปอร์เซ็นต์) ความยาวผล (-2.49 เปอร์เซ็นต์) ดัชนีรูปร่างผล (-2.08 เปอร์เซ็นต์) และความแน่นเนื้อ (-31.59 เปอร์เซ็นต์) มีค่าคิดลบแสดงให้เห็นว่าลูกผสมที่ได้จะมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าหรือด้อยกว่าค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่ และไม่พบความผิดปกติของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่ในลักษณะความหนาเปลือก (-8.72 เปอร์เซ็นต์) และความหวาน (25.50 เปอร์เซ็นต์)

ตารางที่ 4.9 ความผิดปกติเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่ (heterosis) ของลักษณะของผล ในกลุ่มผสมระหว่างแดงไทยกับแคนตาลูป 2 กลุ่มผสม

กลุ่มผสม	ความผิดปกติเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่ (%)				
	น้ำหนักผล	เส้นรอบวงผล	ความหนาเปลือก	ความหนาเนื้อ	ความหนาไส้
RML1 x KML370	28.84	2.96*	-0.25**	13.84	1.83*
RML1 x PI148	-8.56**	-6.78**	8.72	-8.31**	-1.16**

* แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ $P < 0.05$, ** แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ $P < 0.01$

ตารางที่ 4.9 ความผิดปกติเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่ (heterosis) ของลักษณะของผล ในกลุ่มผสมระหว่างแดงไทยกับแคนตาลูป 2 กลุ่มผสม (ต่อ)

กลุ่มผสม	ความผิดปกติเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่ (%)					
	ความกว้างผล	%เนื้อ	ความยาวผล	ดัชนีรูปร่างผล	ความแน่นเนื้อ	ความหวาน
RML1 x KML370	5.40	6.81	17.15	9.54*	-23.65*	-6.16*
RML1 x PI148	-3.19**	-3.09**	-2.49**	-2.08**	-31.59**	25.50

* แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ $P < 0.05$, ** แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ $P < 0.01$

6. การวิเคราะห์ความผิดปกติของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อหรือแม่ที่ผิดปกติ (heterobeltiosis)

คู่ผสมที่ 1 RML1 x KML370 พบความดีเด่นของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อหรือแม่ที่ดีกว่า ในลักษณะเส้นรอบวงผล (-7.07 เปอร์เซ็นต์) ความหนาเปลือก (-0.05 เปอร์เซ็นต์) ความหนาเนื้อ (-3.09 เปอร์เซ็นต์) ความหนาไส้ (-5.38 เปอร์เซ็นต์) ความกว้างผล (-5.01 เปอร์เซ็นต์) และความแน่นเนื้อ (-24.16 เปอร์เซ็นต์) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ซึ่งในทุกลักษณะมีค่าคิดลบ แสดงให้เห็นว่าลูกผสมที่ได้จะให้ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อหรือแม่ที่ดีกว่า และไม่พบความดีเด่นของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อหรือแม่ที่ดีกว่า ในลักษณะน้ำหนักผล (1.97 เปอร์เซ็นต์) เปอร์เซ็นต์เนื้อ (1.38 เปอร์เซ็นต์) ความยาวผล (13.34 เปอร์เซ็นต์) ดัชนีรูปร่างผล (2.35 เปอร์เซ็นต์) และความหวาน (-21.49 เปอร์เซ็นต์)

คู่ผสมที่ 2 RML1 x PI148 พบความดีเด่นของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อหรือแม่ที่ดีกว่า ในลักษณะน้ำหนักผล (-18.67 เปอร์เซ็นต์) เส้นรอบวงผล (-17.11 เปอร์เซ็นต์) ความหนาเนื้อ (-24.05 เปอร์เซ็นต์) ความหนาไส้ (-6.82 เปอร์เซ็นต์) ความกว้างผล (-13.48 เปอร์เซ็นต์) เปอร์เซ็นต์เนื้อ (-11.01 เปอร์เซ็นต์) และความแน่นเนื้อ (-45.02 เปอร์เซ็นต์) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ซึ่งในทุกลักษณะมีค่าคิดลบ แสดงให้เห็นว่าลูกผสมที่ได้จะให้ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าพันธุ์พ่อหรือแม่ที่ดีกว่า และไม่พบความดีเด่นของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อหรือแม่ที่ดีกว่า ในลักษณะความหนาเปลือก (0.25 เปอร์เซ็นต์) ความยาวผล (-12.20 เปอร์เซ็นต์) ดัชนีรูปร่างผล (-20.19 เปอร์เซ็นต์) และความหวาน (20.43 เปอร์เซ็นต์)

ตารางที่ 4.10 ความดีเด่นเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อหรือแม่ที่ดีกว่า (heterobeltiosis) ของลักษณะของผล ในคู่ผสมระหว่างแตงไทยกับแคนตาลูป 2 คู่ผสม

คู่ผสม	ความดีเด่นเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อหรือแม่ที่ดีกว่า (%)				
	น้ำหนักผล	เส้นรอบวงผล	ความหนาเปลือก	ความหนาเนื้อ	ความหนาไส้
RML1 x KML370	1.97	-7.07**	-0.50**	-3.09**	-5.38**
RML1 x PI148	-18.67**	-17.11**	0.25	-24.05**	-6.82**

** แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ $P < 0.01$

ตารางที่ 4.10 ความดีเด่นเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อหรือแม่ที่ดีกว่า (heterobeltiosis) ของลักษณะของผล ในกลุ่มผสมระหว่างแดงไทยกับแคนตาลูป 2 กลุ่มผสม (ต่อ)

กลุ่มผสม	ความดีเด่นเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อหรือแม่ที่ดีกว่า (%)					
	ความกว้างผล	%เนื้อ	ความยาวผล	ดัชนีรูปร่างผล	ความแน่นเนื้อ	ความหวาน
RML1 x KML370	-5.01**	1.38	13.34	2.35	-24.16**	-21.49
RML1 x PI148	-13.48**	-11.01**	-12.20	-20.19	-45.02**	20.43

** แตกต่างกันอย่างสถิติที่ระดับ $P < 0.01$

ในการปรับปรุงพันธุ์แดงไทยและแคนตาลูปสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การผลิตสายพันธุ์แท้ (inbred line) ของแดงไทย และแคนตาลูปเพื่อสร้างลูกผสม (F_1 hybrid) ของแดงไทย แคนตาลูป หรือลูกผสมของแดงไทยระหว่างแคนตาลูป นอกจากนั้นยังสามารถสร้างลูกผสมเปิด (open pollinate variety) จากการทดลองพบว่าการศึกษาปฏิกริยาของยีนในลูกผสมระหว่างแดงไทยและแคนตาลูป สามารถนำมาเป็นประโยชน์ได้ในทุกลักษณะ โดยในลักษณะน้ำหนักผล ความหนาเนื้อ ความกว้างผล และเปอร์เซ็นต์เนื้อ มีปฏิกริยาของยีนแบบบวก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุรชาติ (2554) และอารักษ์ (2555) รายงานว่า ปฏิกริยาของยีนแบบบวกที่ควบคุมลักษณะน้ำหนักผล ความยาวผล ความกว้างผล ความหนาเนื้อ และความหวาน และยังสอดคล้องกับผลของ ปราโมทย์และคณะ (2553) ที่รายงานว่าปฏิกริยาของยีนแบบบวก ควบคุมลักษณะความยาวผล ความกว้างผล และความหนาเนื้อของแดงไทย สายพันธุ์ R-(S_5) และสายพันธุ์ L-(S_5) ในขณะที่บางกลุ่มผสมมีปฏิกริยาของยีนแบบข่ม และข่มข้ามคู่ที่มีแนวโน้มการควบคุมปฏิกริยาของยีนหลายรูปแบบ เช่นความยาวผล ดัชนีรูปร่างผล และความแน่นเนื้อ ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์ต่อไป

ตารางที่ 4.11 วิเคราะห์ปฏิบัติการแสดงออกของยีน อัตราพันธุกรรมเนวกว้าง และความดีเด่นของลูกผสมของลักษณะของผล ในกลุ่มผสมระหว่างแดงไทยกับแคนดาลูป 2 กลุ่ม

ข้อมูลศึกษา	กลุ่มผสม	ลักษณะ											
		น้ำหนักผล	เส้นรอบวงผล	ความหนาเปลือก	ความหนาเนื้อ	ความหนาไส้	ความกว้างผล	%เนื้อ	ความยาวผล	ดัชนีรูปร่างผล	ความแน่นเนื้อ	ความหวาน	
การแสดงออกของยีน	RML1 x KML370	ข่ม, ข่มข้ามคู่	ข่ม, ข่มข้ามคู่	-	บวก, ข่ม, ข่มข้ามคู่	-	ข่ม, ข่มข้ามคู่	บวก, ข่ม, ข่มข้ามคู่	ข่ม, ข่มข้ามคู่	ข่ม, ข่มข้ามคู่	ข่ม, ข่มข้ามคู่	-	บวก, ข่มข้ามคู่
	RML1 x PI148	บวก, ข่มข้ามคู่	บวก, ข่มข้ามคู่	-	บวก, ข่มข้ามคู่	บวก, ข่ม, ข่มข้ามคู่	บวก, ข่มข้ามคู่	บวก, ข่มข้ามคู่	บวก, ข่มข้ามคู่	ข่มข้ามคู่	ข่มข้ามคู่	ข่มข้ามคู่	ข่มข้ามคู่
อัตราพันธุกรรมเนวกว้าง	RML1 x KML370	สูง	สูง	สูง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ก่อนข้างสูง	ต่ำ	สูง	ก่อนข้างสูง	
	RML1 x PI148	สูง	ต่ำ	ต่ำ	สูง	ต่ำ	สูง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ก่อนข้างสูง	สูง	
ความดีเด่นเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่	RML1 x KML370	-	ค่าบวก	ค่าลบ	-	-	-	-	-	ค่าบวก	ค่าลบ	ค่าลบ	
	RML1 x PI148	ค่าลบ	ค่าลบ	-	ค่าลบ	ค่าลบ	ค่าลบ	ค่าลบ	ค่าลบ	ค่าลบ	ค่าลบ	-	
ความดีเด่นเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่หรือแม่ที่ดีกว่า	RML1 x KML370	-	ค่าลบ	ค่าลบ	ค่าลบ	ค่าลบ	ค่าลบ	-	-	-	ค่าลบ	-	
	RML1 x PI148	ค่าลบ	ค่าลบ	-	ค่าลบ	ค่าลบ	ค่าลบ	ค่าลบ	-	-	ค่าลบ	-	

- ไม่แสดงความแตกต่างกันทางสถิติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อัตราพันธุกรรมแนวกว้าง พบว่าลักษณะน้ำหนักผล เส้นรอบวงผล ความหนาเปลือก ความหนาเนื้อ ความกว้างผล ความยาวผล ความแน่นเนื้อ และความหวาน มีอัตราพันธุกรรมแนวกว้างสูง ซึ่งมีความสอดคล้องกับรายงานของสุรชาติ (2554) และอารักษ์ (2555) ที่รายงานว่าพบลักษณะที่มีอัตราพันธุกรรมแนวกว้างสูง คือ น้ำหนักผล ความยาวผล ความกว้างผล ความหนาเนื้อ และดัชนีรูปร่างผล ซึ่งลักษณะดังกล่าวที่มีอัตราพันธุกรรมสูงอาจเลือกใช้วิธีการปรับปรุงพันธุ์อย่างง่ายเช่น mass selection และลักษณะที่มีอัตราพันธุกรรมต่ำ เช่น ความหนาไส้ เเปอร์เซ็นต์เนื้อ และดัชนีรูปร่างผล วิธีการคัดเลือกอาจทำได้ค่อนข้างยาก ซึ่งลักษณะเด่นเหล่านี้นี้อาจหายไปในช่วงการคัดเลือก ทำให้การคัดเลือกต้องมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น และอาจใช้การทดสอบรุ่นลูกในการคัดเลือก และจากการทดลองพบว่า มีความผันแปรในแต่ละกลุ่มผสมซึ่งอาจเป็นผลจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม หรือจากเกิดจากสภาพแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้อง

ความดีเด่นของลูกผสมพบว่าความดีเด่นของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่ ในทั้ง 2 กลุ่มผสม ลักษณะน้ำหนักผล เส้นรอบวงผล ความหนาเปลือก ความหนาเนื้อ ความหนาไส้ ความกว้างผล เเปอร์เซ็นต์เนื้อ ความยาวผล ดัชนีรูปร่างผล ความแน่นเนื้อ และความหวาน ในทุกลักษณะของลูกผสมมีค่าเป็นลบ แสดงให้เห็นว่าลูกผสมชั่วที่ 1 มีความดีเด่นของลูกผสมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่ หรือให้ค่าเฉลี่ยที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่ เช่นเดียวทุกลักษณะให้ผลการวิเคราะห์ความดีเด่นของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อหรือแม่เป็นค่าลบ แสดงว่าลูกผสมชั่วที่ 1 ให้ค่าเฉลี่ยในลักษณะดังกล่าวต่ำกว่าพันธุ์พ่อหรือแม่ที่ดีที่สุด ซึ่งผลการทดลองมีความขัดแย้งกับรายงานของสุรชาติ (2554) และอารักษ์ (2555) ที่รายงานว่าพบลักษณะน้ำหนักผล ความยาวผล ความกว้างผล ดัชนีรูปร่างผล และความหวาน มีความดีเด่นของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์พ่อแม่ค่อนข้างสูงในกลุ่มผสมเดียวกัน ซึ่งผลที่แตกต่างนี้อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม ซึ่งในรายงานของ สุรชาติ (2554) และอารักษ์ (2555) ทำการทดลองในสภาพไร่หรือปลูกกลางแจ้งแต่ในงานทดลองนี้ปลูกในสภาพโรงเรือน และการให้ปุ๋ยที่แตกต่างกันเช่นการให้ปุ๋ยเมล็ด และการให้ปุ๋ยแบบสารละลายธาตุอาหารรวมทั้งสภาพพื้นที่ปลูกเช่นปลูกในดิน และวัสดุปลูก ทั้งนี้การเลือกลักษณะที่ต้องการปรับปรุงพันธุ์อาจต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเนื่องจากลูกผสมที่ได้ อาจมีความจำเพาะ เพื่อให้ประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุ์มีประโยชน์สูงสุด

จากการศึกษาปฏิกริยาที่ควบคุมการแสดงออกของยีนระหว่างแดงไทย และแคนตาลูปอัตราพันธุกรรมแนวกว้าง ความดีเด่นของลูกผสมอาจใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการปรับปรุงพันธุ์ และพัฒนาพันธุ์แดงไทย พันธุ์แคนตาลูป และลูกผสมระหว่างแดงไทยและแคนตาลูป ให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของตลาด และเกษตรกรผู้ปลูก รวมไปถึงการใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป

สหสัมพันธ์กับความยาวผล ลักษณะความหนาใต้มีสหสัมพันธ์แบบบวกกับลักษณะความกว้างผล และความแน่นเนื้อ และมีสหสัมพันธ์ในทางลบกับลักษณะเปอร์เซ็นต์เนื้อ ความยาวผล ดัชนีรูปร่างผล และความหวาน ลักษณะความกว้างผลมีสหสัมพันธ์แบบบวกกับลักษณะเปอร์เซ็นต์เนื้อ และมีสหสัมพันธ์ในทางลบกับลักษณะดัชนีรูปร่างผล แต่ไม่มีสหสัมพันธ์กับความยาวผล ความแน่นเนื้อ และความหวาน ลักษณะเปอร์เซ็นต์เนื้อมีสหสัมพันธ์แบบบวกกับลักษณะความยาวผล และความหวาน และมีสหสัมพันธ์ในทางลบกับลักษณะดัชนีรูปร่างผล และความแน่นเนื้อ ลักษณะความยาวผลมีสหสัมพันธ์แบบบวกกับดัชนีรูปร่างผล และมีสหสัมพันธ์ในทางลบกับลักษณะความแน่นเนื้อ และความหวาน ลักษณะดัชนีรูปร่างผลมีสหสัมพันธ์แบบลบกับลักษณะความหวาน แต่ไม่มีสหสัมพันธ์กับลักษณะความแน่นเนื้อ ลักษณะความแน่นเนื้อมีสหสัมพันธ์แบบลบกับความหวาน

จากการทดลองพบว่ามีความสอดคล้องกับรายงานของ อารักษ์ (2555) ในหลายลักษณะ เช่นลักษณะน้ำหนักผลมีสหสัมพันธ์แบบบวกกับลักษณะความยาวผล และความกว้างผล มีสหสัมพันธ์แบบลบกับดัชนีรูปร่างผล ดังนั้นการศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะต่างๆจะทำให้สามารถเลือกลักษณะที่ต้องการปรับปรุงพันธุ์โดยการใช้ค่าสหสัมพันธ์ที่มีค่าสัมพันธ์กันในการคัดเลือกในโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์หรือการคัดเลือกทางอ้อม ซึ่งอาจคัดเลือกเพียงลักษณะเดียวหรือหลายลักษณะหลายลักษณะ ทั้งนี้การคัดเลือกลักษณะที่ต้องการอาจทำได้ยากหรือต้องใช้เวลาในการคัดเลือกการใช้ประโยชน์จากค่าสหสัมพันธ์จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการปรับปรุงลักษณะบางลักษณะที่ทำการคัดเลือกโดยตรงยาก หรือต้องใช้เวลาในการคัดเลือก



ตารางที่ 4.12 สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของผล จากการศึกษาประชากรชั่วที่ F₂ คู่ผสมที่ 1 RML1 (*Cucumis melo* L. var. *conomon*; P₁) กับ KML370 (*Cucumis melo* L. var. *reticularis* Naudin; P₂)

ลักษณะของผล	เส้นรอบวงผล	ความหนาเปลือก	ความหนาเนื้อ	ความหนาไส้	ความกว้างผล	%เนื้อ	ความยาวผล	ดัชนีรูปร่างผล	ความแน่นเนื้อ	ความหวาน
น้ำหนักผล	0.622**	-0.006	0.555**	0.448**	0.728**	0.206**	0.624**	0.262**	0.081	-0.406**
เส้นรอบวงผล		-0.003	0.520**	0.646**	0.816**	0.088	0.223**	-0.188**	0.042	-0.320**
ความหนาเปลือก			-0.025	0.039	0.061	-0.033	-0.041	-0.075	-0.004	-0.009
ความหนาเนื้อ				0.061	0.675**	0.811**	0.300**	-0.039	-0.106*	-0.231**
ความหนาไส้					0.722**	-0.469**	0.102*	-0.262**	0.153**	-0.329**
ความกว้างผล						0.172**	0.309**	-0.192**	0.033	-0.403**
%เนื้อ							0.180**	0.096*	-0.165**	0.006
ความยาวผล								0.868**	0.152**	-0.380**
ดัชนีรูปร่างผล									0.158**	-0.198**
ความแน่นเนื้อ										-0.352**

* แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ P < 0.05, ** แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ P < 0.01


ตารางที่ 4.13 สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของผล จากการศึกษาประชากรชั่วที่ F₂ คู่ผสมที่ 2 RML1 (*Cucumis melo* L. var. *conomon*; P₁) กับ PI148 (*Cucumis melo* L. var. *reticularis* Naudin; P₂)

ลักษณะของผล	เส้นรอบวงผล	ความหนาเปลือก	ความหนาเนื้อ	ความหนาไส้	ความกว้างผล	%เนื้อ	ความยาวผล	ดัชนีรูปร่างผล	ความแน่นเนื้อ	ความหวาน
น้ำหนักผล	0.680**	0.111*	0.657**	0.520**	0.782**	0.353**	0.477**	-0.067	-0.035	-0.106*
เส้นรอบวงผล		0.206**	0.653**	0.634**	0.856**	0.304**	-0.083	-0.545**	0.023	-0.01
ความหนาเปลือก			0.087*	0.110*	0.209**	0.055	-0.127**	-0.215**	0.08	0.108*
ความหนาเนื้อ				0.141**	0.797**	0.860**	0.043	-0.423**	-0.147**	0.118**
ความหนาไส้					0.701**	-0.364**	-0.091*	-0.441**	0.137**	-0.088*
ความกว้างผล						0.398**	-0.033	-0.579**	-0.012	0.041
%เนื้อ							0.089*	-0.176**	-0.210**	0.172**
ความยาวผล								0.784**	-0.114**	-0.224**
ดัชนีรูปร่างผล									-0.054	-0.216**
ความแน่นเนื้อ										-0.409**


* แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ P < 0.05, ** แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ P < 0.01

4.3 การศึกษาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อเชื่อมโยงลักษณะทางฟีโนไทป์ ของผลในลูกผสม ระหว่างแตงไทยและแคนตาลูป


จากการทดลอง พบว่าการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอในการเชื่อมโยงลักษณะทางฟีโนไทป์ของผลในพันธุ์พ่อ พันธุ์แม่ และพันธุ์ลูกผสมระหว่างแตงไทย และแคนตาลูปนั้น ไม่สามารถทำการวิเคราะห์ได้ เนื่องจากทั้ง 3 ไพรเมอร์ได้แก่ ISSR_(GA)₈YG, ISSR_(ATG)₆ และ RAPD_OPL07 ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างพันธุ์พ่อ และพันธุ์แม่ของแตงไทย และแคนตาลูป เห็นได้จากแบนด์ดีเอ็นเอของแตงไทยทั้ง 2 พันธุ์ และแคนตาลูปนั้นยังมีการกระจายตัวของแถบดีเอ็นเออย่างเห็นได้ชัด ของทั้งพันธุ์พ่อ แม่ และลูก F₁ ในทั้ง 3 ไพรเมอร์ที่ได้ทำการทดลอง ซึ่งอาจเกิดจากการที่ต้นแม่และพ่อ ไม่ใช่สายพันธุ์แท้จึงส่งผลกระทบต่อให้เกิดการกระจายตัวของลำดับเบสบางตำแหน่งในรุ่นลูกได้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ไม่มีความสม่ำเสมอทางพันธุกรรม (Hipi et al., 2010) ทำให้ไม่สามารถแยกความแตกต่างของ แบนด์ในลูกผสม F₁ (แสดงในภาพที่ 4.1-4.3) จึงไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวหาความเชื่อมโยงระหว่างเครื่องหมายโมเลกุลกับลักษณะสีเปลือก สีเนื้อ และรูปร่างผล จากข้อมูลดังกล่าวมาข้างต้น อาจมีการแก้ไขปัญหาใช้แตงไทย และแคนตาลูปสายพันธุ์แท้มาผลิตลูกผสมเพื่อนำมาหาความเชื่อมโยง หรือมีการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างพันธุ์พ่อ และพันธุ์แม่ก่อน จึงนำมาใช้ตรวจสอบพันธุ์ลูกผสม ในการทดลองของศุภลักษณ์ และจิระ (2558) ทำการตรวจสอบความแตกต่างทางจีโนไทป์ระหว่างพ่อ และแม่ในบริเวณดีเอ็นเอที่มีลักษณะเป็น microsatellite ของข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์สงขลา 84-1 ซึ่งมีสายพันธุ์แม่ CLei 56 และสายพันธุ์พ่อ CLei 38 พบว่าเครื่องหมายที่สามารถบ่งบอกความต่างระหว่างพ่อและแม่ ได้แก่ Umc 2071, Umc 2293 และ Bnlg 1083 และอาจผลิตลูกผสมจากพ่อแม่เพียงต้นเดียว เพื่อลดการเกิดความแตกต่างภายในพันธุ์ หากต้องการใช้พันธุ์ผสมเปิดในการทดลองต่อไป



ภาพที่ 4.1 ดีเอ็นเอแดงไทยพันธุ์ RML1 แคนตาลูปพันธุ์ PI148 แคนตาลูปพันธุ์ KML370 กลุ่มที่ 1 RML1 x PI148 และกลุ่มที่ 2 RML1 x KML370 ที่ถูกนำไปเพิ่มปริมาณชิ้นดีเอ็นเอด้วยไพรเมอร์ ISSR₈(GA)₈YG ใน 3% agarose gel



ภาพที่ 4.2 ดีเอ็นเอแดงไทยพันธุ์ RML1 แคนตาลูปพันธุ์ PI148 แคนตาลูปพันธุ์ KML370 กลุ่มสมที่ 1 RML1 x PI148 และกลุ่มสมที่ 2 RML1 x KML370 ที่ถูกนำไปเพิ่มปริมาณชิ้นดีเอ็นเอด้วยไพรเมอร์ ISSR_(ATG)₆ ใน 3% agarose gel



ภาพที่ 4.3 ดีเอ็นเอแดงไทยพันธุ์ RML1 แคนตาลูปพันธุ์ PI148 แคนตาลูปพันธุ์ KML370 คู่ผสมที่ 1 RML1 x PI148 และคู่ผสมที่ 2 RML1 x KML370 ที่ถูกนำไปเพิ่มปริมาณชิ้นดีเอ็นเอด้วยไพรมเมอร์ RAPD_OPL07 ใน 3% agarose gel

บทที่ 5

สรุปผลการทดลอง

จากการศึกษาการเปรียบเทียบความแตกต่างของพันธุ์แตงไทยและแคนตาลูปที่ใช้เป็นพันธุ์พ่อแม่ และวิเคราะห์ความสม่ำเสมอภายในพันธุ์ การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยลักษณะของผล ของประชากร ทั้ง 6 ประชากร ปฏิบัติการทำงานของยีนที่ควบคุมลักษณะของผล อัตราพันธุกรรม ความดีเด่นของลูกผสม และสหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะในลูกผสมระหว่างแตงไทยกับแคนตาลูป พบว่า

1. พันธุ์แตงไทยและแคนตาลูปในทุกลักษณะมีความแตกต่างกัน ซึ่งในบางลักษณะแตงไทยอาจมีค่าใกล้เคียงกับแคนตาลูป เช่นลักษณะเส้นรอบวงผล และในทุกลักษณะมีความสม่ำเสมอภายในพันธุ์เหมาะแก่การนำมาศึกษาปฏิกริยาของยีนระหว่างลูกผสมแตงไทยและแคนตาลูปต่อไป

2. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยทั้ง 6 ประชากร ทั้ง 2 คู่ผสม พบค่าเฉลี่ยของลูกผสมที่แสดงแนวโน้มปฏิกริยาของยีนแบบบวกในลักษณะความหนาไส้ และความกว้างผล แสดงแนวโน้มปฏิกริยาของยีนแบบข่มในลักษณะน้ำหนักผล และความแน่นเนื้อ ซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดลักษณะไปยังรุ่นลูก

3. ปฏิกริยาการทำงานของยีนที่ควบคุมลักษณะผลนั้นมีความแตกต่างกันทั้ง 2 คู่ผสม เช่นในลักษณะน้ำหนักผล คู่ผสมที่ 1 RML1 x KML370 มีการแสดงปฏิกริยาของยีนแบบข่ม และข่มข้ามคู่ แต่คู่ผสมที่ 2 RML1 x PI148 มีการแสดงปฏิกริยาแบบบวก และข่มข้ามคู่ แต่ในขณะเดียวกันทั้ง 2 คู่ผสมมีการแสดงปฏิกริยาแบบบวก ข่ม และข่มข้ามคู่ในลักษณะความหนาเนื้อ ความกว้างผล และเปอร์เซ็นต์เนื้อ

4. อัตราพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะของผล ทั้ง 2 คู่ผสมมีค่าอัตราพันธุกรรมแนวกว้างของลักษณะน้ำหนักผล ความแน่นเนื้อ และความหวานสูง ลักษณะความหนาไส้ เปอร์เซ็นต์เนื้อ และดัชนีรูปร่างผลต่ำ ลักษณะเส้นรอบวงผล ความหนาเปลือก และความยาวผล คู่ผสมที่ 1 RML1 x KML370 มีค่าอัตราพันธุกรรมแนวกว้างสูง แต่คู่ผสมที่ 2 RML1 x PI148 มีค่าอัตราพันธุกรรมแนวกว้างต่ำ และลักษณะความหนาเนื้อ และความกว้างผล คู่ผสมที่ 2 RML1 x PI148 มีค่าอัตราพันธุกรรมแนวกว้างสูง แต่คู่ผสมที่ 1 RML1 x KML370 มีค่าอัตราพันธุกรรมแนวกว้างต่ำ

5. ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะในทั้ง 2 คู่ผสม แต่ละลักษณะมีความคล้ายคลึงกันลักษณะน้ำหนักผลมีสหสัมพันธ์ในทางบวกกับลักษณะเส้นรอบวงผล ความหนาเนื้อ ความหนาไส้ ความกว้างผล เปอร์เซ็นต์เนื้อ ความยาวผล และดัชนีรูปร่างผล และมีสหสัมพันธ์ในทางลบกับลักษณะความหวาน ลักษณะเส้นรอบวงผลมีสหสัมพันธ์กับลักษณะความหนาเนื้อ ความหนาไส้ ความกว้างผล และความยาวผล และมีสหสัมพันธ์ในทางลบกับลักษณะดัชนีรูปร่างผล และความหวาน ลักษณะความหนาเนื้อมีสหสัมพันธ์แบบบวกกับลักษณะความกว้างผล เปอร์เซ็นต์เนื้อ และความยาวผล

ลักษณะความกว้างผลมีสหสัมพันธ์แบบบวกกับลักษณะเปอร์เซ็นต์เนื้อ และความยาวผล และมีสหสัมพันธ์ในทางลบกับลักษณะดัชนีรูปร่างผล และความหวาน ลักษณะเปอร์เซ็นต์เนื้อ มีสหสัมพันธ์แบบบวกกับลักษณะความยาวผล และดัชนีรูปร่างผล และมีสหสัมพันธ์ในทางลบกับลักษณะความแน่นเนื้อ ลักษณะความยาวผลมีสหสัมพันธ์แบบบวกกับลักษณะดัชนีรูปร่างผล และความแน่นเนื้อ ลักษณะดัชนีรูปร่างผลมีสหสัมพันธ์แบบบวกกับลักษณะความแน่นเนื้อ และมีสหสัมพันธ์ในทางลบกับลักษณะความหวาน และลักษณะความแน่นเนื้อ มีสหสัมพันธ์แบบลบกับลักษณะความหวาน

6. การใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการเชื่อมโยงลักษณะทางฟีโนไทป์นั้นไม่สามารถทำได้ในการทดลองนี้เนื่องจากพันธุ์พ่อแม่เป็นพันธุ์ผสมเปิด พันธุ์ยังไม่บริสุทธิ์ทำให้ไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนั้นควรเลือกใช้พันธุ์ที่เป็นพันธุ์แท้ หรือทำการทดสอบจากการผสมพันธุ์พีชต้นใดต้นหนึ่งเพื่อนำลักษณะนั้นๆ มาวิเคราะห์

จากการศึกษาปฏิบัติการแสดงออกของยีนที่ควบคุมลักษณะผลของแตงไทยและแคนตาลูป อัตราพันธุกรรมแนวกว้าง ความดีเด่นของลูกผสม สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ และการเชื่อมโยงลักษณะภายนอกโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล จัดเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการคัดเลือก การวางแผนการปรับปรุง และพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์แตงไทยและแคนตาลูป ให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการ และตรงตามความต้องการของเกษตรกร และตลาดต่อไป ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการคัดเลือกแตงไทย 1 พันธุ์ RML1 และแคนตาลูป 2 พันธุ์ KML370 และ PI148 ซึ่งเป็นแตงเพียง 2 กลุ่ม จากที่มีการจำแนกแตงทั้งหมด 7 กลุ่มพันธุ์ ซึ่งในแต่ละกลุ่มยังประกอบด้วยแตงหลายสายพันธุ์ และอาจมีหลายสายพันธุ์ที่สามารถผสมข้ามสายพันธุ์ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาและจำแนกสายพันธุ์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ต่อไปในอนาคต

เอกสารอ้างอิง


- กรมส่งเสริมการเกษตร. (2559). สถิติการผลิต [ออนไลน์]. ได้จาก: http://production.doae.go.th/report/report_main_plant_01_A_new.php?
- กมล เลิศรัตน์. (2521). การถ่ายทอดลักษณะรากและใบในลูกผสมระหว่างฝักกาดหัวกับฝักขี้หนู. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- คเชนทร์ ม้าทอง. (2551). ความแปรปรวนของลักษณะปรากฏในประชากรลูกชั่วที่ 1 และ 2 ของแคนตาลูปพันธุ์ 'Apple Melon' และลูกผสมข้ามพันธุ์. ปัญหาพิเศษปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นครปฐม. 59 น.
- คำนึ่ง คำอุดม. (มปป). แดงแคนตาลูป. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ฐานเกษตรกรรม.
- คำนึ่ง คำอุดม. (2543). แดงแคนตาลูป. สำนักพิมพ์ฐานเกษตรกรรม, นนทบุรี. 70 น.
- จรัสศรี นวลศรี. (2527). การศึกษาการถ่ายทอดทางพันธุกรรมบางประการของมะเขือจาน 4 สายพันธุ์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- จานุลักษณะ ขนบดี. (2541). การผลิตเมล็ดพันธุ์ฝัก. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
- ตลาดไท. (2560). เมล่อนไทย [ออนไลน์]. ได้จาก: http://talaadthai.com/price_page/thai/P900
- นิพนธ์ ไชยมงคล. (2550). แดงหอม [ออนไลน์]. ได้จาก: <http://www.vegetweb.com/wp-content/download/melon.pdf>
- ปราโมทย์ พรสุริยา และพรทิพย์ พรสุริยา. (2551). การศึกษาผลทางพันธุกรรมในลักษณะรูปร่างผลของแดงไทย. ว. วิทย. กษ. 39(3) (พิเศษ): 322-325.
- ปราโมทย์ พรสุริยา, พรทิพย์ พรสุริยา และปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน. (2553). การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของชั่วรุ่นในลักษณะทางพืชสวนของแดงไทย. 36th Congress on science and technology of Thailand.
- ปราโมทย์ พรสุริยา, พรทิพย์ พรสุริยา และปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน. (2555). การประเมินการแสดงออกของยีนที่ควบคุมลักษณะผลของแดงไทย 2 สายพันธุ์. แก่นเกษตร 40 ฉบับพิเศษ 4: 91-96.
- พรรณเพ็ญ แสงใส. (2532). การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมในลักษณะผลและองค์ประกอบในผลผลิตของมะระ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- เพ็ญภา ทรัพย์เจริญ. (2547). ฝักพื้นบ้านภาคกลาง. กรุงเทพฯ: บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด.
- ไพศาล เหล่าสุวรรณ, อารีย์ วรรณวัฒน์ และ ปิยะดา ทิพย์พ่อง. (2546). หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. นครราชสีมา.
- เมืองทอง ทวนทวี และสุริรัตน์ ปัญญาโตนะ. (2532). สวนฝัก. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ทั้งฮั่วชิน.
- ยุพยงษ์ สุทธิธรรม. (2542). การปลูกแดงแคนตาลูป. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.


- วรนุช เขียวชาญพานิช. (2536). การศึกษาพันธุ์และทดสอบผลผลิตของแตงไทย. ปัญหาพิเศษปริญญาตรี. ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- วีรพันธ์ กันแก้ว และสุทัส จุลศรีไกวัด. (2554). คู่มือการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยประชากร. เชียงใหม่: สำนักพิมพ์ บริษัทเชียงใหม่พรีนติ้ง จำกัด.
- ศุภลักษณ์ สัตยสมิตสถิต และ จิระ สวรรณประเสริฐ. (2558). การตรวจสอบความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมของข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์สงขลา 84-1 โดยเครื่องหมายโมเลกุลชนิดเอสเออาร์ Genetic purity testing of sweet corn hybrid 'Songkhla 84-1' by SSR markers. Thai J. Genet. 8(S): 23–31.
- แสงเดือน อินชนบท. (2555). การรวบรวมและศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของแตงไทยในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (ปีที่ 2). รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
- ศุภัญญา บุญทา. (2553). การกระจายตัวของประชากรลูกชั่วที่ 2 ของแคนตาลูปจากประเทศอินโดนีเซีย 4 ประชากร. ปัญหาพิเศษ ปริญญาตรี. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.
- ศุภาพร รัตนพิทักษ์. (2535). การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของการเจริญเติบโตและลักษณะฝักในการผสมระหว่างถั่วฝักยาวกับถั่วพุ่ม. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- สุรชาติ ลิบบลกรัง. (2554). ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของลักษณะของผลในลูกผสม ระหว่างแตงไทย (*Cucumis melo* L. var. *conomon*) กับแคนตาลูป (*Cucumis melo* L. var. *cantalupensis*). วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
- สมเกียรติ ศรีพงษ์ประไพ. (2557). ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของลักษณะผลที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาของลูกผสมระหว่างแตงไทยกับแคนตาลูป. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. นครราชสีมา. 94 หน้า.
- สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร. (2558). ข้อมูลการส่งออกเมล็ดพันธุ์ผักควบคุม [ออนไลน์]. ได้จาก: <http://www.oae.go.th/download/FactorOfProduct/ValueExportSeed4752.html>.
- หนึ่งฤทัย เดโช. (2543). เยี่ยมสวนเมล่อน พืชทำทายฝีมือที่ปากช่อง. ว. เกษะเกษตร. ปีที่ 24. ฉบับที่ 5. หน้า 8489.
- อารักษ์ ชีร์อำพน. (2538). ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของการเจริญเติบโตและผลผลิตในการผสมระหว่างบร็อคโคลีกับคะน้าจีน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- อารักษ์ ชีร์อำพน. (2555). ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของการเจริญเติบโตและผลผลิตในการผสมระหว่างแตงไทยกับแตงแคนตาลูป. รายงานการวิจัย. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

- อารักษ์ ชีรอำพน. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนทางพันธุกรรมกับลักษณะ ทาง
สัณฐานวิทยาของแตงเทศและแตงไทย จากเทคนิค ISSR. รายงานการวิจัย. สำนักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
- อารักษ์ ชีรอำพน. (2559). ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับการปลูกแตงเทศเป็น
การค้า. รายงานการวิจัย, สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยี การเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
- Ajibade, S.R., Weeden, N.F. and Chite, S.M. (2000). Inter simple sequence repeat analysis of
genetic relationships in the genus *Vigna*. **Euphytica** 111: pp 47-55. Netherlands.
- Behera, T. K., Singh, A. K. and Stauba, J. E. (2008). Comparative analysis of genetic diversity in
Indian bitter gourd (*Momordica charatia* L.) using RAPD and ISSR markers for
developing crop improvement strategies. **Scientia Horticulture**. Vol 115. pp. 209-217.
India.
- Briggs, F.N. and Knowles, P.E. (1967). Introduction to Plant Breeding. Reinhold Publ. **Crop**, New
York.
- Burton, C.W. (1951). Quantitative inheritance in pearl millet (*Pennisetum glaucum*). **Agron. J.** 43:
409-417.
- Ganesan, J. (1988). Genetic studies on certain characters of economic importance in muskmelon
(*Cucumis melo* L.). Ph.D. Thesis, Annamalai Univ.
- Goulao, L. and Oliveira, C.M. (2001). Molecular characterization of cultivars of apple (*Malus X
domestica* Borkh) using microsatellite (SSR and ISSR) markers. **Euphytica** 122: pp 81-89.
Netherlands.
- Gusmini, G., T.C. Wehner and R.L. Jarlet, 2004. Inheritance of Egusi melon seed type in
watermelon. **J. Heredity**, 95: 268-270.
- Hipi A, Surahman M, Ilyas S, Giyanto. (2013). Seed genetic purity assessment of maize hybrid
using microsatellite markers (SSR). **Int J Appl Sci Technol** 3: 66-71.
- Iathet, C. and Piluek, K. (2006). Heritability, Heterosis and Correlations of Fruit Characters
and Yield in Thai Slicing Melon (*Cucumis melo* L. var. conomon Makino). **Kasetsart J.**
(Nat. Sci.) 40: 20-25. Thailand.
- Inner, N.L. (1983). Breeding Field Vegetables. Asia Vegetable Research and Development Center,
10th Anniversary Monograph Series. Shanhua, Taiwan, Republic of China.

- Kaloo, G., and B.O. Bergh. (1993). Genetic improvement of vegetable crops. **Pergamon Press**, Oxford, UK.
- Kosambi, D.D. 1994. The estimation of map distances from recombination values. *Ann. Of Eugenics*. 12: 175-175
- Kubicki (1962). Inheritance of some characters in muskmelon (*Cucumis melo* L.). **Genet. Polonica** 3: 265-274.
- Lander, E.S., P. Green, J. Abrahamson, A. Barlow, M.J. Daly, S.E. Lincoln and L. newburg. 1987. Mapmaker of Aninteractive computer package for constructing primary genetic linkage map of experimental and natural population. **Genomics** 1: 174-181
- Liu, L., Kakihara, F. & Kato, M. Euphytica. (2004). Characterization of six varieties of *Cucumis melo* L. based on morphological and physiological characters, including shelf-life of fruit. **Euphytica**, 135: 305-313.
- Manohar, S.H. and Murthy, H.N. (2012). Estimation of phenotypic divergence in a collection of *Cucumis melo*, including shelf-life of fruit. **Scientia Horticulturae**, 148, 74-82.
- Mather, K. (1957). The measurement of linkage in heredity. **Methuem**, London. 365 p.
- Mather, K. and Jinks, J.L. (1982). Biometrical Genetics. Cornell University Press, New York.
- Mondal, T.K. (2002). Assessment of genetic diversity of tea (*Camellia sinensis* (L.) O. Kuntze) by inter-simple sequence repeat polymerase chain reaction. **Euphytica** 128: pp 307-315. Netherlands.
- Nath, P. (1976). Vegetables for Tropical Region. Private Limited, Delhi.
- Nonnecke, Ib L. (1922). Vegetable Production. Van Nostrand Reinhold, New York.
- Paul, P.C., Ng, N.Q. and Ladeinde, T.A.O. (2003). Mode of gene action of Inheritance for resistance to rice yellow mottle virus. In: **African Crop Sci. J.** 11(3):143-150.
- Purseglove, J.W. (1968). Tropical Crops: Dicotylendons. Longman Group Ltd., London.
- Robinson, R.W. and Decker-Walters, D.S. (1997). **Cucurbits**. Solidus (Bristol) Limited, London.
- Stepansky, A., Kovalski, I. and Perl-Treves, R. (1999). Intraspecific classification of melon (*Cucumis melo* L.) inview of their phenotypic and molecular variation. **Plant Systematics & Evolution**. Vol. 217. pp. 313-333. Israel.
- Tongdeenok, T., Tira-umphon, A. and Ketudat-Cairns, M. (2016). Intraspecific classification of Cantaloupe (*Cucumis melo* L. var. *reticularis* Naudin.) and Thai melon (*Cucumis melo* L.

- var. *conomon*) in molecular variation. **In Proceedings of Third International Conference on Agriculture and Forestry 2016**. pp.167-170. Philippines.
- Tikunov, Y.M., Khrustaleva, L.I. and Karlov, G.I. (2003). Application of ISSR markers in the genus *Lycopersicon*. **Euphytica**. 131: pp 71-80. Netherlands.
- Wall JR. (1967). Correlated inheritance of sex expression and fruit shape in Cucumis. **Euphytica** 16: 199-208.
- Weising, K., Winter, P., Huttel, B. and Kahl, G. (1998). Microsatellite Marker for Molecular Breeding. In: Crop Science: Recent Advance. Basra, **A.S.(Ed)**. pp. 113-143. The Food Products Press, New York
- Yeager, A.F. (1943). The Characteristics of crosses between botanical varieties of cabbage *Brassica oleracea*. In: Proc. Amer. Soc. **Hort. Sci.** 43: 199-200.
- Zheng, X.Y. and Wolff, D.W. (2000). Ethylene production, shelf-life and evidence of RFLP polymorphisms linked to ethylene genes in melon (*Cucumis melo* L.). **Theor Appl Genet.** 101: 613-624.





สูตรปุ๋ย SUT-NS 5 สำหรับใช้ในการทดลอง อัตรา 1 : 200


EC 2.4-3.0, pH 5.2-6.5

Stock A 50 ลิตร

1. แคลเซียมไนเตรท	11	กก.
2. เหล็ก 6 %	20	กรัม
3. เหล็ก 13.2 %	400	กรัม

Stock B 50 ลิตร

1. โปแตสเซียมไนเตรท	5.9	กก.
2. แมกนีเซียมซัลเฟต	5.9	กก.
3. โมโนโปแตสเซียมฟอสเฟต	2.65	กก.
4. จุลธาตุ (Nicspray)	250	กรัม



ตารางภาคผนวกที่ 1 ค่าการวิเคราะห์หว่าเรียนซ์ของลักษณะผลของพันธุ์แดงไทยและแกนตาลูปที่ใช้
ในการทดลอง

Source	Dependent Variable	Sum of Squares	df	Mean Square	F-value	Sig.
Variety	น้ำหนักผล	3.352	2	1.676	31.823	0.00
	เส้นรอบวงผล	1619.334	2	809.667	64.746	0.00
	ความหนาเปลือก	0.127	2	0.063	18.281	0.00
	ความหนาเนื้อ	16.023	2	8.012	42.08	0.00
	ความหนาไส้	16.421	2	8.21	12.058	0.00
Error	น้ำหนักผล	5.478	104	0.053		
	เส้นรอบวงผล	1300.555	104	12.505		
	ความหนาเปลือก	0.36	104	0.003		
	ความหนาเนื้อ	19.8	104	0.19		
	ความหนาไส้	70.815	104	0.681		
Corrected	น้ำหนักผล	8.83	106			
Total	เส้นรอบวงผล	2919.889	106			
	ความหนาเปลือก	0.487	106			
	ความหนาเนื้อ	35.824	106			
	ความหนาไส้	87.236	106			

** = แตกต่างทางสถิติในระดับ 0.01

ตารางภาคผนวกที่ 1 ค่าการวิเคราะห์หว่าเรียนซ์ของลักษณะผลของพันธุ์แดงไทยและแกนตาลูปที่ใช้ในการทดลอง (ต่อ)

Source	Dependent Variable	Sum of Squares	df	Mean Square	F-value	Sig.
Variety	ความกว้างผล	151.192	2	75.596	60.254	0.00
	%เนื้อ	987.206	2	493.603	13.913	0.00
	ความยาวผล	295.869	2	147.934	25.689	0.00
	ดัชนีรูปร่างผล	6.613	2	3.306	48.524	0.00
	ความแน่นเนื้อ	4.329	2	2.164	6.398	0.002
	ความหวาน	202.741	2	101.37	17.692	0.00
Error	ความกว้างผล	130.48	104	1.255		
	%เนื้อ	3689.631	104	35.477		
	ความยาวผล	598.903	104	5.759		
	ดัชนีรูปร่างผล	7.086	104	0.068		
	ความแน่นเนื้อ	35.179	104	0.338		
	ความหวาน	595.895	104	5.73		
Corrected Total	ความกว้างผล	281.672	106			
	%เนื้อ	4676.837	106			
	ความยาวผล	894.772	106			
	ดัชนีรูปร่างผล	13.699	106			
	ความแน่นเนื้อ	39.507	106			
	ความหวาน	798.636	106			

**, ns = แตกต่างทางสถิติในระดับ 0.01 และไม่แตกต่างทางสถิติ ตามลำดับ

ตารางภาคผนวกที่ 2 ค่าการวิเคราะห์หว่าเรียนซ์ของลักษณะผลของประชากรทั้ง 6 ชั่วโมงในกลุ่มผสมที่ 1 RML1 (*Cucumis melo* L. var. *conomon*; P₁) กับ KML370 (*Cucumis melo* L. var. *cantalupensis*; P₂)

Source	Dependent Variable	Sum of Squares	df	Mean Square	F-value	Sig.
Generation	น้ำหนักผล	10.428	5	2.0860	22.1670**	0.00
	เส้นรอบวงผล	1716.089	5	343.2180	15.2180**	0.00
	ความหนาเปลือก	0.006	5	0.0010	0.9070 ^{ns}	0.48
	ความหนาเนื้อ	27.831	5	5.5660	24.2500**	0.00
	ความหนาไส้	18.068	5	3.6140	3.9760**	0.00
Error	น้ำหนักผล	44.595	474	0.0940		
	เส้นรอบวงผล	10690.422	474	22.5540		
	ความหนาเปลือก	0.661	474	0.0010		
	ความหนาเนื้อ	108.797	474	0.2300		
	ความหนาไส้	430.852	474	0.9090		
Corrected	น้ำหนักผล	55.023	479			
Total	เส้นรอบวงผล	12406.511	479			
	ความหนาเปลือก	0.667	479			
	ความหนาเนื้อ	136.627	479			
	ความหนาไส้	448.92	479			

ns = ไม่แตกต่างทางสถิติ และ ** = แตกต่างทางสถิติในระดับ 0.01

ตารางภาคผนวกที่ 2 ค่าการวิเคราะห์หว่าเรียนซ์ของลักษณะผลของประชากรทั้ง 6 ชั่วโมงในคู่ผสมที่ 1
RML1 (*Cucumis melo* L. var. *conomon*; P₁) กับ KML370 (*Cucumis melo* L.
var. *cantalupensis*; P₂) (ต่อ)

Source	Dependent Variable	Sum of Squares	df	Mean Square	F-value	Sig.
Generation	ความกว้างผล	190.789	5	38.1580	22.6410**	0.00
	%เนื้อ	1944.649	5	388.9300	8.9450**	0.00
	ความยาวผล	723.29	5	144.6580	15.5140**	0.00
	ดัชนีรูปร่างผล	4.405	5	0.8810	11.9930**	0.00
	ความแน่นเนื้อ	13.227	5	2.6450	3.7780**	0.00
	ความหวาน	272.699	5	54.5400	11.5420**	0.00
Error	ความกว้างผล	798.842	474	1.6850		
	%เนื้อ	20609.744	474	43.4800		
	ความยาวผล	4419.756	474	9.3240		
	ดัชนีรูปร่างผล	34.817	474	0.0730		
	ความแน่นเนื้อ	331.935	474	0.7000		
	ความหวาน	2239.892	474	4.7260		
Corrected	ความกว้างผล	989.631	479			
Total	%เนื้อ	22554.394	479			
	ความยาวผล	5143.046	479			
	ดัชนีรูปร่างผล	39.222	479			
	ความแน่นเนื้อ	345.162	479			
	ความหวาน	2512.592	479			

** = แตกต่างทางสถิติในระดับ 0.01

ตารางภาคผนวกที่ 3 ค่าการวิเคราะห์หว่าเรียนซ์ของลักษณะผลของประชากรทั้ง 6 ชั่วในคู่ผสมที่ 2
RML1 (*Cucumis melo* L. var. *conomon*; P₁) กับ PI148 (*Cucumis melo* L.
var. *cantalupensis*; P₂)

Source	Dependent Variable	Sum of Squares	df	Mean Square	F-value	Sig.
Generation	น้ำหนักผล	3.513	5	0.703	10.906	0.00
	เส้นรอบวงผล	3455.54	5	691.108	43.169	0.00
	ความหนาเปลือก	0.19	5	0.038	11.596	0.00
	ความหนาเนื้อ	35.556	5	7.111	35.296	0.00
	ความหนาไส้	29.618	5	5.924	8.414	0.00
Error	น้ำหนักผล	33.11	514	0.064		
	เส้นรอบวงผล	8228.841	514	16.009		
	ความหนาเปลือก	1.687	514	0.003		
	ความหนาเนื้อ	103.558	514	0.201		
	ความหนาไส้	361.873	514	0.704		
Corrected	น้ำหนักผล	36.623	519			
Total	เส้นรอบวงผล	11684.381	519			
	ความหนาเปลือก	1.878	519			
	ความหนาเนื้อ	139.114	519			
	ความหนาไส้	391.49	519			

** = แตกต่างทางสถิติในระดับ 0.01

ตารางภาคผนวกที่ 3 ค่าการวิเคราะห์หว่าเรียนธุ์ของลักษณะผลของประชากรทั้ง 6 ชั่วในคู่ผสมที่ 2 RML1 (*Cucumis melo* L. var. *conomon*; P₁) กับ PI148 (*Cucumis melo* L. var. *cantalupensis*; P₂) (ต่อ)

Source	Dependent Variable	Sum of Squares	df	Mean Square	F-value	Sig.
Generation	ความกว้างผล	284.724	5	56.945	34.98	0.00
	%เนื้อ	3093.453	5	618.691	18.319	0.00
	ความยาวผล	359.704	5	71.941	11.427	0.00
	ดัชนีรูปร่างผล	12.992	5	2.598	31.308	0.00
	ความแน่นเนื้อ	10.201	5	2.04	8.809	0.00
	ความหวาน	120.237	5	24.047	8.193	0.00
Error	ความกว้างผล	836.76	514	1.628		
	%เนื้อ	17359.414	514	33.773		
	ความยาวผล	3235.897	514	6.296		
	ดัชนีรูปร่างผล	42.659	514	0.083		
	ความแน่นเนื้อ	119.041	514	0.232		
	ความหวาน	1508.704	514	2.935		
Corrected Total	ความกว้างผล	1121.484	519			
	%เนื้อ	20452.867	519			
	ความยาวผล	3595.602	519			
	ดัชนีรูปร่างผล	55.651	519			
	ความแน่นเนื้อ	129.241	519			
	ความหวาน	1628.942	519			

**, ns = แตกต่างทางสถิติในระดับ 0.01 และไม่แตกต่างทางสถิติ ตามลำดับ

ตารางภาคผนวกที่ 4 ค่าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของลักษณะจำเพาะของผล ในกลุ่มผสมที่ 1 RML1 (*Cucumis melo* L. var. *conomon*; P₁)
กับ KML370 (*Cucumis melo* L. var. *cantalupensis*; P₂)

Source of variance	df	Mean square										
		น้ำหนัก ผล	เส้นรอบ วงผล	ความ หนา เปลือก	ความ หนา เนื้อ	ความ หนาไส้	ความ กว้างผล	%เนื้อ	ความยาว ผล	ดัชนี รูปร่าง ผล	ความ แน่น เนื้อ	ความ หวาน
Generation	5	2.09	6135.85	1.33	17.38	190.80	605.01	7608.89	829.85	7.78	11.43	382.25
Plots/Generation	18	0.25	9156.94	1.66	39.84	248.28	941.70	13556.43	1332.39	9.48	4.68	323.57
Plants/Plots/Generation	456	0.09	21.35	0.001	0.22	0.88	1.61	42.74	9.11	0.07	0.70	4.67
Plants/P₁	38	0.04	14.20	0.001	0.23	1.20	1.19	50.77	5.35	0.07	0.26	2.43
Plants/P₂	38	0.05	9.80	0.000	0.12	0.47	1.13	17.84	10.88	0.10	0.61	13.06
Plants/F₁	76	0.09	11.73	0.001	0.21	0.70	1.38	55.79	12.16	0.07	0.54	3.66
Plants/F₂	190	0.11	24.97	0.001	0.18	0.97	1.66	35.43	8.63	0.07	1.01	4.63
Plants/BC₁P₁	76	0.09	32.98	0.003	0.37	0.81	1.70	65.71	9.52	0.06	0.53	3.34
Plants/ BC₁P₂	38	0.07	17.88	0.004	0.24	1.04	2.62	24.17	6.60	0.08	0.29	3.38
Total	479											

ตารางภาคผนวกที่ 5 ค่าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของลักษณะจำเพาะของผล ในกลุ่มผสมที่ 2 RML1 (*Cucumis melo* L. var. *conomon*; P₁) กับ PI148 (*Cucumis melo* L. var. *cantalupensis*; P₂)

Source of variance	df	Mean square										
		น้ำหนัก ผล	เส้นรอบวง ผล	ความ หนา เปลือก	ความ หนา เนื้อ	ความ หนา ไส้	ความ กว้าง ผล	%เนื้อ	ความ ยาวผล	ดัชนี รูปร่าง ผล	ความ แน่น เนื้อ	ความ หวาน
Generation	5	0.70	7332.68	1.40	29.55	197.34	729.67	11885.69	1505.18	15.55	3.91	252.31
Plots/Generation	18	0.54	11151.35	2.41	35.35	360.00	1140.72	15161.87	1927.20	17.62	5.62	406.98
Plants/Plots/Generation	494	0.05	14.91	0.003	0.17	0.68	1.40	30.43	5.30	0.08	0.21	2.75
Plants/P₁	38	0.04	14.20	0.001	0.23	1.20	1.19	50.77	5.35	0.07	0.26	2.43
Plants/P₂	38	0.07	14.47	0.010	0.22	0.27	1.52	37.49	3.48	0.07	0.09	1.57
Plants/F₁	76	0.07	12.96	0.000	0.19	0.73	2.16	19.36	4.83	0.06	0.09	1.64
Plants/F₂	190	0.04	16.13	0.004	0.14	0.68	1.15	31.34	5.87	0.08	0.22	3.15
Plants/BC₁P₁	76	0.05	12.04	0.002	0.19	0.47	1.16	29.13	4.68	0.05	0.20	2.79
Plants/ BC₁P₂	76	0.04	17.28	0.002	0.13	0.79	1.53	26.85	5.88	0.13	0.38	3.56
Total	517											

ประวัตินักวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย

1. ชื่อ (ภาษาไทย) นาย อารักษ์ ธีรอำพน
(ภาษาอังกฤษ) Mr. Arak Tira-umphon
2. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 3 4098 00086 xx x
3. ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
4. หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4422-4358,-4204 โทรสาร 0-4422-4281
E-mail address:
arak@sut.ac.th, arakkorat@gmail.com,
5. ประวัติการศึกษา
 - 2548 – 2551 ระดับปริญญาเอก จาก มหาวิทยาลัยตูลูส ประเทศฝรั่งเศส (INP/ENSAT, Toulouse, France) หัวข้อวิทยานิพนธ์ <<Influence of the ethylene on the grape berry development and related-genes expression >>
 - 2547 ระดับประกาศนียบัตร จาก มหาวิทยาลัยตูลูส (INP/ENSAT, Toulouse, France) หัวข้อรายงาน << Role of the Ethylene in the Expression of the Glucose-Flavonoid UDP 3 ò-Glucosyltransferase (UFGT) of the Grape Tissues >>
 - 2534 - 2538 ระดับปริญญาโท (เกษตรศาสตร์) วิชาเอก การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน วิชาการ พันธุศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
หัวข้อวิทยานิพนธ์ << Genetic Variation in Growth and Yield of Crosses between Broccoli and Chinese Kale >>
 - 2530 – 2533 ระดับปริญญาตรี (เกษตรศาสตร์) วิชาเอก พืชสวน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

การปรับปรุงพันธุ์พืช (plant breeding), สรีรวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพพืช (plant physiology and biotechnology), เทคโนโลยีการผลิตผักและเมล็ดพันธุ์ผัก (vegetable crop and seed production technology), เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน (horticultural crop production technology)

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย – งานวิจัยที่แล้วเสร็จ

- การทดสอบพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในจังหวัดนครราชสีมา. วช.2540.
- การทดสอบระบบการปลูกและสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการผลิตแตงเทศโดยไม่ใช้ดิน ระยะ 1-2. วช.2542-2543.
- การผลิตผักคะน้าจีนอนามัยเชิงธุรกิจโดยวิธีผสมผสาน. วช.2544.
- ระบบการปลูก สูตรสารละลายธาตุอาหาร ภาชนะปลูกและวัสดุปลูกที่เหมาะสมสำหรับการปลูกผักกาดหอมโดยไม่ใช้ดิน. วช.2545.
- ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของการเจริญเติบโตและผลผลิตในการผสมระหว่างแตงไทย กับแตงแคนตาลูป. วช.2553.
- คลินิกเทคโนโลยี โครงการการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน: เทคโนโลยีทางเลือก. สกอ. 2553.
- คลินิกเทคโนโลยี โครงการการแก้ไข ฟื้นฟู และบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมหลังน้ำลด. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555.
- คลินิกเทคโนโลยี โครงการการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555.
- ความแปรปรวนทางพันธุกรรมในกล้วยไม้ลูกผสมสกุล *Doritaenopsis* ที่ถูกชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ. วช.2555-2556.
- ความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนทางพันธุกรรมกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแตงเทศและแตงไทย จากเทคนิค ISSR. วช.2555.
- สถานภาพและปัญหาในระบบการผลิต การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาดของผักเศรษฐกิจในเขตจังหวัดนครราชสีมา. วช.2556.

- ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการปลูกแต่งเทศเป็นการค้า. วช.2557.
- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักสลัดในระบบไฮโดรโปนิคส์. itap2559. (หัวหน้าโครงการ)

7.2 ผู้ร่วมโครงการวิจัย – งานวิจัยที่แล้วเสร็จ

- ศักยภาพในการนำวัสดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม และวัสดุธรรมชาติมาใช้เป็นวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน. สกว. 2550.
- การปรับปรุงระบบปลูกพืชในโรงเรือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต. ITAP. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2553.
- การฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดด้วยงานวิจัยของ วช. 2554.

7.3 งานวิจัยที่กำลังทำ (หัวหน้าโครงการ)

- ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของการเจริญเติบโตและผลผลิตในการผสมระหว่างแดงไทยกับแดงแคนตาลูป ระยะที่ 2. วช.2557. (อยู่ระหว่างการเขียนรายงานวิจัย)
- ผลของปัจจัยบางประการต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และการเก็บรักษาไข่น้ำด้วยระบบไฮโดรโปนิคส์. วช2588. (หัวหน้าโครงการ) (อยู่ระหว่างการเขียนรายงานวิจัย)
- การพัฒนาป่าชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสุนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูฐานทรัพยากรสมุนไพรอย่างยั่งยืน. วช2558. (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
- ความเข้มข้นของฮอร์โมนกลุ่มไซโตรไคนินที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มปริมาณต้นกล้วยไม้สกุล *Doritaenopsis* ที่ได้จาก การกลายพันธุ์. วช2558. (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
- การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เหลืองโคราชเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2558. (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
- โครงการ หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ผักสลัดอินทรีย์วังน้ำเขียว. 2558-2560. (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
- ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของการเจริญเติบโตและผลผลิตในการผสมระหว่างแดงไทยกับแดงแคนตาลูป ระยะที่ 3. วช2559. (หัวหน้าโครงการ) – อยู่ระหว่างดำเนินการ
- การพัฒนาป่าชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสุนารี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูฐานทรัพยากรสมุนไพรอย่างยั่งยืน. วช2559. (ผู้ร่วมโครงการ) – อยู่ระหว่างดำเนินการ

7.4 เอกสารตีพิมพ์

วารสารระดับนานาชาติ (International Journal)

- 1) Tira-umphon A, Chervin, C., El-Kereamy, A., Roustan, J.P., Lamon, J., Latche, A., Kanellis, A., and Bouzayen, M. (2005). Ethylene is required for the ripening of grape. *Acta Horticulturae* (689): 251-256.
- 2) Tira-umphon A, Roustan, J.P. and Chervin, C. (2007). The stimulation by ethylene of the UDP glucose-flavonoid 3-O-glucosyltransferase (UFGT) in grape tissues is independent from the MybA transcription factors. *Vitis* 46(4): 210-211.
- 3) Chervin C, Tira-umphon A., Terrier, N., Zouine, M., Severac, D. and Roustan, J.P. (2008). Stimulation of the grape berry expansion by ethylene and affects on related gene transcripts over the ripening phase. *Physiol. Plant.* (134): 534–546.
- 4) Chervin C, Tira-umphon A, Chatelet, P, Jauneau, A, Boss, PK and Tesniere C (2009) Ethylene and other stimuli affect expression of the UDP glucose-flavonoid 3-O-glucosyltransferase in a non-climacteric fruit. *Vitis* (48): 11-16.
- 5) Sukkaew, P. and Tira-umphon, A. (2013). Effects of Storage Conditions on Allicin Content in Garlic (*Allium sativum*). *Acta Horticulturae* (969): 209-212.
- 6) Jiaju, L., Tira-umphon, A., Zhengxue, Z., Shifu, L. and Lan, Y. (2014). Effect of Bacteriostat (Qianxing No.1) on Open Tissue Culture of Sugarcane. *Agricultural Science & Technology*. 15(9): 1478-1481.

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference)

- 1) Tira-umphon A, C Chervin, N Terrier, Roustan JP. (2006). The ethylene effect on the berry diameter and related gene expression in grape. *In* Europe-Asia symposium on Quality Management in Postharvest Systems, 3 – 6 December 2007, Bangkok, Thailand.
- 2) Tira-umphon A, Chervin C, PK Boss, Chatelet P, Jauneau A, Tesniere C, El-Kereamy A, Torregrosa L, Thomas MR, Roustan JP, Bouzayen M. (2006). Roles for ethylene in the expression of the UDP glucose-flavonoid 3-O-glucosyltransferase in grape tissues. *In* XIII^{ème} Forum des Jeunes Chercheurs, 5 - 8 September 2006, Clermont-Ferrand, France.

- 3) Jaidee S., Wonprasaid S., Wongkeaw, S., Tira-umphon, A. and Boonkerd, N. (2010). Effects of Ethephon Application on Grape Fruit Quality and Yield. In 16th Asian Agricultural Symposium and 1st International Symposium on Agricultural Technology Proceedings “Sufficiency Agriculture”. 25-27 August 2010, Bangkok, Thailand.
- 4) Sukkaew, P. and Tira-umphon, A. (2012). Effects of storage conditions on allicin content in garlic (*Allium sativum*). In the 6th International Symposium on Edible Alliaceae. 21-24 May 2012, Fukuoka, Japan.
- 5) Dedboon, J. and Tira-umphon, A. (2014). Genetic Variation Induction in *Doritaenopsis* Hybrid by Gamma Irradiation in vitro. In the 11th Asia Pacific Orchid Conference. 2-11 February 2013, Okinawa, Japan.
- 6) Tira-umphon A. and Sibponkrung, S. (2014). Generation Mean Analysis of Fruit Characteristics in Crosses between Thai melon (*Cucumis melo* L. var. conomon) and Cantaloupe (*Cucumis melo* L. var. reticularis). In the 29th International Horticultural Congress 2014. 17-22 August 2014, Brisbane, Australia.
- 7) Tira-umphon A. and Sripongprapai, S. (2015). Gene Effect Evaluation of Fruit Characters and Their Related to Shelf Life in A Cross between Thai melon and Cantaloupe, In the V International Symposium on Cucurbits 2015. 22-26 June 2015, Murcia, Spain.
- 8) 8).Tongdeenok T. and Tira-Umphon, A. (2016). Intraspecific classification of Cantaloupe (*Cucumis melo* L. var. reticularis Naudin.) and Thai Melon (*Cucumis melo* L. var. conomon) in molecular variation. In the 3rd International Conference Agriculture and Forestry (ICOAF 2016). 1–3 June 2016, Manila, Philippines.
- 9) Jiaju L., Tira-umphon A., Guoqiong Y., Shifu L., Erqi H., and Chaoyun L. (2016). Application of CO₂ Gas Fertilizer in Sugar-free Tissue Culture for Sugarcane. In the 7th International Crop Science Congress. 14-19 August 2016. Beijing, China.

วารสารระดับชาติ (National Journal)

- 1) Tira-umphon, A. (1998). Vegetable Soybean Variety Trial in Nakhon Ratchasima. Suranaree Journal Science Technology 7:232-241.
- 2) Tira-umphon, A. and Kumthong U. (2001). Soilless Culture System of Melon Testing between NFT and DWT. Agricultural Science Journal 32 (1-4):77-85.
- 3) Tira-umphon, A. and Kumthong U. (2001). Comparison of Melon Cultivars in Greenhouse and Field in Rainy Season. Agricultural Science Journal 32(1-4):147- 50.
- 4) Sukkaew, P. and Tira-umphon, A. (2013). Effects of Nitrogen and Sulfur on Allicin Content in Garlic (*Allium sativum* L.). Khon Kaen Agri. J. 41 Suppl. 1.:273-277.
- 5) Sibponkrung, S. and Tira-umphon, A. (2010). Genetic Variability of Fruit Characteristics between Thai Melon (*Cucumis melo* var. conomon), and Cantaloupe (*Cucumis melo* L. var. cantalupensis) Hybrids. Agricultural Sci. J. 42 3/1 (Suppl):211-214.
- 6) Sripongprapai, S. and Tira-umphon, A. (2015). Genetic variation of fruit of shelf-life in a cross between Thai melon (*Cucumis melo* var. conomon) and Cantaloupe (*Cucumis melo* L. var. cantaloupensis). Khon Kaen Agr. J. 43(2):353-358.

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (National Conference)

- 1) Tira-umphon, A. and Leonorasae, K. (2001). Suitable of Soilless culture system for melon Production. In Proceeding of the 5th Khon Kaen University Annual Agriculture Seminar, 26-27 January 2001, Khon Kaen.
- 2) Tira-umphon, A. and Kumthong, U. (2001) Comparison of suitable melon cultivars for the greenhouse production. In Proceeding of the 39th Kasetsart University Annual Conference, 5 -7 February 2001, Bangkok.
- 3) Tira-umphon, A. and Srimunvai, P. (2009). The Comparison of Melon Varieties in Hydroponic System. In Proceeding of the 8th National Horticultural Congress, 6-9 May 2009, Chiang Mai.

- 4) Sibponkrung, S. and Tira-umphon, A. (2010). Genetic Variability of Fruit Characteristics between Thai Melon (*Cucumis melo* var. conomon), and Cantaloupe (*Cucumis melo* L. var. cantalupensis) Hybrids. In Proceeding of the 10th National Horticultural Congress, 18-20 May 2010, Bangkok.
- 5) Sukkaew, P. and Tira-umphon, A. (2013). Effects of Nitrogen and Sulfur on Allicin Content in Garlic (*Allium sativum* L.). In Proceeding of the 14th Khon Kaen University Annual Agriculture Seminar, 28-29 January 2013, Khon Kaen.
- 6) Sripongprapai, S. and Tira-umphon, A. (2014). Genetic variation of correlated characters of shelf-life in a cross between Thai melon (*Cucumis melo* var. conomon) and Cantaloupe (*Cucumis melo* L. var. cantalupensis). In Proceeding of the 52nd Kasetsart University Annual Conference, 4-7 February 2014, Bangkok.
- 7) Tira-umphon A., Lohanut P., Yenwaree S. and Nakmai A. (2016). Situation of Organic Lettuce Seed Handling of Sufficiency Economy Settlements, Wang Nam Khiao District, Nakhon Ratchasima. In Proceedings of the 13th National Seed Conference, 21-25 June 2016, Surin.
- 8) Damna, N., Saikaew, W., and Tira-umphon, A. (2016). Effect of Fertilizer Type and Light Filter Level to Yield and Quality of Wolffia (*Wolffia arrhiza* (L.) Wimm. In Proceeding of the 15th National Horticultural Congress, 9-12 November 2016, Songkla.
- 9) Jantaku, N., Kaewsopha, T., Sirisawat, P., Damna, N., Nakmai, A. and Tiraumphon, A. (2016). Size and Shape of Container-Grown for Affecting Melon Yield and Fruit Quality with Substrate Culture In Proceeding of the 15th National Horticultural Congress, 9-12 November 2016, Songkla.

สิทธิบัตร (Patent)

-Jiaju L., **Tira-umphon A.**, Shifu L., Yufei Z., Fanzhi L., Zhenxue Z., and Xiangyong L., Net photosynthetic rapidly determinate system for a whole plantlet *in vitro*. Patent Number: ZL 2013 2 0823127.4, December 16th, 2013.

การบรรยายพิเศษ

- **Tira-umphon A.**, The Workshop and Training Program on *Melon Production*, Program Manager and Speaker at Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, between March-April 2016, 5 times with more than 100 participates.
- **Tira-umphon A.**, The Workshop and Training Program on *Soiless Culture System*, Program manager and Speaker at Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, between 2000-2015, more than 25 times with more than 1,500 participates.

