

การศึกษาการถ่ายเทมวลคาร์บอนของการผลิตอาหารจากการทำฟาร์มปลูสัตว์  
เพื่อพัฒนาค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยคาร์บอน:  
กรณีศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา

นายประยงค์ กิรติอุไร

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ปีการศึกษา 2552

**THE STUDY OF CARBON MASSFLOW OF FOOD  
PRODUCTION FROM ANIMAL HUSBANDRY TO  
DEVELOP C-EMISSION FACTORS: A CASE STUDY  
IN NAKHON RATCHASIMA PROVINCE**

**Prayong Keeratiurai**

**A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the  
Degree of Doctor of Philosophy in Environmental Engineering**

**Suranaree University of Technology**

**Academic Year 2009**

การศึกษาการถ่ายเทมวลสารบ่อนของการผลิตอาหารจากการทำฟาร์มปลูสดัว เพื่อ  
พัฒนาค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยคาร์บอน: กรณีศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาคุณวุฒิปบัณฑิต

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

(ผศ. ดร.สุจิตต์ กระจิต)

ประธานกรรมการ

(ผศ. ดร.ณัฐวุฒิ ธานี)

กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

(อ. ดร.วุฒิ คำนกิตติกุล)

กรรมการ

(ศ. ช่าง เปรมปรีดี)

กรรมการ

(ผศ. ดร.จรียา ยิมรัตน์บวร)

กรรมการ

(ศ. ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

(รศ. น.อ. ดร.วราภรณ์ ขำพิศ)

คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ประยงค์ กิระดิอุไร : การศึกษาการถ่ายเทมวลคาร์บอนของการผลิตอาหารจากการทำฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยคาร์บอน: กรณีศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา (THE STUDY OF CARBON MASSFLOW OF FOOD PRODUCTION FROM ANIMAL HUSBANDRY TO DEVELOP C-EMISSION FACTORS: A CASE STUDY IN NAKHON RATCHASIMA PROVINCE) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธานี, 376 หน้า.

สภาวะเรือนกระจกก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่ง ตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหานี้คือ แก๊ส  $CO_2$  และ  $CH_4$  การทำปศุสัตว์โดยเฉพาะโคนม โคเนื้อและกระบือ และการใช้พลังงานสำหรับการเลี้ยงสุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่เพื่อการผลิตเนื้อ นม ไข่เป็นสาเหตุของการเพิ่มปริมาณ  $CO_2$  และ  $CH_4$  ในชั้นบรรยากาศ ดังนั้นจึงควรศึกษาเพื่อพัฒนาค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจากการทำฟาร์มโคนม โคเนื้อ กระบือ สุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่ และเพื่อศึกษาอัตราการถ่ายเทมวลคาร์บอนจากในพืชอาหารสัตว์ไปสู่สัตว์ชนิดต่าง ๆ โดยการกิน การศึกษาอัตราการปลดปล่อยปริมาณคาร์บอนจากการใช้พลังงานที่มีส่วนสำคัญในกระบวนการผลิตเนื้อ นม ไข่ และจากการทำฟาร์มปศุสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา กระทำโดยสำรวจเก็บข้อมูลจากฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์ใน 26 อำเภอ และ 6 กิ่งอำเภอของจังหวัดนครราชสีมา จำนวนตัวอย่างของฟาร์มในแต่ละอำเภอ และกิ่งอำเภอ และตัวสัตว์แต่ละชนิดจะคำนวณจากการประมาณค่าเฉลี่ยประชากรที่ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% และวิเคราะห์ตัวอย่างพืชอาหาร มูลสัตว์ และเนื้อสัตว์ในห้องปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบว่า ค่าการปลดปล่อยคาร์บอนที่น้ำหนักตัวของสัตว์เท่ากับจากการใช้พลังงานของฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ หรือสหกรณ์โคนม และตัวของโคนม โคเนื้อ กระบือ สุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่ มีค่าเท่ากับ 0.0072, 0.0066, 0.0051, 0.0339, 0.0851 และ 0.0450 กิโลกรัมคาร์บอน/กิโลกรัมน้ำหนักตัวสัตว์/วัน ตามลำดับ และค่าปริมาณการตรึงคาร์บอนในรูปของนม เนื้อ อวัยวะ และไข่ไก่ของสัตว์ทั้ง 6 ชนิดที่ศึกษาเท่ากับ 0.0095, 0.0102, 0.0104, 0.0062, 0.0111 และ 0.0136 กิโลกรัมคาร์บอน/กิโลกรัมน้ำหนักตัวสัตว์/วัน ตามลำดับ อัตราการถ่ายเทของปริมาณคาร์บอนจากหญ้าและพืชอาหารสัตว์ไปสู่ตัวของสัตว์แต่ละชนิดโดยการกินอาหารในแต่ละวันของโคนม โคเนื้อ กระบือ สุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่ มีค่าเท่ากับ 0.0154, 0.0148, 0.0143, 0.0087, 0.0184 และ 0.0220 กิโลกรัมคาร์บอน/กิโลกรัมน้ำหนักตัวสัตว์/วัน ตามลำดับ และยังพบอีกว่าตัวของกระบือสามารถปลดปล่อยคาร์บอนออกมาต่ำสุดเพียง 27.67% ของปริมาณคาร์บอนจากพืชที่ถ่ายเทเข้าสู่กระบือโดยการกินในขณะที่ไก่เนื้อ โคนม ไก่ไข่ โคเนื้อ และสุกรจะปลดปล่อยคาร์บอนออกมาเท่ากับ 39.53% 38.60% 38.10% 30.85% และ 28.78% ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าคาร์บอนที่ถูกปลดปล่อยออกจากการผลิตเนื้อไก่มีส่วนในการก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมมากกว่าการผลิตเนื้อโค สุกร และกระบือ

รวมทั้งการผลิตนมโค และไข่ไก่ ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับประสิทธิภาพในการตรึงคาร์บอนของ  
 กระบือเท่ากับ 72.33% สุกร 71.22% โคนม 69.15% ไก่ไข่ 61.90% โคนม 61.40% และไก่เนื้อ  
 60.47% ดังนั้นการเลี้ยงกระบือและสุกร ควรถูกส่งเสริมมากกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นเพื่อลดปัญหา  
 สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ผลการศึกษานี้ยังสามารถแสดงสมการความสัมพันธ์ระหว่างการปลดปล่อย  
 คาร์บอนกับปริมาณคาร์บอนที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวสัตว์โดยการกินพืชอาหารต่อตัวต่อวัน (Sig. F < 0.05)  
 ดังสมการ  $C\text{-emitted}_{\text{โคนม}} = 0.2907(C_{\text{พืช}}) + 0.6612$  ที่  $\text{Adj. } R^2 = 0.77$ , สมการ  $C\text{-emitted}_{\text{โคนม}} =$   
 $0.1853(C_{\text{พืช}}) + 0.5515$  ที่  $\text{Adj. } R^2 = 0.98$ , สมการ  $C\text{-emitted}_{\text{กระบือ}} = 0.1607(C_{\text{พืช}}) + 0.7559$  ที่  $\text{Adj. } R^2$   
 $= 0.99$ , สมการ  $C\text{-emitted}_{\text{สุกร}} = 0.1737(C_{\text{พืช}}) + 0.1007$  ที่  $\text{Adj. } R^2 = 0.78$ , สมการ  $C\text{-emitted}_{\text{ไก่เนื้อ}} =$   
 $0.6572(C_{\text{พืช}}) - 0.0112$  ที่  $\text{Adj. } R^2 = 0.63$  และสมการ  $C\text{-emitted}_{\text{ไก่ไข่}} = 0.6283(C_{\text{พืช}}) - 0.0107$  ที่  $\text{Adj. } R^2$   
 $= 0.87$  ตามลำดับ

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
 ปีการศึกษา 2552

ลายมือชื่อนักศึกษา \_\_\_\_\_  
 ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา \_\_\_\_\_  
 ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม \_\_\_\_\_

PRAYONG KEERATIURAI : THE STUDY OF CARBON MASSFLOW  
OF FOOD PRODUCTION FROM ANIMAL HUSBANDRY TO DEVELOP  
C-EMISSION FACTORS: A CASE STUDY IN NAKHON RATCHASIMA  
PROVINCE. THESIS ADVISOR : ASST. PROF. NATHAWUT THANEE,  
Ph.D., 376 PP.

## CARBON EMISSION FACTORS/CARBON MASSFLOW/LIVESTOCK/FOOD PRODUCTION

One of the environmental threats that our planet faces today is the greenhouse effect. The global warming problem is caused by livestock production which releases CO<sub>2</sub> and CH<sub>4</sub> to the atmosphere. Dairy cows, ox, and buffaloes are herbivores while pigs, chickens, and hens are energy-using that are raised for their meat, milk, eggs, and all produce emissions of both CO<sub>2</sub> and CH<sub>4</sub>. Therefore, it is important to determine carbon emitted factors, to investigate the rate of carbon massflow from plants to dairy cows, ox, buffaloes, pigs, chickens, and hens, and to study the carbon emission in energy patterns that are used in meat, milk, and egg production from dairy cow, ox, buffalo, pig, chicken, and hen farms and slaughterhouses, in 26 districts and 6 subdistricts of Nakhon Ratchasima province. Samples of grass and food used for feeding in meat production and the feces produced were collected and transferred to the laboratory for analysis. The study showed that the carbon emitted per living weight from dairy cows, ox, buffaloes, pigs, chickens, and hens and emission from farms, and slaughterhouses in meat production were 0.0072, 0.0066, 0.0051, 0.0339, 0.0851 and 0.0450 kg. C/kg. living weight/day, respectively. The carbon fixation in

milk, meat, organs and eggs from dairy cows, ox, buffaloes, pigs, chickens, and hens were 0.0095, 0.0102, 0.0104, 0.0062, 0.0111, and 0.0136 kg.C/living weight/day, respectively. The rate of carbon massflow from grass and animal feed was 0.0154, 0.0148, 0.0143, 0.0087, 0.0184, and 0.0220 kg.C/living weight/day, respectively. The carbon emission from the buffalo was 27.67% of the carbon contents that were transferred to buffalo by feeding. On the other hand, emitted carbon from chickens, dairy cows, hens, ox, and pigs were 39.53%, 38.60%, 38.10%, 30.85%, and 28.78%, respectively. The carbon emitted from chicken meat production increased environmental problems more than from ox, pig, and buffalo meat production, milk, and egg production, respectively. The results also showed that carbon fixation in the buffalo was 72.33%, pig was 71.22%, ox was 69.15%, hen was 61.90%, dairy cow was 61.40%, and chicken was 60.47%. For an equal quantity of meat production it can be suggested that decreasing ox and chicken meat production and increasing buffalo and pig meat production can decrease the environmental problems. The carbon contents emitted from dairy cows, ox, buffaloes, pigs, chickens, and hens can be determined from the rate of carbon massflow from plants (Sig.  $F < 0.05$ ) by using the equation as follow;  $C\text{-emitted}_{\text{dairy cow}} = 0.2907(C_{\text{plant}}) + 0.6612$ , Adj.  $R^2 = 0.77$ :  $C\text{-emitted}_{\text{ox}} = 0.1853(C_{\text{plant}}) + 0.5515$ , Adj.  $R^2 = 0.98$ :  $C\text{-emitted}_{\text{buffalo}} = 0.1607(C_{\text{plant}}) + 0.7559$ , Adj.  $R^2 = 0.99$ :  $C\text{-emitted}_{\text{pig}} = 0.1737(C_{\text{plant}}) + 0.1007$ , Adj.  $R^2 = 0.78$ :  $C\text{-emitted}_{\text{chicken}} = 0.6572(C_{\text{plant}}) - 0.0112$ , Adj.  $R^2 = 0.63$ :  $C\text{-emitted}_{\text{hen}} = 0.6283(C_{\text{plant}}) - 0.0107$ , Adj.  $R^2 = 0.87$ , respectively.

School of Environmental Engineering

Academic Year 2009

Student's Signature \_\_\_\_\_

Advisor's Signature \_\_\_\_\_

Co-advisor's Signature \_\_\_\_\_

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบุคคล และกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งได้ให้ความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง ทั้งด้านวิชาการและด้านการดำเนินการวิจัย ซึ่งได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธานี และอาจารย์ ดร.วุฒิ ค่านกิตติกุล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ และแนวทางอันเป็นประโยชน์ยังต้องงานวิจัย รวมถึงได้ช่วยตรวจทาน และแก้ไขรายงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้จนทำให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นกำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตหลาย ๆ ด้านให้กับผู้วิจัยเสมอมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตต์ ทรูจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา ยัมรัตน์บวร และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทุกท่าน รวมถึงศาสตราจารย์ ช่าง เปรมปรีดิ์ ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ และความรู้ทางด้านวิชาการอย่างดียิ่งมาโดยตลอด

ขอขอบคุณ คุณณารี กลิ่นกลาง และคุณจริยาพร ศรีวิไลลักษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในการอนุเคราะห์การดำเนินการและตรวจรูปแบบการจัดทำวิทยานิพนธ์

ขอขอบคุณ พี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ บัณฑิตศึกษาทุกท่าน รวมถึงมิตรสหายทั้งในอดีตและปัจจุบันที่คอยให้กำลังใจในการทำวิจัยมาโดยตลอด

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และสภาวิจัยแห่งชาติ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเงินทุนทางด้านการศึกษาแก่ผู้วิจัยอย่างดียิ่งมาโดยตลอด จนทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ทางด้านต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน และขอกราบขอบพระคุณ บิดา คุณพ่อสกุศล และมารดา คุณแม่เข็มเสียง กิรติอุไร รวมถึงญาติพี่น้องของผู้วิจัยทุกท่าน ที่ได้ให้ความรัก ความอบอุ่น ความห่วงใย การอบรมเลี้ยงดู นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณสริมน กิรติอุไร (ภรรยา) และลูก ๆ ทั้ง 3 คน ได้แก่ ค.ญ. รมีตา ค.ญ. ศศิชา และ ค.ช. สิทธานต์ กิรติอุไร ที่ได้เสียสละเวลา ความสุข และให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาอย่างดียิ่งมาโดยตลอด รวมทั้งเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ในยามที่ผู้วิจัยท้อและท้อแท้ใจ ช่วยให้มีพลังใจเข้มแข็งพร้อมเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ จนทำให้ผู้วิจัยประสบความสำเร็จในชีวิตเรื่อยมา

ประยงค์ กิรติอุไร



# สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ (ภาษาไทย).....	ก
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ).....	ค
กิตติกรรมประกาศ.....	จ
สารบัญ.....	ฉ
สารบัญตาราง.....	ญ
สารบัญรูป.....	ด
คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ.....	ธ
<b>บทที่</b>	
<b>1 บทนำ</b>	
1.1 ความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย.....	5
1.3 ขอบเขตการวิจัย.....	6
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ.....	7
<b>2 ปรัชญ่วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง</b>	
2.1 ระบบนิเวศและความสัมพันธ์เชิงระบบ.....	9
2.2 การวิเคราะห์สมดุลคาร์บอนจากปริมาณปศุสัตว์.....	34
2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการต่าง ๆ.....	38
2.4 แนวทางในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนจากงานวิจัยในอดีต.....	47
2.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนจากการเลี้ยงสัตว์.....	51
2.6 งานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.....	59
<b>3 วิธีดำเนินการวิจัย</b>	
3.1 ชนิดของปศุสัตว์ และพื้นที่เป้าหมายในการศึกษา.....	74
3.2 จำนวนตัวอย่าง สถานที่ในการเก็บตัวอย่าง และวิธีการทดสอบในห้องปฏิบัติการ.....	76
3.3 ขั้นตอนในการดำเนินการศึกษาวิจัย.....	83

## สารบัญ (ต่อ)

### หน้า

3.4	การเก็บรวบรวมข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย .....	85
3.5	การวิเคราะห์ข้อมูล .....	85
3.6	สรุปแนวทางในการดำเนินการวิจัย .....	88
<b>4</b>	<b>ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผล</b>	
4.1	การสำรวจปริมาณสัตว์แต่ละชนิดที่มีการทำฟาร์มในจังหวัดนครราชสีมา .....	92
4.2	ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนและอัตราการถ่ายเทปริมาณคาร์บอนจากการเลี้ยงสัตว์ .....	98
4.3	ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนจากการใช้พลังงานที่มีส่วนสำคัญในการผลิตเนื้อ นม ไข่ .....	121
4.4	ความสัมพันธ์ระหว่างรอยละคาร์บอนกับคุณสมบัติต่าง ๆ ของพืชอาหารสัตว์เนื้อ นม ไข่ และมูลจากสัตว์ และการวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมจากชนิดของการเลี้ยงสัตว์ .....	125
4.5	แนวทางในการวิเคราะห์ เพื่อลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนจากการผลิตเนื้อ โคเนื้อ เนื้อกระบือ เนื้อสุกร เนื้อไก่ นมโค และไข่ไก่ รวมทั้งแนวโน้มจากการทำปศุสัตว์ทั้ง 6 ชนิดในจังหวัดนครราชสีมา .....	134
4.6	สรุปภาพรวมการถ่ายเท การตรึง และการปลดปล่อยคาร์บอนของสัตว์ชนิดต่าง ๆ .....	139
<b>5</b>	<b>บทสรุปและข้อเสนอแนะ</b>	
5.1	สรุปผลการศึกษา .....	150
5.2	สรุปแนวทางการลดการปลดปล่อยคาร์บอนสำหรับการผลิตเนื้อ นม และไข่ .....	154
	รายการอ้างอิง .....	157
	ภาคผนวก	
	ภาคผนวก ก. ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวไก่ไข่และน้ำหนักไข่เฉลี่ยเทียบกับอายุไก่ อายุไข่ และสัดส่วนองค์ประกอบของไข่ไก่ .....	174
	ภาคผนวก ข. ชนิดรถบรรทุกและน้ำหนักรถเปล่าที่มีการใช้งาน .....	179
	ภาคผนวก ค. แหล่งคาร์บอนที่ถูกตรึงไว้ในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ .....	181

## สารบัญ (ต่อ)

### หน้า

ภาคผนวก ง.	ข้อมูลประกอบรายงานตามข้อกำหนดของ UNFCCC ที่เกี่ยวกับการถ่ายเทมวลคาร์บอนสำหรับการผลิตอาหารจากการทำฟาร์มปศุสัตว์และโรงฆ่าสัตว์รวมทั้งสหกรณ์โคนมในจังหวัดนครราชสีมา.....	191
ภาคผนวก จ.	แหล่งคาร์บอนที่ถูกตรึงไว้ในพืชอาหารสัตว์แต่ละชนิด .....	198
ภาคผนวก ฉ.	ตัวอย่างตัวคูณการปล่อยมลพิษสำหรับแหล่งกำเนิดประเภทสันดาปเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟ้า และปริมาณการใช้คาร์บอนในรูปของพลังงานต่าง ๆ.....	203
ภาคผนวก ช.	การวิเคราะห์หาค่าคาร์บอนด้วยเครื่อง CNS – 2000 หรือ CHNS – 932 Analyzer .....	208
ภาคผนวก ซ.	แบบตารางที่ใช้ในการสำรวจข้อมูลภาคสนามจากฟาร์มเลี้ยงและโรงฆ่าสัตว์ชนิดต่าง ๆ.....	211
ภาคผนวก ฌ.	แนวโน้มการเกิดแก๊ส CO <sub>2</sub> จากการหายใจของไก่อเนื้อและไก่ไข่.....	216
ภาคผนวก ฎ.	บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่.....	208
ภาคผนวก ฏ.	ข้อมูลดิบระหว่าง C-input กับ C-emitted และ C-input กับ C-fixation ของโคนม โคเนื้อ กระบือ สุกร ไก่อเนื้อและไก่ไข่ ที่ทำการศึกษาระหว่างปี 2550-2551 .....	222
ภาคผนวก ฐ.	ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตรึงคาร์บอนกับคาร์บอนที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวไก่ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% .....	279
ภาคผนวก ฑ.	จำนวนฟาร์มและตัวสัตว์แต่ละชนิดในปี 2548 แยกเป็นรายอำเภอและกิ่งอำเภอของจังหวัดนครราชสีมา .....	283
ภาคผนวก ท.	ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยของโคเนื้อและกระบือที่อายุต่าง ๆ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%.....	286
ภาคผนวก ธ.	ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจากจำนวนการเลี้ยงโคเนื้อตามปกติ 10% 50% 60% 70% และ 80% ในปีต่าง ๆ.....	291

## สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ภาคผนวก ค. การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอน จากจำนวนการเลี้ยงกระบือตามปกติ 20% 30% และ 40% ในปีต่าง ๆ .....	295
ภาคผนวก ด. การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอน จากจำนวนโคเนื้อและกระบือที่เลี้ยงในปีต่าง ๆ.....	298
ภาคผนวก ถ. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ .....	301
ประวัติผู้เขียน .....	376

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1	ธาตุที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต..... 13
2.2	ร้อยละของคาร์บอนที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในสารอินทรีย์แต่ละชนิด ..... 23
2.3	ปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจกที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2537..... 34
2.4	การคำนวณการผลิตและการบริโภคของปศุสัตว์แต่ละชนิดเป็นรายอำเภอ และกิ่งอำเภอ..... 35
2.5	การกำหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane ..... 42
2.6	ตัวอย่างจำนวนประชากรและจำนวนกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan..... 43
2.7	ตัวอย่างการจัดผลลัพธ์ในรูปของเมทริกซ์..... 44
2.8	ตัวอย่างการคำนวณผลลัพธ์เพื่อการตัดสินใจโดยอาศัยการประยุกต์ใช้ กฎของลาปลาซ..... 45
2.9	ผลลัพธ์ที่สถานะ X..... 46
2.10	ค่าสูงสุดของความเสียหายในแต่ละทางเลือก..... 47
2.11	ขนาดและการเพิ่มขึ้นของสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงจากฟาร์มในปี 1997 ..... 51
2.12	การกระจายของแก๊สเรือนกระจกที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากกิจกรรม ทางการเกษตร ..... 52
2.13	การจำลองการถ่ายเทคาร์บอนของระบบการผลิตเนื้อวัวในอเมริกา ..... 53
2.14	แหล่งการเกิดแก๊ส CH <sub>4</sub> จากกิจกรรมของมนุษย์..... 59
2.15	ปริมาณแก๊สชีวภาพและส่วนประกอบของแก๊สชีวภาพที่เกิดจาก การย่อยสลายคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ..... 70
2.16	ข้อมูลเกี่ยวกับแก๊ส CH <sub>4</sub> ที่ผลิตได้ ..... 71
2.17	ข้อมูลพลังงานที่ได้จากแก๊ส CH <sub>4</sub> ..... 71
3.1	ชนิดของปศุสัตว์ที่มีความสำคัญของจังหวัดนครราชสีมา..... 75
3.2	จำนวนการเก็บตัวอย่างฟาร์มและจำนวนตัวอย่างโคนม โคนเนื้อ กระบือ แยกเป็นรายอำเภอ และกิ่งอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา..... 77

## สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
3.3	จำนวนการเก็บตัวอย่างฟาร์มและจำนวนตัวอย่าง สุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ แยกเป็นรายอำเภอ และกิ่งอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา..... 57
3.4	ตัวอย่างการคำนวณจำนวนตัวอย่างในแต่ละอำเภอ..... 81
3.5	ตัวอย่างการคำนวณจำนวนตัวอย่างฟาร์มในแต่ละอำเภอ..... 81
3.6	ตัวอย่างการคำนวณจำนวนตัวอย่างสัตว์ในฟาร์มของอำเภอที่ 1 ..... 81
3.7	วิธีการในการทดสอบหาคุณสมบัติของพืชอาหารสัตว์ที่ใช้ใน การเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด..... 82
3.8	วิธีการในการทดสอบคุณสมบัติของเนื้อ นม ไข่ และมูลสัตว์ ของสัตว์แต่ละชนิด ..... 83
3.9	ตัวอย่างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากปศุสัตว์แต่ละชนิดที่ต้องการ จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามฟาร์มของแต่ละอำเภอ และกิ่งอำเภอ ..... 87
4.1	ปริมาณสัตว์ชนิดต่าง ๆ ในแต่ละปีและแนวโน้มการทำฟาร์มใน จังหวัดนครราชสีมา..... 93
4.2	อัตราการถ่ายเท การตรึง และการปลดปล่อยปริมาณคาร์บอน ของสัตว์ชนิดต่าง ๆ ..... 99
4.3	การปลดปล่อยคาร์บอนต่อตัวต่อวันและการปลดปล่อยคาร์บอนต่อวัน เทียบจากน้ำหนักสัตว์แต่ละชนิดที่เท่ากัน ..... 99
4.4	แก๊สที่เกิดจากสัตว์แต่ละชนิดที่เลี้ยงในฟาร์มต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา..... 102
4.5	ค่าเฉลี่ยปริมาณคาร์บอนที่ถูกถ่ายเท ( $C_{plant}$ ) ตรึงสะสมในสัตว์ ( $C_{fixation}$ ) ปลดปล่อยออกจากสัตว์ ( $C_{emitted}$ ) ในมูลสัตว์ ( $C_{output}$ ) และ $C_{emission}$ ของแก๊ส $CO_2$ และ $CH_4$ จากมูล การหายใจ และการย่อยอาหาร ..... 106
4.6	สัดส่วนเนื้อรวมและเครื่องในของสัตว์แต่ละชนิด ..... 110
4.7	ค่าเฉลี่ย C-emission จากพลังงานที่ฟาร์ม และ โรงฆ่าสัตว์ หรือสหกรณ์โคนมไข่ ..... 122

## สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.8	ค่าเฉลี่ยและความสัมพันธ์ของคาร์บอน น้ำหนักแห้ง ของพืชอาหาร ที่สัตว์กินและมูลสัตว์ที่ขับถ่ายออกมาต่อตัวต่อวันและระยะเวลา การเลี้ยงเฉลี่ยของสัตว์แต่ละชนิด..... 126
4.9	ความสัมพันธ์ของความชื้น ของแข็งระเหย และปริมาณคาร์บอน ของพืชอาหารสัตว์ มูลสัตว์ น้ำนมโค เนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ และไขไก่..... 128
4.10	ผลการปลดปล่อยคาร์บอนในสถานการณ์ต่าง ๆ จากการทำปุ๋ยสัตว์ ในรูปแบบทริกซ์..... 131
	(ก) ผลลัพธ์จากการประยุกต์ใช้กฎของลาปลาซ ..... 131
	(ข) ผลลัพธ์จากการประยุกต์ใช้กฎสูงสุดจากสูงสุด..... 132
	(ค) ค่าความเสียหายของแต่ละทางเลือกในการทำปุ๋ยสัตว์..... 133
	(ง) ค่าสูงสุดของความเสียหายในแต่ละทางเลือกทำปุ๋ยสัตว์..... 134
4.11	การเปรียบเทียบสัดส่วนการปลดปล่อยคาร์บอนระหว่างจากตัวสัตว์ กับจากการใช้พลังงานของฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์ หรือสหกรณ์โคนม ใช้ในการผลิตเนื้อ นม ไข่ ของสัตว์ชนิดต่าง ๆ..... 137
	(ก) การทดลองปรับสัดส่วนจำนวนการเลี้ยงโคเนื้อ : กระบือ ..... 143
	(ข) สัดส่วนของการทดลองปรับจำนวนการเลี้ยงกระบือ : จำนวนโคเนื้อ ..... 144
5.1	อัตราการถ่ายเท การตรึง และการปลดปล่อยปริมาณคาร์บอน ของสัตว์ชนิดต่าง ๆ..... 132
ก.1	ความสัมพันธ์ของน้ำหนักตัวไก่ไข่ และน้ำหนักไข่เฉลี่ยกับอายุไข่ และอายุไข่..... 175
ข.1	ชนิดรถบรรทุกและน้ำหนักรถเปล่าที่มีการใช้งาน ..... 180
ค.1	ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารในสัตว์เลี้ยงประเภทต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล..... 183
ค.2	ส่วนประกอบของโภชนะในเนื้อสัตว์ประเภทต่าง ๆ ..... 183
ค.3	รายละเอียดของสัตว์เลี้ยงทางเศรษฐกิจแต่ละชนิดในจังหวัดนครราชสีมา ..... 184

## สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
ค.4	ระยะเวลาสูงสุดของการตรึงคาร์บอนในรูปของอาหารที่อุณหภูมิ -18 °ซ โดยคุณภาพของอาหารคงเดิม ..... 185
ค.5	ปริมาตรของโลหิตสัตว์..... 186
ค.6	สัดส่วนของส่วนประกอบในน้ำนมจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่ละชนิด ..... 187
ค.7	พันธุ์และชนิดของสัตว์ให้นมในการให้น้ำนมเฉลี่ยกิโลกรัมต่อปี..... 187
ค.8	สัดส่วนของส่วนประกอบทางเคมีของไขทั้งหมด ..... 188
ค.9	น้ำหนักไขต่อฟองของไขขนาดต่าง ๆ..... 188
ค.10	น้ำหนักของสัตว์ปีกที่ให้เนื้อแต่ละชนิดรวมทั้งจำนวนไขที่ออกต่อปี..... 188
ค.11	จำนวนปีสสาวะที่ถ่ายใน 24 ชั่วโมง คิดเป็นลิตร โดยประมาณ ..... 189
ค.12	ปริมาณมูลสด และปีสสาวะที่ถูกขับถ่ายออกมาจากสุกร ..... 189
ค.13	ปริมาณมูลสดและมูลอบแห้งที่โค กระบือขับถ่ายต่อวัน..... 190
ง.1	รายงานเกี่ยวกับภาคพลังงานที่มีส่วนในการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก จากการถ่ายเทมวลคาร์บอนสำหรับการผลิตเนื้อโค กระบือ สุกร ไก่ นมโค และไข่ไก่..... 192
ง.2	รายงานเกี่ยวกับภาคเกษตรกรรมที่มีส่วนในการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก จากการถ่ายเทมวลคาร์บอนสำหรับการผลิตเนื้อ นม ไข่..... 194
ง.3	รายงานเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของภาคเกษตรกรรมจากการถ่ายเทมวล คาร์บอนสำหรับการผลิตเนื้อ นม ไข่ การหมักภายในลำไส้ และการหายใจ ..... 196
ง.4	รายงานข้อมูลพื้นฐานของภาคเกษตรกรรมจากการถ่ายเทมวลคาร์บอน สำหรับการผลิตเนื้อ นม ไข่ การปลดปล่อย CH <sub>4</sub> +CO <sub>2</sub> จากมูลสัตว์..... 197
จ.1	ส่วนประกอบทางเคมีของอาหาร ..... 200
จ.2	เปอร์เซ็นต์สารอาหารที่สัตว์ต่อตัวต้องการและแหล่งอาหารที่สำคัญ..... 201
ฉ.1	ตัวอย่างตัวคูณการปล่อยมลพิษสำหรับแหล่งกำเนิดประเภท การสันดาปเชื้อเพลิง ..... 204
ฉ.2	ตัวอย่างการปล่อยมลพิษสำหรับการผลิตไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมงของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในปี 2003..... 204



## สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
ฉ.3	การวิเคราะห์ค่า C-input จากการผลิตพลังงานไฟฟ้า 1 kWh จากสัดส่วน ของแหล่งเชื้อเพลิงที่ใช้ในปี 2548 ..... 205
ฉ.4	ค่าเฉลี่ย C-input จากพลังงานที่ฟาร์ม และ โรงฆ่าสัตว์ หรือสหกรณ์โคนมใช้..... 206
ญ.1	ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการปลดปล่อยคาร์บอนกับคาร์บอน ที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวโคนมที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ..... 219
ญ.2	ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการปลดปล่อยคาร์บอนกับคาร์บอน ที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวโคนมที่ระดับความเชื่อมั่น 95%..... 219
ญ.3	ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการปลดปล่อยคาร์บอนกับคาร์บอน ที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวกระบือที่ระดับความเชื่อมั่น 95%..... 220
ญ.4	ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการปลดปล่อยคาร์บอนกับคาร์บอน ที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวสุกรที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ..... 220
ญ.5	ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการปลดปล่อยคาร์บอนกับคาร์บอน ที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวไก่เนื้อที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ..... 221
ญ.6	ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการปลดปล่อยคาร์บอนกับคาร์บอน ที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวไก่ไข่ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ..... 221
ฎ.1	ข้อมูลดิบ C-input กับ C-emitted ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษา ในปี 2550-2551 ..... 223
ฎ.2	ข้อมูลดิบ C-input กับ C-emitted ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษา ในปี 2550-2551 ..... 237
ฎ.3	ข้อมูลดิบ C-input กับ C-fixation ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษา ในปี 2550-2551 ..... 251
ฎ.4	ข้อมูลดิบ C-input กับ C-fixation ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษา ในปี 2550-2551 ..... 265
ฎ.1	ความสัมพันธ์ระหว่างการตรึงคาร์บอนกับคาร์บอนที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวโคนม ..... 280
ฎ.2	ความสัมพันธ์ระหว่างการตรึงคาร์บอนกับคาร์บอนที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวโคนม ..... 280

## สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
ฎ.3	ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตรึงคาร์บอนกับคาร์บอน ที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวกระบือที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ..... 281
ฎ.4	ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตรึงคาร์บอนกับคาร์บอน ที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวสุกรที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ..... 281
ฎ.5	ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตรึงคาร์บอนกับคาร์บอน ที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวไก่เนื้อที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ..... 282
ฎ.6	ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตรึงคาร์บอนกับคาร์บอน ที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวไก่ไข่ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ..... 282
ฐ.1	จำนวนฟาร์มและจำนวนสัตว์แยกเป็นรายอำเภอ และกิ่งอำเภอ ในจังหวัดนครราชสีมาของปี 2548 ..... 284
ท.1	ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย ของโคเนื้อ และกระบือที่อายุต่าง ๆ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ..... 287
ต.1	ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นจำนวนโคเนื้อและกระบือ ที่เลี้ยงในปี 2009-2010 ..... 289
ต.2	ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นจำนวนกระบือที่เลี้ยง ในปี 2009-2010 ..... 289
ต.3	ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นจำนวนโคเนื้อที่เลี้ยง ในปี 2009-2010 ..... 290
ณ.1	ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจาก จำนวนการเลี้ยงโคเนื้อตามปกติในปีต่าง ๆ ..... 292
ณ.2	ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจาก จำนวนการเลี้ยงโคเนื้อ 10% ในปีต่าง ๆ ..... 292
ณ.3	ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจาก จำนวนการเลี้ยงโคเนื้อ 50% ในปีต่าง ๆ ..... 293
ณ.4	ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจาก จำนวนการเลี้ยงโคเนื้อ 60% ในปีต่าง ๆ ..... 293

## สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
ณ.5	ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจาก จำนวนการเลี้ยงโคเนื้อ 70% ในปีต่าง ๆ..... 294
ณ.6	ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจาก จำนวนการเลี้ยงโคเนื้อ 80% ในปีต่าง ๆ..... 294
ด.1	ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจาก จำนวนการเลี้ยงกระบือตามปกติในปีต่าง ๆ..... 296
ด.2	ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจาก จำนวนการเลี้ยงกระบือ 20% ในปีต่าง ๆ..... 296
ด.3	ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจาก จำนวนการเลี้ยงกระบือ 30% ในปีต่าง ๆ..... 297
ด.4	ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจาก จำนวนการเลี้ยงกระบือ 40% ในปีต่าง ๆ..... 297
ต.1	ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจาก จำนวน โคเนื้อ และกระบือที่เลี้ยงตามปกติในปีต่าง ๆ..... 299
ต.2	ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจาก การทดลองปรับสัดส่วนจำนวน โคเนื้อ : กระบือ = 80 : 20 ที่เลี้ยงในปีต่าง ๆ..... 299
ต.3	ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจาก การทดลองปรับสัดส่วนจำนวน โคเนื้อ : กระบือ = 70 : 30 ที่เลี้ยงในปีต่าง ๆ..... 300
ต.4	ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจาก การทดลองปรับสัดส่วนจำนวน โคเนื้อ : กระบือ = 60 : 40 ที่เลี้ยงในปีต่าง ๆ..... 300

## สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1.1	แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO <sub>2</sub> ) ในบรรยากาศโลก .....	1
1.2	การประมาณการปริมาณการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จำแนกตามแหล่งกำเนิดที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2537-2563 .....	4
1.3	การประมาณการปริมาณการปลดปล่อยก๊าซมีเทน จำแนกตาม แหล่งกำเนิดที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2537-3563.....	5
1.4	ขั้นตอนการผลิตอาหารจากสัตว์และความสัมพันธ์ของข้อมูล ปริมาณคาร์บอนที่ใช้.....	7
2.1	วัฏจักรคาร์บอน มีการหมุนเวียนในระบบนิเวศโดยผ่านการสังเคราะห์แสง การหายใจ การย่อยสลาย และการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง .....	15
2.2	วัฏจักรคาร์บอน และปริมาณคาร์บอนในรูปแบบต่าง ๆ มีหน่วยเป็น 10 <sup>15</sup> กรัม.....	17
2.3	ความสัมพันธ์ของปัจจัยจำกัด และความหนาแน่นประชากร .....	19
2.4	ความสัมพันธ์เชิงระบบของคาร์บอนกับสิ่งมีชีวิต .....	20
2.5	การเกิดโปรตีนจากพันธะเพปไทด์.....	21
2.6	ไขมันจากการผสมกันของกลีเซอรอล และกรดไขมัน .....	22
2.7	ทางเดินอาหารของโคที่โตเต็มที่แล้ว.....	24
2.8	ระบบทางเดินอาหารของสุกร .....	28
2.9	แสดงระบบทางเดินอาหารของไก่.....	28
2.10	เมทาบอลิซึมในสิ่งมีชีวิต.....	32
2.11	ระบบการถ่ายเทคาร์บอนในแต่ละกิจกรรมของการทำฟาร์มปศุสัตว์.....	39
2.12	การลดลงของการกระจายคาร์บอนจากโครงการ CDM .....	48
2.13	กระบวนการผลิตนม UHT จากน้ำนมดิบ.....	57
2.14	แบบจำลองความสัมพันธ์องค์ประกอบคาร์บอนจากระบบนิเวศ และระบบเศรษฐกิจ.....	66
3.1	ตำแหน่งของพื้นที่เป้าหมายทั้ง 26 อำเภอ 6 กิ่งอำเภอในการศึกษา.....	75

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.2	ขั้นตอนการผลิตอาหารจากสัตว์ และความสัมพันธ์ของข้อมูลปริมาณคาร์บอนที่ใช้..... 77
4.1	การเลี้ยงโคนมในอำเภอ และกิ่งอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา..... 93
4.2	การเลี้ยงโคเนื้อในอำเภอ และกิ่งอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา..... 94
4.3	การเลี้ยงกระบือในอำเภอ และกิ่งอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา..... 95
4.4	การเลี้ยงสุกรในอำเภอ และกิ่งอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา ..... 96
4.5	การเลี้ยงไก่เนื้อในอำเภอ และกิ่งอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา..... 97
4.6	การเลี้ยงไก่ไข่ในอำเภอ และกิ่งอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา ..... 98
4.7	สัดส่วนการปลดปล่อยคาร์บอนต่อตัวต่อวันจากแหล่งต่าง ๆ ของสัตว์แต่ละชนิด ..... 101
4.8	ร้อยละสัดส่วนของการปลดปล่อยแก๊ส CH <sub>4</sub> และ CO <sub>2</sub> จากมูลสัตว์ การย่อยอาหารและการหายใจของสัตว์ชนิดต่างๆที่น้ำหนักตัวเท่ากัน ..... 103
4.9	ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคาร์บอนที่ถ่ายเทเข้าสู่สัตว์โดยการกิน (C <sub>plant</sub> ) กับปริมาณคาร์บอนปลดปล่อยออกจากสัตว์ (C-emitted) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%..... 107
4.11	ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคาร์บอนที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวสัตว์โดยการกิน (C <sub>plant</sub> ) กับปริมาณคาร์บอนคาร์บอนที่ตรึงอยู่ในตัวสัตว์ชนิดต่าง ๆ (C-fixed) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%..... 112
4.11	ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักเฉลี่ยของโคเนื้อและกระบือที่อายุต่าง ๆ ..... 115
4.12	ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยของโคเนื้อ และกระบือที่อายุต่าง ๆ ..... 116
4.12	ร้อยละสัดส่วนปริมาณ C จากส่วนต่าง ๆ ของโคนมที่ถ่ายเทมาจากพืชอาหารสัตว์ต่อวัน ..... 118
4.13	ร้อยละสัดส่วนปริมาณ C จากส่วนต่าง ๆ ของโคเนื้อที่ถ่ายเทมาจากพืชอาหารสัตว์ต่อวัน ..... 118

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.14	ร้อยละสัดส่วนปริมาณ C จากส่วนต่าง ๆ ของกระบือที่ถ่ายเทมาจาก พืชอาหารสัตว์ต่อวัน ..... 119
4.15	ร้อยละสัดส่วนปริมาณ C จากส่วนต่าง ๆ ของสุกรที่ถ่ายเทมาจาก พืชอาหารสัตว์ต่อวัน ..... 119
4.16	ร้อยละสัดส่วนปริมาณ C จากส่วนต่าง ๆ ของไก่เนื้อที่ถ่ายเทมาจาก พืชอาหารสัตว์ต่อวัน ..... 120
4.17	ร้อยละสัดส่วนปริมาณ C จากส่วนต่าง ๆ ของไก่ไข่ที่ถ่ายเทมาจาก พืชอาหารสัตว์ต่อวัน ..... 120
4.18	ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนรวมจากการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมัน และแก๊ส LPG ผลิตเนื้อสัตว์ น้านมโค และไข่ไก่ โดยเทียบที่ น้ำหนักสัตว์เท่ากัน ..... 123
4.19	สัดส่วนการปลดปล่อยคาร์บอนจากการใช้พลังงานผลิตเนื้อสัตว์ น้านมโค และไข่ไก่ ของฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์ หรือสหกรณ์โคนม โดยเทียบที่น้ำหนักสัตว์เท่ากัน ..... 124
4.20	การปลดปล่อยคาร์บอนของการใช้พลังงานผลิตเนื้อสัตว์ น้านมโค และไข่ไก่ระหว่างฟาร์มกับโรงฆ่าสัตว์ หรือสหกรณ์โคนม โดยเทียบที่น้ำหนักสัตว์เท่ากัน ..... 124
4.21	เปอร์เซนต์คาร์บอนในพืชอาหารสัตว์ นม เนื้อ ไข่ และมูลของสัตว์ชนิดต่าง ๆ ..... 127
4.22	เปรียบเทียบสัดส่วนการปลดปล่อยคาร์บอนรวมทั้งหมดจากตัวสัตว์ และจากการใช้พลังงานของการผลิตเนื้อ นม ไข่จากสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่น้ำหนักเท่ากัน ..... 136
4.23	สัดส่วนการปลดปล่อยคาร์บอนรวมทั้งหมดต่อตัวต่อวันสำหรับ การผลิตเนื้อ นม ไข่ ..... 136
4.24	ปริมาณคาร์บอนที่ถูกปลดปล่อยในแต่ละปีสำหรับการผลิตเนื้อ นม ไข่ จากสัตว์แต่ละชนิด ..... 141

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.25	เปอร์เซ็นต์การลดลงของการปลดปล่อยคาร์บอนจากการผลิตเนื้อโค และเนื้อกระบือที่น้ำหนักตัวเท่ากัน โดยการปรับเพิ่มจำนวนกระบือ และลดจำนวนโคนเนื้อ ..... 146
4.26	ภาพรวมของการถ่ายเท ตรึง และปลดปล่อยคาร์บอนสำหรับการผลิตน้ำนมโค ..... 147
4.27	ภาพรวมของการถ่ายเท ตรึง และปลดปล่อยคาร์บอนสำหรับการผลิตเนื้อโค ..... 147
4.28	ภาพรวมของการถ่ายเท ตรึง และปลดปล่อยคาร์บอนสำหรับการผลิตเนื้อกระบือ ..... 148
4.29	ภาพรวมของการถ่ายเท ตรึง และปลดปล่อยคาร์บอนสำหรับการผลิตเนื้อสุกร ..... 148
4.30	ภาพรวมของการถ่ายเท ตรึง และปลดปล่อยคาร์บอนสำหรับการผลิตเนื้อไก่ ..... 149
4.31	ภาพรวมของการถ่ายเท ตรึง และปลดปล่อยคาร์บอนสำหรับการผลิตไข่ไก่ ..... 149
ก.1	ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวไก่ไข่เฉลี่ยกับอายุไข่ ..... 178
ก.2	สัดส่วนองค์ประกอบของไข่ไก่โดยเฉลี่ย ..... 178
ฉ.1	แนวโน้มการเกิดแก๊ส CO <sub>2</sub> จากการหายใจของไก่เนื้อ ..... 217
ฉ.2	แนวโน้มการเกิดแก๊ส CO <sub>2</sub> จากการหายใจของไก่ไข่ ..... 217

## อธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ

C	=	ปริมาณคาร์บอน
C <sub>emission</sub> , C-emission	=	ปริมาณคาร์บอนเฉลี่ยที่อยู่ในรูปของแก๊ส CO <sub>2</sub> และ CH <sub>4</sub>
C <sub>emitted</sub> , C-emitted	=	ปริมาณคาร์บอนเฉลี่ยที่ถูกปลดปล่อยออกจากตัวสัตว์ซึ่งเกิดจากผลรวมของปริมาณคาร์บอนเฉลี่ยที่อยู่ในมูลสัตว์ร่วมกับปริมาณคาร์บอนเฉลี่ยที่อยู่ในรูปของแก๊ส CO <sub>2</sub> และ CH <sub>4</sub> ที่เกิดขึ้นจากมูลสัตว์ การย่อยอาหาร และการหายใจของสัตว์
C <sub>fixation</sub> , C-fixation	=	ปริมาณคาร์บอนเฉลี่ยที่ถูกตรึงสะสมอยู่ในร่างกายของสัตว์รวมทั้งน้ำนมโค หรือ ไข่ไก่
CH <sub>4</sub>	=	แก๊สมีเทน
C <sub>input</sub> , C-input	=	ปริมาณคาร์บอนเฉลี่ยที่เกิดจากผลรวมของปริมาณคาร์บอนเฉลี่ยที่อยู่ในพืชอาหารสัตว์แต่ละชนิดร่วมกับปริมาณคาร์บอนเฉลี่ยที่อยู่ในรูปของพลังงานที่ใช้
CO	=	แก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์
CO <sub>2</sub>	=	แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
C <sub>output</sub> , C-output	=	ปริมาณคาร์บอนเฉลี่ยที่อยู่ในมูลสัตว์
C <sub>plant</sub>	=	ปริมาณคาร์บอนเฉลี่ยที่อยู่ในพืชอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ
FCR	=	การใช้อาหารเปลี่ยนเป็นร่างกาย เนื้อ น้มนม หรือ ไข่ไก่
FE	=	พลังงานที่สูญหายในมูล
GE	=	พลังงานรวมในอาหาร
GWP <sub>s</sub>	=	ศักยภาพในการทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน
H	=	ไฮโดรเจน
Kcal	=	กิโลแคลลอรี่
kg	=	กิโลกรัม (กก.)
KJ	=	กิโลจูล
kWh	=	กิโลวัตต์-ชั่วโมง
LPG	=	แก๊สปิโตรเลียมเหลว



## อธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ (ต่อ)

m <sup>3</sup>	=	ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)
ME	=	พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้
MJ	=	เมกกะจูล (10 <sup>6</sup> )
N	=	ไนโตรเจน
N.D.	=	ไม่ได้ตรวจวิเคราะห์
NH <sub>3</sub>	=	แก๊สแอมโมเนีย
NO	=	แก๊สไนตริกออกไซด์
N <sub>2</sub> O	=	แก๊สไนตรัสออกไซด์
O <sub>2</sub>	=	แก๊สออกซิเจน
P	=	ฟอสฟอรัส
TS	=	ของแข็งทั้งหมดหรือวัตถุแห้ง
TVS	=	ของแข็งระเหยทั้งหมด
UE	=	พลังงานที่สูญเสียในปัสสาวะ
UHT	=	Ultra High Temperature
VFA	=	กรดไขมันระเหยได้
°ซ	=	องศาเซลเซียส
°ฟ	=	องศาฟาเรนไฮต์
การย่อย (digestion)	=	ขบวนการเปลี่ยนแปลงลักษณะของอาหารที่มีโครงสร้างสลับซับซ้อนให้อยู่ในรูปลักษณะเชิงเดี่ยว เพื่อง่ายต่อการดูดซึมและการนำไปใช้ประโยชน์
การดูดซึม (absorption)	=	ขบวนการขนถ่ายนำเอาโภชนะผ่านผนังของระบบการย่อยอาหารเพื่อนำไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
อัตราการไหลผ่าน	=	ระยะเวลาที่ใช้ในการที่อาหารชนิดใดชนิดหนึ่งที่สัตว์กินเข้าไปถูกย่อยในระบบและถูกขับออกมา มีหน่วยของเวลาเป็นตัววัด
การขับแก๊ส (eructation)	=	ขบวนการที่สัตว์ไค้งอตัวเพื่อขับแก๊สที่เกิดขึ้นเนื่องจากการหมัก (fermentation) ส่วนใหญ่คือ แก๊สมีเทนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

### อธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ (ต่อ)


Rumen turnover time	=	ระยะเวลาที่ ingesta พักตัวอยู่ในรูเมน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความสะดวกของการเข้าหมักของจุลินทรีย์ อัตราการไหลผ่านของ ingesta ระยะพักตัวในรูเมนมีส่วนสัมพันธ์กับปริมาณอาหารที่กินได้ และค่าการย่อยได้ของโภชนะในอาหารนั้น
Ingesta	=	อาหารที่สัตว์กินเข้าไปเมื่อได้คลุกเคล้ากับของเหลวในกระเพาะรูเมนแล้ว
Digesta	=	อาหารที่ไหลผ่านออกจากรูเมน

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความสำคัญของปัญหา

วัฏจักรคาร์บอน (carbon cycle) มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เพราะคาร์บอนเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ เมื่อคาร์บอนรวมตัวกับออกซิเจนอย่างสมบูรณ์จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ( $\text{CO}_2$ ) ซึ่งมีอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์และสัตว์ต่าง ๆ แก๊ส  $\text{CO}_2$  เป็นแก๊สเรือนกระจกชนิดหนึ่งที่มีผลทำให้โลกร้อนขึ้นดังรูปที่ 1.1 และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (อรรถชัย จินตะเวช, 2547)



รูปที่ 1.1 แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ( $\text{CO}_2$ ) ในบรรยากาศโลก

(จาก “Trends in Atmospheric Carbon Dioxide-Global.”)

โดย NOAA, 2009, [On-line]. Available:[http:](http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends)

[//www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends](http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends))

โดยที่ประชุม Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC] ในปี ค.ศ. 1995 ณ ประเทศอังกฤษ สรุปไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเกิดจากแก๊สเรือนกระจกซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์ การป้องกันหรือแก้ปัญหา โดยวิธีการที่มนุษย์จะต้องลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกลง ตัวอย่างของผลลัพธ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกคือระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ซึ่ง IPCC (1995) ทำนายไว้ว่าในปี ค.ศ. 2100 ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นประมาณ 3 ฟุต จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ เกิดการลดลงของป่าที่อุดมสมบูรณ์ เกิดการแพร่กระจายและเพิ่มจำนวนของเชื้อโรค อาจทำให้มนุษย์เสียชีวิตด้วยมลภาวะในอากาศ และคลื่นความร้อน พืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์จะได้รับผลกระทบเสียหายจากภัยแล้ง น้ำท่วม พายุ ซึ่งมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกที ภูเขาน้ำแข็งที่ขั้วโลกจะละลาย ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นท่วมผืนแผ่นดิน ซึ่งเป็นผลทำให้พื้นที่ในการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ลดลง เช่น พื้นที่ที่อยู่อาศัย พื้นที่เพื่อการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ในขณะที่จำนวนประชากรของมนุษย์เพิ่มขึ้นจะทำให้มนุษย์ต้องบุกรุกและทำลายป่า ในที่สุดจะส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมกับโลกอีก วนเวียนเป็นปัญหาเช่นนี้เรื่อยไปและรุนแรงมากยิ่งขึ้น สามารถสังเกตได้จากความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติและมีผลเสียหายต่อชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อย ๆ การทำปศุสัตว์เพื่อผลิตอาหารของมนุษย์โดยเฉพาะสัตว์เคี้ยวเอื้องจะก่อให้เกิดแก๊ส  $\text{CO}_2$  และ  $\text{CH}_4$  ซึ่งเป็นแก๊สเรือนกระจก (Tamminga, 1992) ในขณะที่การใช้พลังงานสำหรับการเลี้ยงและฆ่า สุกรและไก่เนื้อ ก็ก่อให้เกิดแก๊ส  $\text{CO}_2$  ด้วยเช่นกัน (นพภาพร พานิช และคณะ, 2547)


การเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแก๊ส  $\text{CO}_2$  ในชั้นบรรยากาศ และมหาสมุทรไปเป็นสารประกอบอินทรีย์ และอนินทรีย์ มีส่วนต่อการเคลื่อนย้ายคาร์บอนในระบบนิเวศของโลก และเกิดการถ่ายเทพลังงานความร้อนมีการสังเคราะห์สารชีวเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานเคมีในรูปของการเจริญเติบโต และมีการปลดปล่อยพลังงานความร้อนจากการเผาผลาญ และการย่อยสลายของสิ่งมีชีวิตการที่รักษาสภาพของโลกให้อยู่ในสภาพเดิมได้นั้น จะต้องเกี่ยวข้องกับการรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติให้คงอยู่ในสภาพสมดุลซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด การดูดซับคาร์บอนของระบบนิเวศบนบกมีบทบาทสำคัญ คาร์บอนที่ถูกเก็บรักษาในรูปแบบนี้เสี่ยงต่อการถูกปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศได้อีกอย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของคาร์บอนในระบบนิเวศบนบกจากการดูดซับคาร์บอนไว้ในรูปต่าง ๆ เช่น พืช สัตว์ และอาศัยการตรึงคาร์บอนของต้นไม้และพื้นที่ป่าจะช่วยแบ่งเบาปัญหาการเพิ่มขึ้นของแก๊ส  $\text{CO}_2$  ในบรรยากาศได้ ในขณะเดียวกัน มนุษย์มีการบุกรุกทำลายป่ามากขึ้นและมีการใช้พลังงานที่อยู่ใต้ดินซึ่งเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์มานานด้วย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนมีส่วนต่อการกระจายคาร์บอนในบรรยากาศทั้งสิ้น (อรรถชัย จินตะเวช, 2547)

และนอกจากนี้ นิตยา เลาะห์จินดา (2549) ยังได้กล่าวถึงการผลิตอาหาร และการย่อยสลาย ต้องได้สมดุลกัน จึงจะทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ในปัจจุบันมนุษย์ได้เพิ่มอัตราการย่อยสลายโดยการที่มนุษย์เผาถ่านหิน และเชื้อเพลิง การทำกิจกรรมและการเลี้ยงสัตว์เป็นเหตุให้เพิ่มปริมาณ CO<sub>2</sub> ในบรรยากาศมากเกินกว่าที่ผู้ผลิตหรือพืชจะนำไปใช้ได้ทัน จึงส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของโลกในที่สุดก็ส่งผลกระทบต่อภารกิจกรรม การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ทั่วไปจัดเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโลกในขณะนี้ ดังนั้นเราจึงต้องศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคาร์บอนที่ถูกปลดปล่อยจากการปศุสัตว์ และการถ่ายเทคาร์บอนจากสัตว์กินพืชรวมทั้งพลังงานที่ใช้ในการปศุสัตว์ และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ ได้แก่ เนื้อ นม ไข่


ระบบนิเวศบนบกมีศักยภาพในการตรึงคาร์บอนต่างกันขึ้นอยู่กับชนิด และสภาพของระบบนั้น ๆ โดยเฉพาะในด้านของความสามารถในการตรึงคาร์บอนไว้อยู่ในรูปของเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในแต่ละชนิด อายุของสัตว์ และการจัดการซึ่งกระบวนการถ่ายเทคาร์บอนไปตามปิรามิดอาหารจึงเป็นกุญแจสำคัญของการศึกษานี้ หน้าที่ที่คาร์บอนถูกตรึงในรูปของชีวมวลคาร์บอนจะอยู่ในรูปเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้นานเท่าใดก่อนที่จะถูกเปลี่ยนกลับไปเป็นแก๊ส CO<sub>2</sub> อีกครั้งหนึ่งอันเนื่องมาจากกระบวนการย่อยสลาย ดังนั้นการตรึงคาร์บอน (carbon fixation) ในที่นี้คือการดึงคาร์บอนออกจากชั้นบรรยากาศแบบกึ่งถาวรมาอยู่ในรูปของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ซึ่งการสะสมปริมาณคาร์บอนสุทธิ (net carbon production) จึงเท่ากับอัตราการสะสมของปริมาณคาร์บอนระหว่างระยะของการเจริญเติบโตในระยะต่าง ๆ ของสัตว์ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ใช้อธิบายการหาปริมาณคาร์บอนเฉลี่ยตามเวลา (time averaged C stocks) มีหน่วยวัดเป็นน้ำหนักของคาร์บอนต่อเวลา (van Noordwijk, Cerri, Wooster, Nugroho, and Bernoux, 1997; van Noordwijk, et al., 1998) ความหมายของการตรึงคาร์บอนนี้แสดงให้เห็นว่า การปลดปล่อยแก๊ส CO<sub>2</sub> สู่อากาศจะถูกบรรเทาได้โดยกระบวนการตรึงคาร์บอนของพืชที่เป็นอาหารสัตว์ และในรูปของเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์

Ministry of Science, Technology and Environment (MoSTE) (2000) ได้รายงานข้อมูลการประมาณปริมาณการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และแก๊สมีเทน จำแนกตามแหล่งกำเนิดที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2537-2563 ในรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ดังรูปที่ 1.2 และ 1.3 ดังนั้นจากที่กล่าวมาจึงเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่จะต้องทำการศึกษากการถ่ายเทมวลคาร์บอนของการผลิตอาหารประเภทเนื้อ นม และไข่ จากการทำฟาร์มปศุสัตว์โดยใช้จังหวัดนครราชสีมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อหาค่าอัตราการปลดปล่อย และการถ่ายเทคาร์บอนจากแหล่งกำเนิดในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตอาหารประเภทเนื้อ นม และไข่

การผลิตเนื้อ นม และไข่ เช่น การเลี้ยงในระบบฟาร์ม การขนส่ง การฆ่า และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร สำหรับเป็นฐานข้อมูลบัญชีคาร์บอนของประเทศเพื่อจัดลำดับความสำคัญของการผลิตอาหารจากการปศุสัตว์ชนิดต่าง ๆ ทั้งกระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในแง่ของการปลดปล่อยแก๊ส CO<sub>2</sub> น้อยที่สุด



รูปที่ 1.2 การประมาณการปริมาณการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จำแนกตามแหล่งกำเนิดที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2537-2563 (จาก Thailand's Initial National Communication under the United Nations Framework Convention on Climate Change. โดย MoSTE, 2000, Bangkok: MoSTE.



รูปที่ 1.3 การประมาณการปริมาณการปล่อยแก๊สมีเทน จำแนกตามแหล่งกำเนิดที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2537-2563 (จาก Thailand's Initial National Communication under the United Nations Framework Convention on Climate Change. โดย MoSTE, 2000, Bangkok: MoSTE.)

## 1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย

วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยเรื่องการศึกษาก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนสำหรับการผลิตอาหารจากการทำฟาร์มปศุสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมาคือ

1.2.1 เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์การปลดปล่อยคาร์บอนสำหรับการผลิตอาหารจากการทำฟาร์มปศุสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา

1.2.2 เพื่อศึกษาอัตราการถ่ายเทปริมาณคาร์บอนจากพืชอาหารสัตว์ไปสู่สัตว์ชนิดต่าง ๆ โดยการกินตามห่วงโซ่อาหารก่อนถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย

1.2.3 เพื่อศึกษาปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนจากการใช้พลังงานที่มีส่วนสำคัญในกระบวนการผลิตอาหารประเภท เนื้อ นม ไข่ จากการทำฟาร์มปศุสัตว์ของจังหวัดนครราชสีมา

1.2.4 เพื่อเสนอแนะ การปรับการเลี้ยงสัตว์ประเภทที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนสู่บรรยากาศลดลง แต่ได้ปริมาณเนื้อสัตว์ใกล้เคียงกับของเดิม

### 1.3 ขอบเขตการวิจัย


เพื่อให้การศึกษาการถ่ายเทมวลคาร์บอนสำหรับการผลิตอาหารเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์การปลดปล่อยคาร์บอนจากการทำฟาร์มปศุสัตว์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น จึงได้กำหนดขอบเขตการวิจัยโดยได้อาศัยข้อมูลปศุสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมาเป็นกรณีศึกษาเพราะเป็นจังหวัดที่มีจำนวนครัวเรือนและเนื้อที่ถือครองทางการเกษตรซึ่งประกอบด้วยที่อยู่อาศัย ที่นา ที่พืชไร่ ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น ที่สวนผักและไม้ดอก ที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ที่รกร้างว่างเปล่า และที่อื่น ๆ รวมแล้วเป็นเนื้อที่ถึง 7,793,412 ไร่ ในปี 2544 ซึ่งมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2547) และมีการทำปศุสัตว์โดยเฉพาะสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิดมากกว่าจังหวัดอื่น ๆ และเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ (กรมปศุสัตว์, [www.dld.go.th/index.html](http://www.dld.go.th/index.html), 2548) ดังนั้นในการศึกษานี้จึงใช้เป็นตัวแทนของประชากรปศุสัตว์ทั้งประเทศ

การศึกษานี้จะต้องลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ทั้ง 6 ชนิดได้แก่ โคเนื้อ โคนเนื้อ กระบือ สุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่ ที่มีการเลี้ยงอยู่จริงในฟาร์มของเกษตรกรโดยไม่ได้คำนึงถึงพันธุ์ของสัตว์ในแต่ละชนิด แต่สัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่ทำการศึกษจะต้องมีอายุอยู่ในช่วงที่จะใช้ประโยชน์หรือให้เนื้อ นม และ ไข่เท่านั้น การศึกษานี้เน้นที่สัตว์กินพืช และสัตว์ที่มีลักษณะของการกินที่ทราบชนิดและปริมาณของอาหารที่สัตว์กินในทุก ๆ อำเภอ และกิ่งอำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีด้วยกัน 26 อำเภอ 6 กิ่งอำเภอโดยจะเน้นแหล่งข้อมูลที่มีระบบการจัดการปศุสัตว์ในรูปแบบของฟาร์มปศุสัตว์ที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นหลัก การประเมินและวิเคราะห์ระบบจะพิจารณาเสมือนระบบอยู่ในสถานะสมดุลโดยอาศัยหลักการของการถ่ายเทมวลคาร์บอน (carbon mass flow concept) ซึ่งการประเมินปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนทั้งจากตัวสัตว์และจากการใช้พลังงาน รวมทั้งการตรึงคาร์บอนของสัตว์ สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1.4 ซึ่งแสดงถึงปริมาณคาร์บอนสุทธิที่ใช้ในการผลิตอาหารจากสัตว์โดยการสะสมคาร์บอนซึ่งอยู่ในรูปของพืชอาหารสัตว์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ลบด้วยปริมาณคาร์บอนต่อตัวต่อวันที่ถูกปลดปล่อยออกมาพร้อมกับสิ่งขับถ่ายจากสัตว์ในรูปของกากอาหารที่สัตว์ไม่สามารถย่อยได้ จากการหายใจรวมทั้งการย่อยอาหารของสัตว์ตลอดระยะเวลาของการเลี้ยงสัตว์จนส่งโรงฆ่าสัตว์ และคาร์บอนเฉลี่ยที่ปลดปล่อยออกมาจากการใช้พลังงานในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ขนส่งฆ่าสัตว์ โดยมีพลังงานส่วนสำคัญใหญ่ 4 ส่วน ที่เกี่ยวข้องได้แก่

- ปริมาณพลังงานไฟฟ้า หรือน้ำมันที่ใช้ในโรงเรือนเพื่อการเลี้ยงสัตว์ (กิโลกรัมคาร์บอนเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน)
- ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการฆ่าสัตว์ และพลังงานความร้อนในการถนอมขน หรือ ขูดขนสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ (กิโลกรัมคาร์บอนเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน)



- ปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุดในการเก็บรักษาเนื้อสัตว์แช่แข็ง และน้ำมันโค (กิโลกรัมคาร์บอนเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน)
- ปริมาณพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งตัวสัตว์ไปโรงฆ่าสัตว์ และขนส่งเนื้อสัตว์หลังชำแหละไปยังตลาดหรือโรงงานแปรรูป หรือขนส่งน้ำมันโคจากฟาร์มไปสหกรณ์โคนมต่าง ๆ ในจังหวัด (กิโลกรัมคาร์บอนเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน)



รูปที่ 1.4 ขั้นตอนการผลิตอาหารจากสัตว์และความสัมพันธ์ของข้อมูลปริมาณคาร์บอนที่ใช้

#### 1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

ผลการศึกษาทำให้สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรึงคาร์บอนจากสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่ทำการศึกษาซึ่งได้แก่ โคนม โคเนื้อ กระบือ สุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่ สำหรับการผลิตอาหารประเภทเนื้อ นม และไข่ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของการทำปศุสัตว์แต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสม

จากสัดส่วนการปลดปล่อยคาร์บอนต่อคาร์บอนที่ถูกตรึงอยู่ในร่างกายของสัตว์แต่ละชนิดรวมทั้งสัดส่วนของการปลดปล่อยคาร์บอนต่อคาร์บอนในอาหารสัตว์ที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวสัตว์แต่ละชนิดโดยการกิน ทำให้สามารถใช้เป็นเหตุผลหนึ่งในการบ่งชี้ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ

เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกับอายุของโคเนื้อ และกระบือจะทำให้สามารถทราบถึงแนวทางในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนจากการเลี้ยงโคเนื้อ และกระบือ โดยควรที่จะขายโคเนื้อหรือกระบือเข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ในช่วงอายุไม่เกินไปจาก 2 ปี และ 4 ปี ตามลำดับ เพราะหลังจากนี้โคเนื้อ และกระบือจะมีอัตราการสะสมคาร์บอนไว้ในร่างกายลดลง

รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแนวทางในการจัดการลดการปลดปล่อยคาร์บอน จากการใช้เชื้อเพลิงสำหรับผลิตพลังงานความร้อน ด้วยการปรับเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นแกลบหรือฟืนมาเป็นการใช้แก๊ส LPG แทน และแนวทางการลดการปล่อยคาร์บอนจากการผลิตเนื้อ โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ใหญ่ประเภทที่สามารถทดแทนกันได้ ด้วยการปรับลดจำนวนการเลี้ยงโคเนื้อลง แล้วเพิ่มจำนวนการเลี้ยงกระบือทดแทน เพื่อชดเชยปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์ให้มีอัตราเท่าเดิม

นอกจากนี้ผลการศึกษานี้ยังเป็นองค์ความรู้พื้นฐานในการวิจัยต่อไป โดยการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติแล้ว ผลการศึกษานี้ยังสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดทำรายงานแห่งชาติเสนอต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาภายใต้พิธีสารเกียวโต ตามพันธกรณีที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้ และเก็บผลการวิจัยไว้ในฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยของสถาบันต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นต้น

## บทที่ 2

### ปรัทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 ระบบนิเวศและความสัมพันธ์เชิงระบบ (Ecosystems and System Relationship)

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเป็นการศึกษาทางนิเวศวิทยา (ecology) ซึ่งเป็นการศึกษาการประกอบกันของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าระบบนิเวศ (ecosystem) มุ่งเน้นการศึกษาในระดับประชากร (population) ชุมชน (community) และระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิต โดยสนใจบทบาทหรือการดำรงชีวิต การหมุนเวียนของสารและพลังงานอันนำไปสู่การเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ ซึ่งมีกระบวนการของสิ่งมีชีวิตที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย เพื่อนำไปสู่ความสมดุลของระบบ


Marsh and Grossa (1996) ให้ความหมายของระบบนิเวศ หมายถึง กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์ (interaction) กับการถ่ายโอนพลังงานในห่วงโซ่อาหาร (food chain) รวมทั้งชุมชนของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตนั้น

มูกดา สุขสมาน (2536) ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า ระบบนิเวศ หมายถึง ระบบของความสัมพันธ์ของ สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยการแลกเปลี่ยนสสาร แร่ธาตุและถ่ายทอดพลังงานกับสิ่งแวดล้อมผ่านห่วงโซ่อาหาร (food chain) มีลำดับขั้นของการกินเป็นทอด ๆ เริ่มจากพืชซึ่งเรียกว่าเป็นผู้ผลิต เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานเคมี (คาร์โบไฮเดรต) โดยกระบวนการสังเคราะห์แสง พลังงานเคมีนี้จะถูกถ่ายทอดไปอยู่ในผู้บริโภค โดยการกิน เมื่อสัตว์ตายซากสัตว์จะเน่าเปื่อยย่อยสลายโดยผู้ย่อยสลาย พลังงานถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของธาตุอาหารพืชที่อยู่ในดิน พืชหรือผู้ผลิตก็จะดูดธาตุอาหารเหล่านี้ไปทำให้สสารและแร่ธาตุมีการหมุนเวียนไปใช้ในระบบจนเกิดเป็นวัฏจักร (cycle) นั่นก็คือวัฏจักรของธาตุทำให้เกิดระบบนิเวศขึ้น เพราะฉะนั้นในระบบนิเวศจึงประกอบด้วย การถ่ายทอดพลังงานไปตามลำดับขั้นในห่วงโซ่อาหารเป็นช่วง ๆ วัฏจักรของธาตุ และกลไกการควบคุมประชากร การจำแนกองค์ประกอบของระบบนิเวศ ส่วนใหญ่จะจำแนกเป็น 2 องค์ประกอบใหญ่ ๆ คือ องค์ประกอบที่มีชีวิต (biotic components) และองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต (abiotic components)

องค์ประกอบที่มีชีวิตในระบบนิเวศจะมีบทบาทและหน้าที่ (ecological niche) เฉพาะอย่าง โดยองค์ประกอบที่มีชีวิตในระบบนิเวศ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับดังนี้

1) ผู้ผลิต (producers) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้เองจากสารอนินทรีย์ โดยการสังเคราะห์แสง (photosynthesis) ซึ่งส่วนมากจะเป็นพืชที่มีคลอโรฟิลล์โดยรับพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนพลังงานให้เป็นพลังงานเคมีโดยอยู่ในรูปของสารอาหารได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ดังสมการที่ 2.1

แสงและคลอโรฟิลล์



2) ผู้บริโภค (consumers) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้แต่จะดำรงชีวิตได้โดยการบริโภคสารอาหารจากสิ่งมีชีวิตอื่น ซึ่งสามารถจำแนกผู้บริโภคออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 ผู้บริโภคที่กินพืชเป็นอาหาร (herbivores) เช่น วัว ควาย ช้าง

กลุ่มที่ 2 ผู้บริโภคที่กินสัตว์เป็นอาหาร (carnivores) เช่น สิงโต เสือ ปลาฉลาม งู

กลุ่มที่ 3 ผู้บริโภคที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร (omnivores) เช่น หมู ไก่ คน

3) ผู้ย่อยสลาย (decomposers) หมายถึง สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สร้างอาหารเองไม่ได้ ทำหน้าที่ย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วในรูปของสารประกอบโมเลกุลใหญ่ จนกลายเป็นสารประกอบโมเลกุลเล็กในรูปของสารอาหาร ปลดปล่อยสารอาหารกลับคืนสู่พื้นดิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของผู้ผลิตนำไปใช้ได้ใหม่ เช่น แบคทีเรีย เห็ดรา

องค์ประกอบของสิ่งที่มีชีวิต สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มคือ

1) สารอนินทรีย์ (inorganic substances) ประกอบด้วย แร่ธาตุ และสารอนินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของเซลล์สิ่งมีชีวิต เช่น คาร์บอน ออกซิเจน ไนโตรเจน  $\text{CO}_2$  และน้ำ เป็นต้น

2) สารอินทรีย์ (organic substances) ได้แก่ สารอินทรีย์ที่จำเป็นต่อชีวิต เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และฮิวมัส เป็นต้น

3) สภาพภูมิอากาศ (climate regime) เป็นปัจจัยทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิต เช่น อุณหภูมิ แสง ความชื้น อากาศ และพื้นผิวที่อยู่อาศัย

แหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดในระบบนิเวศ คือ พลังงานจากดวงอาทิตย์ สารเคมีในรูปของอินทรีย์สารที่ได้จากการสังเคราะห์แสงได้แก่ คาร์โบไฮเดรต และสารเคมีในรูปของอนินทรีย์สาร ได้แก่ ออกซิเจน และน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบเข้าด้วยกันในรูปของการรับ และการให้อาหารตามห่วงโซ่อาหาร

### 2.1.1 หน้าที่ที่สำคัญของระบบนิเวศ

หน้าที่สำคัญของระบบนิเวศ คือ การถ่ายทอดพลังงาน (energy flow) และการหมุนเวียนของธาตุอาหาร (nutrient cycle) กระบวนการส่งต่อพลังงานโดยการบริโภคเป็นการถ่ายทอดพลังงานเข้าไปในระบบนิเวศ และท้ายสุดก็มีพลังงานถูกถ่ายทอดออกจากระบบนิเวศในรูปของความร้อนเช่นกัน การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศจะถ่ายทอดตามการบริโภคต่อกันเป็นระดับชั้นซึ่งเรียกว่า ถ่ายทอดตามห่วงโซ่อาหาร (food chain) และข่ายใยอาหาร (food web) (อยู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ บีเวอร์, 2531 และ Odum, 1971)

ห่วงโซ่อาหาร (food chain) สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ ห่วงโซ่อาหารชนิดที่มีการกินอาหารโดยตรง (grazing food chain) เริ่มจากพืชสีเขียว ถูกสัตว์กินพืชกินเป็นอาหาร จากนั้นสัตว์กินสัตว์ก็เข้ามากินสัตว์กินพืช และห่วงโซ่อาหารของการสลายอินทรีย์วัตถุ (detritus food chain) ห่วงโซ่อาหารประเภทนี้เริ่มจากซากสิ่งมีชีวิตเน่าสลายแล้วมีสัตว์อื่นเข้ามากิน

ข่ายใยอาหาร (food web) ในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตไม่ได้ดำรงในลักษณะใด ๆ ส่งถ่ายทอดพลังงานตามห่วงโซ่อาหาร แต่สิ่งมีชีวิตจะเกิดการกินกันข้ามห่วงโซ่อาหาร สลับซับซ้อน ห่วงโซ่อาหารหลายห่วงโซ่ที่เชื่อมโยง และมีความสัมพันธ์กัน (interconnection) โดยผ่านการบริโภค เรียกว่า ข่ายใยอาหาร

2.1.1.1 การถ่ายทอดพลังงานจะเป็นไปตามกฎเทอร์โมไดนามิกส์ (Law of Thermodynamics) ซึ่งมีอยู่ 2 ข้อ คือ กฎข้อที่ 1 กฎแห่งการคงอยู่ (Law of Conservation) พลังงานไม่สามารถจะสร้างขึ้นใหม่หรือถูกทำลายได้ แต่พลังงานสามารถเปลี่ยนรูปใหม่ได้ และสามารถจะเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ และกฎข้อที่ 2 กฎแห่งการลดน้อยถอยลง (Law of Entropy) พลังงานสามารถเปลี่ยนรูปได้ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนรูปจะต้องมีการสูญเสียพลังงานไปในรูปของความร้อนเสมอ ความร้อนที่สูญเสียเป็นความร้อนที่มีอนุภาคต่ำไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เมื่อพลังงานจากดวงอาทิตย์ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีในรูปของสารอาหารจะถูกส่งต่อไปในระบบนิเวศ โดยจะมีการสูญเสียพลังงานไปในทุกขั้นตอนของการเปลี่ยนรูปในห่วงโซ่อาหาร สรุปได้ว่า พลังงานที่จะส่งต่อไปยังผู้บริโภคระดับสูงนั้นจะเหลือเพียงส่วนน้อยเนื่องจากมีพลังงานที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้ 3 ส่วนคือ พลังงานในส่วนที่กินไม่ได้ พลังงานในส่วนที่ย่อยไม่ได้ และพลังงานที่ถูกเปลี่ยนรูปเป็นความร้อน

2.1.1.2 การหมุนเวียนของธาตุอาหารเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการถ่ายทอดพลังงานโดยธาตุที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตในการสร้างโมเลกุลมีทั้งหมด 15 ธาตุดังที่แสดงในตารางที่ 2.1 ซึ่งธาตุหลัก 3 ธาตุ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ ในการสังเคราะห์แสงคือ ไฮโดรเจน คาร์บอน และออกซิเจน โดยที่ทั้ง 3 ธาตุนี้รวมกันจะมีสัดส่วนถึง 99.47% ของธาตุทั้งหมดที่มีความ

จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต (Marsh and Grossa, 1996) ในการหมุนเวียนของธาตุอาหาร เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการถ่ายทอดพลังงาน โดยในที่นี้เริ่มจากจุลินทรีย์ในดินเป็นตัวการสำคัญในการย่อยสลายของอินทรีย์สาร และปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาสำหรับใช้เป็นอาหารของพืช การถ่ายทอดพลังงานเป็นวงจรเปิด ซึ่งแตกต่างจากการหมุนเวียนของธาตุอาหาร เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก เป็นต้น ซึ่งสารเหล่านี้จะไม่หายไป แต่จะหมุนเวียนกลับมาให้พืชได้ใช้เป็นอาหารอยู่เสมอ แร่ธาตุที่เป็นหัวใจสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร์ และฟอสฟอรัส แร่ธาตุเหล่านี้จะมีการหมุนเวียนระหว่างสิ่งมีชีวิตและส่วนที่ไม่มีชีวิตในระบบนิเวศ จึงทำให้เกิดวัฏจักรที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับแหล่งสะสมที่ผิวโลก (Kupchella and Hyland, 1989) จะเห็นว่าแร่ธาตุโดยเฉพาะแร่ธาตุที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตได้เคลื่อนย้ายผ่านไปสู่อากาศ ดิน น้ำ และผ่านเข้าไปในวงจรของสิ่งมีชีวิต และมีเฉพาะฟอสฟอรัสเท่านั้นที่จำกัดตัวเองอยู่ในดินและน้ำ ตามวงจรการหมุนเวียนในธรรมชาติหรืออาจจะพิจารณาการถ่ายทอดพลังงานในรูปของมวลชีวภาพ (biomass) ซึ่ง Odum (1971) และ Cunningham and Saigo (2001) ได้แสดงให้เห็นว่า สารอาหารในมวลชีวภาพของสิ่งมีชีวิตจะถูกใช้ในการดำรงชีวิตซึ่งในการกินเป็นลำดับในห่วงโซ่อาหารนั้นมิใช่ทุกส่วนของพืชหรือสัตว์จะถูกกิน และใช้ในกระบวนการเมตาบอลิซึมสร้างเนื้อเยื่อของผู้บริโภคเพื่อการเจริญเติบโตได้ทั้งหมด แต่จะมีเนื้อเยื่อส่วนที่กินไม่ได้รวมทั้งส่วนที่กินไปแล้วไม่สามารถย่อยได้ในระบบย่อยอาหาร จึงเป็นของเหลือที่ผู้ย่อยสลายซากจะได้ย่อยสลาย และกลายเป็นสารอาหารสะสมในระบบนิเวศ

### 2.1.2 วัฏจักรของแร่ธาตุในระบบนิเวศ

นักนิเวศวิทยา กล่าวว่า วัฏจักรการหมุนเวียนทางชีวธรณีเคมีมี 2 ชนิด คือ

2.1.2.1 วัฏจักรในธรณีภาค (lithospheric cycles) เป็นวัฏจักรที่มีการหมุนเวียนของแร่ธาตุที่ถูกปลดปล่อยจากหินตะกอน ดินต่าง ๆ โดยกระบวนการชะล้าง (weathering) แหล่งสะสมส่วนใหญ่จึงอยู่ที่ผิวโลกส่วนธรณีภาค (lithosphere) เช่น ฟอสฟอรัส และกำมะถัน เป็นต้น วัฏจักรในธรณีภาคนี้มักมีลักษณะสำคัญ คือ จะมีแหล่งสะสม (sink) ที่ธาตุเหล่านี้จะถูกตรึงเอาไว้เป็นเวลานานนอกวัฏจักร และจะมีการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ในวัฏจักรใหม่โดยการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก (นิตยา เลหาะจินดา, 2549) ธาตุจากแหล่งเก็บกักสามารถหมุนเวียนสู่แหล่งพร้อมสู่กระบวนการ เพื่อให้พืชและสัตว์ลำเลียงไปใช้ในห่วงโซ่อาหาร ตัวอย่างเช่นแหล่งแร่ธาตุในดินจะถูกพืชดึงขึ้นมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงและเก็บส่วนหนึ่งไว้ในส่วนต่าง ๆ ของพืชและสัตว์ และธาตุจะกลับคืนสู่ดิน เมื่อเกิดการเน่าสลายของพืชและสัตว์ ส่วนแหล่งแร่ธาตุอีกส่วนหนึ่งก็จะถูกชะล้างพังทลายโดยลม ฝน น้ำ ฯลฯ เพื่อลำเลียงธาตุสู่แม่น้ำทะเล มหาสมุทร ผู้การกินของ

พืช และสัตว์เล็ก ๆ ในแหล่งน้ำ เช่น แพลงก์ตอน ปลา และมนุษย์ในที่สุด บางส่วนก็สามารถฟุ้งกระจายสู่บรรยากาศ เช่น ซัลเฟอร์ คลอรีน เมื่อสิ่งมีชีวิตตายลงธาตุก็เกิดการแปรสภาพเป็นตะกอนในทะเล มหาสมุทร เป็นการแปรสภาพกลับคืนสู่แหล่งเก็บกักของธาตุโดยอยู่ในรูปของแหล่งแร่ธาตุ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม เป็นต้น

ตารางที่ 2.1 ธาตุที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

ธาตุ	ร้อยละ	ความสำคัญ
ไฮโดรเจน	49.74	ธาตุหลัก 3 ธาตุ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์แสง
คาร์บอน	24.90	
ออกซิเจน	24.83	
ไนโตรเจน	0.272	Macronutrient คือธาตุที่จำเป็นสูงสำหรับสิ่งมีชีวิต
แคลเซียม	0.072	
โปรแตสเซียม	0.044	
แมกนีเซียม	0.031	
ซัลเฟอร์	0.017	
ฟอสฟอรัส	0.013	
ซิลิกอน	0.033	Micronutrients คือ ธาตุที่มีความจำเป็นรองลงไปสำหรับสิ่งมีชีวิต
อลูมิเนียม	0.016	
คลอรีน	0.011	
โซเดียม	0.006	
เหล็ก	0.005	
แมงกานีส	0.003	

หมายเหตุ : จาก Land Use and Earth Systems. Environmental Geography Science, Marsh and Grossa, 1996, New York: John Wiley & Sons.



2.1.2.2 วัฏจักรในบรรยากาศ (atmospheric cycles) เป็นการหมุนเวียนของแร่ธาตุที่มีแหล่งสะสมส่วนใหญ่อยู่ในบรรยากาศ ในสถานะแก๊สเช่น คาร์บอน หรือไนโตรเจน ส่วนใหญ่จะเป็นวัฏจักรที่ใช้เวลาไม่ยาวนานนัก

การหมุนเวียนทางชีวธรณีเคมีจะเริ่มจากแหล่งแร่ธาตุ (pool) ซึ่งจะมี 2 ชนิด คือ แหล่งธาตุพร้อมสู่กระบวนการ (active pool) คือ แหล่งแร่ธาตุที่อยู่ในรูปและสถานที่ง่ายต่อการใช้ของกระบวนการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์เช่น  $O_2$ ,  $CO_2$  ในบรรยากาศ และแหล่งธาตุเก็บกัก (storage pool) คือแหล่งแร่ธาตุที่นำเข้าสู่การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตได้ยาก แหล่งธาตุพร้อมสู่



กระบวนการจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่าและเร็วกว่า แหล่งธาตุเก็บกัก ตัวอย่างเช่นในวัฏจักรของคาร์บอนกระบวนการสังเคราะห์แสง และกระบวนการหายใจของพืชเป็นการใช้แก๊ส  $\text{CO}_2$  ในบรรยากาศซึ่งเป็นแหล่งธาตุพร้อมสู่กระบวนการ ระยะเวลา อาจเกิดขึ้นสั้น ๆ ในขณะที่การแปรสภาพจาก  $\text{CO}_2$  เป็นตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเป็นแหล่งธาตุเก็บกักจะใช้เวลาหลายล้านปี


1) วัฏจักรคาร์บอน (carbon cycle) มีการหมุนเวียนคาร์บอนเกิดขึ้นระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเป็นหลัก โดยเกิดขึ้นผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง การหายใจ และการย่อยสลาย นอกจากนี้ยังมีการเผาไหม้ (combustion) ของเชื้อเพลิง และการผุพังอยู่กับที่ (weathering) ของหินปูนเข้ามาร่วมในวัฏจักรด้วย ธาตุคาร์บอนเป็นธาตุที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของสารประกอบหลักที่ประกอบเป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิต หรือกล่าวได้ว่าคาร์บอนเป็น โครงร่างของสารประกอบอินทรีย์ทุกชนิด ดังนั้นจึงมีความสำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตมาก วัฏจักรคาร์บอนอาจเริ่มที่พืชดึงแก๊ส  $\text{CO}_2$  ในบรรยากาศ ไปใช้เพื่อการสังเคราะห์แสง กระบวนการนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่ดึงคาร์บอนจากบรรยากาศมาใช้ จากนั้นธาตุคาร์บอนจะมีการหมุนเวียนไปตามห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศในสภาพสารอินทรีย์ในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต ธาตุคาร์บอนจะหมุนเวียนกลับแหล่งสะสมในบรรยากาศใหม่โดยการหายใจของสิ่งมีชีวิต และการย่อยสลายซากของจุลินทรีย์และผู้ย่อยสลายอื่นๆ ซึ่งได้แก๊ส  $\text{CO}_2$  กลับคืนสู่บรรยากาศใหม่ ดังรูปที่ 2.1 นอกจากนี้ยังมีกระบวนการอื่นที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีการหมุนเวียน  $\text{CO}_2$  สู่บรรยากาศเช่นเดียวกับ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตเช่น ซากสิ่งมีชีวิตที่ถูกทับถมภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจนนับร้อยล้านปีเกิดเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ถูกนำไปใช้ในการเผาไหม้เกิดแก๊ส  $\text{CO}_2$  สู่บรรยากาศ จนเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะเรือนกระจก (greenhouse effects) ขึ้นทั่วโลก คาร์บอนที่อยู่ในรูปของสารอินทรีย์และ  $\text{CO}_2$  โดย  $\text{CO}_2$  ที่เข้าสู่พืชจะถูกเปลี่ยนไปเป็นคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด และคาร์โบไฮเดรตนี้จะสลายตัวเป็น  $\text{CO}_2$  ทั้งหมดในกระบวนการหายใจ สารอินทรีย์คาร์บอนสะสมอยู่ในหลายแหล่งภายในระบบนิเวศ เช่น  $\text{CO}_2$  ในอากาศ  $\text{CO}_2$  ที่ละลายอยู่ในน้ำ คาร์บอเนตที่ละลายอยู่ในน้ำ และคาร์บอเนตที่อยู่ในตะกอน คาร์บอนในแหล่งสะสมต่าง ๆ เหล่านี้สิ่งมีชีวิตนำเอาไปใช้มากน้อยต่าง ๆ กัน เนื่องจากการแลกเปลี่ยนหรือไหลผ่าน คาร์บอนที่ผิวสัมผัสระหว่างน้ำและอากาศเป็นไปอย่างช้ามาก ธาตุคาร์บอนในสภาพหินปูน (carbonate rock) อาจมีการผุกร่อนตามธรรมชาติ และมีการชะล้าง สะสมในแหล่งน้ำเป็นสารละลายคาร์บอเนต ซึ่งพืชน้ำจะนำไปใช้ในการสังเคราะห์แสงได้ต่อไป บางส่วนของสารละลายคาร์บอเนตซึ่งมักอยู่ในรูปของกรดคาร์บอนิกจะแตกตัวให้  $\text{CO}_2$  และน้ำ แก๊ส  $\text{CO}_2$  จากปฏิกิริยาการแตกตัวจะซึมผ่านผิวหนังน้ำกลับสู่บรรยากาศได้ ปฏิกิริยาของ  $\text{CO}_2$  ในน้ำสามารถสรุปได้ดังสมการที่ 2.2 - 2.5 โดยสมการเคมีของ  $\text{CO}_2$  ในน้ำนี่จะเป็นปฏิกิริยาที่สามารถเกิดได้ทั้งสองทาง ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ในน้ำ เช่น pH และอุณหภูมิ





รูปที่ 2.1 วัฏจักรคาร์บอน มีการหมุนเวียนในระบบนิเวศโดยผ่านการสังเคราะห์แสง การหายใจ การย่อยสลาย และการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง (จาก *Ecology and Field Biology*, Smith, 1974, New York : Harper and Row อ้างถึงใน นิตยา เลาะห์จินดา, 2549, นิเวศวิทยา : พื้นฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา)





ดังนั้น วัฏจักรคาร์บอนในน้ำและบนบกจึงค่อนข้างจะแยกออกจากกัน โดยวัฏจักรของคาร์บอนที่บ่งบอกถึงปริมาณของคาร์บอนจะแสดงได้ดังรูปที่ 2.2 ปริมาณการปล่อย  $\text{CO}_2$  สู่อากาศของโลกเพิ่มขึ้นทุกทีอาจกล่าวได้ว่าในศตวรรษหน้าความเข้มข้นของแก๊ส  $\text{CO}_2$  ในบรรยากาศจะมีถึง 2 เท่าของปัจจุบัน เนื่องจาก  $\text{CO}_2$  เป็นแก๊สที่มีความสำคัญต่อการกำหนดคุณภาพของอากาศในโลก ดังนั้น ถ้ามีแก๊ส  $\text{CO}_2$  มากเป็น 2 เท่า จะทำให้อากาศรอบ ๆ โลกร้อนขึ้นประมาณ  $1.5^\circ\text{C} - 4.5^\circ\text{C}$  อีกทั้งการเพิ่มประชากรมนุษย์ของโลก ทำให้มีการตัดไม้ทำลายป่ากระจายไปทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาเมื่อต้นไม้หมดไปจึงไม่มีต้นไม้มาซึมซับแก๊ส  $\text{CO}_2$  ที่เกิดขึ้น (มุกดา สุขสมาน, 2536)

2) วัฏจักรไนโตรเจน (nitrogen cycle) ไนโตรเจนเป็นธาตุที่จำเป็นของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง โดยจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรตีนและกรดนิวคลีอิก สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จะไม่สามารถใช้แก๊ส  $\text{N}_2$  ในบรรยากาศได้โดยตรงแต่จะใช้ได้เมื่ออยู่ในสภาพสารประกอบ เช่น แอมโมเนีย ไนไตรท์ และไนเตรต ดังนั้นแหล่งสะสมที่แท้จริงของไนโตรเจนจึงอยู่ในสภาพสารอินทรีย์ เช่น ยูเรีย โปรตีน กรดนิวคลีอิก ธาตุไนโตรเจนในบรรยากาศจึงจำเป็นต้องถูกเปลี่ยนรูปให้อยู่ในสภาพที่สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จะใช้ได้ ซึ่งเกิดโดยการตรึงไนโตรเจน (nitrogen fixation) ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องอาศัยแบคทีเรียและจุลินทรีย์หลายชนิด จึงจะทำให้เกิดสมดุลของการหมุนเวียนแร่ธาตุเหล่านี้ได้ วัฏจักรไนโตรเจนและคาร์บอนในระบบนิเวศมีข้อแตกต่างที่สำคัญหลายประการเช่น การสลายตัวของสารอินทรีย์ไนโตรเจนให้เป็นสารอนินทรีย์มีหลายขั้นตอนในบางขั้นตอนต้องการแบคทีเรีย และมีโมเลกุลของไนโตรเจนในอากาศเป็นจำนวนมาก ( $3.85 \times 10^{21}$  กรัม) ซึ่งสิ่งมีชีวิตนำเอามาใช้ไม่ได้ ในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตมีไนโตรเจนที่ไหลสู่ระบบนิเวศประมาณ 3% พืชดูดซึมเอาไนโตรเจนไปใช้ได้ไม่ถึง 1% ของปริมาณไนโตรเจนที่ไหลอยู่ในวัฏจักร พืชบกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไม้ใหญ่มีไนโตรเจนน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นคาร์โบไฮเดรต เช่น เซลลูโลส ลิกนิน (อู่แก้ว ประกอบ ไวยาทยกิจ บีเวอร์, 2531)


### 2.1.3 ปัจจัยหลักในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

ปัจจัยหลักในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศ ได้แก่ ปัจจัยทางกายภาพ (physical factors) และปัจจัยทางชีวภาพ (biotic factors) (สมพงษ์ ธรรมถาวร, 2541)

#### 2.1.3.1 ปัจจัยทางกายภาพได้แก่ สิ่งไม่มีชีวิตทั้งหลายซึ่งอาจจัดเป็นกลุ่มได้ดังนี้

1) ปัจจัยเกี่ยวกับดิน (soil factor) ซึ่งหมายถึงคุณภาพ ประเภทและองค์ประกอบของดิน รวมทั้งพวกที่เป็นธาตุอาหารต่าง ๆ ของพืช

2) ปัจจัยเกี่ยวกับน้ำ (water factor) รวมเอาความชื้นในอากาศและปริมาณน้ำฝนระหว่างปี ปริมาณน้ำที่อยู่ภายในตัวของสิ่งมีชีวิต



รูปที่ 2.2 วัฏจักรคาร์บอน และปริมาณคาร์บอนในรูปแบบต่าง ๆ มีหน่วยเป็น  $10^{15}$  กรัม (จาก Ecology, โดย Ricklefs, 1973, Massachusetts : Chirm Press, อ้างถึงในอุ๋แก้ว ประกอบไวยทกิจ บีเวอร์, 2531, นิเวศวิทยา (หน้า 115-117), กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช)

3) ปัจจัยเกี่ยวกับอุณหภูมิ (temperature factor) มีผลต่อแบบแผนการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตในเขตต่าง ๆ ของโลกเช่น เขตร้อน (tropical) เขตอบอุ่น (temperate) และเขตหนาว (tundra)

4) ปัจจัยเกี่ยวกับแสง (light factor) แสงจากดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานแหล่งเดียวของโลก พืชจะเป็นผู้ถ่ายทอดเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงโดยการสังเคราะห์แสงให้อยู่ในรูปของพลังงานเคมี (สารอาหาร) และแสงยังมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตด้วยเช่น แสงกำหนดเวลาออกหาอาหารของสัตว์ เป็นต้น

5) ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพบรรยากาศที่ผิวโลก (atmospheric factor) เช่น สภาพวะมลพิษทางอากาศ ปัญหาภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก เป็นต้น


2.1.3.2 ปัจจัยทางชีวภาพ ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง ทุกชั้น ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ จุลชีพ ทั้งพวกที่สังเคราะห์แสงได้หรือพวกที่สังเคราะห์แสงไม่ได้ ซึ่งกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ได้แก่ พวกที่อาศัยอยู่ร่วมกัน (symbiotic phenomena) สัตว์ที่กินพืชเป็นอาหาร (herbivorous animals) พวกที่อยู่ร่วมกันและตรึงไนโตรเจนได้ (symbiotic nitrogen fixation) และพวกที่เป็นอิสระและตรึงไนโตรเจนได้ (nonsymbiotic nitrogen fixation)

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดย่อมมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตเฉพาะตัว และไม่เพียงแต่ปัจจัยจำกัดในสภาพที่น้อยเกินไปเท่านั้นที่มีผลให้สิ่งมีชีวิตตาย ปัจจัยจำกัดนี้ถ้ามีมากเกินไป จะเป็นสาเหตุให้สิ่งมีชีวิตตายได้เช่นกัน ดังนั้นสิ่งมีชีวิตจึงมีชีวิตอยู่ในช่วงต่ำสุดและสูงที่สุดของแต่ละปัจจัยจำกัด (limit of tolerance) ซึ่งนิคยา เลาะห์จินดา (2549) ได้อธิบายไว้ว่า ความหนาแน่นของประชากรจะสูงสุดในช่วงที่ปัจจัยจำกัดอยู่ในช่วงกลาง ๆ หรือช่วงที่เหมาะสมที่สุด (optimum) ค่าความเหมาะสมนี้แตกต่างกันไปตามชนิดของสิ่งมีชีวิต และในช่วงที่ปัจจัยจำกัดมีค่าต่ำสุดและสูงสุด จะมีผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและทำให้ความหนาแน่นของประชากรน้อยกว่าปกติ ในขณะที่ช่วงที่อยู่นอกขีดจำกัดต่ำสุดและสูงสุด ไม่มีสิ่งมีชีวิตที่สามารถอาศัยอยู่ได้ ดังแสดงในรูปที่ 2.3


Stuth, Lyons, and Kreuter (1993) ได้กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการขยายการผลิตปศุสัตว์ ได้แก่ การเลือกชนิดของอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ขนาดการใช้ที่ดินและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ระดับของการเลือกบริโภคของมนุษย์ ตำแหน่งใกล้หรือไกลของพื้นที่ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์กับศูนย์กลางที่มีประชากรหนาแน่น นอกจากนี้ Simpson (1993) ยังได้กล่าวถึงความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มจำนวนของประชากรและผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่ตามมา มากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยการเพิ่มความหนาแน่นของการผลิตปศุสัตว์ตามความต้องการอาหารของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการผลิตอาหารประเภท นม ไข่ และหมู ซึ่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั้งในชนบทและในเมือง ต้องได้รับการสนับสนุนจากระบบการค้าขายที่เกิดจากการขายสินค้าเกษตร และสินค้าจากการปศุสัตว์ที่ผลิตได้

### 2.1.4 ความสัมพันธ์เชิงระบบของคาร์บอน

ดิน พืช สัตว์ และมนุษย์ ต่างก็พึ่งพาอาศัย และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และสามารถอธิบายได้ในเชิงของสมดุลมวลคาร์บอน โดยความสัมพันธ์ของคาร์บอนระหว่างทรัพยากรดังกล่าวสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2.4 พบว่าพืชเป็นตัวจักรสำคัญที่จะรับเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงโดยใช้แก๊ส  $\text{CO}_2$  ที่มีอยู่ในบรรยากาศ เพื่อสร้างเป็นเซลล์และเนื้อเยื่อของพืช จากนั้นเมื่อสัตว์กินพืชก็จะเกิดการถ่ายเทคาร์บอนจากพืชไปสู่สัตว์ และในที่สุดสัตว์กินพืชเหล่านี้ ก็กลายเป็นอาหารของสัตว์กินเนื้ออีกทีหนึ่ง ซึ่งนั่นก็คือความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดคาร์บอนจากสัตว์สู่สัตว์



รูปที่ 2.3 ความสัมพันธ์ของปัจจัยจำกัด และความหนาแน่นประชากร  
(จาก นิเวศวิทยา : พื้นฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา,  
นิตยา เลาหะจินดา, 2549)



รูปที่ 2.4 ความสัมพันธ์เชิงระบบของคาร์บอนกับสิ่งมีชีวิต

การเลี้ยงสัตว์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของการสะสมคาร์บอนจากพืช เมื่อประชากรของโลกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การเลี้ยงสัตว์ย่อมจะมีประโยชน์และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นดังนี้

2.1.4.1 เป็นแหล่งสะสมคาร์บอนในรูปของอาหารโปรตีน และพลังงานที่มีคุณค่าสูง เช่น เนื้อ นม ไข่ ไขมัน เป็นต้น

2.1.4.2 เปลี่ยนรูปคาร์บอนที่อยู่ในพืชผลที่มีราคาต่ำ (รำ ปลายข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง) เป็นรูปคาร์บอนของเนื้อ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงกว่า


ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เป็นผลของการสะสมคาร์บอน ซึ่งจะมีมูลค่าของคาร์บอนมากกว่าที่พืช โดยแหล่งสะสมคาร์บอนที่มีปริมาณคาร์บอนสูง และมีความสำคัญคือ เนื้อสัตว์ รองลงมาเช่น นม ไข่ หนัง ไขมัน กระดูก เขา และมูลสัตว์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2538) ได้กล่าวไว้ว่าคุณภาพทางด้านโภชนาการของเนื้อสัตว์โดยทั่วไปจะมีน้ำประมาณ 70% โปรตีน 20 - 23% (โปรตีนเป็นสารอาหารที่ให้พลังงาน โดยโปรตีน 1 กรัม จะให้พลังงาน 4 แคลอรี เป็นส่วนประกอบของเซลล์ เลือด และเนื้อเยื่อต่าง ๆ) ไขมัน 2 - 3.5% แร่ธาตุ 1 - 1.2% (ในร่างกายของสัตว์มีแร่ธาตุอยู่ประมาณ 3 - 5% ของน้ำหนักตัว และประมาณ 80% ของแร่ธาตุทั้งหมดเป็นกระดูกและฟัน) และวิตามินจำนวนเล็กน้อย ส่วนคาร์โบไฮเดรต (แป้ง น้ำตาล) นั้นมีอยู่น้อยมากประมาณ 1%

โปรตีนคือ สารชีวโมเลกุลประเภทสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยธาตุ C, H, O, N เป็นองค์ประกอบสำคัญ โปรตีนเป็นสารพอลิเมอร์ ประกอบด้วยกรดอะมิโนจำนวนมากมาย

การเกิดพันธะเพปไทด์ คือ พันธะโคเวเลนต์ที่เกิดขึ้นระหว่าง C อะตอมในหมู่คาร์บอกซิล

$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ -\text{C}-\text{OH} \end{array}$  ของกรดอะมิโน โมเลกุลหนึ่งยึดกับ N อะตอม ในหมู่อะมิโน ( $-\text{NH}_2$ ) ของกรดอะมิโนอีกโมเลกุลหนึ่งดังรูปที่ 2.5




รูปที่ 2.5 การเกิดโปรตีนจากพันธะเพปไทด์ (จากเอกสารประกอบคำบรรยายวิชาเคมี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538, โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ ภาคฤดูร้อน Brand's Summer Camp'95)

ไขมัน ประกอบด้วยธาตุ C, H และ O คล้ายคาร์โบไฮเดรต แต่ไขมันจะมี C และ H ต่อ O มากกว่าพวกคาร์โบไฮเดรตและไขมันยังให้พลังงานมากกว่าคาร์โบไฮเดรตถึง 2.25 เท่า ซึ่งไขมันคือสารอินทรีย์ประเภทลิพิดชนิดหนึ่งได้จากเนื้อเยื่อพืชและสัตว์เกิดจากการผสมกันของกลีเซอรอลและกรดไขมัน ดังที่แสดงในรูปที่ 2.6 ไขมันเป็นของแข็งมักพบในสัตว์ประกอบด้วยกรดไขมันอิ่มตัว ( $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{COOH}$ ) มากกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัว ( $\text{C}_n\text{H}_x\text{COOH}$ ;  $x < 2n+1$ ) เช่น ไขวัว ควาย

คาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) คือ สารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยธาตุ C, H และ O อัตราส่วนโดยอะตอมของ H : O = 2:1 เช่น  $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$ ,  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ,  $(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n$  ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่หมู่คาร์บอกซาลดีไฮด์ ( $-\text{CHO}$ ) และหมู่ไฮดรอกซิล ( $-\text{OH}$ ) หรือหมู่คาร์บอนิล ( $-\text{CO}$ ) เป็นหมู่ฟังก์ชัน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538)

เนื่องจากคาร์บอนที่อยู่ในเนื้อสัตว์โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ โปรตีน และไขมัน ดังนั้น เราจึงสามารถหาปริมาณของคาร์บอนจากเนื้อสัตว์ได้โดยอาศัยตารางที่ 2.2



รูปที่ 2.6 ไขมันจากการผสมกันของกลีเซอรอล และกรดไขมัน (จาก เอกสาร  
ประกอบคำบรรยาย วิชาเคมี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538,  
โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน  
Brand's Summer Camp'95)

เมธา วรรณพัฒน์ (2533) ได้กล่าวไว้ในหนังสือโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องว่า สัตว์เคี้ยวเอื้อง (ruminant) มีความสามารถพิเศษในการใช้อาหารหยาบ (roughage) กระเพาะของสัตว์เหล่านี้มีลักษณะพิเศษสามารถจุได้ 20-40 แกลลอน ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของสัตว์เอง กระเพาะทั้งหมดแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ กระเพาะหมักหรือผ้าชีรีว (rumen) รังผึ้ง (reticulum) สามสิบกลีบ (omasum) และกระเพาะจริง (abomasum) ในบริเวณส่วนเหล่านี้โดยเฉพาะในกระเพาะรูเมน จะมีประชากรจุลินทรีย์อยู่เป็นจำนวนมาก จุลินทรีย์จะทำหน้าที่ย่อยหมักอาหารที่สัตว์กินเข้าไป สำหรับหน้าที่ของสามสิบกลีบเท่าที่มีรายงาน มีส่วนในการดูดซึมกลับของของเหลวหรือกรดไขมันที่ระเหยได้ (volatile fatty acids, VFA) ที่ผ่านไป ส่วนกระเพาะจริงจะทำหน้าที่ทุกอย่างคล้ายกับกระเพาะของสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง ดังรูปที่ 2.7 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กระเพาะหมัก หรือผ้าชีรีว (rumen) กระเพาะส่วนนี้มีปริมาตรความจุถึง 80% ของกระเพาะทั้งหมด อยู่ติดกับผนังด้านซ้ายของช่องท้อง ถัดไปทางด้านขวาของรูเมนจะเป็นส่วนของกระเพาะโอมาซั่มหรือสามสิบกลีบ กระเพาะอะโบมาซั่มหรือกระเพาะจริง และอวัยวะอื่น ๆ ผนังมีคุ่มเล็ก ๆ อยู่ทั่วไป จึงเรียกว่า ผ้าชีรีว ภายในมีจุลินทรีย์ที่ช่วยในการหมักอาหารหยาบก่อนที่สัตว์จะขยอกอาหารออกมาเคี้ยวอีกครั้งหนึ่ง โดยไม่มีการขับน้ำย่อยออกมาช่วยย่อยอาหาร

กระเพาะเรตติคูลั่ม หรือรังผึ้ง (reticulum) เป็นกระเพาะที่มีลักษณะเป็นถุงขนาดเล็ก มีปริมาตรความจุประมาณ 5% ของปริมาตรความจุทั้งหมดของกระเพาะ อยู่ติดกับส่วนหน้าของกระเพาะรูเมน ผนังมีลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยมเล็ก ๆ เรียงติดต่อกัน จึงเรียกว่า รังผึ้ง ไม่มีการขับน้ำย่อยออกมาช่วยย่อยอาหาร




ตารางที่ 2.2 ร้อยละของคาร์บอนที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในสารอินทรีย์แต่ละชนิด

สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์		พลังงาน (kcal/g)	ร้อยละของส่วนประกอบโดยน้ำหนัก			
			คาร์บอน	ไฮโดรเจน	ออกซิเจน	ไนโตรเจน
คาร์บอน	คาร์บอน	8.0	100	-	-	-
	CH <sub>4</sub>	13.3	75	25		
คาร์โบไฮเดรต	กลูโคส	3.75	40	7	53	
	ซูโครส	3.96	42	6	52	
	แป้งและไกลโคเจน	4.23	45	6	49	
	เซลลูโลส	4.18	45	6	49	
กรดไขมัน และไขมัน	กรดอะซีติก	3.49	40	7	53	
	กรดโพรไพโอนิก	4.96	49	8	43	
	กรดบิวทีริก	5.95	55	9	36	
	กรดพามมีติก	9.35	75	13	12	
	กรดสเตียริก	9.53	76	13	11	
	กรดโอเลอิก	9.5	76	12	11	
	ค่าเฉลี่ย ไตรกลีเซอไรด์*	9.45	75	13	12	
กรดอะมิโน และโปรตีน	กลูตามีน	3.11	32	7	42	19
	แอลลาไนน์	4.35	40	8	36	16
	ไทโรซีน	5.92	60	6	26	8
	ค่าเฉลี่ย โปรตีน*	5.65	52	7	23	16
สารจากระบบ ขับถ่าย	ยูเรีย	2.53	20	7	26	47
	กรดยูริก	2.74	36	2	29	33
	ครีเอทีน	4.24	37	7	24	32
	ครีเอทีนีน	4.6	43	6	14	37

\* ค่าเฉลี่ยจากส่วนผสมที่ขับถ่ายของไขมันและโปรตีน

หมายเหตุ : จาก Bioenergetics and Growth, Brody, 1945, New York : Hafner ; จาก Animal Nutrition, Maynard and Loosli, 1969, New York : McGraw-Hill.



รูปที่ 2.7 ทางเดินอาหารของโคที่โตเต็มที่แล้ว (จาก The science of animal agriculture. โดย Herren, 1998, New York: Delmar publishers Inc.)

กระเพาะโอม่าซั่ม หรือสามสิบกลีบ (omasum) กระเพาะส่วนนี้อยู่ติดกับผิวบนส่วนหน้าของกระเพาะรูเมน มีปริมาตรความจุประมาณ 7-8% ของกระเพาะทั้งหมด หน้าที่โดยตรงของ omasum คือ จะดูดเอาของเหลวในอาหารกลับ ทำให้อาหารมีลักษณะแห้ง สะดวกต่อการเคลื่อนตัวสู่กระเพาะจริง ไม่มีการหลั่งน้ำย่อยแต่ทำหน้าที่ดูดซับน้ำ ทำให้อาหารแห้งขึ้น

กระเพาะอะโบมาซั่ม หรือกระเพาะจริง (abomasums) จะอยู่ติดด้านขวาของกระเพาะรูเมน และอยู่ติดกับพื้นล่างของช่องท้อง ส่วนปลายของกระเพาะจะเปิดเข้าสู่ลำไส้เล็ก ทำหน้าที่ขับน้ำย่อยออกมาย่อยอาหารเหมือนกับในสัตว์กระเพาะเดี่ยว อาหารจะผ่านส่วนต่างๆ ต่อจากกระเพาะแท้ เหมือนกับสัตว์กระเพาะเดี่ยวจนขับกากอาหารออกทางทวารหนัก

การบดเคี้ยว (chewing) ในสัตว์เคี้ยวเอื้องลักษณะการเคี้ยวเป็นไปตามแนวราบ ทำให้อาหาร निकาดออกจากกัน ส่วนในสัตว์กระเพาะเดี่ยวลักษณะการเคี้ยวเป็นไปตามแนวตั้ง

ขบวนการเคี้ยวเอื้อง (rumination) คือ ขบวนการที่เกิดขึ้นในระบบการย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

- Regurgitation เป็นการขอยกกลับของ ingesta จาก reticulo-rumen เข้าสู่หลอดคอและปากตามลำดับ

- Swallowing หลังจากที่ ingesta ขยอกกลับถึงปากแล้ว สัตว์จะทำการกลืนกลับส่วนของเหลวที่ขยอกกลับมาด้วยลงสู่กระเพาะรูเมน
- Remastication สัตว์จะทำการเคี้ยวอาหารอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ละเอียดยิ่งขึ้น
- Reinsalivation ในขณะที่สัตว์ทำการเคี้ยวอาหารอีกครั้งหนึ่ง จะมีการขับน้ำลายออกมาเพิ่ม และผสมคลุกเคล้ากับอาหารอีก
- Reswallowing เป็นขั้นตอนสุดท้ายของขบวนการเคี้ยวเอื้อง โดยสัตว์จะทำการกลืนอาหารทั้งหมดลงสู่กระเพาะรูเมน

การเคี้ยวเอื้องมีประโยชน์โดยทำให้การบดอาหารละเอียดยิ่งขึ้นส่งผลให้การย่อยหมักอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเร่งให้การไหลผ่านของ ingesta เร็วขึ้นทำให้สัตว์กินอาหารได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอาหารหยาบคุณค่าต่ำ และช่วยรักษาภาวะให้ประชากรจุลินทรีย์มีความมั่นคงและสมดุล ทำให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตและขยายตัวได้เร็วขึ้น รวมทั้งทำให้การผลิตกรดไขมันที่ระเหยได้เพิ่มขึ้น

Schalk and Amadon (1928) ได้สรุปลักษณะการกินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้องได้ดังนี้

- ใช้เวลากินอาหาร 1 ใน 3
- ใช้เวลาเคี้ยวเอื้อง 1 ใน 3
- และใช้เวลาพักผ่อน อีก 1 ใน 3

กลไกการเกิดขบวนการขับแก๊ส (mechanics of eructation) จะเกิดขึ้นร่วมกับการบีบตัวของกระเพาะรูเมน ในรอบการบีบตัวปกติของกระเพาะในสัตว์ที่โตแล้วจะสามารถขับไล่แก๊สได้ประมาณ 2 ลิตรต่อนาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่กินเข้าไป (เมธา วรรณพัฒน์, 2533; van Soest, 1982)

ทิม พรรณศิริ (2531) ได้กล่าวไว้ในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 12 ว่า สัตว์เลี้ยงที่ถือว่ามีค่าและความสำคัญและสามารถทำรายได้ให้แก่เกษตรกร คือ สัตว์เคี้ยวเอื้อง สัตว์กระเพาะเดี่ยว และสัตว์ปีก โดยมีรายละเอียดดังนี้

สัตว์เคี้ยวเอื้องได้แก่ สัตว์เลี้ยงพวกโค กระบือ แพะและแกะ ซึ่งเป็นสัตว์สี่กระเพาะ เมื่อกินอาหารเข้าไปแล้วจะคายออกมาเคี้ยวเอื้องอีกครั้งก่อนจะถูกนำไปใช้เป็นประโยชน์ สัตว์เคี้ยวเอื้องอาจแบ่งแยกประเภทออกได้ตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการเลี้ยงคือ

- โคเนื้อ โคที่เลี้ยงในบ้านเราเป็นโคขนาดเล็ก มีการเจริญเติบโตช้า ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้ใช้งานเช่น ไถนา ทำไร่ และเทียมเกวียนหรือล้อ เพื่อใช้ในการขนส่งระยะสั้นๆ หลังจากเลิกใช้งานแล้วก็ส่งเข้าโรงฆ่าชำแหละออกมาเป็นเนื้อวัวสำหรับบริโภค ปัจจุบันทางราชการได้นำโคพันธุ์เนื้อจากต่างประเทศเข้ามาเลี้ยงหลายพันธุ์ และพบว่าโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน หรือโคลูกผสม

อเมริกันบร่ำหมั้น (เช่น โคนมรัฐเคราต์มาสเตอร์) สามารถเลี้ยงและเจริญเติบโตได้ดีในภูมิประเทศของบ้านเรา นอกจากนี้ยังมีความทนทานต่อโรคเหมือนโคนมพื้นเมืองของไทย

- โคนม ซึ่งเป็นโคนมพื้นเมืองของไทยให้มน้อยประมาณวันละ 2-3 ลิตร ทางราชการจึงได้ทดลองนำโคนมจากต่างประเทศเข้ามาเลี้ยงหลายพันธุ์ด้วยกัน และพบว่าโคนมพันธุ์แท้ที่นำเข้ามาทดลองเลี้ยงในบ้านเรายังไม่มีความเหมาะสมกับบ้านเรา โดยเฉพาะมีการแพ้โรคต่าง ๆ มากและมักจะเสียชีวิตหลังจากนำเข้าไม่นานนัก จึงได้ผลิตโคลูกผสมโดยใช้โคนมพันธุ์มาจากต่างประเทศที่นำเข้ามาผสมกับโคนมพื้นเมือง และพบว่าโคนมลูกผสมขาวดำ (โฮลสไตน์ ฟรีเซียน) กับโคนมพื้นเมืองเป็นโคนมลูกผสมที่ให้นมดีที่สุดในบางตัวให้นมสูงถึง 38 ลิตรต่อวัน และทั่ว ๆ ไปให้นมมากกว่า 10 ลิตรต่อวัน

- กระบืองานหรือกระบือปลัก กระบือบ้านเราเรียกทั่ว ๆ ไปว่ากระบือปลักหรือกระบือที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้งานเป็นหลัก ให้น้ำนมน้อยประมาณวันละ 1-2 ลิตร และเมื่อเลิกใช้งานแล้วก็ส่งเข้าโรงฆ่าเอาเนื้อมาบริโภค

สัตว์กระเพาะเดี่ยวที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศคือสุกร ซึ่งมีการเลี้ยงกันมากทั่วประเทศ สุกรพื้นเมืองเดิมมีชื่อต่าง ๆ กัน เช่น พวง แรด และอื่น ๆ มีลำตัวค่อนข้างเล็ก แต่ให้ลูกดกและมีความทนทานต่อโรคต่าง ๆ ได้ดีซึ่งไม่เหมาะสมจะใช้เลี้ยงเพื่อธุรกิจการค้า ต่อมาจึงได้มีการนำสุกรพันธุ์จากต่างประเทศเข้ามาทดลองเลี้ยงในบ้านเราหลายพันธุ์ด้วยกัน และพบว่าสุกรพันธุ์แท้บางพันธุ์สามารถเลี้ยงได้ดีในบ้านเรา ซึ่งได้แก่ สุกรพันธุ์ครุฑหรือเจอร์ซี ลาร์จไวต์ แลนด์เรซ นอกจากนี้ก็ได้มีผู้นำสุกรพันธุ์ผสมเข้ามาเลี้ยงอีกหลายพันธุ์ แต่ส่วนใหญ่เป็นสุกรพันธุ์ผสมซึ่งเกิดจากสุกรทั้งสามพันธุ์ดังกล่าวข้างต้น

สัตว์ปีกที่มีการเลี้ยงกันในแง่ของการค้าคือ ไก่ เป็ด ห่าน ไก่วง และนกกระทา โดยในงานนี้จะสนใจเฉพาะไก่เนื้อ และไก่ไข่เท่านั้น

- ไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงในบ้านเรา เป็นไก่ที่เจริญเติบโตช้า ให้ไข่น้อย และมีลำตัวค่อนข้างเล็ก แต่มีความทนทานต่อโรคต่าง ๆ ได้ดี

ปัจจุบันมีผู้นำไก่จากต่างประเทศมาเลี้ยงในรูปของการค้ากันมาก จนถึงกับมีการส่งเนื้อไก่ออกไปขายต่างประเทศจำนวนมาก ไก่ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ

- ไก่เนื้อ คือไก่ที่เลี้ยงประมาณ 8 สัปดาห์หรือ 56 วัน ก็จะส่งตลาดหรือเข้าโรงฆ่า เป็นไก่ที่มีการเจริญเติบโตเร็วและมีเนื้อมาก หากมีการให้อาหารตามคุณภาพที่กำหนด

ไก่เนื้อที่นำเข้ามาเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นไก่ลูกผสมที่ผลิตจากบริษัทในต่างประเทศ โดยประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตไก่เนื้อที่มีคุณภาพดีเท่าต่างประเทศได้ ไก่เนื้อที่นำเข้ามาส่วนใหญ่เป็นพ่อแม่พันธุ์ ซึ่งเมื่อเลี้ยงแล้วผสมพันธุ์ ลูกที่ออกมาจะนำไปเลี้ยงเป็นไก่เนื้อส่งโรงฆ่า

- ไก่ไข่ในระยะเริ่มแรกที่น่าเข้ามาเลี้ยง เมื่อประมาณ 40 ปีจนถึงเมื่อประมาณ 15 ปีที่แล้ว มา ส่วนใหญ่เป็นไก่พันธุ์แท้ซึ่งได้แก่ ไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์แดง และพันธุ์เล็กฮอร์นขาวเป็นหลัก แต่ต่อมาได้มีการนำไก่ไข่อุทกผสมจากต่างประเทศเข้ามาเลี้ยงเป็นส่วนใหญ่ จนอาจกล่าวได้ว่า ปัจจุบันนี้ไม่มีผู้ใดเลี้ยงไก่ไข่อุทกแท้ที่หาได้ นอกจากไก่ของหน่วยงานของรัฐบาล

วิทวิช โมพี. (2540). ได้อธิบายกระบวนการย่อยอาหาร และลักษณะทางเดินอาหารของ สัตว์กระเพาะเดี่ยวไว้ในเอกสารประกอบการสอนโภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวว่า กระบวนการย่อยอาหารของสัตว์กระเพาะเดี่ยวแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ


- การย่อยโดยวิธีกล (mechanical digestion) ได้แก่ การบดเคี้ยวอาหารในปาก การบีบและหดตัวของกล้ามเนื้อเพื่อบีบนำอาหาร การบดเคี้ยวอาหารในกระเพาะบด (gizzard)

- การย่อยทางเคมี (chemical digestion) ได้แก่ การย่อยโปรตีนในกระเพาะอาหารโดยกรดไฮโดรคลอริก (HCl)


- การย่อยทางชีวภาพ (biological digestion) ได้แก่ การย่อยอาหารโดยการใช้ enzyme ในระบบทางเดินอาหารในการย่อยอาหาร

ลักษณะทางเดินอาหารของสัตว์กระเพาะเดี่ยว (Digestive tract) ทางเดินอาหารของสัตว์ หมายถึง ช่องทางที่อาหารที่สัตว์กินเข้าไป เริ่มจากปากจนถึงทวารหนัก ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามชนิดของสัตว์ในที่นี้ยกตัวอย่างทางเดินอาหารของไก่ และสุกร ดังรูปที่ 2.8 และ 2.9

- ปาก (Mouth) เป็นส่วนที่รับอาหารเข้าสู่ร่างกาย และทำหน้าที่ในการบดอาหารด้วยวิธีกล ในสุกรจะมีฟันสำหรับช่วยในการบดอาหารด้วย ซึ่งแตกต่างกับไก่ เพราะไก่ไม่มีริมฝีปาก ฟันและแก้ม แต่จะมีจงอยปากเพื่อใช้ในการจิกอาหารและฉีกอาหาร ในปากจะมีต่อมน้ำลายเพื่อทำให้ปากมีความชุ่มชื้น และช่วยในการคลุกเคล้าและกลืนอาหารลงสู่หลอดอาหาร นอกจากนี้ในปากยังมี enzyme ptyalin เพื่อทำการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล แต่ในไก่จะไม่เกิดการย่อยนี้เพราะว่าระยะเวลาที่อาหารอยู่ในปากนั้นสั้นมาก



รูปที่ 2.8 ระบบทางเดินอาหารของสุกร (จาก Animal science and industry. โดย Acker, D. and Cunningham, M., 1991, New Jersey: Prentice Hall; จาก The science of animal agriculture. โดย Herren, 1994, New York: Delmar publishers Inc.



รูปที่ 2.9 แสดงระบบทางเดินอาหารของไก่ (จาก Animal science and industry. โดย Acker and Cunningham, 1991, New Jersey: Prentice Hall.

- หลอดอาหาร (Esophagus) เป็นท่อยาวที่เชื่อมระหว่างปากกับกระเพาะ มีกล้ามเนื้ออยู่รอบ ๆ เพื่อบีบไล่อาหารให้ลงไปสู่กระเพาะอาหาร ในหลอดอาหารของไก่จะมีการขยายตัวเป็นถุง เรียกว่า กระเพาะพัก (modified esophagus) ทำหน้าที่ในการเก็บกักอาหาร ระยะเวลาที่อาหารอยู่ในกระเพาะพักขึ้นอยู่กับขนาดของอาหาร ปริมาณอาหารที่กิน และปริมาณอาหารที่อยู่ในกิน (gizzard) ในกระเพาะพักจะไม่มีการสร้าง enzyme เพื่อใช้ในการย่อยอาหาร

- กระเพาะ (Stomach) ในไก่แบ่งกระเพาะออกเป็น 2 ส่วนคือ กระเพาะส่วนหน้า เรียกว่า กระเพาะจริง (proventriculus) หรือ glandular stomach ทำหน้าที่เช่นเดียวกับกระเพาะของสุกร คือผลิต enzyme pepsin และกรดไฮโดรคลอริก (HCl) โดย HCl ทำหน้าที่ในการ denature โปรตีน และกระตุ้นทำให้ pepsin ทำงาน pepsin ทำหน้าที่ในการย่อยโปรตีนให้มีขนาดเล็กลง ส่วนหลัง เรียกว่า กระเพาะบด (gizzard) หรือ muscular stomach เป็นอวัยวะที่มีผนังกล้ามเนื้อหนา แข็งแรง ทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารแทนฟันทำให้อาหารมีขนาดเล็กลงเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวทำให้อาหารสามารถสัมผัสกับ enzyme ได้ดีขึ้น การเสริมก้อนกรวดลงในอาหารจะทำให้กระเพาะบดทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (วิทวิช โมพี, 2540; ศาโรช คำเจริญ, 2542) ในสุกรกระเพาะมีหน้าที่ในการย่อยอาหารโดยการบีบตัวของกล้ามเนื้อ และการใช้ HCl กับ enzyme pepsin ในการย่อยอาหารประเภทโปรตีน เมื่ออาหารถูกย่อยจนมีขนาดเล็กลงแล้วอาหารจะถูกลำเลียงเข้าสู่ลำไส้เล็กต่อไป

- ลำไส้เล็ก (Small intestine) เป็นส่วนที่มีความยาวมากที่สุดในระบบทางเดินอาหารในไก่ยาว 62 นิ้ว ในสุกรยาว 16 เมตร ลำไส้เล็กทำหน้าที่สำคัญในการย่อยและการดูดซึมอาหารที่ได้รับการย่อยแล้วเข้าสู่ร่างกาย เพราะที่ผนังภายในลำไส้เล็กจะมีส่วนที่ยื่นออกมา เรียกว่า villi จำนวนมากเพื่อทำหน้าที่ในการย่อยสารอาหารให้เป็นสารอาหารที่มีขนาดเล็ก และจะทำการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายต่อไป ลำไส้เล็กแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ส่วนแรก เรียกว่า duodenum เป็นส่วนที่มีการปรับ pH ของอาหาร และเป็นส่วนที่มีการย่อยอาหารและดูดซึมอาหารมาก ส่วนที่ 2 เรียกว่า jejunum เป็นส่วนที่มีการดูดซึมอาหารและการดูดกลับของน้ำดี ส่วนสุดท้าย เรียกว่า ileum นอกจากนั้นยังมีอวัยวะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะอีกหลายอย่าง เช่น ตับ ตับอ่อน ทำหน้าที่ขับน้ำย่อยเรียกว่า pancreatic juices และถุงน้ำดี ทำหน้าที่ในการขับน้ำดีมาช่วยทำให้ไขมันเป็นสารแขวนลอย ทำให้ enzyme lipase ย่อยไขมันได้ดีขึ้น การทำงานของอวัยวะมีประสิทธิภาพ (ประภาพร ตั้งชนธานี, 2545; ศาโรช คำเจริญ, 2542)

- ลำไส้ติ่ง (Caecum) ไก่มีลำไส้ติ่ง 2 อัน สุกรมีหนึ่งอัน มีลักษณะเป็นถุงขยายใหญ่เชื่อมต่อกับทางเดินอาหารบริเวณรอยต่อระหว่างลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่ เป็นส่วนสุดท้ายสำหรับการย่อยอาหารซึ่งเกิดการหมักย่อยเชื้อโยอาหารโดย bacteria นอกจากนี้ลำไส้ติ่งยังทำหน้าที่ในการดูดกลับของน้ำในร่างกายของสัตว์อีกด้วย

- ลำไส้ใหญ่ (Large intestine) อยู่ต่อจากลำไส้เล็กมีขนาดใหญ่แต่สั้น ในไก่ลำไส้ใหญ่จะไปรวมกับท่อน้ำดีและขับถ่ายมูลกับปัสสาวะออกทางทวารรวม (cloaca) อาหารซึ่งถูกย่อยแล้วจะดูดซึมแล้วจะเคลื่อนตัวมาเก็บที่ลำไส้ใหญ่ เพื่อดูดน้ำจากกากอาหารกลับเข้าสู่ร่างกายเพื่อทำให้อาหารมีลักษณะแห้ง

- ทวาร (Anus) และทวารรวม (Cloaca) เป็นส่วนสุดท้ายของท่อทางเดินอาหาร ซึ่งมีกล้ามเนื้อสำหรับปิดเปิดเพื่อส่งกากอาหารออกนอกร่างกาย ในตัวไก่ทวารรวมเป็นทวารรวมทั้งระบบขับถ่ายและระบบสืบพันธุ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (2545) ได้กล่าวว่า การจัดการให้อาหารสัตว์แต่ละชนิด เพศ และวัย จะมีความต้องการอาหารที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

- การจัดการให้อาหารสุกรแต่ละเพศ และแต่ละช่วงอายุจะมีความต้องการอาหารแตกต่างกันออกไป สุกรพ่อแม่พันธุ์จะต้องมีการควบคุมอาหารไม่ให้สุกรกินจนอ้วนเกินไป ซึ่งอาจจะมีผลทำให้ความสมบูรณ์พันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ลดลง สุกรขุนจะต้องมีอาหารให้กินตลอดเวลาเพื่อเร่งการเจริญเติบโต การให้อาหารสุกรขุน จะเป็นระยะที่สุกรต้องการอาหารมากเพื่อเร่งการเจริญเติบโต วิธีการให้อาหารนั้นควรให้วันละ 2 – 3 ครั้ง แต่แต่ละครั้งที่ให้อาหารนั้นควรให้ในปริมาณที่สุกรสามารถกินได้หมดในแต่ละมื้อเท่านั้น และใช้อาหารสุกรขุนเลี้ยงตั้งแต่ 4 เดือนจนถึงระยะขาย ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่มีพลังงานมาก แต่โปรตีนลดต่ำกว่าในระยะขุนหรือใกล้เคียงกับอาหารสำหรับพ่อแม่พันธุ์ อาจใช้แบบหากินเองแบบอัตโนมัติหรือแบบให้เลือกกิน

- การจัดการให้อาหารไก่ไข่ ระยะไข่ขึ้นนั้นจะนับตั้งแต่ย้ายไก่สาวขึ้นกรงจนไข่ได้ 5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแม่ไก่จะมีอายุประมาณ 4 ถึง 5 เดือน ระยะนี้แม่ไก่จะต้องการอาหารมากเพื่อนำไปเปลี่ยนเป็นไข่ ดังนั้น ผู้เลี้ยงจะต้องมีความเข้าใจเรื่องการให้อาหารพอสมควร โดยปกติก่อนแม่ไก่จะไข่เราจะให้อาหาร วันละ 100 – 110 กรัมต่อตัวต่อวัน แต่เมื่อแม่ไก่เริ่มให้ไข่ได้ 5 เปอร์เซ็นต์ ระยะนี้เราต้องให้อาหารแบบเต็มเพื่อให้แม่ไก่เพิ่มจำนวนไข่จนให้ไข่สูงสุด (peak) หลังจากแม่ไก่ให้ไข่สูงสุดแล้วจะลดอาหารลงเหลือไม่เกิน 120 กรัมต่อตัวต่อวัน

- การจัดการให้อาหารไก่เนื้อหรือบางที่เรียกว่า ไก่กระทง (broiler) เป็นไก่ลูกผสมที่เจริญเติบโตเร็ว ส่วนใหญ่จะมีขนสีเทา ใช้เวลาเลี้ยง 45 วัน จะได้น้ำหนักตัว 1.8 ถึง 2.0 กิโลกรัม โดยทั่วไปการให้อาหารไก่เนื้อจะให้แบบเต็มที่ทำให้ไก่กินอาหารได้ 24 ชั่วโมง โดยเปิดไฟให้ไก่ในช่วงเวลากลางคืน อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่เนื้อในปัจจุบันจะเป็นอาหารเม็ดผสมเสร็จ การจัดการให้อาหารไก่เนื้อตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (2545) แนะนำมีดังต่อไปนี้



1) อาหารไก่เนื้อระยะแรก (starter feed) เป็นอาหารสำหรับเลี้ยงลูกไก่ ซึ่งลูกไก่มีอายุ 1 – 21 วัน อาหารระยะนี้จะเป็นอาหารเม็ดขบที่มีโปรตีนประมาณ 22 – 23 เปอร์เซ็นต์ อาหารระยะแรกจะใช้ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณอาหารที่ไก่กินทั้งหมดตลอดช่วงอายุ

2) อาหารไก่เนื้อระยะที่สอง (grower feed) เป็นอาหารสำหรับเลี้ยงไก่รุ่น ซึ่งไก่รุ่นมีอายุ 22 – 35 วัน โดยเป็นอาหารอัดเม็ด มีโปรตีนประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ อาหารระยะนี้จะใช้ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณอาหารที่ไก่กินทั้งหมด


3) อาหารไก่เนื้อระยะสุดท้าย (finisher feed) เป็นอาหารสำหรับเลี้ยงไก่เนื้อระยะสุดท้ายก่อนจับขาย อายุ 35 – 45 วัน อาหารระยะนี้เป็นอาหารอัดเม็ดที่มีโปรตีนประมาณ 18 เปอร์เซ็นต์ อาหารระยะนี้จะใช้ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณอาหารที่ไก่กินทั้งหมด

- การจัดการให้อาหารโคนม เป็นสัตว์สี่กระเพาะหรือเรียกอีกอย่างว่า สัตว์เคี้ยวเอื้อง อาหารที่โคนมต้องได้รับเป็นอาหารหลักในแต่ละวันคือ อาหารหยาบพวกหญ้า ถั่ว ฟางข้าว ฯลฯ แต่การเลี้ยงโคนม ถ้าต้องการจะได้ปริมาณน้ำนมสูง ๆ แล้วจำเป็นที่จะต้องเสริมอาหารชั้นให้กับแม่โคนมในแต่ละวันด้วย ช่วงให้นมเป็นช่วงระยะเวลาที่แม่โคนมต้องการอาหารที่มีคุณภาพสูง ผู้เลี้ยงจะต้องให้แม่โคนมกินอาหารหยาบให้เต็มที่แล้วเสริมด้วยอาหารชั้นช่วงเวลาเช้าและเย็น การจัดการให้อาหารโคนมมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้

- การจัดการอาหารหยาบสำหรับโคนม อาหารหยาบหลักของแม่โคคือ หญ้า แม่โคนมต้องกินหญ้านี้คิดเป็นน้ำหนักแห้งไม่ต่ำกว่า 1.4 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว ตัวอย่าง เช่น แม่โคนมตัวหนึ่งหนัก 400 กิโลกรัม ดังนั้น แม่โคนมตัวนี้ต้องกินหญ้าเมื่อเทียบเป็นน้ำหนักแห้งแล้วเท่ากับ 5.6 กิโลกรัมต่อวัน เมื่อเทียบกับเป็นน้ำหนักสดซึ่งโดยทั่วไปหญ้าสดมีวัตถุแห้งอยู่ 25 เปอร์เซ็นต์ นั่นคือ แม่โคนมควรจะได้รับหญ้าสดในปริมาณวันละ เท่ากับ 22.4 กิโลกรัม โดยทั่วไปเราจะให้อาหารชั้นกับแม่โคนมโดยคิดจากน้ำหนักที่ได้คือ ให้อาหารชั้น 1 กิโลกรัมต่อปริมาณน้ำนมที่ให้ 4 กิโลกรัม และควรให้ในช่วงเวลาที่แม่โคยืนโรงรีดนม คือ ช่วงเช้าและเย็น

- การจัดการให้อาหารโคเนื้อ ปฏิบัติคล้าย ๆ กับการให้อาหารโคนม แต่อาหารหลักของโคเนื้อก็คือ อาหารหยาบ เช่น หญ้า ถั่ว ฟางข้าว ฯลฯ ซึ่งหากได้รับอาหารหยาบที่มีคุณภาพสูงแล้วอาจจะไม่ต้องเสริมอาหารชั้นเลยก็ได้ การเลี้ยงโคเนื้อแบบชาวบ้านจะไม่เสริมอาหารชั้นแต่ให้กินอาหารหยาบพวกหญ้าอย่างเดียว แต่หากเลี้ยงเพื่อขุนจำเป็นต้องเสริมอาหารชั้นซึ่งมีสูตรแตกต่างกันออกไป การเสริมอาหารชั้นให้โคเนื้อ 0.3 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว แต่ถ้าอาหารหยาบที่ให้มีคุณภาพต่ำควรเสริมอาหารชั้นเป็น 0.6 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว และควรให้อาหารชั้นที่มีโปรตีน 14 – 16 เปอร์เซ็นต์

พัชรา วีระกะลัส (2544) กล่าวว่า กระบวนการเมแทบอลิซึมประกอบด้วย ปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ที่มีเอนไซม์เป็นตัวเร่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสสาร และพลังงานที่เซลล์ได้รับจากสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นสสาร และพลังงานในรูปที่เซลล์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของเซลล์ได้ซึ่งทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถเจริญเติบโต และดำรงชีวิตต่อไปได้ดังรูปที่ 2.10 เมแทบอลิซึมในร่างกายของสิ่งมีชีวิตประกอบด้วย 2 กระบวนการย่อยคือ



รูปที่ 2.10 เมแทบอลิซึมในสิ่งมีชีวิต (จาก พลังงานและเมแทบอลิซึม โดย พัชรา วีระกะลัส, 2544, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

- Catabolism คือ การสลายสารอาหารเพื่อให้ได้ ATP สารนำอิเล็กตรอน (NAD<sup>+</sup>, NADP<sup>+</sup> และ FAD) และสารตั้งต้นสำหรับการสังเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต
- Anabolism เป็นการใช้ ATP สารนำอิเล็กตรอน รวมทั้งสารตั้งต้นที่ได้จากกระบวนการ catabolism ในการสังเคราะห์องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1994) ได้กล่าวถึงวิธีการคำนวณปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจกว่า

ปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจก

$$= \text{แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงาน} + \text{แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากพื้นที่ป่าที่สูญเสีย} + \text{แก๊สมีเทนจากการปลูกข้าว} + \text{แก๊สมีเทนจากปศุสัตว์} \quad (2.6)$$

ปริมาณการปล่อย CO<sub>2</sub> จากผืนป่าที่สูญเสียไป

$$= \text{พื้นที่ป่าที่ถูกทำลาย (พื้นที่ป่าในปีที่ t-1-พื้นที่ป่าในปีที่ t)} \times 39.36 \text{ ตันคาร์บอน/ไร่} \quad (2.7)$$

และแปลงหน่วยตันคาร์บอนเป็นหน่วยตันเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์โดยคูณด้วย 3.6667

ปริมาณการปล่อย CH<sub>4</sub> จากปลูกข้าว (ตันเทียบเท่า CO<sub>2</sub>)

$$= \text{อัตราการปล่อย CH}_4 \text{ ข้าวไร่และนาปรัง} \times \text{พื้นที่ปลูกข้าวไร่และนาปรัง} \times \text{จำนวนวันในการเก็บเกี่ยว} \quad (2.8)$$

และแปลงหน่วยตันมีเทนให้เป็นหน่วยตันเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์โดยคูณด้วย 21

ปริมาณการปล่อย CH<sub>4</sub> จากปศุสัตว์ (ตันเทียบเท่า CO<sub>2</sub>)

$$= \text{อัตราการปล่อย CH}_4 \text{ ของสัตว์แต่ละประเภท} \times \text{จำนวนปศุสัตว์ (โคนม โคเนื้อ กระบือ หมู และไก่)} \quad (2.9)$$

และแปลงหน่วยตันมีเทนให้เป็นหน่วยตันเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์โดยคูณด้วย 21

Ministry of Science, Technology and Environment (MoSTE) (2000) ได้รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจกที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2537 ในรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 ปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจกที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2537

แก๊ส	ปริมาณการปล่อยแก๊ส (พันตัน)	GWP* (เท่า)	เทียบเท่า CO <sub>2</sub> (พันตัน)	ร้อยละ
คาร์บอนไดออกไซด์	202,458.05	1	202,458	70.69
มีเทน	3,171.35	21	66,598	23.25
ไนตรัสออกไซด์	55.86	310	17,317	6.06
รวม			286,373	100.00

หมายเหตุ : \* GWP = Global Warming Potential (จาก Thailand's Initial National Communication under the United Nations Framework Convention on Climate Change. โดย MoSTE, 2000, Bangkok: MoSTE.)

## 2.2 การวิเคราะห์สมดุลคาร์บอนจากปริมาณปศุสัตว์

การวิเคราะห์สมดุลคาร์บอนจะอาศัยการคำนวณการผลิต (production) และการบริโภค (consumption) ของปริมาณปศุสัตว์แต่ละชนิด ซึ่งการผลิต หมายถึง ปริมาณสัตว์ที่จังหวัดสามารถผลิตได้ทั้งหมดรวมทั้งสัตว์ที่มีการเคลื่อนย้ายเข้าจริง และหักออกด้วยสัตว์ที่เคลื่อนย้ายออกจริง ส่วนปริมาณการบริโภค หมายถึง จำนวนซากสัตว์ที่จังหวัดสามารถผลิตได้ รวมถึงซากสัตว์ที่มีการเคลื่อนย้ายเข้าจริงและเคลื่อนย้ายออกจริงในรอบ 1 ปีปฏิทิน ซึ่งการคำนวณอัตราการผลิตและอัตราการบริโภคดีังกล่าวสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2.4

ตารางที่ 2.4 การคำนวณการผลิต (production) และการบริโภค (consumption) ของปศุสัตว์แต่ละชนิดเป็นรายอำเภอ และกิ่งอำเภอ

ชนิดสัตว์	ข้อมูลและวิธีคำนวณ การผลิต (production)	ข้อมูลและวิธีคำนวณ การบริโภค (consumption)
1. โคนม (น้ำนมดิบ)	<p>ข้อมูล : 1. น้ำนมที่ส่งให้ทุกศูนย์รวมนม</p> <p>สูตรการคำนวณ :</p> <p>อัตราการผลิต = ผลรวมน้ำนมที่ส่งให้ทุกศูนย์รวมนมภายในจังหวัดต่อปี</p>	<p>ข้อมูล : 1. ปริมาณความต้องการใช้น้ำนมดิบ</p> <p>สูตรการคำนวณ :</p> <p>ปริมาณความต้องการใช้น้ำนมดิบ = (ปริมาณน้ำนมที่ผลิตได้ทั้งหมด - ปริมาณน้ำนมที่จำหน่ายออกนอกจังหวัด)</p>
2. โคนเนื้อ	<p>ข้อมูล : 1. จำนวนโคพันธุ์เนื้อเพศเมียที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์</p> <p>2. อัตราการให้ลูก 55% ต่อปี</p> <p>3. จำนวนการเคลื่อนย้ายโคออกและเข้า</p> <p>4. จำนวนแม่โคนมปลดระวาง</p> <p>5. จำนวนโคนมเพศผู้</p> <p>สูตรการคำนวณ :</p> <p>อัตราการผลิต = จำนวนโคทั้งหมดที่มีอยู่ในแต่ละอำเภอ และกิ่งอำเภอ + (จำนวนโคเนื้อเพศเมียทั้งหมดที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ในพื้นที่ x อัตราการให้ลูกต่อปี) + จำนวนโคเนื้อที่เคลื่อนย้ายเข้า - จำนวนโคเนื้อที่เคลื่อนย้ายออก</p>	<p>ข้อมูล : 1. จำนวนโคนเนื้อ, โคนมที่เข้าโรงฆ่า</p> <p>2. ปริมาณซากโคนเนื้อ, โคนมที่นำเข้า</p> <p>3. ปริมาณซากโคนเนื้อ, โคนมที่ส่งออก</p> <p>4.% ซาก = 55</p> <p>5. น้ำหนักเฉลี่ย 350 กก.ต่อตัว</p> <p>สูตรการคำนวณ :</p> <p>ปริมาณการบริโภค = (จำนวนโคที่คาดว่าจะฆ่าจริง x น้ำหนักเฉลี่ยโคต่อตัว x % ซาก) + ปริมาณซากโคที่นำเข้า - ปริมาณซากโคที่ส่งออก</p> <p>*โค หมายถึง โคนเนื้อทุกประเภท โคนมคัดทิ้ง โคนมเพศผู้</p>

หมายเหตุ : จาก “การคำนวณอัตราการผลิตและอัตราการบริโภคของปศุสัตว์”, โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จังหวัดนครราชสีมา, 2549 (เอกสารที่ไม่ได้พิมพ์เผยแพร่)

ตารางที่ 2.4 การคำนวณการผลิต ( production ) และการบริโภค ( consumption ) ของปศุสัตว์แต่ละชนิดเป็นรายอำเภอ และกิ่งอำเภอ (ต่อ)

ชนิดสัตว์	ข้อมูลและวิธีคำนวณ การผลิต ( production )	ข้อมูลและวิธีคำนวณ การบริโภค ( consumption )
3. กระบือ	<p>ข้อมูล : 1. จำนวนกระบือเพศเมียที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์</p> <p>2. อัตราการให้ลูก 45% ต่อปี</p> <p>3. จำนวนการเคลื่อนย้ายกระบือออกและเข้า</p> <p>อัตราการผลิตกระบือ = จำนวนกระบือทั้งหมดในแต่ละอำเภอ และกิ่งอำเภอ + (จำนวนกระบือเพศเมียที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ในพื้นที่ x อัตราการให้ลูกต่อปี) + จำนวนกระบือที่เคลื่อนย้ายเข้า - จำนวนกระบือที่เคลื่อนย้ายออก</p>	<p>ข้อมูล : 1. จำนวนกระบือที่เข้าโรงฆ่า</p> <p>2. ปริมาณซากกระบือที่นำเข้าและส่งออก</p> <p>3. % ซาก = 45</p> <p>4. น้ำหนักเฉลี่ย 450 .กก.ต่อตัว</p> <p>ปริมาณการบริโภค = (จำนวนกระบือที่คาดว่าจะฆ่าจริง x น้ำหนักเฉลี่ยกระบือต่อตัว x % ซาก) + ปริมาณซากกระบือที่นำเข้า - ปริมาณซากกระบือที่ส่งออก</p>
4. สุกร	<p>ข้อมูล : 1. จำนวนสุกรเพศเมียที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์</p> <p>2. จำนวนครอกต่อแม่ต่อปี (2 ครอกต่อแม่)</p> <p>3. ค่าเฉลี่ยลูกหมูต่อครอก (10 ตัว)</p> <p>อัตราการผลิต = จำนวนสุกรทั้งหมดในแต่ละอำเภอ และกิ่งอำเภอ + [(จำนวนสุกรแม่พันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่ x จำนวนครอกต่อปี x ค่าเฉลี่ยลูกสุกรต่อครอก x (1 - อัตราการตาย))] + จำนวนสุกรเล็กที่นำเข้า - จำนวนสุกรเล็กที่ส่งออก</p> <p>*สุกรเล็ก หมายถึง สุกรที่มีอายุตั้งแต่ 4 - 12 สัปดาห์</p>	<p>ข้อมูล : 1. จำนวนสุกรที่เข้าโรงฆ่า</p> <p>2. ปริมาณซากสุกรที่นำเข้า - ออก (% ซาก = 75)</p> <p>3. น้ำหนักเฉลี่ย 100 กก.ต่อตัว</p> <p>ปริมาณการบริโภค = (จำนวนสุกรที่คาดว่าจะฆ่าจริง x น้ำหนักเฉลี่ยต่อตัว x % ซาก) + ปริมาณน้ำหนักซากสุกรที่นำเข้า - ปริมาณน้ำหนักซากสุกรที่ส่งออก</p> <p>* ซากสุกร คือส่วนร่างกายทั้งหมดของสุกรหลังเอาเลือด ขน หัว เครื่องใน มันเปลว และเส้นออกแล้ว</p>

หมายเหตุ : จาก “การคำนวณอัตราการผลิตและอัตราการบริโภคของปศุสัตว์”, โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จังหวัดนครราชสีมา, 2549 (เอกสารที่ไม่ได้พิมพ์เผยแพร่)

ตารางที่ 2.4 การคำนวณการผลิต ( production ) และการบริโภค ( consumption ) ของปลู๊ตั่วแต่ละชนิดเป็นรายอำเภอ และกิ่งอำเภอ (ต่อ)

ชนิดปลู๊ตั่ว	ข้อมูลและวิธีคำนวณ การผลิต ( production )	ข้อมูลและวิธีคำนวณ การบริโภค ( consumption )
5. ปลู๊ตั่วเนื้อ	<p>ข้อมูล : 1. จำนวนปลู๊ตั่วเนื้อที่เลี้ยงในพื้นที่</p> <p>2. จำนวนการเลี้ยง 5.5 รุ่นต่อปี</p> <p>3. อัตราการตาย (3 เปอร์เซ็นต์)</p> <p>สูตรการคำนวณ :</p> <p>อัตราการผลิต = จำนวนปลู๊ตั่วเนื้อที่ได้จากการสำรวจในพื้นที่ x จำนวนรุ่นต่อปี x (1 - อัตราการตาย)</p>	<p>ข้อมูล : 1. จำนวนปลู๊ตั่วเนื้อที่ผลิตได้ในพื้นที่</p> <p>2. ปริมาณซากปลู๊ตั่วเนื้อนำเข้าและส่งออก</p> <p>3. % ซาก = 63</p> <p>4. น้ำหนักเฉลี่ย 2.2 กก.ต่อตัว</p> <p>สูตรการคำนวณ :</p> <p>ปริมาณการบริโภค = (จำนวนปลู๊ตั่วเนื้อที่ส่งเข้าโรงฆ่าภายในจังหวัด x น้ำหนักเฉลี่ยต่อตัว x % ซาก) + ซากปลู๊ตั่วเนื้อที่นำเข้า - ซากปลู๊ตั่วเนื้อที่ส่งออก</p>
6. ปลู๊ตั่วไข่	<p>ข้อมูล : 1. จำนวนแม่ปลู๊ตั่วไข่ในกรงในพื้นที่ (อายุมากกว่า 22 สัปดาห์ขึ้นไป) = จำนวนแม่ปลู๊ตั่วไข่ในกรงเดิม + แม่ปลู๊ตั่วไข่ที่นำเข้า - แม่ปลู๊ตั่วไข่ที่ตาย - แม่ปลู๊ตั่วไข่ที่ตาย</p> <p>2. จำนวนไข่เฉลี่ย ฟองต่อปี (275 ฟองต่อตัวต่อปี)</p> <p>3. อัตราการตาย (3 เปอร์เซ็นต์)</p> <p>สูตรการคำนวณ :</p> <p>อัตราการผลิต = จำนวนแม่ปลู๊ตั่วไข่ที่สำรวจได้ x จำนวนไข่เฉลี่ยต่อตัวต่อปี x (1 - อัตราการตาย)</p>	<p>ข้อมูล : 1. จำนวนไข่ปลู๊ตั่วที่ผลิตได้</p> <p>2. จำนวนไข่ปลู๊ตั่วที่มีการนำเข้าและส่งออกในพื้นที่</p> <p>สูตรการคำนวณ :</p> <p>ปริมาณการบริโภค = จำนวนไข่ปลู๊ตั่วที่ผลิตได้ + จำนวนไข่ปลู๊ตั่วที่นำเข้า - จำนวนไข่ปลู๊ตั่วที่ส่งออก</p>

หมายเหตุ : จากการศึกษาอัตราการผลิตและอัตราการบริโภคของปลู๊ตั่ว, โดย สำนักงานปลู๊ตั่วจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา, 2549 (เอกสารที่ไม่ได้พิมพ์เผยแพร่)

## 2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการต่าง ๆ

### 2.3.1 หลักการปลดปล่อยหรือถ่ายเทมวลของคาร์บอน (carbon massflow concept)

กิจกรรมของมนุษย์สำหรับการผลิตอาหารอย่างหนึ่งที่สำคัญ คือ กิจกรรมจากการปศุสัตว์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการถ่ายเทคาร์บอนจากพืชไปสู่สัตว์ ตามระบบห่วงโซ่อาหาร เพื่อที่สัตว์จะนำคาร์บอนจากพืชไปสะสมและสร้างเป็นเนื้อเยื่อ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ ดังนั้น วิธีการคำนวณเพื่อที่จะทราบข้อมูลการถ่ายเทคาร์บอนสามารถทำได้โดยอาศัยสมการดังนี้

$$\text{อัตราการปลดปล่อยคาร์บอน} = \text{จำนวนสัตว์} \times \text{ปัจจัยการปลดปล่อยคาร์บอนต่อหน่วย} \quad (2.10)$$


โดยที่ UNECE (2004) ได้อธิบายถึง การปลดปล่อยหรือการถ่ายเทของมวลคาร์บอนจากการทำฟาร์มปศุสัตว์ไว้ โดยอาศัยหลักการของอนุรักษมวล (mass conservation) ซึ่งจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษานี้โดยวิธีการคำนวณการถ่ายเทหรือการปลดปล่อยมวลทั้งหมดของคาร์บอนจากการทำฟาร์มปศุสัตว์ ในรูปของน้ำหนักคาร์บอนต่อตัวของสัตว์ ที่น้ำหนักถูกฆ่าเฉลี่ย เช่น กิโลกรัมคาร์บอนต่อตัว หรือน้ำหนักคาร์บอนต่อพื้นที่ ในแต่ละแหล่งที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ที่ระยะเวลาในการเลี้ยงเฉลี่ย เช่น กิโลกรัมคาร์บอนต่อตารางเมตร เพื่อความเข้าใจได้ง่ายขึ้นจะสามารถแสดงการถ่ายเทคาร์บอนในแต่ละกิจกรรมได้ดังรูปที่ 2.11 และสามารถเขียนเป็นสมการการถ่ายเทคาร์บอนได้ดังนี้

$$E_{\text{total}} = E_{\text{metabolic}} + E_{\text{grazing}} + E_{\text{housing}} + E_{\text{storage}} + E_{\text{spreading}} \quad (2.11)$$

โดยที่	$E_{\text{total}}$	= คาร์บอนจากการถ่ายเททั้งหมด (กิโลกรัมคาร์บอนต่อตัว)
	$E_{\text{metabolic}}$	= คาร์บอนที่สะสมในตัวสัตว์ ในรูปของเนื้อหรือผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ (กิโลกรัมคาร์บอนต่อตัว)
	$E_{\text{grazing}} + E_{\text{housing}}$	= คาร์บอนจากพืชอาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ จากทุ่งหญ้า และจากการให้อาหารเสริมในโรงเรือน (กิโลกรัมคาร์บอนต่อตัว)
	$E_{\text{storage}}$	= คาร์บอนของพลังงานที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ (กิโลกรัมคาร์บอนต่อตัว)
	$E_{\text{spreading}}$	= คาร์บอนในรูปของสิ่งขับถ่ายจากสัตว์ (กิโลกรัมคาร์บอนต่อตัว)



เมื่อนำมาสร้างความสัมพันธ์กับจำนวนของสัตว์แต่ละชนิด ( $n_{\text{animal}}$ ) จำนวนคาร์บอนที่ถ่ายเทมาอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ทั้งหมดของสัตว์แต่ละชนิดในแต่ละอำเภอ และกิ่งอำเภอหรือของจังหวัดนครราชสีมา สามารถคำนวณได้โดยอาศัย ผลรวมของปัจจัยการถ่ายเทคาร์บอนในแต่ละส่วนกิจกรรมของสัตว์แต่ละชนิด ดังนี้



รูปที่ 2.11 ระบบการถ่ายเทคาร์บอนในแต่ละกิจกรรมของการทำฟาร์มปศุสัตว์

(จาก “Task Force on Emission Inventories and Projections”,

โดย UNECE, 2004, [On-line]. Available:

<http://tfeip-secretariat.org/unece.htm>)

$$E_{\text{total}} = n_{\text{animal}} \times (EF_{\text{metabolic}} + EF_{\text{grazing}} + EF_{\text{housing}} + EF_{\text{storage}} + EF_{\text{spreading}}) \quad (2.12)$$

เมื่อ  $n$  = จำนวนของสัตว์แต่ละชนิด ในแต่ละพื้นที่

$EF$  = ปัจจัยของการถ่ายเทคาร์บอนมาอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์แต่ละชนิด (กิโลกรัมคาร์บอน ต่อตัว ต่อพื้นที่) โดยคิดที่น้ำหนักเฉลี่ยต่อตัวของสัตว์ที่ถูกฆ่าเป็นอาหารประเภทเนื้อ หรือระยะเวลาเฉลี่ยในการเลี้ยงสัตว์จนฆ่าเป็นอาหาร

Dämmgen and Webb (2006) รายงานถึงสนธิสัญญาที่นานาประเทศจะต้องทำการลดการกระจายสารมลพิษทางอากาศ รวมถึงการจัดทำรายงานข้อมูลมลพิษทางอากาศให้นานาประเทศรับรู้ โดยหนึ่งในการพิจารณาที่จะต้องลดสารมลพิษทางอากาศหรือรายงานสภาพสารมลพิษคือ มลพิษ

จากแหล่งกำเนิดทางเกษตรกรรม โดยเฉพาะจากการทำฟาร์มปศุสัตว์ ซึ่งวิธีคิดเพื่อหาการกระจายของสารมลพิษในปัจจุบันได้รับการปรับปรุงล่าสุด โดยอาศัยการคำนวณอัตราการกระจายสารมลพิษจากปัจจัยการกระจายในแต่ละส่วนของแหล่งกำเนิดมลพิษต่าง ๆ เช่นจากโรงเรือนเลี้ยงสัตว์จากการจัดการมูลสัตว์เป็นต้น โดยใช้หลักการถ่ายเทมวล (mass flow concept) สำหรับสารทั้งในโตรเจนและคาร์บอนจากแหล่งของการกระจายมลพิษทางอากาศต่างกันก็จะทำให้ค่าปัจจัยการกระจาย (emission factor) ต่างกันด้วย

IPCC and Schimel (1995) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบหลักของวัฏจักร CO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ โดยค่าในสมการจะเป็นค่าเฉลี่ยของคาร์บอนต่อปี (Pg C ต่อปี [1Pg = 10<sup>15</sup>g]) ในปี ค.ศ. 1980 - 1989 ดังสมการ

$$E_{ff} + E_{trop} = \Delta_{atm} + \Delta_{ocean} + (\Delta_{trop} + \Delta_{other}) \quad (2.13)$$

$$5.5 \pm 0.5 \quad 1.6 \pm 1.0 \quad 3.3 \pm 0.2 \quad 2.0 \pm 0.8 \quad 1.8 \pm 1.6$$

โดยที่  $E_{ff}$  = อัตราของการกระจายแก๊ส CO<sub>2</sub> จากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง และการผลิตซีเมนต์

$E_{trop}$  = อัตราของการกระจายแก๊ส CO<sub>2</sub> จากการทำลายป่า

$\Delta_{atm}$  = การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของแก๊ส CO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

$\Delta_{ocean}$  = การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของแก๊ส CO<sub>2</sub> ในมหาสมุทร

$\Delta_{trop} + \Delta_{other}$  = การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของแก๊ส CO<sub>2</sub> ในระบบนิเวศป่าเขตร้อน และระบบนิเวศบนบกอื่น ๆ

ซึ่งค่าของ  $E_{ff}$  และ  $\Delta_{atm}$  ในสมการ ได้ถูกประมาณค่าไว้ว่าเป็นเหตุเป็นผลและมีความถูกต้องแล้ว แต่ค่าของ C ในเทอมอื่น ๆ ของสมการ ยังขาดความแน่นอนและขาดความถูกต้อง โดยเฉพาะจากแหล่งเก็บสะสมคาร์บอนในระบบนิเวศบนบก ( $\Delta_{other}$ ) ซึ่งยังคงต้องการการศึกษาวิจัยถึงปริมาณ C ในระบบนิเวศบนบกนี้โดยละเอียด

### 2.3.2 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการทางสถิติ

กัลยา วานิชย์บัญชา (2545); Devore (1995); Mc Bean and Rovers (1998) ได้กล่าวถึงการคำนวณหาขนาดตัวอย่างจากการประมาณค่าเฉลี่ยประชากรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ค่าจริงกับค่าประมาณใกล้เคียงกันมากที่สุด ดังนั้นการหาขนาดตัวอย่าง จึงต้องมีการกำหนดความคลาดเคลื่อนสูงสุดในการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยค่าสถิติ ซึ่งขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือ

ระดับความเชื่อมั่น หรือระดับนัยสำคัญ และความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับให้เกิดในการประมาณค่าเฉลี่ยประชากร ( $\mu$ ) ด้วยค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง ( $\bar{X}$ )

ถ้าต้องการประมาณค่าเฉลี่ยประชากรโดยให้ความผิดพลาดไม่เกินค่า  $e$  แล้วค่าประมาณแบบช่วงของค่าเฉลี่ยประชากรจะเท่ากับ  $\bar{X} \pm e$  ดังนั้น

$$n = \left[ \frac{Z_{1-\alpha/2} \sigma}{e} \right]^2 \quad (2.14)$$

ศรเทพ ชัมวาสร (2545) กล่าวว่าความผิดพลาดในการประมาณค่าประชากรด้วยตัวอย่าง เนื่องจาก  $e = |\bar{X} - \mu|$  ซึ่งในงานวิจัยทางสัตวโดยส่วนใหญ่กำหนดให้เกิดความผิดพลาดสูงสุดได้ไม่เกิน 5% หรือ  $e = (0.05) \times (\bar{X})$  ดังนั้น ศรเทพ ชัมวาสร (2545) และ Marks (1982) จึงได้อธิบายวิธีการหาขนาดตัวอย่างสำหรับประมาณค่าเฉลี่ยประชากรที่เกี่ยวกับงานวิจัยทางสัตวดังนี้

$$n = \frac{n_0}{\left(1 + \frac{n_0}{N}\right)} \quad ; \text{เมื่อ} \quad n_0 = \left[ \frac{Z_{1-\alpha/2} \sigma}{e} \right]^2 \quad (2.15)$$

โดยที่	$n$	=	ขนาดตัวอย่างสุ่มที่ต้องการ
	$N$	=	ขนาดประชากร
	$Z_{1-\alpha/2}$	=	ค่าปกติมาตรฐานที่ได้จากตารางสถิติขึ้นอยู่กับระดับความเชื่อมั่น โดยงานวิจัยทางสัตวส่วนใหญ่จะพิจารณาที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.96
	$\sigma^2$	=	ค่าความแปรปรวนของประชากร
	$e$	=	ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์สูงสุดที่ยอมรับให้เกิดขึ้นได้จากการใช้ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง ( $\bar{X}$ ) ประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร ( $\mu$ ) ซึ่งงานวิจัยทางสัตวคิดความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์สูงสุดที่ 5%

นอกจากนี้ยังมีวิธีการกำหนดขนาดตัวอย่างของ Yamane (1973) ซึ่งเป็นวิธีการหาขนาดตัวอย่างที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการศึกษาวิจัย เพื่อหาจำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดซึ่งส่วนมากได้กำหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับให้เกิดระหว่างค่าจริงและค่าประมาณอยู่ที่ร้อยละ 0.05 โดยสูตรการกำหนดขนาดตัวอย่างของ Yamane (1973) คือ

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad (2.16)$$

เมื่อ  $n$  = ขนาดตัวอย่างที่ต้องการ  
 $N$  = ขนาดประชากรทั้งหมด  
 $e$  = ระดับความคลาดเคลื่อน (0.05)

และเพื่อความสะดวกได้มีทำตารางสำเร็จรูปของ Yamane (1973) โดยอาศัยการคำนวณจากสูตรดังกล่าวข้างแสดงในตารางที่ 2.5

ตารางที่ 2.5 การกำหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane

ขนาดประชากร	ขนาดตัวอย่างความคลาดเคลื่อน (e) = ± 5%
500	222
1,000	286
2,000	333
3,000	353
5,000	370
8,000	381
10,000	385
15,000	390
20,000	392
25,000	394
50,000	397
100,000	398

หมายเหตุ : Mathematics for Economists : An Elementary Survey, Yamane, 1973, New Delhi : Prentice-Hall.

ประธาน เกิดกล้า (2549) ได้ทำผลงานเพื่อขอรับการประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยในผลงานดังกล่าวได้ใช้วิธีการศึกษาจำนวนตัวอย่างประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เกษตรกรอาสาพัฒนาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน (อพปม.) จังหวัดน่าน ที่ยังคงปฏิบัติงานในปี 2547 จำนวน 858 คน โดยขนาดตัวอย่างคำนวณตามสูตรของ Yamane (Yamane, 1973) ซึ่งมีค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง (e) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง อพปม. แบบง่าย (Simple random sampling) ในแต่ละอำเภอ ได้ตัวอย่างทั้งสิ้นรวม 276 ตัวอย่าง

ปรารธนา ยศสุข (2551) ได้กล่าวไว้ว่า การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าทุกหน่วยประชากรได้มีโอกาสรับเลือกเป็นตัวแทนของประชากร งานวิจัยนิยมกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของ ทาโร ยามานะ (Yamane, 1973) หรือ (Krejcie and Morgan, 1970) การที่จะให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้มาน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความสำคัญของปัญหา โดยทั่วไปแล้วมักจะยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ 5%

การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ Robert V. Krejcie แห่งมหาวิทยาลัย Minisota และ Earyle W. Morgan แห่งมหาวิทยาลัย Texas ได้สร้างตารางขนาดประชากร และขนาดกลุ่มตัวอย่างขึ้นมา เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถเลือกขนาดของกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยไปใช้ได้โดยในตารางที่ 2.6 แสดงตัวอย่างขนาดของกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยจากจำนวนประชากร (Krejcie and Morgan, 1970)

ตารางที่ 2.6 ตัวอย่างจำนวนประชากรและจำนวนกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan

จำนวนประชากร	จำนวนตัวอย่าง	จำนวนประชากร	จำนวนตัวอย่าง
100	80	200	132
300	169	400	196
500	217	750	254
1000	278	1500	306
2000	322	3000	341
4000	351	5000	357
7000	364	9000	368
15000	375	20000	377
40000	380	50000	381
75000	382	100000	384

หมายเหตุ : Educational and Psychological Measurement (608-609), Krejcie and Morgan, 1970.

### 2.3.3 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการต่าง ๆ

สำหรับตัดสินใจปัจจัยของการทำปศุสัตว์ที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พบว่า ไพบูลย์ เข้มเฟื่อน (2542); Sullivan et al. (2003) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจโดยอาศัยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีหรือกฎต่าง ๆ ซึ่งไม่มีหลักตายตัวหรือแน่นอน แต่จำเป็นที่จะต้องหาวิธีวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ โดยจะกล่าวถึงวิธีการต่าง ๆ ดังนี้

2.3.3.1 การจัดผลลัพธ์ในรูปของเมทริกซ์ (payoff matrix) หลักการจัดผลลัพธ์ในรูปของเมทริกซ์ (Payoff Matrix) คือ การนำเอาทางเลือกต่าง ๆ และสถานการณ์ต่าง ๆ มาเรียงกันในลักษณะตารางเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ ตัวเลขที่อยู่ภายในเมทริกซ์เป็นค่าของผลลัพธ์ โดยให้ทางเลือกเป็นแนวนอน ซึ่งในที่นี้คือ ชนิดของการทำปศุสัตว์ และสถานการณ์เป็นแนวตั้ง ซึ่งในที่นี้คือ ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนจากตัวสัตว์ และจากการใช้พลังงาน ดังตัวอย่างในตารางที่ 2.7 (ไพบูลย์ เข้มเฟื่อน, 2542)

ตารางที่ 2.7 ตัวอย่างการจัดผลลัพธ์ในรูปของเมทริกซ์

ทางเลือกของการทำปศุสัตว์	สถานการณ์การปลดปล่อยคาร์บอน (กก.C/น.สัตว์/วัน)	
	C-emitted จากตัวสัตว์	C-emission จากการใช้พลังงาน
โคนม		
โคเนื้อ		
กระบือ		
สุกร		
ไก่เนื้อ		
ไก่ไข่		

2.3.3.2 การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจโดยอาศัยการประยุกต์ใช้กฎของลาปลาซ (ไพบูลย์ เข้มเฟื่อน, 2542) ในบางครั้งไม่ทราบค่าความน่าจะเป็นของสถานการณ์ต่าง ๆ ทำให้ไม่สามารถตัดสินใจเลือกได้ การนำเอากฎของลาปลาซมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจเลือกทำการปศุสัตว์ ทำได้โดยการกำหนดค่าของโอกาสที่จะเกิดของแต่ละสถานการณ์เท่า ๆ กัน เมื่อให้  $n$  เท่ากับจำนวนสถานการณ์ต่าง ๆ ค่าของความน่าจะเป็นเท่ากับ  $1/n$  ซึ่งในที่นี้จำนวนสถานการณ์การปลดปล่อยคาร์บอน  $n = 2$  (การปลดปล่อยคาร์บอนจากตัวสัตว์ และจากการใช้พลังงาน) ทำให้โอกาสที่จะเกิด =  $1/2$  โดยให้ความสำคัญของแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ เท่ากันหมด ดังนั้นการประยุกต์ใช้กฎของลาปลาซเพื่อการตัดสินใจนี้ จะได้ผลลัพธ์เฉลี่ยของแต่ละทางเลือกจากการรวมค่าการปลดปล่อยคาร์บอนของสถานการณ์ต่าง ๆ แล้วคูณกับความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่จะเกิด โดยผลลัพธ์เฉลี่ย

ของทางเลือกใดมีค่าต่ำสุดแสดงว่า ควรเลือกทำการปศุสัตว์จากทางเลือกนั้นเพราะมีการปลดปล่อยคาร์บอนต่ำสุด ในขณะที่ผลลัพธ์เฉลี่ยจากทางเลือกใดมีค่าสูงสุดแสดงว่าทางเลือกของการทำปศุสัตว์นั้นถูกบ่งชี้ว่า ก่อให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมสูงสุด ดังตัวอย่างในตารางที่ 2.8 (ไพบูลย์ เข้มเฟื่อน, 2542)

ตารางที่ 2.8 ตัวอย่างการคำนวณผลลัพธ์เพื่อการตัดสินใจโดยอาศัยการประยุกต์ใช้กฎของลาปลาซ

ทางเลือกของการทำปศุสัตว์	(ค่าการปล่อยคาร์บอนจากตัวสัตว์ + จากการใช้พลังงาน)/n	สถานการณ์การปลดปล่อยคาร์บอน (กก.C/น.สัตว์/วัน)
โคนม		
โคเนื้อ		
กระบือ		
สุกร		
ไก่เนื้อ		
ไก่ไข่		

2.3.3.3 กฎสูงสุดเพื่อการตัดสินใจโดยอาศัยการประยุกต์ใช้กระบวนการของเซอร์วิกซ์ การประยุกต์กระบวนการของเซอร์วิกซ์ (The Hurwicz procedure) เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกทำการปศุสัตว์ ทำโดยการเลือกสถานการณ์ที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนสูงสุดของทุก ๆ ทางเลือก จากนั้นจะนำมาเลือกทางเลือกที่พบว่าให้ผลลัพธ์สูงสุดอีกครั้งหนึ่ง การใช้กระบวนการของเซอร์วิกซ์ สามารถแสดงได้ด้วยรูปแบบทางคณิตศาสตร์ดังนี้ (Sullivan et al., 2003)

$$\max_i \left[ \max_j P_{ij} \right] \quad (2.17)$$

เมื่อ  $P_{ij}$  เป็นผลลัพธ์ทางเลือก  $i$  ของสถานการณ์  $j$  จากตารางที่ 2.7

ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากตารางที่ 2.7 ซึ่งผลลัพธ์ถูกจัดอยู่ในรูปของแมทริกซ์ เมื่อเลือกสถานการณ์ที่ให้ผลลัพธ์สูงสุดของทุกทางเลือก จะได้สถานะ  $X$  นำมาเขียนเป็นตารางดังแสดงในตารางที่ 2.9 ซึ่งจากตารางที่ 2.9 เลือกค่าสูงสุดจากทางเลือกต่าง ๆ โดยผลลัพธ์จากทางเลือกใดมีค่าสูงสุดแสดงว่าทางเลือกของการทำปศุสัตว์นั้นถูกบ่งชี้ว่า ก่อให้เกิดปัญหาทาง

สิ่งแวดล้อมสูงสุด ในขณะที่ผลลัพธ์ของทางเลือกใดมีค่าต่ำสุดแสดงว่า ควรเลือกทำการปศุสัตว์จากทางเลือกนั้นเพราะมีการปลดปล่อยคาร์บอนต่ำสุด (Sullivan et al., 2003)

ตารางที่ 2.9 ผลลัพธ์ที่สถานะ X

ทางเลือกของการทำปศุสัตว์	$\frac{\max P_{ij}}{i(x)}$
โคนม	
โคเนื้อ	
กระบือ	
สุกร	
ไก่เนื้อ	
ไก่ไข่	

2.3.3.4 การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจโดยอาศัยการประยุกต์กฎต่ำสุดจากค่าสูงสุดของความเสียหายของแต่ละทางเลือกในการทำปศุสัตว์ ถ้าผู้ตัดสินใจเลือกทางเลือกได้แล้วแต่ไม่ได้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดก็จะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า ค่าความเสียหาย (regret) ซึ่งเป็นค่าที่เกิดขึ้นระหว่างผลลัพธ์ที่ควรจะได้กับผลลัพธ์ที่ได้รับจากการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ด้อยกว่า กฎนี้ผู้ตัดสินใจต้องการที่จะหลีกเลี่ยงจากความเสียหายนั่นเอง โดยการเลือกค่าต่ำสุดจากค่าความเสียหายสูงสุด การประยุกต์ใช้คือเลือกผลลัพธ์ของทางเลือกที่มีการปล่อยคาร์บอนสูงสุดในแต่ละสถานการณ์ แล้วนำเอาผลลัพธ์ดังกล่าวตั้งลบด้วยค่าการปล่อยคาร์บอนทุกตัวของแต่ละทางเลือกในสถานการณ์เดียวกัน ค่าที่ได้เป็นค่าเสียหาย แล้วจัดให้อยู่ในรูปแมทริกซ์ แล้วเลือกค่าเสียหายสูงสุดของแต่ละทางเลือกจากแถวในแนวนอน ซึ่งจะได้ดังตารางที่ 2.10 จากนั้นนำมาเลือกหาค่าต่ำสุดของแต่ละทางเลือก จะทำให้การตัดสินใจถูกต้องมากขึ้นมีความเสียหายหรือผิดพลาดน้อย สามารถเขียนเป็นรูปแบบทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้ (ไพบูลย์ เข้มเฟื่อน, 2542)

$$\min_i \left[ \frac{\max R_{ij}}{j} \right] \quad (2.18)$$

เมื่อ  $R_{ij}$  คือ มูลค่าของความเสียหาย สำหรับทางเลือก  $i$  และ  $j$  ของสถานการณ์ต่าง ๆ



ตารางที่ 2.10 ค่าสูงสุดของความเสียหายในแต่ละทางเลือก

ทางเลือกของการทำปศุสัตว์	$\left[ \frac{\max R_{ij}}{j} \right]$
โคนม	
โคเนื้อ	
กระบือ	
สุกร	
ไก่เนื้อ	
ไก่ไข่	

ซึ่งจากตารางที่ 2.10 ค่าต่ำสุดจากทางเลือกต่าง ๆ ที่เลือกแสดงว่า ทางเลือกของการทำปศุสัตว์นั้นถูกบ่งชี้ว่า ก่อให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมสูงสุด ในขณะที่ผลลัพธ์ของทางเลือกใดมีค่าสูงสุดแสดงว่า ควรเลือกทำการปศุสัตว์จากทางเลือกนั้นเพราะมีการปลดปล่อยคาร์บอนต่ำสุด (ไฟฟูลล์ แอ้มเฟื่อน, 2542)


## 2.4 แนวทางในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนจากงานวิจัยในอดีต

Pfaff et al. (2000) ได้อธิบายไว้ว่า การป้องกันแหล่งสะสมคาร์บอนที่สำคัญได้แก่ ป่าในภูมิภาคเขตร้อนภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (clean development mechanism: CDM) จะสามารถลดการกระจายคาร์บอนได้โดยอาศัยความสัมพันธ์ของการใช้ที่ดิน (land use) กับปริมาณคาร์บอนพื้นฐาน การทำนายปริมาณคาร์บอนที่เกิดจากการผลิตเพื่อตอบสนองตลาด และการประเมินจุดเหมาะสมของตลาดที่ควรเป็นไปได้

การประมาณการสะสมของคาร์บอนภายใต้โครงการ CDM อาจจะนำไปสู่ การขายคาร์บอน (C-trading) ในอนาคต ซึ่งสามารถแสดงผลของการลดการกระจายคาร์บอนภายใต้โครงการ CDM ได้ดังรูปที่ 2.12 ซึ่ง CER<sub>t</sub> (certified emission reduction) คือการลดการกระจายคาร์บอน ซึ่งวิเคราะห์จากปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์และระบบนิเวศจากการใช้ที่ดิน

Garton and Birkenholz (1998) กล่าวว่า การใช้เทคนิคการบริหารจัดการปศุสัตว์อย่างเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค สามารถลดปริมาณการกระจายของแก๊สเรือนกระจกที่เกิดจากสัตว์เคี้ยวเอื้องได้ ในปัจจุบันเกษตรกรและหน่วยงานของรัฐยังไม่มีเทคนิคใหม่และแนวทางในการจัดการ หรือทำนายความสัมพันธ์ระหว่าง พืช และการปศุสัตว์ ทำให้ไม่สามารถจัดการผลิตทรัพยากรอาหารให้เพียงพอกับความต้องการของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มจำนวนประชากร ทำให้เกษตรกรของทุกภูมิภาคในโลกบุกรุกถากถางป่า เพื่อเปลี่ยนเป็นผืนแผ่นดินที่ใช้ใน

การเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะกิจกรรมปศุสัตว์จำพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องซึ่งก่อให้เกิดแก๊ส  $\text{CO}_2$  และ  $\text{CH}_4$  สูงสุดจากการหายใจ และการย่อยสลายอาหารไฟเบอร์ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง ซึ่งแก๊ส  $\text{CO}_2$  และ  $\text{CH}_4$  ส่วนใหญ่จะแพร่กระจายสู่อากาศทางปากและจมูกของสัตว์ ถึงแม้ว่าการแพร่กระจายของแก๊สเรือนกระจกจากกิจกรรมการปศุสัตว์จะไม่ได้ถูกกำจัดไปทั้งหมดแต่การจัดการที่ดีให้เหมาะสม หรือผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค นอกจากจะช่วยให้ผู้ผลิตมีกำไรมากขึ้นจากการผลิตแล้ว ยังสามารถช่วยลดการเกิดแก๊สเรือนกระจกได้จากการปศุสัตว์และช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกได้ด้วย



รูปที่ 2.12 การลดลงของการกระจายคาร์บอนจากโครงการ CDM (จาก “The Kyoto protocol and payments for tropical forest : An interdisciplinary method for estimating carbon-offset supply and increasing the feasibility of a carbon market under the CDM”, โดย Pfaff et al., 2000, *Ecological Economics*)

Leng (1991) ทำการศึกษาพบว่า การเกิด  $\text{CH}_4$  ต่อปีจากการปศุสัตว์ทั่วโลกมีสัดส่วนประมาณ 28% ของ  $\text{CH}_4$  ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ ถึงแม้ว่าวัว 1 ตัวจะสามารถทำให้เกิด  $\text{CH}_4$  เพียง 80 - 110 กิโลกรัมต่อปี ก็ตามแต่เมื่อรวมการปศุสัตว์ทั่วโลกที่มีประมาณ 1,200 ล้านตัว จึงทำให้การปศุสัตว์เป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของแหล่งกำเนิด  $\text{CH}_4$  การปลดปล่อยแก๊ส  $\text{CH}_4$  จากสัตว์ จะแสดงถึงการสูญเสียคาร์บอนที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์โดยไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะทำให้อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ในแต่ละมือกลายเป็นนมหรือเนื้อให้มากที่สุด โดยให้เกิดการสูญเสีย

พลังงานจากมี้อาหารของสัตว์ไปในรูปของ  $\text{CH}_4$  ให้น้อยที่สุด ดังนั้นการพัฒนาการจัดการปศุสัตว์ จากอาหาร สามารถช่วยลดความเข้มข้นของแก๊ส  $\text{CH}_4$  ในบรรยากาศได้โดยผ่านกลไกของคาร์บอน ในดิน บนผืนแผ่นดินหรือทุ่งหญ้าที่ใช้เลี้ยงสัตว์ ซึ่งการจัดการปศุสัตว์ที่ดีจะช่วยเพิ่มจำนวนของ สารอินทรีย์ในดินและลดการแพร่กระจายของแก๊สเรือนกระจกสู่บรรยากาศได้

Sommer, Peteren, and Sogaard (2000) กล่าวว่าถ้ามีการควบคุมจำนวนสัตว์ให้เหมาะสม กับความต้องการในการบริโภคของคน จะทำให้การเลี้ยงสัตว์ไม่มากเกินไปจนส่งผลให้มูล สัตว์มีปริมาณน้อยและจัดการง่ายขึ้นซึ่งสิ่งสำคัญในการลดการแพร่กระจายของแก๊ส  $\text{CH}_4$  เนื่องจา การสะสมของมูลสัตว์คือ

- การเก็บมูลสัตว์ เพื่อใช้งานในรูปของแข็งจะดีกว่าในรูปของเหลว
- การมีระบบการควบคุมการแพร่กระจายที่ดี
- การเติมอากาศที่ดี เพื่อให้ผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการย่อยสลายของจุลินทรีย์ อยู่ในรูป ของแก๊ส  $\text{CO}_2$  จะดีกว่าในรูปของแก๊ส  $\text{CH}_4$
- ลดระยะเวลาของการเก็บมูลสัตว์ โดยนำไปใช้ให้เร็วขึ้น
- ลดการใช้หญ้าหรือฟาง ในการปลูกสัตว์ จะทำให้ลดคาร์บอน ในมูลสัตว์ได้
- มูลสัตว์ที่เปียกให้เก็บใส่ภาชนะในที่เย็นเช่นใต้ดิน เพื่อให้การย่อยสลายคาร์บอนช้าลง
- การใช้ระบบบำบัดน้ำเสียระบบปิด จะสามารถช่วยลดการกระจายของแก๊ส  $\text{CH}_4$  ได้

Eghball, Power, Gilley, and Doran (1997) กล่าวว่า มีวิธีการในการบำบัดมูลสัตว์มากมาย แต่การหมักทำปุ๋ยคอก อาจเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะปุ๋ยคอกจะปลดปล่อยแก๊ส  $\text{CH}_4$  น้อยกว่าการเก็บ มูลสัตว์แบบอื่น ๆ เนื่องจากต้องมีการเติมอากาศในระหว่างการหมัก ปุ๋ยคอกจากมูลวัวนี้จะสูญเสีย คาร์บอนไปเป็นแก๊ส  $\text{CO}_2$  ประมาณ 46 - 62%

Kirchgesner, Windisch, and Miller (1995) ได้รายงานถึงชนิดของอาหารที่เหมาะสมที่ใช้ ในการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง เพื่อลดการเกิดแก๊ส  $\text{CH}_4$  จากการย่อยอาหารและจากการดำเนินชีวิตของ สัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่นการใช้อาหารประเภทแป้ง เพื่อช่วยทำให้เกิดกรดโพรไพโอนิก (propionic acid) เป็นต้น กระบวนการให้อาหารที่เหมาะสมส่วนใหญ่จะมีความเป็นไปได้และมีประสิทธิภาพจากระบบอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ โดยที่สัตว์เคี้ยวเอื้องจะสูญเสียแก๊ส  $\text{CH}_4$  ประมาณ 1.5 กรัมต่อ (กิโลกรัมน้ำหนักสัตว์ที่เพิ่มขึ้น)<sup>0.75</sup> ต่อวัน ในการดำเนินชีวิต โดยจากตารางที่ 2.11 สามารถคำนวณ ได้ว่า 85% ของอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ สัตว์เคี้ยวเอื้องจะนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต ดังนั้น 85% ของ แก๊ส  $\text{CH}_4$  ที่ถูกผลิตมาจากสัตว์เคี้ยวเอื้องจะเกิดเนื่องจากการใช้ในการรักษาไว้ซึ่งจำนวนของสัตว์ เคี้ยวเอื้อง ซึ่งถูกประมาณไว้ว่าแก๊ส  $\text{CH}_4$  ที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อปี จะมีประมาณ  $80 \times 10^{12}$  กรัม นั้น หมายความว่าแก๊ส  $\text{CH}_4$   $68 \times 10^{12}$  กรัม สูญเสียไปในการดำเนินชีวิตของสัตว์เคี้ยวเอื้องและที่เหลือ

อีก  $12 \times 10^{12}$  กรัม จะใช้ไปในการผลิต นม และเนื้อ ซึ่งการผลิตอาหารประเภท นม และเนื้อจากสัตว์เคี้ยวเอื้องนี้ มีความสำคัญที่ต้องศึกษาการลดลงของแก๊ส  $\text{CH}_4$  จากระบบ ในรูปของอาหาร เพราะทั่วโลกมีปริมาณการเลี้ยงสัตว์ประเภทนี้สูงมาก และต้องคำนึงถึงปริมาณอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์เหล่านั้นเป็นหลักด้วย

Hartung and Phillips (1994) ได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์เริ่มให้ความสนใจถึงแก๊สที่ถูกปล่อยออกมาจากการผลิตสัตว์ ซึ่งมีความรุนแรง และเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศ งานวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงชนิดและปริมาณของแก๊สที่ถูกปล่อยออกมาจากโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และจากที่เก็บกักมูลสัตว์ เพื่อหาทางป้องกันหรือลดการเกิดแก๊ส ซึ่งจากร่องรอยแก๊สที่เกิดขึ้นในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ทั้ง 136 ชนิด แอมโมเนีย และ  $\text{CH}_4$  เป็นแก๊สที่มีความเสี่ยงที่จะกระทบกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดยเกิดจากมูลสัตว์สด ๆ อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ และจากตัวของสัตว์เอง การกระจายของแอมโมเนียจากการผลิตและเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดในเยอรมันตะวันออกประมาณ 300,000 – 700,000 ตันต่อเอเคอร์ ซึ่งเป็นค่าที่เกินกว่าที่ธรรมชาติจะรับได้ มีผลกระทบโดยตรงกับต้นไม้รอบ ๆ โรงเรือน และส่งผลถึงคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ อันเนื่องจากสาหร่ายในน้ำที่เบ่งบานเกินไป ปกคลุมผิวน้ำจนสิ่งมีชีวิตในน้ำดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้ ในที่สุดก็ตาย และทำให้น้ำเน่าเสีย อีกทั้งดินมีสภาพเป็นกรด ปัจจัยที่ใช้ในการจัดการเพื่อลดการกระจายของแอมโมเนียในโรงเรือนคือ การควบคุมปริมาณโปรตีนในอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ ค่า pH ของอาหารส่วนเพิ่มที่ใช้เลี้ยงสัตว์ อุณหภูมิอากาศ อัตราการระบายอากาศ สิ่งที่มีความสำคัญต่อปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่สุดจากการเลี้ยงสัตว์คือ คาร์บอนที่อยู่ในรูปของแก๊ส  $\text{CH}_4$  ที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก การลดการกระจายของแก๊ส  $\text{CH}_4$  มีความจำเป็น และมีความสำคัญซึ่งไม่เพียงแต่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเป็นการลดการสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดอีกด้วย

ตารางที่ 2.11 ขนาดและการเพิ่มขึ้นของสัตว์ที่เลี้ยงจากฟาร์มในปี 1997

ชนิด	จำนวน (x10 <sup>9</sup> )	น้ำหนัก (x10 <sup>6</sup> ตัน)	การผลิตต่อปี (x10 <sup>6</sup> ตัน)	สัดส่วน
สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่	1.41	332	52.6	0.16
สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก	1.57	36	9.9	0.28
สัตว์กระเพาะเดียว	1.36	47	87.2	1.85
สัตว์ปีก	13.9	12	58.1	4.84
รวมสัตว์ทั้งหมด	18.2	427	207.9	0.49

หมายเหตุ : จาก “Nutritional factors for the quantification of methane production”, โดย

Kirchgessner, Windisch and Miller, 1995, In: Engelhardt, Leonhard-Marek, Breves, Giesecke, (eds.), Ruminant Physiology: Digestion, Metabolism, Growth and Reproduction. Ferdinand Enke Verlag. Stuttgart. 333-348.

## 2.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนจากการเลี้ยงสัตว์

Tamminga (2003) อธิบายไว้ว่า การผลิตสัตว์หรือการปศุสัตว์จะทำให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมได้ทั้งดิน น้ำ และอากาศ ซึ่งผลกระทบในส่วนที่เกิดกับดินและน้ำจะเกิดจาก NO<sub>3</sub><sup>-</sup>, P และ K ที่มาจากปุ๋ยมูลสัตว์ ซึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์สาหร่ายเบ่งบานเต็มผิวน้ำของน้ำ และส่งผลทำให้น้ำเน่าเสียในที่สุด ส่วนผลกระทบที่เกิดกับอากาศจากการเลี้ยงสัตว์จะเป็นในเรื่องของภาวะโลกร้อนจากแก๊สเรือนกระจกโดยเฉพาะแก๊ส CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub> และ N<sub>2</sub>O ที่เกิดจากการปศุสัตว์แต่ Sauerbeck (2001) ได้พิสูจน์เอาไว้ว่าการกระจายของแก๊ส CO<sub>2</sub> ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้น้ำมันในขณะที่การกระจายของแก๊ส CO<sub>2</sub> ที่เกิดจากภาคเกษตรกรรม และการเลี้ยงสัตว์จะเล็กน้อยไม่เกิน 5% แต่ถึงแม้ว่าจะน้อยก็มีความสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามได้ เนื่องจากปริมาณโดยรวมทั้งหมดมีจำนวนสูง ส่วนการกระจายของแก๊ส CH<sub>4</sub> จะเกิดจากการย่อยสลายในสภาวะไร้อากาศซึ่ง Johnson, Ward, and Bernal (1997) ได้กล่าวไว้ว่าแก๊ส CH<sub>4</sub> ประมาณ 20% ของค่าการเกิดแก๊สจากภาคเกษตรกรรมในตารางที่ 2.12 เกิดจากสัตว์เคี้ยวเอื้อง และของเสียจากสัตว์ แก๊ส CH<sub>4</sub> ที่เกิดจากรวันมีส่วนทำให้โลกร้อนได้ถึง 55% ของการปศุสัตว์ทั้งหมด ส่วนแก๊สเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมการปศุสัตว์ตัวสุดท้ายคือ แก๊ส N<sub>2</sub>O ซึ่ง Vermoesen, van Cleemput, and Hofman (1996) ได้ศึกษาไว้ว่าการกระจายของแก๊ส N<sub>2</sub>O เกิดจากการใช้ที่ดิน เช่น การตัดหญ้าบนทุ่งหญ้า การเลี้ยงสัตว์บนทุ่งหญ้า และการปลูกข้าวโพด จะมีค่าเท่ากับ 2.8, 14.0 และ 3.2 กิโลกรัม N<sub>2</sub>O ต่อเฮกตาร์ต่อปี

Johnson, Phetteplace, and Seidl (2001) ได้ศึกษาการจำลองสถานการณ์ การใช้พื้นที่เพื่อผลิตวัวเนื้อ โดยคำนึงถึงพื้นที่โดยเฉลี่ยที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยงวัวหรือลูกวัวเพื่อขุนเท่ากับ 3 - 18.5 เอเคอร์ต่อวัว 1 ตัวพบว่า ค่าเฉลี่ยของการถ่ายเทคาร์บอนสำหรับการจัดการที่ดีที่สุด (best management practices: BMP) ของทุ่งหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์ บริเวณที่ใช้เพื่อการปศุสัตว์และฟางหรือหญ้าแห้ง = 357, 45 และ 178 ปอนด์คาร์บอนต่อเอเคอร์ต่อปี หรือประมาณตามจำนวนวัวได้ว่าศักยภาพของการถ่ายเทคาร์บอนอยู่ในช่วง 46 - 94 ตันคาร์บอนต่อปีต่อวัว 100 ตัว ดังที่แสดงรายละเอียดไว้ในตารางที่ 2.13 การเพิ่มขึ้นของการถ่ายเทคาร์บอนสำหรับการปศุสัตว์ ในกรณีที่หมุนเวียนการให้กินหญ้าจะประมาณ 50 ตันต่อปีต่อฝูงวัว 100 ตัว หรือคิดเป็นการแพร่กระจายของการสมมูลแก๊ส  $\text{CO}_2 = 30\%$  ของแก๊สเรือนกระจกทั้งหมด

นอกจากนั้น Sere and Steinfeld (1996) ยังได้กล่าวถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการเลี้ยงสัตว์มากเกินไปเพราะชนิดและความหนาแน่นของการเลี้ยงสัตว์เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ต้องบุกรุกทำลายป่าซึ่งเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนที่สำคัญที่สุดของโลกเพื่อปลูกหญ้าหรือพืชอาหารสัตว์ชนิดต่าง ๆ ไว้ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้การเลี้ยงสัตว์ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของเสียหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น แก๊ส  $\text{CO}_2$  และ  $\text{CH}_4$  ที่เกิดจากระบบการย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้องและการหายใจ และแม้กระทั่งมูลหรือสิ่งขับถ่ายที่เกิดจากสัตว์ที่ทำให้เกิดแก๊ส  $\text{N}_2\text{O}$  และ  $\text{NO}$  ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นโดยเฉพาะปัญหาโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก

ตารางที่ 2.12 การกระจายของแก๊สเรือนกระจกที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมทางการเกษตร

กิจกรรม	$\text{CO}_2$ (ppb)	$\text{CH}_4$ (ppb)	$\text{N}_2\text{O}$ (ppb)
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อปี	1500	7.0	0.8
ศักยภาพที่ทำให้โลกร้อน (GWP)	1000	40	330
การเกิดแก๊สจากภาคเกษตรกรรม	5000	20	>50

หมายเหตุ : จาก “Pollution due to nutrient losses and its control in European animal production”

โดย Tamminga, 2003, Livestock Production Science, 84 : 101-111 ; จาก “Biotechnology mitigating the environmental effects of dairying: greenhouse gas emissions”, โดย Johnson, Ward and Bernal, 1997, In : Welch, Burns, Davis, Popay, Prosser (eds.), Milk Composition, Production and Biotechnology, 497-511.

ตารางที่ 2.13 การจำลองการถ่ายเทคาร์บอนของระบบการผลิตเนื้อวัวในอเมริกา

การถ่ายเทคาร์บอน	ปอนด์คาร์บอนต่อ เอเคอร์ต่อปี	ค่าเฉลี่ยตันคาร์บอนต่อปี ต่อวัว 100 ตัว
การจัดการที่ดีที่สุดของทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์	357	51
บริเวณที่ใช้เพื่อการปศุสัตว์และโรงเรือน	45	9
ฟางหรือหญ้าแห้ง	178	4
รวมคาร์บอนในอาหารสัตว์ทั้งหมด	580	64
คาร์บอนจากการปลูกพืช	714	14
รวมการถ่ายเทคาร์บอนทั้งหมด	1294	78

หมายเหตุ : จาก “Methane, nitrous oxide and carbon dioxide emissions from ruminant livestock production systems”, โดย Johnson, Phetteplace and Seidl, 2001, Proceeding 1<sup>st</sup> International Conference Greenhouse Gases and Animal Agriculture, Obihiro, Japan.

อย่างไรก็ตามการปศุสัตว์ยังคงดำเนินต่อไปเพราะจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นและความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์เพิ่มมากขึ้น การปศุสัตว์จะเป็นการถ่ายเทชีวมวลที่อยู่ในพืชไปสู่สัตว์ ในรูปของเนื้อ นม ไข่ ขน หนัง แร่งงานจากสัตว์ มูลสัตว์ และแก๊สที่เกิดจากการหายใจของสัตว์ ซึ่งดูเหมือนกับเป็นผลลัพธ์ของวัฏจักรของสาร C และ N ผ่านดิน น้ำ อากาศ พืช สัตว์และมูลสัตว์ที่ใช้เป็นปุ๋ย โดยอาศัยกลไกการสังเคราะห์แสงของพืช การตรึงไนโตรเจน (N-fixation) ในตรีฟิเลชั่น ดินในตรีฟิเลชั่น และเมื่อกิจกรรมของมนุษย์มารบกวนวัฏจักรของสารให้ขาดความสมดุลก็จะทำให้ C และ N ถูกปลดปล่อยออกจากระบบนิเวศไปสร้างปัญหาทางสิ่งแวดล้อม การแพร่กระจาย C และ N ที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์เป็นผลมาจากกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้องที่ทำให้เกิดแก๊ส CH<sub>4</sub> ส่วนการขับถ่ายของเสียจากสัตว์จะทำให้เกิดแก๊ส N<sub>2</sub>O และ NO ซึ่งการผลิตสัตว์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ที่จะต้องเกิดของเสีย หรือสิ่งขับถ่ายจากสัตว์และจะต้องใช้อาหารในการเลี้ยงสัตว์ตามความสามารถของพื้นที่ ที่สามารถเพาะปลูกพืชอาหารสัตว์ได้ ถ้าการผลิตสัตว์มีมากเกินไป ความสามารถที่พื้นที่นั้น ๆ จะสามารถรองรับได้แล้วจะทำให้เกิดผลเสียที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น (Tamminga, 2003)

Hogberg et al. (2005) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการปศุสัตว์กับสิ่งแวดล้อมและชุมชนในชนบท เนื่องจากใน 50 ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงมากมายของการปศุสัตว์ที่เกี่ยวกับการเพิ่มขนาดของการผลิตต่อหน่วย การใช้เทคโนโลยี การลดแรงงานคนในการผลิต การเพิ่มจำนวนสัตว์ด้วยการผสมพันธุ์และการตกูกของสัตว์ และระบบการพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้สายพันธุ์เฉพาะที่เหมาะสม ซึ่งเป้าหมายในระยะยาวคือ การเพิ่มศักยภาพทางอาหารเชิงปริมาณ 2 - 3 เท่า จาก

อาหารที่ได้จากสัตว์ รวมทั้งการผลิตนม และไข่ด้วย แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมคือ การผลิตปุ๋ยสัตว์ในปริมาณมาก บนพื้นที่น้อยหรือจำกัด ทำให้ความเข้มข้นต่อพื้นที่ของของเสียจาก สิ่งขี้ถ่ายของสัตว์มีความรุนแรงสูงขึ้น และยังสร้างปัญหาหลายอย่างต่าง ๆ ตามมาด้วย เช่น มลภาวะ ทางน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน รวมทั้งเกิดปัญหาในเรื่องของกลิ่นรบกวนบริเวณใกล้เคียงหรือ ชุมชนเมืองที่ขยายตัวมาอยู่ใกล้ชิดกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์มากขึ้น และกลายเป็นปัญหากระทบกระทั่งกัน ระหว่างผู้ทำฟาร์มปุ๋ยสัตว์กับชุมชนอยู่เสมอ ๆ ส่งผลทำให้จำนวนผู้ประกอบการและขนาดกำลัง การผลิตลดน้อยลงไปทุกทีจากผลของการขยายตัวของชุมชน

นอกจากนี้ผลการศึกษาของ NASS. (2002) ได้แสดงให้เห็นถึง ร้อยละของอายุฟาร์ม ปุ๋ยสัตว์ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา เช่น ฟาร์มไก่ลดลงจาก 78% เหลือแค่ 4.6% ฟาร์มโคนมลดลงจาก 68% เหลือแค่ 4.3% ฟาร์มหมูลดลงจาก 56% เหลือ 3.7% ในขณะที่ฟาร์มวัว เนื้อคงที่อยู่ที่ 41% ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา

U.S. Environmental Protection Agency (2002) รายงานว่า การปุ๋ยสัตว์ในอเมริกา ก่อให้เกิดแก๊ส  $CH_4$  ประมาณ 26% และแก๊ส  $N_2O$  มากกว่า 50% ซึ่งคิดเทียบเป็นการปลดปล่อยแก๊ส  $CO_2$  ประมาณ 15% ของแก๊สที่เกิดขึ้นทั้งหมด แต่ถึงอย่างไรก็ตามระบบการปุ๋ยสัตว์ก็มีความสำคัญ ในการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก และการถ่ายเทคาร์บอน

De Boer (2003) ได้อธิบายถึงวิธีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการ ทั้งหมดของการผลิตนม โดยเริ่มตั้งแต่การปลูกพืชเลี้ยงวัวนมไปจนถึงการรีดนมวัว และเก็บรักษา ซึ่งไม่รวมถึงส่วนของการขนส่ง และการบริโภคนม และได้แยกการพิจารณาในเรื่องของยาฆ่าแมลง และยารักษาโรคออกไป เนื่องจากไม่มีข้อมูลโดยผลกระทบที่ถูกประเมินจะแยกออกเป็น 3 กลุ่มคือ

- ศักยภาพการเกิดสภาพกรด (acidification) จะพบแก๊สแอมโมเนียระเหยอยู่ที่ 78 - 97%
- ศักยภาพของการเกิดยูโทรฟิเคชัน (eutrophication) เนื่องจาก N และ P ต่อต้นของนม หรือต่อพื้นที่ฟาร์มนม

- ศักยภาพที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เนื่องจากการกระจายของแก๊สเรือนกระจกเช่น แก๊ส  $CH_4$  48 - 65% ซึ่งการเกิดแก๊ส  $CH_4$  ขึ้นอยู่กับขนาดและชนิดของสัตว์ และการย่อยอาหารหญ้าที่ใช้ ในการเลี้ยงสัตว์ (Wilkerson, Casper, Mertens, and Tyrell, 1994) การกระจายของ  $CO_2$  จะเกิดจาก การใช้น้ำมันในกิจการฟาร์ม (22%) และการขนส่ง (30%) และการใช้ปุ๋ย (21%) และการลดการเกิด แก๊ส  $N_2O$  ด้วยการใส่ปุ๋ยในอัตราที่สมดุลกับความต้องการปุ๋ยของพืช

Hirota et al. (2005) ได้ทำการศึกษาประเมินผลกระทบของทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ต่อการเกิด แก๊สเรือนกระจก โดยศึกษาจากการเจริญเติบโตของพืช และการเปลี่ยนแปลงของแก๊ส  $CO_2$  และ  $CH_4$  ภายใต้สภาพพื้นที่ที่เป็นและไม่เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ของที่ราบสูงริเบต พบว่า การใช้แก๊ส  $CO_2$



ของระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตเหนือพื้นดินสุทธิ มีความสำคัญน้อยกว่าการกระจายแก๊ส  $\text{CH}_4$  ของระบบนิเวศเหนือพื้นดิน และภายใต้สภาพที่เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์จะมีความสำคัญมากกว่าสภาพที่ไม่ใช่ทุ่งเลี้ยงสัตว์ โดยผลการศึกษายพบว่า ในสภาพที่เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์จะมีการเปลี่ยนแปลงของแก๊ส  $\text{CO}_2$  และ  $\text{CH}_4$  สูงกว่าคิดเป็น 5.6 – 11.3 เท่าของสภาพที่ไม่ใช่ทุ่งเลี้ยงสัตว์ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์สำหรับการปศุสัตว์จะเป็นสาเหตุของการเพิ่มศักยภาพของสภาวะโลกร้อน

Paillat, Robin, Hassouna, and Leterme (2005) ได้ทำการศึกษาวัดการเปลี่ยนแปลงการกระจายของแก๊ส  $\text{NH}_3$ ,  $\text{N}_2\text{O}$ ,  $\text{CO}_2$ ,  $\text{CH}_4$  และน้ำ จากกองปุ๋ยหมัก 8 กอง เพื่อแสดงถึงความความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของไนโตรเจนและคาร์บอนที่อยู่ในมูลสัตว์จากการปศุสัตว์ การตรวจวัดจะพิจารณาในช่วงเวลา 2 เดือนแรกเนื่องจากเป็นช่วงที่เกิดการย่อยสลายชีวมวลสูงสุดและมีอุณหภูมิอยู่ในสภาวะเทอร์โมฟิลิก (thermophilic phase) โดยตัวแปรที่ศึกษาเพื่อใช้อธิบายจลนศาสตร์ของการกระจายแอมโมเนียคือ เวลาตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงเวลาที่เกิดความเข้มข้นของการกระจายแอมโมเนียสูงสุด ช่วงกว้างของความสามารถในการย่อยสลายคาร์บอน การกระจายเนื่องจากการย่อยสลายไนโตรเจน และการกระจายสะสมซึ่งในกองปุ๋ยหมักจะมีการเปลี่ยนแปลงไนโตรเจนอยู่ในช่วง 16.5 – 48.9% ของไนโตรเจนเริ่มต้นโดยขึ้นอยู่กับความสามารถในการย่อยสลายของ C และ N การเปลี่ยนแปลงการสะสมของการกระจายแก๊ส  $\text{CO}_2$  และ  $\text{CH}_4$  จะวิเคราะห์จากปริมาณของธาตุ N และ C ในสารละลายและในเซลล์ของมูลสัตว์สภาพแห้ง ผลจากการศึกษากองปุ๋ยหมักที่อยู่ในสภาพที่มีอากาศ ความชื้นน้อย และการกระจายของแก๊ส  $\text{N}_2\text{O}$  และ  $\text{CH}_4$  ต่ำพบว่า ถ้ามีความสามารถในการย่อยสลาย C สูงจะทำให้ลดการกระจายของแอมโมเนียลงได้

Manlay et al. (2004) พบว่าระบบการผสมผสานการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ เป็นการจัดการทรัพยากรที่เป็นสารอินทรีย์อย่างหนึ่ง ซึ่งการประเมินสมดุลของสารอินทรีย์ถูกประเมินทั้งเป็นบางตำแหน่งและทั้งระบบของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแอฟริกาตะวันตกจะสามารถใช้บ่งชี้ถึงความสามารถในการใช้ทรัพยากรสารอินทรีย์ได้ การกระจายของปริมาณคาร์บอน ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ในดินและพืชของหมู่บ้านจะอธิบายได้ถึงความแตกต่างของระบบการใช้ที่ดิน และสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนจากการทำฟาร์มปศุสัตว์ คาร์บอนที่อยู่ในรูปสารอินทรีย์ของสิ่งมีชีวิตแสดงถึงทรัพยากรทางอาหาร เชื้อเพลิงจากไม้ และวัสดุในการก่อสร้างที่มนุษย์ต้องใช้ในการดำรงชีวิต และการปศุสัตว์ในรูปของอาหารสัตว์ การศึกษาเหตุการณ์ความสัมพันธ์ที่แน่นชัดของการกระจายคาร์บอนและสารอาหาร ตามหน้าที่ของกิจกรรมทางการเกษตรของระบบการใช้ที่ดินที่ขนาดต่าง ๆ กันจะเป็นปัจจัยหลักของการศึกษาเพื่อให้มั่นใจถึงหน้าที่ในหน่วยต่าง ๆ ของระบบโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรที่เป็นสารอินทรีย์

การวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงสร้างประชากรและค่าเฉลี่ยของการผลิตปศุสัตว์ โดยการคำนวณ ถ่วงน้ำหนักขนาดประชากรตามอายุ เพื่อบ่งชี้ถึงความต้องการอาหาร สำหรับประชากรที่มีอายุต่ำกว่า และมากกว่า 15 ปี จะใช้ค่าถ่วงน้ำหนักความต้องการอาหาร = 0.5 และ 1.0 ตามลำดับ ส่วนค่าเฉลี่ยของการผลิตปศุสัตว์จะถูกสำรวจถึงความสามารถในการผลิตในหน่วยน้ำหนักปศุสัตว์ ซึ่ง 1 TLU (tropical livestock units) = 250 กิโลกรัมของน้ำหนักสัตว์ (live weight [LW]) โดยการคำนวณ ศักยภาพของความเพียงพอของพืชอาหารสัตว์ ที่ใช้ในการปศุสัตว์ ( $SSF_H$ ) จาก

$$SSF_H = \frac{AFP_H}{NFI \times HS_H} \quad (2.19)$$

โดยที่  $AFP_H$  = น้ำหนักพืชอาหารสัตว์ที่ผลิตได้ในแต่ละพื้นที่ (ตัน/ปี)


$HS_H$  = จำนวนของสัตว์ทั้งหมดในหน่วยน้ำหนัก (กิโลกรัม)

$NFI$  = ค่าเฉลี่ยโดยปกติในการกินพืชอาหารของสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์ม

ซึ่ง Ickowicz et al. (1998) ทำการศึกษาพบว่า  $NFI = 15.4 \times 10^{-3}$  ตัน/ปี/  
น้ำหนักสัตว์ 1 กิโลกรัม

นอกจากนี้การศึกษายังอธิบายถึง วิธีการประมาณค่าการใช้ปริมาณคาร์บอนจากพืชที่สัตว์กิน และปริมาณคาร์บอนที่ถูกขับถ่ายออกมาจากสัตว์พร้อมกับมูลสัตว์ (Ickowicz, Richard and Usengumuremyi, 1999) ซึ่งดัชนีมูลสัตว์ (faecal indice) จะถูกใช้ในการประมาณการบริโภคสารอินทรีย์คาร์บอน (organic matter intake [OMI]) จากค่าของสารอินทรีย์คาร์บอนที่ถูกขับถ่ายออกมาพร้อมกับมูลสัตว์ (faecal organic matter excretion [FOME]) (Guérin et al. 1989) ซึ่งวิธีการหาปริมาณ C จากมูลสัตว์จะใช้วิธีการเผาที่ 850 °ซ และตามด้วยการโครมาโตกราฟี (Thermoquest NC soil 2000) การประมาณการบริโภคหรือได้รับคาร์บอนของสัตว์ในฟาร์มนี้ จะถูกสมมติให้เกิดได้จากการบริโภคอาหารที่เป็นชีวมวลเข้าไปในร่างกายโดยทางปากเท่านั้น โดยที่คาร์บอนที่สัตว์ได้รับจากการกินนี้จะถูกคำนวณจากค่าเฉลี่ยของปริมาณคาร์บอนในพืชอาหารสัตว์แต่ละชนิด (Manlay, Kairé, Masse, Chotte, Ciornei, and Floret, 2002; Manlay, Chotte, Masse, Laurent, Feller, 2002) และคิดจากค่าการใช้หรือปริมาณการบริโภคสารอินทรีย์ในสภาพน้ำหนักแห้ง (dry matter intake [DMI]) ที่พัฒนามาจาก OMI โดยสมมติให้ร้อยละของน้ำเป็น 10% ซึ่งการคิดปริมาณคาร์บอนที่สัตว์บริโภค หรือใช้ในการเจริญเติบโตนี้จะคิดโดยคำนึงถึงเวลาที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ จนกระทั่งส่งไปฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์

พวงพร โชติกไกร (2534) ได้อธิบายถึงกระบวนการผลิตนม Ultra High Temperature (UHT) จากนมดิบ โดยผ่านขบวนการฆ่าเชื้อแบบพาสเตอร์ ซึ่งมี 2 วิธีคือ วิธีให้ความร้อนจากไอน้ำ ด้วยอุณหภูมิต่ำ แต่ใช้เวลานาน (low temperature long time) โดยอุณหภูมิที่ใช้คือ  $62.8^{\circ}\text{C}$  ( $145^{\circ}\text{F}$ ) เป็นเวลา 30 นาที หรือวิธีให้ความร้อนจากไอน้ำ ด้วยอุณหภูมิสูง แต่ใช้ระยะเวลาสั้น (high temperature short time) โดยอุณหภูมิที่ใช้คือ  $71.7^{\circ}\text{C}$  ( $161^{\circ}\text{F}$ ) เป็นเวลา 15 วินาที แล้วทำให้เย็นลง ที่อุณหภูมิ  $4.4^{\circ}\text{C}$  ( $40^{\circ}\text{F}$ ) จะทำให้สามารถเก็บนํ้านมที่ผ่านจากขบวนการฆ่าเชื้อแบบพาสเตอร์นี้ได้นาน 2 - 3 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ  $1.6 - 4.4^{\circ}\text{C}$  แต่ถ้าเก็บนํ้านมไว้ที่อุณหภูมิ  $4.4 - 7.2^{\circ}\text{C}$  จะสามารถเก็บได้นาน 1 - 2 สัปดาห์ หลังจากขบวนการฆ่าเชื้อแบบพาสเตอร์ จะนํ้านมดังกล่าวมาผ่านการให้ความร้อนจากไอน้ำอีกครั้งภายในระยะเวลาสั้น 1 - 5 วินาที ซึ่งอุณหภูมิที่ใช้จะประมาณ  $140^{\circ}\text{C}$  หลังจากนั้นจึงทำให้เย็นลง นํ้านมที่ผ่านกระบวนการทำไร้เชื้อแบบ UHT จากนํ้านมดิบนี้จะสามารถเก็บได้นาน 1 เดือน ที่อุณหภูมิ  $1.6 - 4.4^{\circ}\text{C}$  ดังที่แสดงกระบวนการผลิตนํ้านมในรูปที่ 2.13



รูปที่ 2.13 กระบวนการผลิตนม UHT จากนํ้านมดิบ (จากจุลชีววิทยาของอาหารและนม, โดย พวงพร โชติกไกร, 2534, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

ประทีป เต็ดแก้ว วนิตา วาเกริกกุลชัย สุกานดา โพธิ์ศรี และ ชาติ เกสรกุล (2540) ได้ทำการศึกษาศาวรสภาพสุขภาพสัตว์ปีกเลี้ยงในคอก และข้อมูลพื้นฐานของโรงฆ่าสัตว์พบว่า จำนวนสัตว์ที่ถูกฆ่าส่วนใหญ่เป็นสุกร อยู่ในช่วง 11 - 30 ตัวต่อวัน และโรงฆ่าสัตว์ส่วนใหญ่จะฆ่าโค กระบือ 1 - 5 ตัวต่อสัปดาห์ โรงฆ่าสัตว์ทั้งหมดที่สำรวจ จะมีการตรวจสอบสุขภาพสัตว์ ก่อนและหลังฆ่า สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ฆ่าและสัตว์นั้น จะดำเนินการโดยเจ้าของสัตว์จะนำคนงานมาเอง ซึ่งเชื่อเพลิงที่ใช้ในการต้มน้ำที่ใช้ในขั้นตอนการขูดลอกขนส่วนใหญ่ใช้ไม้หรือฟืน โดยโรงฆ่าสัตว์ทุกแห่งมีเตาสำหรับต้มน้ำในกรรมวิธีขูดลอกขนอย่างเพียงพอทุกแห่ง และมีน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 80°C ใช้เพียงพอ ระบบรางเหนือศีรษะที่ใช้สำหรับการขนส่งซากสัตว์ไปตามจุดต่าง ๆ พบว่า สำหรับโรงฆ่าสัตว์ที่มีรางลอกไม่มีการใช้ประโยชน์จากรางลอกที่มีเนื่องจากผู้ที่ฆ่าสัตว์มีความเคยชินในการฆ่าและซากกับพื้น นอกจากนี้ยังพบว่าวิธีการใช้ฆ่าสัตว์มากที่สุด คือ การทุบหรือตีหัวให้สลบก่อนฆ่า ส่วนสัตว์ที่ฆ่าและชำแหละแล้ว มักขนส่งเพื่อไปจำหน่ายทันทีโดยเจ้าของสัตว์เป็นผู้ขนส่งเป็นส่วนใหญ่

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จังหวัดนครราชสีมา (2549) ได้บอกถึงลักษณะของโรงเรือนเลี้ยงไก่ที่มีการเลี้ยงในจังหวัดนครราชสีมาจากการขึ้นบัญชีฟาร์มเลี้ยงไก่ พบว่าการทำฟาร์มเลี้ยงไก่จะเลี้ยงในโรงเรือนปิด 3 แบบ คือ แบบโรงเรือนธรรมดา โรงเรือนเลี้ยงไก่แบบวิธีสปริงเกอร์ เป็นวิธีการเลี้ยงโดยให้ไก่อยู่กรงเดี่ยวเรียงเป็นแถวยาวโดยจะมีรางน้ำ และรางอาหารวางอยู่ตรงหน้ากรงไก่ โรงเรือนเลี้ยงไก่แบบสปริงเกอร์นี้เป็นโรงเรือนที่มีการระบายอากาศโดยการปล่อยน้ำให้ไหลจากบนหลังคา และส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรือนแบบอีแวป (evap) ซึ่งคล้ายกับวิธีการเลี้ยงแบบสปริงเกอร์ แต่จะต่างกันตรงที่ไก่ที่เลี้ยงแบบวิธีอีแวปจะอยู่ในห้องควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับไก่

Hashizume et al., (1963) and Liang et al., (1989) ได้ทำการวัดแก๊สจากลมหายใจของสัตว์เลี้ยงเอื้องโดยใช้เทคนิคหน้ากากครอบหน้าของสัตว์ซึ่งในภายหลังได้เปลี่ยนเป็นการใช้ห้องวัดลมหายใจ (respiration chamber) แทนสำหรับการทดลองเพื่อทำการวัดพลังงานจากสัตว์ (Iwasaki, 1982) แต่อย่างไรก็ตามการใช้หน้ากากต่อเข้ากับถุงเก็บแก๊สเพื่อเก็บสะสมปริมาณแก๊สที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยการครอบหน้าและรัดแน่นให้สนิทเพื่อป้องกันแก๊สรั่วออกมาจะทำให้วั่วเกิดความเครียดซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการควบคุมตัวสัตว์ นอกจากนี้ในประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น โดยศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ขอนแก่นร่วมมือกับ JIRCAS ตั้งแต่ปี 1994 ได้ทำโครงการวิจัยโดยการใช้วิธีการวัดระบบการหายใจของวั่วและกระบือซึ่งใช้หน้ากากครอบที่หน้าของสัตว์ (respiration trial system) สำหรับทำการศึกษामетаบอลิซึมของสัตว์เลี้ยงเอื้องขนาดใหญ่เพื่อประเมินแหล่งการใช้อาหารเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่นซึ่งผลการศึกษาพบว่า วิธีการดังกล่าวสามารถวัดค่าเฉลี่ยของแก๊สที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดถึง 93.3% โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพียงเล็กน้อย 0.8 - 1.7% เท่านั้น (Kawashima et al., 2000)

## 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

### 2.6.1 ต้นทุนคาร์บอนและแหล่งกำเนิดแก๊สเรือนกระจก

Hogan (1993) กล่าวว่า ถึงแม้ว่าแก๊ส CO<sub>2</sub> จะเป็นแก๊สที่มีน้อยในบรรยากาศคือมีแค่เพียง 0.33% เท่านั้น แต่แก๊ส CO<sub>2</sub> ก็มีความสำคัญเพราะสามารถควบคุมอุณหภูมิของโลกได้ เนื่องจากเมื่อแก๊ส CO<sub>2</sub> มีมากขึ้น ก็จะสามารถรับแสงอินฟราเรดได้มากขึ้น และปล่อยความร้อนออกสู่บรรยากาศ ของโลกได้มากขึ้น ซึ่งชนิดของแก๊สเรือนกระจกที่สำคัญ ได้แก่ แก๊ส CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub> และ N<sub>2</sub>O ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมปศุสัตว์ อาทิเช่น การหายใจ การย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง และการจัดการมูลสัตว์ เป็นต้น การตัดไม้ทำลายป่าเพื่อการเกษตรกรรม ซึ่งแก๊ส CH<sub>4</sub> ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ประมาณ 70% ของ CH<sub>4</sub> ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโลกหรือประมาณ 350 ล้านตันต่อปี และแหล่งกำเนิดจากกิจกรรมการปศุสัตว์ก็เป็นแหล่งของการเกิดแก๊ส CH<sub>4</sub> ที่ใหญ่ที่สุด ดังที่แสดงในตารางที่ 2.14

ตารางที่ 2.14 แหล่งการเกิดแก๊ส CH<sub>4</sub> จากกิจกรรมของมนุษย์

แหล่งกำเนิด	จำนวนโดยประมาณ (ล้านตันต่อปี)
การปศุสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์	80
นาข้าว	60
การใช้แก๊สธรรมชาติและปิโตรเลียม	50
การทำเหมืองถ่านหิน	40
การเผาชีวมวล	40
หลุมฝังกลบขยะสุขาภิบาล	30
มูลสัตว์จากการปศุสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์	25
การบำบัดน้ำเสียในสภาวะไร้อากาศ	25
<b>รวม</b>	<b>350</b>

หมายเหตุ : จาก Anthropogenic Methane Emissions in the United States : Estimates for 1990 Report to Congress, (Environmental Protection Agency Report No. 430-R-93-003), Hogan, 1993, Washington, DC : United States Environmental Protection Agency-Office of Air and Radiation.

Watson et al. (2000) กล่าวว่าไว้ว่าการประมาณต้นทุนคาร์บอนของโลก (global carbon budget) แสดงให้เห็นว่าในช่วงปี ค.ศ. 1850 - 1998 ระบบนิเวศบนบกเป็นแหล่งกำเนิดของแก๊ส CO<sub>2</sub> ในบรรยากาศสุทธิประมาณ  $(270 \pm 30) \times 10^{15}$  กรัมของคาร์บอนถูกปล่อยสู่บรรยากาศจากการเผาไหม้ น้ำมัน เชื้อเพลิงและการผลิตซีเมนต์ และประมาณ  $(136 \pm 55) \times 10^{15}$  กรัมของคาร์บอน ถูกปล่อยออกมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และการบุกรุกทำลายป่าซึ่งบรรยากาศสามารถจะกักเก็บคาร์บอนไว้ในบรรยากาศประมาณ  $(176 \pm 10) \times 10^{15}$  กรัมของคาร์บอน นั่นคือประมาณ 43% ของคาร์บอนที่แพร่กระจายสู่บรรยากาศทั้งหมด ดังนั้นคาร์บอนอีก  $(230 \pm 60) \times 10^{15}$  กรัมของคาร์บอน จะถูกเคลื่อนย้ายออกจากบรรยากาศเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กันคือ คาร์บอนจะเคลื่อนย้ายไปที่มหาสมุทร และไปยังระบบนิเวศบนบก ดังนั้นเมื่อทำสมดุลมวลพบว่า ระบบนิเวศบนบกมีการปลดปล่อยคาร์บอนสู่บรรยากาศมากกว่าที่ตัวระบบนิเวศเองสามารถดูดซับไว้ได้ถึงประมาณ  $21 \times 10^{15}$  กรัมของคาร์บอน

เฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ (2549) กล่าวว่าสภาวะเรือนกระจกมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเกิดจากกิจกรรมตามธรรมชาติ และกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน น้ำมัน แก๊สธรรมชาติ การตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นแหล่งในการดูดซับแก๊ส CO<sub>2</sub> ขยะ น้ำเสีย และการปศุสัตว์ ซึ่งเป็นแหล่งปล่อยแก๊ส CH<sub>4</sub> ที่สำคัญจากการย่อยอาหารของสัตว์ประเภทเคี้ยวเอื้อง และกระบวนการแปรรูปทางอุตสาหกรรม ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเกษตรจะทำให้ผลผลิตตกต่ำ และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศคือ ภัยแล้ง น้ำท่วม การเกิดโรคระบาด เช่น โรคซาร์ส โรคหวัด ไข้หวัดนก โรคปากเท้าเปื่อย เป็นต้น สิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ และการกระจายตัว พื้นที่ชุ่มน้ำลดลงส่งผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งขยายพันธุ์ของพืชและสัตว์ อีกทั้งมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ในบริเวณกว้างเนื่องจากสุขภาพขึ้นอยู่กับอาหารที่เพียงพอ น้ำดื่มที่สะอาด ที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการควบคุมโรคติดต่อ ประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศรุนแรงที่สุด เพราะขาดความรู้ เทคโนโลยี และกลไกในการปรับตัว ซึ่งประเทศไทยยังขาดองค์ความรู้ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินการหลายประการ

ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเป้าหมายของอนุสัญญาฯ คือ การรักษาระดับความเข้มข้นของแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศให้คงที่ โดยไม่คุกคามต่อการผลิตอาหารของมนุษย์ นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ร่วมลงนาม และให้สัตยาบันต่อพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) โดยมีผลบังคับใช้เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งไทยต้องจัดทำรายงานแห่งชาติเพื่อเสนอต่อประเทศภาคีสมาชิก และสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกโดยเฉพาะจากแหล่งกำเนิด เช่น การรักษา

พื้นที่ป่าเพื่อเพิ่มแหล่งดูดซับคาร์บอน และลดการปล่อยแก๊ส  $\text{CH}_4$  ในภาคเกษตรและปศุสัตว์ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้า จูงใจให้มีการนำมูลสัตว์มาใช้ประโยชน์ และลดมูลสัตว์จากการผลิตสัตว์ โดยการผลิตสัตว์ในจำนวนที่สอดคล้องกับความต้องการบริโภค เป็นต้น จัดทำฐานข้อมูลการจัดการทรัพยากรเพื่อติดตามตรวจสอบบัญชีคาร์บอนของประเทศ และสร้างองค์ความรู้ การตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาแก่ประชาชน แต่ปัญหาในปัจจุบันคือ ข้อมูลเกี่ยวกับคาร์บอนไม่เพียงพอ การศึกษากระบวนการวิเคราะห์ยังไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยงกับข้อมูลได้ การประมาณค่าปริมาณคาร์บอนมีค่าใช้จ่ายสูง ในขณะที่ค่าที่ได้หรือข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่ละเอียด และที่สำคัญคือ ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแหล่งสะสมคาร์บอนในภูมิภาคเขตร้อนมีน้อยมาก (Pfaff et al., 2000)

Perters and Vogel (2005) ได้อ้างอิงไว้ว่า การศึกษาคาร์บอนไอโซโทป (carbon isotope) จากกระดูกของมนุษย์โบราณสามารถชี้ให้เห็นถึง ลักษณะชนิดของอาหารที่มนุษย์โบราณบริโภค ซึ่งเทคนิคการศึกษาอยู่บนพื้นฐานของความจริงที่ว่า เนื้อเยื่อของพืชจำพวก  $\text{C}_4$  จากการสังเคราะห์แสงมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับคาร์บอนไอโซโทป  $^{13}\text{C}$  นอกจากนั้นยังพิจารณาได้กับสัตว์ที่กินพืชอีกด้วย ซึ่งการเจริญเติบโตของพืชหรือสัตว์กินพืชเป็นส่วนหนึ่งของพลวัตของระบบการสร้างเนื้อเยื่อด้วยคาร์บอนของพืช และถ่ายทอดไปยังสัตว์กินพืช ปริมาณแก๊ส  $\text{CO}_2$  สูงสุดที่พืชนำไปใช้คือ อัตราสูงสุดของการตรึงแก๊ส  $\text{CO}_2$  ซึ่งนักสรีระวิทยาทางพืช เรียกว่า กลุ่มพืช  $\text{C}_4$  เช่น หญ้า เป็นพืชที่มีความสามารถตรึงแก๊ส  $\text{CO}_2$  ได้สูงกว่าพืชในกลุ่ม  $\text{C}_3$  เช่น ข้าว เมื่อพิจารณาจากกระบวนการเจริญเติบโตโดยเฉพาะในสภาพที่มีอุณหภูมิสูง หรือในประเทศเขตร้อน

Wortmann, Herrle, and Weissert (2004) กล่าวว่าไว้ว่า การรบกวนวัฏจักรคาร์บอนซึ่งทำให้ระดับของแก๊ส  $\text{CO}_2$  ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นจะมีผลทำให้เกิดการเร่งรอบวัฏจักรน้ำให้เร็วขึ้นด้วย และเพิ่มการแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ ซึ่งมีผลต่อระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตโดยผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีการรบกวนวัฏจักรคาร์บอน คือกิจกรรมการระเบิดของภูเขาไฟ ซึ่งมีมาตั้งแต่ยุคก่อนไดโนเสาร์สูญพันธุ์ และมนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้

Canadell and Noble (2001) ได้กล่าวว่า ในขณะนี้โลกได้เริ่มเข้าสู่ยุคที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโลกที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์ ทำให้นักวิทยาศาสตร์กว่า 400 คนจากหลายประเทศ หาท่างป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก โดยสามารถสรุปได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

- วัฏจักรคาร์บอน โดยกิจกรรมของมนุษย์ทำให้ความเข้มข้นของแก๊ส  $\text{CO}_2$  และ  $\text{CH}_4$  เพิ่มขึ้นเกินกว่าที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และหลายครั้งเกิดเร็วกว่าที่ธรรมชาติจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ ผลของการศึกษาแบบจำลองแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการลดลงอย่างรุนแรงของแหล่งเก็บกักคาร์บอนในระบบนิเวศบนบก (terrestrial carbon sink) ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อปี 2050

- การผลิตอาหารของมนุษย์ลดลงมากกว่า 25% โดยเฉพาะผลผลิตอาหารจากประเทศยากจน ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาโลกร้อน
  - ปัญหาความรุนแรงของภัยแล้ง และน้ำท่วม
  - อัตราการสูญพันธุ์ ของสิ่งมีชีวิตที่มีเพิ่มขึ้นทั้งในทะเล และในระบบนิเวศบนบก
- Canadell and Pataki (2002) ได้กล่าวถึงแนวโน้มของงานวิจัยเกี่ยวกับวัฏจักรคาร์บอนที่จำเป็นต้องมีในอนาคต ดังนี้
- การศึกษาวิธีการวัดแก๊ส CO<sub>2</sub> การหาการเปลี่ยนแปลงคาร์บอน (C fluxes) และการทดลองวัดจริงจากสนาม โดยขยายการศึกษาให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค เช่น ในมหาสมุทรที่อยู่ ในซีกโลกใต้ หรือในเอเชีย ในภูมิภาคเขตร้อน เพื่อให้สามารถอธิบายระบบคาร์บอนของทั้งโลกได้
  - การพัฒนาข้อมูลของการกระจายคาร์บอนให้มีความละเอียดถูกต้องมากขึ้น
  - การพัฒนารูปแบบใหม่จากการใช้ข้อมูลหลาย ๆ แหล่งเพื่อสร้างแบบจำลองทางคาร์บอน
  - การปรับปรุงวิธีการประมาณค่าการเปลี่ยนแปลงของคาร์บอนจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ
  - การศึกษาทำความเข้าใจถึงผลกระทบของไฟ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และวัฏจักรไนโตรเจนที่มีผลต่อวัฏจักรคาร์บอนในเชิงของข้อจำกัดของสารอาหาร
  - การศึกษาวิเคราะห์ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงการเคลื่อนที่ของคาร์บอนระหว่างกลไกของแหล่งเก็บกักคาร์บอน (C sinks) และแหล่งกำเนิดคาร์บอน

## 2.6.2 การประเมินการสงวนรักษาคาร์บอนในพืชและจากสารอินทรีย์ที่อยู่ในดิน

Loladze (2002) กล่าวว่า พืชจะได้รับสารประกอบหลักคือ คาร์บอนจากแก๊ส CO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ ส่วนสารประกอบทางเคมีอื่น ๆ พืชได้รับโดยการดูดซึมมาจากดิน จากการสมดุลมวลทางเคมีของธาตุแต่ละตัว (stoichiometry) ทำให้สามารถบอกได้ว่าแก๊ส CO<sub>2</sub> จะถูกเปลี่ยนไปเป็นสารประกอบซึ่งรวมกันเป็นเนื้อเยื่อของพืช และสุดท้ายก็จะไปกระทบถึงสารอาหารที่มนุษย์ต้องการตามห่วงโซ่อาหาร การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของแก๊ส CO<sub>2</sub> นอกจากจะมีผลกระทบต่อพืชแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสัตว์กินพืชอีกด้วย ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการทำสมดุลมวลทางเคมีของธาตุแต่ละตัว

Davis and Paustian (2002) กล่าวว่า วัฏจักรคาร์บอนในดินเป็นแหล่งกำเนิดหลักของการกระจายแก๊ส N<sub>2</sub>O และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของไนโตรเจนจากการใส่ปุ๋ยมูลสัตว์หรือการปลูกพืชตระกูลถั่วซึ่งสารอินทรีย์ในดิน (soil organic matter: SOM) จะใช้บ่งบอกถึงสถานการณ์วิกฤตของสมดุลคาร์บอนของโลก และปัญหาภาวะเรือนกระจก โดยที่



$$\text{SOM} = \text{SOC} \times \text{conversion factor} \quad (2.20)$$

โดยที่ soil organic carbon: SOC = คาร์บอนจากสารอินทรีย์ที่อยู่ในดิน

เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบโดยรวมจากแก๊สเรือนกระจกที่ส่งผลให้โลกร้อน (global warming potential [GWP]) จะพบว่าเมื่อกำหนดให้แก๊ส CO<sub>2</sub> ทำให้โลกร้อนโดยมีค่า GWP = 1

แก๊ส N<sub>2</sub>O จะมีความรุนแรงมากกว่าแก๊ส CO<sub>2</sub> ถึง 300 เท่า ในขณะที่แก๊ส CH<sub>4</sub> จะมีความรุนแรงมากกว่าแก๊ส CO<sub>2</sub> ถึง 20 เท่า ดังนั้นถึงแม้ว่าแก๊ส N<sub>2</sub>O และ CH<sub>4</sub> จะมีความเข้มข้นน้อยกว่าแก๊ส CO<sub>2</sub> มาก ก็สามารถทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนได้ โดยสรุปประโยชน์ของการลดการกระจายของแก๊สเรือนกระจกเป็นการสงวนรักษาดินและน้ำ และเป็นการปรับปรุงระบบนิเวศวิทยาให้สมบูรณ์

ผลการศึกษาของ Sundquist et al. (1998); Stallard (1998) ได้ทำการวิเคราะห์สมดุลระหว่างคาร์บอนในดินกับคาร์บอนในบรรยากาศ พบว่าการใช้ที่ดินที่ไม่คำนึงถึงความสมดุลทางธรรมชาติมุ่งหาแต่ประโยชน์โดยไม่มีการพัฒนาและปรับปรุงดิน และสภาพของระบบนิเวศเป็นสาเหตุหนึ่งของการเพิ่มคาร์บอนในบรรยากาศเนื่องจากการปลดปล่อยคาร์บอนจากดินในรูปของแก๊ส CO<sub>2</sub> และ CH<sub>4</sub> สู่อากาศ ในปี 2002 ได้มีผลการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประชากรและพื้นที่เกษตรกรรมที่เวลาต่าง ๆ เพื่อศึกษาแบบจำลองพลวัตของวัฏจักรคาร์บอนของ Waisanen and Bliss (2002) พบว่า รูปแบบของการพัฒนาการเกษตรกรรมจะสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของสภาพอากาศ คุณสมบัติของดิน การเพิ่มขึ้นของประชากร การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงทางด้านพลังงานที่ใช้ในการขนส่ง และทำการเกษตร

Follett et al. (2001) ได้ออกแบบการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพของโครงการสงวนรักษาคาร์บอน ที่ถ่ายเทจากบรรยากาศมาอยู่ในดิน (conservation reserve program and C sequestration: CRP) โดยพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาประมาณ 13.9 ล้านเอเคอร์ อาศัยหลักการทางสถิติโดยคิด พื้นที่ได้เป็น 40% ของพื้นที่ทั้งหมดในโครงการที่ศึกษา ผลจากการศึกษาที่ค่าความเชื่อมั่นที่ 95% พบว่าอัตราของการถ่ายเทคาร์บอน (sequestration rates) จะเท่ากับ 500 660 และ 810 ปอนด์ของคาร์บอนจากสารอินทรีย์ในดิน (SOC) ต่อเอเคอร์ต่อปี ที่ความลึกจากผิวดิน 0 - 2 นิ้ว 0 - 4 นิ้ว และ 0 - 8 นิ้ว ตามลำดับ ถ้าคิดที่พื้นที่ 33.8 ล้านเอเคอร์ของโครงการ CRP ในสหรัฐอเมริกา จะพบว่า คาร์บอนจากสารอินทรีย์ในดินมีการถ่ายเท ประมาณ 8.5 - 13.5 ล้านตันต่อปี และเมื่อคิดพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา จะคิดเทียบเป็นการแพร่กระจายของแก๊ส CO<sub>2</sub> ได้เท่ากับ 47.3 ล้านตันของคาร์บอนต่อปี

Davidson and Ackerman (1993); Harden et al. (1999) กล่าวว่า การรบกวนดิน เช่น การไถดิน การขุดและการพรวนดินล้วนเป็นสาเหตุให้เกิดการลดลงของสารอินทรีย์คาร์บอนในดิน ซึ่งการลดลงสูงสุดประมาณ 20 - 40% ของสารอินทรีย์คาร์บอนในดินอาจเกิดจากการเพาะปลูก โดยที่การลดลงของคาร์บอนในดินอย่างรวดเร็วมีสาเหตุใหญ่มาจากการไม่ได้บำรุงรักษาดินและการไม่ป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน แบบจำลองที่ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนในดินจะมีความสมบูรณ์ได้จะต้องอาศัยข้อมูลในอดีต จากการสำรวจภาคสนามที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนมาประกอบการศึกษาด้วย

Malhi and Grace (2000) ได้ทำการศึกษาวิจัยพบว่า ป่าในภูมิภาคเขตร้อนมีความสำคัญและมีบทบาทหลักในปัจจุบันต่อความเข้มข้นของแก๊ส CO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ ทั้งจากแหล่งที่ก่อให้เกิดคาร์บอน (carbon source) จากการทำลายป่าในภูมิภาคเขตร้อนนี้ เพื่อใช้พื้นที่สำหรับการเพาะปลูกพืช โดยมีสัดส่วนถึง 55% ของป่าที่ถูกทำลายทั้งหมด หรือการทำลายป่าเพื่อต้องการพื้นที่ใช้ในการปศุสัตว์ ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ประมาณ 20% จากพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายทั้งหมด ดังนั้นจึงสามารถบอกได้ว่าการทำลายป่า แม้ว่าจะเพื่อการปลูกพืชหรือการปศุสัตว์จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกได้ นอกจากแหล่งที่ก่อให้เกิดคาร์บอนแล้วยังมีแหล่งเก็บสะสมคาร์บอนจากกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชอีกแหล่งที่มีบทบาทต่อความเข้มข้นของแก๊ส CO<sub>2</sub> ในบรรยากาศด้วย อย่างไรก็ตามถึงแม้จะทราบแหล่งที่มีบทบาทสำคัญต่อแก๊ส CO<sub>2</sub> ในบรรยากาศทั้ง 2 แหล่งก็ตาม ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรคาร์บอนของโลกก็ยังคงขาดความเข้าใจที่ชัดเจน

ความยั่งยืนของระบบฟาร์มจะสามารถได้รับความสำเร็จจากการใช้ผลการศึกษาพลวัตของ C N และ P ในลักษณะของการศึกษาทั้งระบบนิเวศของหมู่บ้านมากกว่าผลจากการศึกษาเฉพาะบางตำแหน่ง เนื่องจากจะทำให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของการเชื่อมต่อหน้าที่ระหว่างระบบการใช้ที่ดินจากการปลูกพืชกับการจัดการปศุสัตว์ และจะทำให้ได้ค่าต้นทุนปริมาณของคาร์บอน และสารอาหารที่ต้องการอย่างถูกต้องของแต่ละรูปแบบของการใช้ที่ดินจากขนาดของพื้นที่ คุณสมบัติดิน และประวัติของการปลูกพืช (Izac and Swift, 1994; Krogh, 1997; Landais and Lhoste, 1993)

Manlay et al. (2004) ได้ศึกษาการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสารอินทรีย์ในระบบฟาร์มทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ของแอฟริกาตะวันตก โดยได้ศึกษาการเคลื่อนที่ของ C, N และ P จากการใช้แหล่งสารอินทรีย์ที่แตกต่างกันในปริมาณที่ไม่เท่ากันของแต่ละหมู่บ้านของการใช้ที่ดิน พบว่า การปศุสัตว์ การเก็บเกี่ยวพืช การเก็บสะสมกองไม้และกองฟางข้าว จะทำให้เกิด C เคลื่อนที่ออกจากพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ของหมู่บ้านเท่ากับ 59% 27% และ 14% ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นว่าการปศุสัตว์มีส่วนทำให้เกิดการกระจายของ C มากที่สุดของกิจกรรมทางการเกษตร แต่ใน

ที่สุดแล้วกิจกรรมการปลูสดั้วก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียน C, N และ P คืนกลับสู่ดินมากที่สุดด้วยเช่นกันคือประมาณ 80% ของการเคลื่อนที่ของสารอินทรีย์ออกจากพื้นที่ ผลลัพธ์ของการเคลื่อนที่นี้และการกลับคืนสู่พื้นที่ของชีวมวลโดยเฉพาะ C ที่มีการหมุนเวียนสูง โดยจะกลายมาเป็นส่วนประกอบหลักของพืช ส่วน N และ P จะสูญเสียออกจากระบบเพียงประมาณ 4 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อเฮกตาร์ต่อปี (kg.N/ha/yr) และ 1 กิโลกรัม ฟอสฟอรัสต่อเฮกตาร์ต่อปี (kg.P/ha/yr) ตามลำดับเท่านั้น นอกจากนี้การศึกษานี้ยังแนะนำว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความยั่งยืนของระบบฟาร์ม เนื่องจากเกิดการเสียดุลระหว่างอุปสงค์ และอุปทานของแหล่งทรัพยากรสารอินทรีย์

### 2.6.3 แบบจำลองประเมินสถานการณ์คาร์บอน จากการใช้พื้นที่และผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

Pfaff et al. (2000) กล่าวว่าแบบจำลองสถานการณ์ที่เคยมีผู้ศึกษาไว้แล้ว และงานผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องก่อนนั้น ไม่ได้ศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และระบบนิเวศวิทยาไว้ จึงได้เสนอปัจจัยที่ควรต้องคำนึงในการสร้างวิธีการประมาณค่าคาร์บอน คือ


- การวิเคราะห์เศรษฐกิจของการใช้ที่ดินจากข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้องเป็นจริง
- การวิเคราะห์ระบบนิเวศวิทยา จากความน่าเชื่อถือของการวัดหรือการประเมิน

คาร์บอนจากระบบนิเวศ

ดังนั้น การวิเคราะห์คาร์บอนด้วยการประเมินปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์โดยอาศัยการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ ร่วมกับการประเมินการสะสมคาร์บอนต่อหน่วยพื้นที่ซึ่งจะวัดจากคาร์บอนที่อยู่เหนือดินและคาร์บอนจากดินในแต่ละพื้นที่ โดยจะวัดในลักษณะของพลวัตคาร์บอนที่เปลี่ยนแปลงไปตามการใช้ที่ดิน แบบจำลองที่ได้จึงจะมีคุณภาพสูงซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบจากทางเลือกของการใช้ที่ดินคือ การทำลายป่า การขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรม การขยายตัวของเมือง การเจริญเติบโตหรือการเพิ่มจำนวนประชากรและการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ

Kerr, Liu, Pfaff, and Hughes (2003) ได้ศึกษานโยบายเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ป่าเขตร้อนชื้น ที่มีศักยภาพในการช่วยบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเพื่อต้องการพยากรณ์ภาพรวมของการใช้ประโยชน์ที่ดินและภาพรวมของการเก็บกักคาร์บอน (carbon storage) ในระยะยาว ซึ่งแบบจำลองที่ศึกษาจะเกี่ยวกับพลวัตของระบบการใช้ที่ดินของมนุษย์และแหล่งกักเก็บคาร์บอนในแต่ละระบบนิเวศที่มีความสัมพันธ์กัน (โดยแบบจำลองนี้จะเป็นภาพรวมในระดับชาติและข้อมูลที่ใช้ศึกษาอยู่ในช่วงระยะเวลามากกว่า 50 ปี) การศึกษาแบบจำลองนี้ประกอบด้วยกระบวนการทางนิเวศวิทยา ตัวแปรหรือข้อมูลจากการเก็บภาคสนาม ข้อมูลแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ การประมาณการโดยอาศัยข้อมูลในอดีตที่เป็นจริง ซึ่งแบบจำลองที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบภาพรวมของคาร์บอนจากระบบนิเวศและระบบเศรษฐกิจ

(Integrated Carbon Ecology and Economy [ICEE] model) สามารถแสดงสรุปถึงองค์ประกอบที่ศึกษาได้ดังรูปที่ 2.14 จากรูปการพยากรณ์ จะได้เส้นแสดงค่าความคุ้มค่าจากการดำเนินงานการใช้ที่ดินตามปกติ (baselines) และการประมาณค่าการลดการกระจายของคาร์บอนจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและปัจจัยความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในภูมิภาคป่าเขตร้อนที่มีส่วนทำให้เกิดการบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ซึ่งประโยชน์ของการประเมินด้วยกิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์จะช่วยเพิ่มความถูกต้อง



รูปที่ 2.14 แบบจำลองความสัมพันธ์องค์ประกอบคาร์บอนจากระบบนิเวศและระบบเศรษฐกิจ (จาก “Carbon dynamics and land-use choices: building a regional-scale multidisciplinary model”, โดย Kerr, Liu, Pfaff and Hughes, 2003, Journal of Environmental Management)

Plant and Bouman (1999) ได้ศึกษาแบบจำลองการจัดการการเปลี่ยนแปลงของทุ่งหญ้าที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ พบว่าการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินร่วมกับ การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน จะเป็นตัวช่วยบ่งบอกขั้นต้นถึงการกระจายของแก๊ส  $N_2O$  และ  $NO$  ในภูมิภาคนั้น ซึ่งการใช้ที่ดินเป็นเรื่องที่ซับซ้อนระหว่างเทคโนโลยี เศรษฐกิจโลก สภาพการค้า และนโยบายการเมือง

Howden et al. (1999) ได้ศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงแก๊ส CO<sub>2</sub> จากฟาร์มปศุสัตว์ ด้วยการจำลองสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของแก๊ส CO<sub>2</sub> ในสภาวะอากาศต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 4 เหตุการณ์โดยใช้โปรแกรม GRASP คือ เมื่อมีระดับความเข้มข้นของแก๊ส CO<sub>2</sub> เพิ่มขึ้น 2 เท่า เมื่อมีระดับความเข้มข้นของแก๊ส CO<sub>2</sub> เพิ่มขึ้น 2 เท่าและเพิ่มอุณหภูมิด้วย เมื่อมีระดับความเข้มข้นของแก๊ส CO<sub>2</sub> เพิ่มขึ้น 2 เท่าและเพิ่มอุณหภูมิด้วยในสภาพอากาศแห้งและเหตุการณ์สุดท้ายคือเมื่อมีระดับความเข้มข้นของแก๊ส CO<sub>2</sub> เพิ่มขึ้น 2 เท่าและเพิ่มอุณหภูมิด้วยในสภาพอากาศเปียกชื้น โดยผลการศึกษพบว่า การเพิ่มขึ้นของแก๊ส CO<sub>2</sub> จะก่อให้เกิดประโยชน์กับการเจริญงอกงามของหญ้าที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์และพืชปกคลุมดิน, ส่วนผลของการเพิ่มแก๊ส CO<sub>2</sub> ที่มีต่อการเจริญของหญ้าหรือพืช ในสภาพอากาศแห้งจะดีกว่าในสภาพอากาศเปียกชื้น เนื่องจากไนโตรเจนเป็นปัจจัยที่มีจำกัดในดิน ส่วนเหตุการณ์ที่มีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิรวมกับการเพิ่มขึ้นของแก๊ส CO<sub>2</sub> จะมีผลทำให้ความสามารถในการผลิตสัตว์มีมากขึ้น เนื่องจากมีจำนวนวันที่สามารถเกิดการเจริญเติบโตได้เพิ่มขึ้นในเดือนที่มีอากาศเย็น และสุดท้ายในสภาพที่มีอากาศเปียกชื้นหรือฝนตก มีผลในเชิงบวกเล็กน้อย แต่ในทางตรงกันข้ามสภาพอากาศแห้งจะกระทบกับการเจริญของพืชและการผลิตสัตว์ในทางลดลง

#### 2.6.4 การเปลี่ยนแปลงคาร์บอนจากการใช้พื้นที่

Houghton and Hackler (2000) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนในระบบนิเวศบนบก และการประมาณการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลพืชหรือธัญพืชที่ปกคลุมดิน โดยประเมินการดูดซับ และการปลดปล่อยคาร์บอนจากการเกษตรกรรมและป่า จากการคำนวณพบว่าการปลดปล่อยคาร์บอนทั้งหมดในช่วงปีค.ศ. 1700 - 1990 เป็น  $32.6 \times 10^{15}$  กรัมของคาร์บอน การดูดซับคาร์บอนในบริเวณพื้นที่ป่าไม้ประมาณ  $29 \times 10^{15}$  กรัมของคาร์บอน และผลการศึกษาสรุปได้ว่าเหตุผลสำคัญของการเปลี่ยนแปลงแก๊ส CO<sub>2</sub> ในบรรยากาศเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ซึ่งสอดคล้องกับแบบจำลองของ Ramankutty and Foley (1999) ที่ได้ศึกษาการใช้พื้นที่ระหว่างพื้นที่ที่เป็นทุ่งหญ้ากับพื้นที่ที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ซึ่งสัมพันธ์กับข้อมูลประชากรในการพัฒนาหรือปรับปรุงการใช้พื้นที่ที่เป็นฟาร์มและพื้นที่ในการปลูกพืชโดยอาศัยภาพถ่ายดาวเทียมช่วยในการจำแนกแผ่นดินที่มีพืชปกคลุมก่อนที่จะมีมนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐาน

Reiners et al. (2002) รายงานว่าพื้นที่เขตร้อนชื้นจะเป็นแหล่งใหญ่ของการปลดปล่อย N<sub>2</sub>O และ NO สู่อากาศ อัตราการแพร่กระจายจะอยู่ในช่วงกว้างตามสภาพของท้องถิ่น และลักษณะการใช้ที่ดิน ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามการขยายตัวของการตั้งถิ่นฐาน การศึกษานี้เป็นการประมาณการแพร่กระจายของแก๊ส N<sub>2</sub>O และ NO ทั้งในอดีตและในอนาคต จากที่ดิน 0.5 ล้านเอเคอร์ของ Costa Rica ซึ่งมีการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างรวดเร็ว โดยเชื่อมโยง

ระหว่างข้อมูลสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับอากาศกับสมการการจำลองสถานการณ์ระบบนิเวศวิทยา ซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงจากป่ามาเป็นทุ่งหญ้าที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแก๊ส  $N_2O$  และ  $NO$  ในภูมิภาคนี้ ซึ่งทราบได้จากข้อมูลการเคลื่อนไหวของแก๊ส  $N_2O$  และ  $NO$  ทั้งในอดีตและปัจจุบันของภูมิภาคนี้ ส่วนการเปลี่ยนแปลงของแก๊ส  $N_2O$  และ  $NO$  ดูได้จากการควบคุมการใช้ปุ๋ยและการขยายการจัดการความเข้มข้นของการปลูกพืช ส่วนอายุของทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ใช้ชี้ขาดถึงความเป็นไปได้ ในการหาการเปลี่ยนแปลงของแก๊ส  $N_2O$  สำหรับภูมิภาค

Keller, Veldkamp, Weitz, and Reiners (1993) รายงานผลการศึกษากการเปลี่ยนแปลงของแก๊ส  $N_2O$  และ  $NO$  จากชนิดของพืชที่คลุมดินและดินที่ไม่มีพืชคลุมดินไว้ตามช่วงเวลาต่างๆ ไว้ว่า ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ใหม่จะมีการกระจายของแก๊ส  $N_2O$  และ  $NO$  สูงชั่วคราว หลังจาก 15 ปี อัตราการกระจายก็จะลดลงอยู่ในระดับต่ำโดย

- การเปลี่ยนแปลงของแก๊ส  $N_2O$  ของทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เก่า มีค่าเฉลี่ย = 2.1 กิโลกรัม ในโตรเจนต่อปีต่อ 2.471 เฮกเตอร์

- การเปลี่ยนแปลงของแก๊ส  $N_2O$  ของทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ใหม่ มีค่าเฉลี่ย = 21 กิโลกรัม ในโตรเจนต่อปีต่อ 2.471 เฮกเตอร์

- การเปลี่ยนแปลงของแก๊ส  $NO$  ของทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เก่า และดินที่ไม่มีสิ่งปกคลุมหรือพื้นที่ที่เป็นป่า มีค่าเฉลี่ย = 0.9 กิโลกรัม ในโตรเจนต่อปีต่อ 2.471 เฮกเตอร์

- การเปลี่ยนแปลงของแก๊ส  $NO$  ของทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ใหม่ มีค่าเฉลี่ย = 8.9 กิโลกรัม ในโตรเจนต่อปีต่อ 2.471 เฮกเตอร์


ปัจจัยหลักหรือแหล่งกำเนิดหลักของการเพิ่มแก๊ส  $N_2O$  คือการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในภูมิภาคเขตร้อนชื้น (Bouwman, 1998) ซึ่งการเพิ่มขึ้นของแก๊ส  $N_2O$  จะเกิดจากการเปลี่ยนโครงสร้างของป่าหรือตัดไม้ทำลายป่า แล้วเปลี่ยนเป็นทุ่งหญ้าที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ (Veldkamp et al., 1999; Verchot et al., 1999) หรือ การทำการเกษตรกรรม และการเพาะปลูก (Crill et al., 2000) รูปแบบของการพัฒนาการเกษตรกรรมอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงป่ากลายเป็นทุ่งหญ้าที่ใช้เลี้ยงสัตว์ และพื้นที่เพาะปลูก เช่นในพื้นที่ตอนเหนือของ Costa Rica พื้นที่ป่าลดลงจาก 73% ไปเป็น 6% ภายในเวลา 24 ปี (Veldkamp, Weitz, Staritsky, and Huising, 1992)

### 2.6.5 งานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมคิด สัตตะยะนันท์ วสันต์ จอมภักดี และสัมพันธ์ ไชยเทพ (2535) พบว่า การใช้ประโยชน์จากแก๊สชีวภาพสามารถนำมาเป็นแก๊สเชื้อเพลิงใช้ทดแทนหรือนำมาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล เป็นต้น โดยการปรับปรุงอุปกรณ์หรือเครื่องยนต์ที่เคยใช้แก๊สหุงต้มหรือน้ำมันเชื้อเพลิงบางจุดก็จะสามารถใช้แก๊สชีวภาพได้ ซึ่งผลการทดลองใช้แก๊ส

ชีวภาพที่มีแก๊ส  $\text{CH}_4$  อยู่ประมาณ 59% โดยปริมาตรกับอุปกรณ์และเครื่องยนต์เช่นตู้เย็นขนาด 8.5 ลูกบาศก์ฟุต ซึ่งใช้แก๊สหุงต้มสามารถใช้แก๊สชีวภาพแทนได้ ด้วยการขยายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนมหนูเป็น 2 มม. ความดันแก๊สชีวภาพ 20 มิลลิบาร์ สิ้นเปลืองแก๊สชีวภาพประมาณ 173 ลิตรต่อชั่วโมง

ศุวสา กานตวนิชกูร (2538) ได้อธิบายไว้ว่า การเกิดแก๊สชีวภาพสามารถนำมาสัมพันธ์กับปริมาณและชนิดของสารอินทรีย์ที่ถูกใช้ไป เช่น การบำบัด COD 1 กิโลกรัมจะได้แก๊สชีวภาพ 0.35  $\text{m}^3$  ที่มาตรฐานของอุณหภูมิและความดัน STP ในขณะที่สารอินทรีย์คาร์บอน 1 กิโลกรัมจะให้แก๊สชีวภาพ 1.87  $\text{m}^3$  ที่ STP ส่วนประกอบและปริมาณของแก๊สที่เกิดจากการหมักอย่างสมบูรณ์ สามารถคำนวณได้ทางทฤษฎีโดยใช้สมการดังนี้



โดยที่ c, h, o, n และ s เป็นจำนวนของอะตอมของคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน และซัลเฟอร์ตามลำดับ

หากไม่คำนึงถึงแก๊สอื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งในแก๊สชีวภาพที่เกิดในปริมาณน้อย และใช้สูตรอย่างง่ายในการคำนวณจะได้ว่า คาร์โบไฮเดรตจะให้  $\text{CO}_2$  73% และ  $\text{CH}_4$  27% ไขมันจะให้  $\text{CO}_2$  52% และ  $\text{CH}_4$  48% โปรตีนจะให้  $\text{CO}_2$  73% และ  $\text{CH}_4$  27% โดยปริมาตรรวมของแก๊สชีวภาพที่เกิดจากสารอาหารแต่ละอย่างนี้คือ 0.75, 1.44, และ 0.98 ลูกบาศก์เมตรต่อกิโลกรัมน้ำหนักแห้งตามลำดับ (Buswell and Mueller, 1952) นอกจากนี้ Casey (1981) ก็ได้ทำการศึกษาการเกิดแก๊สชีวภาพและสัดส่วนของแก๊ส  $\text{CH}_4$  และ  $\text{CO}_2$  ที่เป็นส่วนประกอบ จากการย่อยสลายคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ดังแสดงในตารางที่ 2.15

ตารางที่ 2.15 ปริมาณแก๊สชีวภาพและส่วนประกอบของแก๊สชีวภาพที่เกิดจากการย่อยสลายคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน

สารอาหาร	ปริมาณแก๊สที่เกิด (ม <sup>3</sup> /กก.)	ส่วนประกอบ (%)	
		CH <sub>4</sub>	CO <sub>2</sub>
คาร์โบไฮเดรต	0.8	50	50
โปรตีน	0.7	70	30
ไขมัน	1.2	67	33

หมายเหตุ : จาก “Developments in anaerobic digestion”, โดย Casey, 1981, Transactions of the Institute of Engineers in Ireland, 105 : 25-32.

นอกจากนี้ยังได้มีการกล่าวถึงการใช้ประโยชน์จากแก๊สชีวภาพในด้านพลังงาน ซึ่งสามารถใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงจาก ฟืน ถ่านหิน น้ำมัน แก๊สหุงต้ม และไฟฟ้าได้ โดยแก๊สชีวภาพจำนวน 1 ลูกบาศก์เมตร สามารถนำไปใช้ได้ดังนี้

- ให้ค่าความร้อน 3,000 - 5,000 กิโลแคลอรี ความร้อนนี้จะทำให้น้ำ 130 กิโลกรัมเดือดได้
- ใช้กับตะเกียงแก๊สขนาด 60 - 100 วัตต์ ลูกใหม่ได้ 5 - 6 ชั่วโมง หรือผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 1.8 หน่วย (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)
- ใช้กับเครื่องยนต์ 2 แรงม้า ใช้นาน 1 ชั่วโมง หรือเทียบเท่าน้ำมันดีเซล 0.6 ลิตร หรือเบนซิน 0.67 ลิตร
- สามารถหุงต้มได้ โดยเทียบเท่าแก๊สหุงต้ม (LPG) 0.46 กิโลกรัม หรือฟืนไม้ 1.5 กิโลกรัม
- ทดแทนน้ำมันเตาโดยแก๊สชีวภาพจำนวน 1 ลูกบาศก์เมตรเทียบเท่าน้ำมันเตา 0.5 ลิตร

เกรียงศักดิ์ อุคมสิน โรจน์ (2543) ได้อธิบายไว้ว่า แก๊สชีวภาพที่ผลิตได้จากระบบบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน มีอยู่ด้วยกันหลายชนิดได้แก่ แก๊ส CH<sub>4</sub> ประมาณ 70% แก๊ส CO<sub>2</sub> ประมาณ 30% และแก๊สอื่น ๆ อีกเล็กน้อยคือ แก๊ส N<sub>2</sub> H<sub>2</sub> H<sub>2</sub>S ฯลฯ ปริมาณแก๊สที่ผลิตออกมาได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของสารอินทรีย์ โดยแก๊สที่ผลิตได้นี้สามารถนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้คือ 0.5 ม<sup>3</sup> ของแก๊สที่ผลิตได้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 1.0 กิโลวัตต์ - ชม. ต่อไปนี้จะได้แสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการคำนวณหาข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตความร้อนและกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นข้อมูลที่เก็บได้จากการทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 2.16 และ 2.17



ตารางที่ 2.16 ข้อมูลเกี่ยวกับแก๊ส CH<sub>4</sub> ที่ผลิตได้

สิ่งที่ก่อให้เกิดแก๊ส CH <sub>4</sub>	อัตราแก๊ส CH <sub>4</sub> *
น้ำมัน (850 กก./ม <sup>3</sup> ที่ 25 °ซ ความดัน 1 บรรยากาศ)	1 ม <sup>3</sup> CH <sub>4</sub> / 0.84 กก.น้ำมัน
น้ำมัน	1 ม <sup>3</sup> CH <sub>4</sub> / 1.0 ลิตร น้ำมัน
ไขมัน (fats)	0.75 ม <sup>3</sup> CH <sub>4</sub> / กก.ไขมัน
คาร์โบไฮเดรต	0.42 ม <sup>3</sup> CH <sub>4</sub> / กก.คาร์โบไฮเดรต
โปรตีน	0.47 ม <sup>3</sup> CH <sub>4</sub> / กก.โปรตีน
ซีโอดี (COD)	0.25 กก. CH <sub>4</sub> / กก.COD
ซีโอดี (COD)	0.38 ม <sup>3</sup> CH <sub>4</sub> / กก.COD

หมายเหตุ : \* 1 ม<sup>3</sup> แก๊ส CH<sub>4</sub>หนัก 0.667 กิโลกรัม ณ สภาวะมาตรฐาน 25 °ซ 1 ความดันบรรยากาศ (จากหนังสือวิศวกรรมกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 4, เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, 2543, มหาวิทยาลัยรังสิต)

ตารางที่ 2.17 ข้อมูลพลังงานที่ได้จากแก๊ส CH<sub>4</sub>

ค่าพลังงาน*	ค่าพลังงานที่เกิดขึ้น				
	ปริมาณแก๊ส CH <sub>4</sub> ในแก๊สทั้งหมด (%)				
	50	60	70	80	100
ค่าความร้อน (กิโลจูล/ม <sup>3</sup> แก๊ส)	17500	21000	24500	28000	35000
ค่าพลังงานไฟฟ้า:					
กระแสไฟฟ้าที่ได้ (กิโลวัตต์. ชม./ม <sup>3</sup> )	1.5	1.7	2.0	2.3	2.9
ความร้อนที่เกิดขึ้น (กิโลวัตต์. ชม./ม <sup>3</sup> )	2.5	2.9	3.4	3.9	4.9
ความสูญเสีย (กิโลวัตต์. ชม./ม <sup>3</sup> )	1.0	1.1	1.3	1.5	1.9

หมายเหตุ : \* 1 ม<sup>3</sup> CH<sub>4</sub> ได้ 35000 กิโลจูล และได้ 9.7 กิโลวัตต์. ชม.

(โดย 1 ม<sup>3</sup> CH<sub>4</sub> สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ซึ่งประกอบด้วย

- 1) 30% เป็นกระแสไฟฟ้า 2.9 กิโลวัตต์. ชม.
- 2) 50% เป็นความร้อน 4.9 กิโลวัตต์. ชม. และ
- 3) 20% เป็นความสูญเสีย 1.9 กิโลวัตต์. ชม.)

(จากหนังสือ วิศวกรรมกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 4, เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, 2543, มหาวิทยาลัยรังสิต)

นภาพร พานิช และคณะ (2547) กล่าวว่าไว้ว่า การเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า (kWh/kg) จากแก๊สหุงต้ม แกลบ และไม้ฟืนพบว่า แก๊สหุงต้มมีประสิทธิภาพการเผาไหม้สูงเกิดเขม่าน้อย ไม่มีขี้เถ้าเกิดขึ้นจากการเผาไหม้ ซึ่งเชื้อเพลิงแก๊สเป็นเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศน้อยที่สุด โดยคุณสมบัติของแก๊สปิโตรเลียมเหลวจะให้ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง 11,832 - 12,034 Kcal/kg หรือเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า 13.70 kWh/kg ในขณะที่แกลบ 1 กิโลกรัมเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดเท่ากับ 0.49 kWh หรือแกลบ 1 kg เทียบเท่าพลังงาน 14.27 MJ/kg หรือ 3,410.611 Kcal/kg (กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน, 1999) ส่วนเศษไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อปานกลางมีน้ำหนัก  $748.23 \pm 116.42$  kg/m<sup>3</sup> ประมาณ 0.5 ลูกบาศก์เมตรเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า 0.21 kWh/kg ดังนั้นการใช้แก๊ส LPG ในการต้มน้ำร้อนจะให้พลังงานความร้อนสูงกว่า และมีมลพิษทางอากาศต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นฟืนหรือแกลบ

ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ (2551) กล่าวว่า กระบือและโคพื้นเมืองหรือลูกผสมบราห์มัน ซึ่งมีจำนวนโดยประมาณคิดเป็น 70% ของโคเนื้อทั้งหมดโดยเกษตรกรจะเลี้ยงเป็นเหมือนกระบูกอมนสินในลักษณะปล่อยตามพื้นที่สาธารณะ ท้องนา ช้างถนน ที่รกร้าง ป่าชายเขา รวมทั้งบนภูเขา ลักษณะการเลี้ยงเป็นการไล่ต้อนไปตามแหล่งอาหารธรรมชาติโดยไม่มีการเสริมอาหารชั้น และไม่มีการกำหนดเวลาในการขายเพื่อนำเข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ที่แน่นอน การขายโคจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเกษตรกรต้องการใช้เงินจริง ๆ (กันยา ตันติวิสุทธิกุล, 2551)

ธีรรงค์ เมฆโหรา (2551) ได้ทำการศึกษาประเมินมูลค่าของโคไทยพื้นเมืองและลูกผสมบราห์มันต่อตัวโดยพื้นที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาพบว่า ระยะเวลาสำหรับโครุ่นไทยพื้นเมืองควรอยู่ที่ 1 - 1.5 ปี ส่วนลูกผสมบราห์มันควรอยู่ที่ 1.5 ปี

Ichhponani et al. (1971) and Kawashima et al. (2000) กล่าวว่ากระบือเป็นสัตว์ชนิดที่มีความสามารถในการย่อย และใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบกลุ่มเซลลูโลสได้ดีกว่าโคเนื้อ ซึ่งสอดคล้องกับ Czerkawski ให้ข้อมูลไว้ในหนังสือ An Introduction to Rumen Studies ว่าปริมาณอาหารที่สัตว์กินเท่ากัน 3600 กก./ตัว/ปี โคเนื้อจะมีการขับไล่แก๊ส CH<sub>4</sub> (Eructation) มากกว่ากระบือโดยจะเกิดแก๊ส CH<sub>4</sub> จากโคเนื้อและกระบือเท่ากับ 91 และ 73 ลูกบาศก์เมตร/ตัว/ปี ตามลำดับ (Czerkawski, 1986)

เมธา วรรณพัฒน์ (2533) กล่าวว่าไว้ในหนังสือโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องว่า อาหารหยาบหรืออาหารชั้นที่ถูกหมักในรูเมนจะให้ผลผลิตสุดท้ายแตกต่างกัน โดยเฉพาะอาหารหยาบจะได้กรดอะซิเตตสูงกว่าอาหารชั้น และทำให้อัตราส่วนของกรดโพรพิอเนตต่ออะซิเตตต่ำกว่าในอาหารชั้น ซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดแก๊ส CH<sub>4</sub> สูงตามไปด้วย หรือกล่าวได้ว่าอาหารกลุ่มที่มีเซลลูโลส เช่น หญ้าแห้งหรือฟางจะมีส่วนสนับสนุนการผลิตแก๊ส CH<sub>4</sub> มากกว่าอาหารพวกแป้ง (Moe and Tyrell, 1979)

นอกจากนี้จากหลักการสมดุลคาร์บอนโดยเฉพาะการตรึงคาร์บอน ( $C_{\text{fixation}} = C_{\text{plant}} - C_{\text{emitted}}$ ) มีแนวทางการวิเคราะห์ที่คล้ายกับการวิเคราะห์โภชนะของสัตว์เคี้ยวเอื้องด้วยหลักการทางพลังงานโดย

$$\text{พลังงานที่ข้อยได้} = \text{พลังงานรวมในอาหาร (GE)} - \text{พลังงานที่สูญเสียในมูล (FE)} \quad (2.22)$$

และการวิเคราะห์อัตราส่วนของการตรึงคาร์บอนต่อคาร์บอนในพืชอาหารที่สัตว์กินจะสอดคล้องกับอัตราส่วนของพลังงานใช้ประโยชน์ได้ (metabolizable energy; ME) ต่อพลังงานรวมในอาหาร (gross energy; GE) (เมธา วรณพัฒน์, 2533) โดยที่

$$\text{ME} = \text{GE} - (\text{FE} + \text{พลังงานที่สูญเสียใน \{ปัสสาวะ[UE] + CH_4\}}) \quad (2.23)$$

Czerkawski (1986) ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า การเกิดแก๊ส  $\text{CH}_4$  ในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอื้องจากการย่อยอาหารหยาบจะมากกว่าอาหารข้น โดยการย่อยอาหารหยาบจะเกิดแก๊ส  $\text{CH}_4$  1.75 โมลต่อกิโลกรัม ส่วนอาหารข้นจะทำให้เกิดแก๊ส  $\text{CH}_4$  1.40 โมลต่อกิโลกรัมที่โคนเนื้อมีการผลิตแก๊ส  $\text{CH}_4$  250 ลิตรต่อตัวต่อวัน

Chaturvedi et al. (1973) พบว่า การสับฟางและแช่น้ำค้างคืนทำให้โคและกระบือสามารถกินฟางได้มากขึ้น ซึ่งทำให้การผลิตกรดไขมันระเหยได้สูงขึ้นด้วย ซึ่งการแปรรูปอาหารหยาบเช่นการสับหรือหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ แทนการใช้อาหารข้นเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายก็จะสามารถช่วยให้การย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้องเพิ่มขึ้นและลดการเกิดแก๊ส  $\text{CH}_4$  ได้เพราะว่าอาหารละเอียดจะทำให้สัตว์สามารถกินหญ้าแห้งหรือฟางได้มากขึ้น ระยะพักตัวของอาหารสั้นหรืออัตราการไหลผ่านของอาหารได้เร็วทำให้อาหารผ่านออกหรือพักตัวในกระเพาะรูเมนน้อยลง ซึ่งทำให้จุลินทรีย์มีเวลาในการเข้าย่อยสลายน้อยลงนั่นคือแก๊ส  $\text{CH}_4$  จะลดลงได้ (Reid, 1962; Church, 1979; Minson, 1980) นอกจากนี้ เมธา วรณพัฒน์ได้กล่าวไว้ว่า การบดหรือการสับอาหารให้เล็กลงนั้นจะมีผลทำให้ผลผลิตกรดไขมันระเหย และแก๊ส  $\text{CH}_4$  ในกระเพาะรูเมนเปลี่ยนไป โดยสัดส่วนของกรดโพธิอเนตต่ออะซิเตทจะเพิ่มขึ้นและปริมาณแก๊ส  $\text{CH}_4$  ลดลง (เมธา วรณพัฒน์, 2533)

## บทที่ 3

### วิธีดำเนินการวิจัย


#### 3.1 ชนิดของปศุสัตว์ และพื้นที่เป้าหมายในการศึกษา

การดำเนินการวิจัยศึกษาการถ่ายเทมวลคาร์บอนสำหรับการผลิตอาหารจากการทำฟาร์มปศุสัตว์ในแต่ละอำเภอ และกิ่งอำเภอของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การศึกษาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน จึงพิจารณาเลือกชนิดของปศุสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและเน้นศึกษาที่ประเภทของสัตว์กินพืชเป็นหลักเพื่อพิจารณาการถ่ายเทมวลคาร์บอนจากพืชอาหารสัตว์มาเป็นเนื้อนมและไข่จากสัตว์แต่ละชนิด โดยสามารถแบ่งชนิดของปศุสัตว์ที่ต้องการศึกษาออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังแสดงในตารางที่ 3.1 ซึ่งมีประเด็นในการพิจารณาดังนี้ กลุ่มที่ 1 สัตว์บกสี่เท้าที่กินพืชเป็นอาหาร โดยเฉพาะหญ้าหรือฟางและสุกรที่เลี้ยงในระบบฟาร์มซึ่งทราบชนิดและปริมาณการกินอาหารที่แน่นอนเนื่องจากสุกรเป็นแหล่งอาหารประเภทเนื้อที่สำคัญของมนุษย์ และกลุ่มที่ 2 สัตว์ปีกได้แก่ ไก่เนื้อและไก่ไข่ที่เลี้ยงในระบบฟาร์มซึ่งทราบชนิดและปริมาณการกินอาหารที่แน่นอนเพราะเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของมนุษย์เช่นเดียวกับสุกร

การศึกษานี้ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการศึกษา โดยสามารถแสดงตำแหน่งและรายชื่อของทั้ง 26 อำเภอและ 6 กิ่งอำเภอ (จะรวมเรียกเป็น 32 อำเภอ) ของจังหวัดนครราชสีมาและตัวอย่างความหนาแน่นของฟาร์มปศุสัตว์ในแต่ละอำเภอ และกิ่งอำเภอของปี 2548 (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา, 2548) ตามที่ระบุไว้ในรูปที่ 3.1 โดยกระบวนการศึกษานี้เกี่ยวข้องกับการถ่ายเทปริมาณคาร์บอนจากพืชที่เป็นผู้ผลิตขั้นต้นไปสู่สัตว์โดยเฉพาะสัตว์กินพืชเป็นหลักซึ่งเป็นผู้บริโภคขั้นต้นในห่วงโซ่อาหารและการแปรรูปคาร์บอนจากพืชอาหารสัตว์ที่ถูกสัตว์กินพืชเหล่านี้กินมาเป็นคาร์บอนในรูปของอาหารประเภทเนื้อหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้แก่ นม ไข่ มูลสัตว์ โดยอาศัยข้อมูลปริมาณสัตว์และรายละเอียดในการทำปศุสัตว์แต่ละชนิดจากฟาร์มปศุสัตว์ต่าง ๆ โรงฆ่าสัตว์ สัตว์แพทย์ และสัตว์บาล รวมทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในแต่ละอำเภอ และกิ่งอำเภอของจังหวัดนครราชสีมา และจากการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในพื้นที่เป้าหมายที่ศึกษาทั้ง 26 อำเภอและ 6 กิ่งอำเภอ

ตารางที่ 3.1 ชนิดของปศุสัตว์ที่มีความสำคัญของจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่ม	ชนิดของปศุสัตว์	ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ
กลุ่มที่ 1 (สัตว์บกสี่เท้า กินพืช)	โคนม	นม
	โคเนื้อ	เนื้อ
	กระบือ	เนื้อ
	สุกร	เนื้อ
กลุ่มที่ 2 (สัตว์ปีก)	ไก่เนื้อ	เนื้อ
	ไก่ไข่	ไข่



รูปที่ 3.1 ตำแหน่งพื้นที่ในการศึกษาทั้ง 26 อำเภอ และ 6 กิ่งอำเภอ  
(จาก [ออนไลน์] ได้จาก [http://www.dld.go.th/pvlo\\_nak](http://www.dld.go.th/pvlo_nak),  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา, 2548)

### 3.2 จำนวนตัวอย่าง สถานที่ในการเก็บตัวอย่าง และวิธีการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

การสำรวจด้วยตัวอย่างเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงบางส่วนของประชากรเพื่อเป็นการประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ประชากร หมายถึง ปริมาณของปศุสัตว์แต่ละชนิดและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ การเลือกตัวอย่างจากประชากรทำได้หลายวิธีแต่ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็มีหลักเกณฑ์เพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีของประชากร นั่นคือตัวอย่างที่ถูกเลือกมาควรประกอบไปด้วยลักษณะต่าง ๆ ของประชากรครบถ้วน ดังนั้นในการศึกษานี้ทำการคำนวณหาขนาดตัวอย่างจากการประมาณค่าเฉลี่ยประชากรที่ขนาดความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5% (ปรารธนา ยศสุข, 2551) โดยใช้วิธีการกำหนดขนาดตัวอย่างของ Yamane (1973) เนื่องจากเป็นวิธีการหาขนาดตัวอย่างที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการศึกษาวิจัย (ประธาน เกิดกล้า, 2549) เพื่อหาจำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดซึ่งส่วนมากได้กำหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับให้เกิดระหว่างค่าจริงและค่าประมาณอยู่ที่ร้อยละ 0.05 โดยใช้สูตรการกำหนดขนาดตัวอย่างของ Yamane (1973) ตามที่ได้นำเสนอไว้แล้วในสมการที่ 2.16 หรือตารางที่ 2.5

จากวิธีการหาจำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดของ Yamane (1973) ที่ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างอยู่ที่ร้อยละ 0.05 หรือที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % จะได้จำนวนตัวอย่างของฟาร์มและจำนวนตัวอย่างของสัตว์ชนิดต่าง ๆ ดังตารางที่ 3.2 และ 3.3 แสดงจำนวนตัวอย่างฟาร์ม และจำนวนตัวอย่างสัตว์แยกเป็นรายอำเภอ และกิ่งอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา (ใช้ฐานข้อมูลปี 2548) ที่ใช้ในการทำงานวิจัยนี้ ซึ่งจำนวนฟาร์มตัวอย่าง และจำนวนของสัตว์ตัวอย่างชนิดต่าง ๆ ในแต่ละอำเภอ สามารถคำนวณได้ตามสัดส่วนจากจำนวนตัวอย่างทั้งหมดที่ต้องการ โดยการเทียบสัดส่วนจากจำนวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดของเกษตรกร และจำนวนของสัตว์ที่มีการเลี้ยงจริง ในแต่ละอำเภอและมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของปศุสัตว์ ซึ่งสามารถแสดงตัวอย่างการคำนวณจำนวนตัวอย่างสัตว์ในแต่ละอำเภอได้ดังตารางที่ 3.4 แสดงตัวอย่างการคำนวณจำนวนตัวอย่างฟาร์มในแต่ละอำเภอได้ดังตารางที่ 3.5 และสามารถแสดงตัวอย่างการคำนวณจำนวนตัวอย่างสัตว์ในแต่ละฟาร์มตามอำเภอต่าง ๆ ได้ดังตารางที่ 3.6 ตามลำดับโดยที่ทำการเก็บจำนวนตัวอย่างจากสัตว์ เช่น น้ำหนักสัตว์ อาหารสัตว์ และมูลสัตว์ในแต่ละฟาร์มอย่างน้อยชนิดละ 1 ตัวอย่างเสมอ

การเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบหาคุณสมบัติที่สนใจโดยวิธีการทดสอบในห้องปฏิบัติการของการศึกษานี้ ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างจากพืชอาหารสัตว์และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ จากฟาร์มปศุสัตว์ในแต่ละอำเภอ และกิ่งอำเภอของจังหวัดนครราชสีมาโดยการเก็บตัวอย่างนี้ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 18 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2550 ถึงเดือนมิถุนายน ปี 2551 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 3.2 จำนวนการเก็บตัวอย่างฟาร์มและจำนวนตัวอย่างโคนม โคนเนื้อ กระบือแยกเป็นรายอำเภอ และกิ่งอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ	โคนม				โคนเนื้อ				กระบือ			
	จำนวนสัตว์		จำนวนฟาร์มเกษตรกร		จำนวนสัตว์		จำนวนฟาร์มเกษตรกร		จำนวนสัตว์		จำนวนฟาร์มเกษตรกร	
	ประชากร	ตัวอย่าง	ประชากร	ตัวอย่าง	ประชากร	ตัวอย่าง	ประชากร	ตัวอย่าง	ประชากร	ตัวอย่าง	ประชากร	ตัวอย่าง
เมือง	985	7	54	8	9,652	10	521	4	1,632	9	324	10
ขามทะเลสอ	1,530	10	104	15	6,403	7	284	2	683	4	63	2
ขามสะแกแสง	182	1	19	3	13,213	14	2,200	16	1,131	7	247	8
คง	5	0	1	0	19,443	20	4,554	32	6,773	39	1,402	43
ครบุรี	1,700	12	91	13	5,220	5	387	3	2,590	15	205	6
จักราช	-	-	-	-	17,495	18	2,814	20	865	5	174	5
ชุมพวง	775	5	37	5	19,365	20	3,032	21	3,025	18	684	21
โชคชัย	30	0	2	0	4,892	5	387	3	1,545	9	192	6
ด่านขุนทด	-	-	-	-	31,636	32	1,881	13	2,593	15	220	7
โนนสูง	-	-	-	-	21,626	22	7,165	51	2,729	16	487	15
โนนไทย	-	-	-	-	13,562	14	2,130	15	2,365	14	264	8
โนนแดง	30	0	2	0	8,925	9	2,285	16	3,602	21	1,240	38
บัวใหญ่	-	-	-	-	6,559	7	1,843	13	6,613	38	1,476	46
บ้านเหลื่อม	-	-	-	-	6,665	7	587	4	3,077	18	431	13
ปักธงชัย	3,257	22	72	10	17,544	18	1,546	11	3,878	23	519	16
ปากช่อง	39,059	267	1,559	222	7,162	7	536	4	545	3	102	3
ประทาย	192	1	2	0	23,656	24	5,269	37	3,471	20	723	22

ตารางที่ 3.2 จำนวนการเก็บตัวอย่างฟาร์มและจำนวนตัวอย่างโคนม โคนเนื้อ กระบือ แยกเป็นรายอำเภอ และกิ่งอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา (ต่อ)

อำเภอ	โคนม				โคนเนื้อ				กระบือ			
	จำนวนสัตว์		จำนวนฟาร์มเกษตรกร		จำนวนสัตว์		จำนวนฟาร์มเกษตรกร		จำนวนสัตว์		จำนวนฟาร์มเกษตรกร	
	ประชากร	ตัวอย่าง	ประชากร	ตัวอย่าง	ประชากร	ตัวอย่าง	ประชากร	ตัวอย่าง	ประชากร	ตัวอย่าง	ประชากร	ตัวอย่าง
พิมาย	3,564	24	151	21	22,090	23	2,741	19	690	4	143	4
สูงเนิน	3,152	22	128	18	11,700	12	859	6	1,394	8	166	5
เสิงสาง	690	5	40	6	4,932	5	708	5	854	5	87	3
สีคิ้ว	2,518	17	127	18	17,458	18	981	7	2,442	14	363	11
ห้วยแถลง	9	0	2	0	19,535	20	3,954	28	2,301	13	459	14
หนองบุญมาก	-	-	-	-	6,996	7	551	4	1,023	6	114	4
แก่งสนามนาง	-	-	-	-	12,505	13	1,559	11	2,213	13	328	10
วังน้ำเขียว	350	2	13	2	11,566	12	436	3	355	2	19	1
กิ่ง อ.เมืองยาง	72	0	5	1	11,475	12	1,736	12	1,986	12	362	11
กิ่ง อ.เทพารักษ์	-	-	-	-	13,195	14	725	5	592	3	63	2
กิ่ง อ.พระทองคำ	33	0	3	0	1,045	1	1,333	9	1,127	7	239	7
กิ่ง อ.ลำทะเมนชัย	6	0	2	0	9,057	9	203	1	997	6	57	2
เฉลิมพระเกียรติ	-	-	-	-	3,831	4	344	2	349	2	42	1
กิ่ง อ.สีดา	-	-	-	-	7,889	8	1,960	14	2,717	16	718	22
กิ่ง อ.บัวลาย	-	-	-	-	4,323	4	875	6	2,421	14	705	22
รวม	58,139	398	2,414	343	390,615	400	56,386	398	68,578	398	12,618	390



ตารางที่ 3.3 จำนวนการเก็บตัวอย่างฟาร์มและจำนวนตัวอย่างสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ แยกเป็นรายอำเภอ และกิ่งอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ	สุกร				ไก่ไข่				ไก่เนื้อ			
	จำนวนสัตว์		จำนวนฟาร์มเกษตรกร		จำนวนสัตว์		จำนวนฟาร์มเกษตรกร		จำนวนสัตว์		จำนวนฟาร์มเกษตรกร	
	ประชากร	ตัวอย่าง	ประชากร	ตัวอย่าง	ประชากร	ตัวอย่าง	ประชากร	ตัวอย่าง	ประชากร	ตัวอย่าง	ประชากร	ตัวอย่าง
เมือง	8,017	13	68	2	1,431	0	53	12	14,596	0	736	123
ขามทะเลสอ	540	1	101	3	2,140	1	25	6	89,847	2	28	5
ขามสะแกแสง	1,766	3	183	6	346	0	48	11	9,530	0	1	0
คง	2,831	4	316	11	15,846	4	43	10	93,500	2	8	1
ครบุรี	7,432	12	389	13	123,715	30	32	7	210,500	5	20	3
จักราช	4,427	7	506	17	400	0	1	0	89,880	2	10	2
ชุมพวง	2,085	3	445	15	1,479	0	112	25	186,319	5	129	22
โชคชัย	3,394	5	88	3	-	-	-	-	2,693,600	67	14	2
ด่านขุนทด	4,430	7	684	23	79,984	20	253	57	337,754	8	236	39
โนนสูง	2,660	4	464	16	6,240	2	256	57	713	0	38	6
โนนไทย	9,528	15	712	24	36,603	9	45	10	724,700	18	74	12
โนนแดง	3,153	5	321	11	568	0	42	9	115	0	7	1
บัวใหญ่	5,803	9	417	14	341	0	50	11	50,841	1	47	8
บ้านเหลื่อม	1,638	3	271	9	514	0	15	3	122,282	3	66	11
ปักธงชัย	12,385	20	780	26	936,909	229	68	15	2,130,674	53	68	11
ปากช่อง	114,209	181	196	7	52,000	13	3	1	611,800	15	24	4
ประทาย	4,182	7	518	17	600	0	2	0	23,000	1	3	1

ตารางที่ 3.3 จำนวนการเก็บตัวอย่างฟาร์มและจำนวนตัวอย่างสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ แยกเป็นรายอำเภอ และกิ่งอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา (ต่อ)

อำเภอ	สุกร				ไก่ไข่				ไก่เนื้อ			
	จำนวนสัตว์		จำนวนฟาร์มเกษตรกร		จำนวนสัตว์		จำนวนฟาร์มเกษตรกร		จำนวนสัตว์		จำนวนฟาร์มเกษตรกร	
	ประชากร	ตัวอย่าง	ประชากร	ตัวอย่าง	ประชากร	ตัวอย่าง	ประชากร	ตัวอย่าง	ประชากร	ตัวอย่าง	ประชากร	ตัวอย่าง
พิมาย	4,211	7	577	19	1,216	0	80	18	27,720	1	72	12
สูงเนิน	20,749	33	1,009	34	70,205	17	43	10	5,974,640	148	52	9
เสิงสาง	1,256	2	273	9	-	-	-	-	-	-	-	-
สีคิ้ว	4,735	8	216	7	129,501	32	50	11	177,369	4	165	28
ห้วยแถลง	12,101	19	748	25	10,000	2	3	1	422,326	10	35	6
หนองบุญมาก	5,760	9	570	19	28	0	1	0	1,743,000	43	23	4
แก่งสนามนาง	2,237	4	241	8	288	0	25	6	43	0	4	1
วังน้ำเขียว	1,809	3	160	5	937	0	15	3	173,267	4	48	8
กิ่ง อ.เมืองยาง	2,028	3	252	9	94	0	3	1	-	-	-	-
กิ่ง อ.เทพารักษ์	1,101	2	116	4	1,252	0	21	5	108,000	3	4	1
กิ่ง อ.พระทองคำ	1,127	2	72	2	31	0	4	1	148,503	4	67	11
กิ่ง อ.ลำทะเมนชัย	1,328	2	189	6	592	0	36	8	10,999	0	18	3
เฉลิมพระเกียรติ	2,373	4	376	13	162,633	40	25	6	251	0	16	3
กิ่ง อ.สีดา	996	2	76	3	453	0	16	4	305	0	17	3
กิ่ง อ.บัวลาย	1,543	2	212	7	177	0	13	3	18,000	0	9	2
รวม	251,834	400	11,546	390	1,636,523	400	1,383	310	16,194,074	400	2,039	340

ตารางที่ 3.4 ตัวอย่างการคำนวณจำนวนตัวอย่างสัตว์ในแต่ละอำเภอ

อำเภอ	สัตว์ (%)	จำนวนตัวอย่าง	
1	$A_1$	$A_1/100*n$	= $X_1$
2	$A_2$	$A_2/100*n$	= $X_2$
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
32	$A_{32}$	$A_{32}/100*n$	= $X_{32}$
Total	100		$n_A$

ตารางที่ 3.5 ตัวอย่างการคำนวณจำนวนตัวอย่างฟาร์มในแต่ละอำเภอ

อำเภอ	ฟาร์ม (%)	จำนวนตัวอย่าง	
1	$F_1$	$F_1/100*n$	= $f_1$
2	$F_2$	$F_2/100*n$	= $f_2$
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
32	$F_{32}$	$F_{32}/100*n$	= $f_{32}$
Total	100		$n_f$

ตารางที่ 3.6 ตัวอย่างการคำนวณจำนวนตัวอย่างสัตว์ในแต่ละฟาร์มของอำเภอที่ 1

ฟาร์ม	สัตว์ (%)	จำนวนตัวอย่าง	
1	$AF_1$	$AF_1/100*X_1$	= $Y_1$
2	$AF_2$	$AF_2/100*X_1$	= $Y_2$
.	.	.	.
.	.	.	.
$f_1$	.	.	.
Total	100		$X_1$

น้ำหนักและชนิดของพืชอาหารสัตว์ที่ฟาร์มแต่ละแห่งใช้ในการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดและน้ำหนักตัวของสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่ทำการศึกษา โดยสำรวจจากฟาร์มผู้เลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดในแต่ละอำเภอ และกิ่งอำเภอโดยอาศัยการจับสลาก (ดัดแปลงมาจาก Cavana, Delahaye, and Sekaran, 2000) เมื่อทราบน้ำหนัก และชนิดของพืชอาหารสัตว์ที่ใช้แล้วก็นำตัวอย่างพืชอาหารสัตว์แต่ละชนิดจากการสุ่มเลือกชนิดละจำนวนอย่างน้อย 200 ตัวอย่างมาวิเคราะห์คุณสมบัติในห้องปฏิบัติการดังแสดงในตารางที่ 3.7

ตารางที่ 3.7 วิธีการในการทดสอบหาคุณสมบัติของพืชอาหารสัตว์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด

คุณสมบัติ	วิธีการทดสอบ	หมายเหตุ
ร้อยละของ ความชื้นของแข็งทั้งหมด จากน้ำหนักแห้งคงที่ ที่ 70 °ซ	โดยน้ำหนัก ที่ทราบน้ำหนักของตัวอย่าง ซึ่งถูกอบแห้งที่อุณหภูมิ 103-105 °ซ เป็นเวลา 24 ชม.	Manlay et al. (2004)
ปริมาณคาร์บอน	CNS-2000 ELEMENTAL ANALYZER	Manlay et al. (2004)
ของแข็งระเหยง่าย (volatile solids)	โดยน้ำหนักที่หายไป จากน้ำหนักหรือปริมาตรของตัวอย่างที่ทราบ ซึ่งถูกเผาในเตาเผา ที่อุณหภูมิ 550 °ซ จนกระทั่งน้ำหนักคงที่ (ประมาณ 30 นาที)	APHA, AWWA, WEF. (1992)
ของแข็งคงตัว (fixed solids)	โดยน้ำหนักที่เหลือ จากน้ำหนักหรือปริมาตรของตัวอย่างที่ทราบ ซึ่งถูกเผาในเตาเผา ที่อุณหภูมิ 550 °ซ จนกระทั่งน้ำหนักคงที่ (ประมาณ 30 นาที)	APHA, AWWA, WEF. (1992)
น้ำหนัก	โดยการชั่งด้วยเครื่องชั่งน้ำหนัก หรือใช้สายเทป CATTLE and PIG WEIGHING TAPE รัศรอบอกที่หลัง ขาหน้าของโคนม โคนเนื้อ กระบือ สุกร	Bunyavejchewin et al. (1985)

น้ำหนักตัวของสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่ทำการศึกษา ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ ได้แก่ เนื้อสัตว์ นม ไข่ และมูลสัตว์รวมทั้งแก๊ส CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub> จากการย่อยอาหาร และการหายใจของสัตว์แต่ละชนิด สำรวจโดยหาปริมาณ และน้ำหนักจากจำนวนของสัตว์แต่ละชนิดจากโรงฆ่าสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ ซึ่งการเลือกโรงฆ่าสัตว์ หรือฟาร์มใช้วิธีการจับสลาก (ดัดแปลงมาจาก Cavana, Delahaye, and Sekaran, 2000) เมื่อทราบถึงปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์แล้ว นำตัวอย่างเนื้อ นม ไข่

และมูลสัตว์ที่ได้จากสัตว์แต่ละชนิดนั้นจากการสุ่มเลือกชนิดละจำนวนอย่างน้อย 200 ตัวอย่างมาวิเคราะห์คุณสมบัติในห้องปฏิบัติการ ดังแสดงในตารางที่ 3.8

ตารางที่ 3.8 วิธีการในการทดสอบหาคุณสมบัติของเนื้อ นม ไข่ และมูลสัตว์จากสัตว์แต่ละชนิด

คุณสมบัติ	วิธีการทดสอบ	หมายเหตุ
ร้อยละของ ความชื้นของแข็งทั้งหมดจากน้ำหนักแห้งคงที่ ที่ 70 °ซ	โดยน้ำหนัก ที่ทราบน้ำหนักของตัวอย่าง ซึ่งถูกอบแห้งที่อุณหภูมิ 103-105 °ซ เป็นเวลา 24 ชม.	Manlay et al. (2004)
ปริมาณคาร์บอน (C)	CNS-2000 ELEMENTAL ANALYZER และ GAS ANALYZER Respiration Trial system	Manlay et al. (2004) Kawashima, Terada, and Shibata (2000)
ของแข็งระเหยง่าย (volatile solids)	โดยน้ำหนักที่หายไป จากน้ำหนักหรือ ปริมาตรของตัวอย่างที่ทราบ ซึ่งถูกเผาในเตาเผา ที่อุณหภูมิ 550 °ซ จนกระทั่งน้ำหนักคงที่ (ประมาณ 30 นาที)	APHA, AWWA, WEF. (1992)
ของแข็งคงตัว (fixed solids)	โดยน้ำหนักที่เหลือ จากน้ำหนักหรือ ปริมาตรของตัวอย่างที่ทราบ ซึ่งถูกเผาในเตาเผา ที่อุณหภูมิ 550 °ซ จนกระทั่งน้ำหนักคงที่ (ประมาณ 30 นาที)	APHA, AWWA, WEF. (1992)
น้ำหนัก	โดยการชั่งด้วยเครื่องชั่งน้ำหนัก หรือใช้สายเทป CATTLE and PIG WEIGHING TAPE รัศรอบอกที่หลังขาหน้าของโคนม โคเนื้อ กระบือ สุกร	Bunyavejchewin et al. (1985)

### 3.3 ขั้นตอนในการดำเนินการศึกษาวิจัย

การดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการถ่ายเทคาร์บอนของการผลิตอาหารประเภทเนื้อ นม และไข่จากการทำฟาร์มปศุสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ ๆ โดยสามารถขยายความถึงรายละเอียดของวิธีดำเนินการศึกษาในขั้นตอนต่าง ๆ ทั้ง 2 ขั้นตอนได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เป็นส่วนของการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ชนิดของข้อมูลที่ต้องการ ปริมาณของข้อมูลตามการคำนวณ โดยเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ด้วยการออกสำรวจภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพืชอาหารสัตว์ การทำปศุสัตว์ น้ำหนักสัตว์ และสัดส่วนของซากสัตว์

แต่ละชนิดจากโรงฆ่าสัตว์ ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ 3.2 โดยวิธีการเก็บตัวอย่างในฟาร์ม ใช้วิธีจับสลากเลือกตัวสัตว์เฉพาะที่กำลังให้เนื้อ นม ไข่ โดยไม่สนใจ เพศ อายุ พันธุ์ หรือสภาวะต่าง ๆ ของร่างกายสัตว์ เช่น ตั๊กทอง ป่วย

ขั้นตอนที่ 2 เป็นส่วนของการวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการเพื่อหาค่าของคาร์บอนด้วยเครื่อง CNS-2000 ELEMENTAL ANALYZER และ GAS ANALYZER ได้แก่ ตัวอย่างพืชอาหารสัตว์และตัวอย่างเนื้อจากสัตว์แต่ละชนิด นม โคน ไข่ไก่ และในมูลสัตว์ โดยอาศัยความร้อนในการเผาที่ 850°C และใช้หลักการแยกสารด้วยวิธีการดูดซึมมากน้อย (chromatography) โดยใช้น้ำหนักตัวอย่างที่ 0.2 กรัม ส่วนตัวอย่างหามาด้วยวิธีการสุ่มเลือกตัวอย่างตามความสะดวก (convenience sampling) (ศรเทพ ธีมวาสร, 2545; สุรินทร์ นิยมางกูร, 2542; Cavana, Delahaye and Sekaran, 2000; Marks, 1982) โดยกำหนดขนาดตัวอย่างแต่ละตัวอย่างในการวิเคราะห์จำนวนอย่างน้อย 200 ตัวอย่าง เมื่อได้ค่าของคาร์บอนจากห้องปฏิบัติการแล้ว นำมาหาค่าปริมาณคาร์บอนเฉลี่ยจากกิจกรรมการปศุสัตว์กับเวลา (กิโลกรัมคาร์บอนต่อตัวต่อวัน) และนำมาใช้ในการศึกษาหาอัตราการถ่ายเทคาร์บอนจากพืชไปสู่สัตว์ด้วยการกิน เพื่อป้องกันผลวัดของการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนเทียบกับเวลา และการตรึงคาร์บอนสะสมอยู่ในรูปของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ โดยการสมดุลมวล รวมทั้งการปลดปล่อยคาร์บอนในรูปของแก๊ส CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub> และมูลสัตว์ ซึ่งการวิเคราะห์หาอัตราการปลดปล่อยคาร์บอนรวมต่อวัน และปัจจัยของการปลดปล่อยคาร์บอนในแต่ละส่วนของขั้นตอนการถ่ายเทคาร์บอนจากการปศุสัตว์แต่ละชนิด อาศัยหลักการถ่ายเทมวลตาม (UNECE, 2004) โดยสมการการปลดปล่อยคาร์บอนรวมสามารถแสดงได้ดังสมการที่ 3.1

$$E_{\text{total}} = n_{\text{animal}} \times (EF_{\text{metabolic}} + EF_{\text{spreading}} + EF_{\text{energy equivalent}}) \quad (3.1)$$

โดยที่	$n_{\text{animal}}$	=	จำนวนของสัตว์แต่ละชนิด ในแต่ละพื้นที่
	$E_{\text{total}}$	=	คาร์บอนที่ถูกปลดปล่อยทั้งหมด (กิโลกรัมคาร์บอนต่อวัน)
	$EF_{\text{metabolic}}$	=	คาร์บอนที่ปลดปล่อยจากการหายใจและการย่อยอาหารของสัตว์ (กิโลกรัมคาร์บอนต่อตัวต่อวัน)
	$EF_{\text{energy equivalent}}$	=	คาร์บอนที่ปลดปล่อยจากพลังงานที่ใช้ในการผลิต เนื้อ นม ไข่ เช่น พลังงานน้ำมันในการขนส่งและพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในฟาร์ม และโรงฆ่า รวมถึงพลังงานที่ใช้แช่เย็นนม (กิโลกรัมคาร์บอนต่อตัวต่อวัน)
	$EF_{\text{spreading}}$	=	คาร์บอนที่ปลดปล่อยจากสิ่งขับถ่ายและในรูปของเสียของสัตว์ (กิโลกรัมคาร์บอนต่อตัวต่อวัน)

ส่วนการศึกษาความสัมพันธ์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของการทำปศุสัตว์แต่ละชนิดอาศัยความสัมพันธ์ของค่าปริมาณคาร์บอนที่ได้ในรูปของผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์กับปริมาณคาร์บอนของพืชที่ต้องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งปริมาณคาร์บอนที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากตัวสัตว์และจากการใช้พลังงานในโรงเรือน ฆ่าสัตว์ ขนส่ง และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จากสัตว์โดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผลิตอาหารประเภทเนื้อ นม และไข่

### 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

3.4.1 ข้อมูลที่ต้องการจากการสำรวจฟาร์มปศุสัตว์คือ น้ำหนักสัตว์ ปริมาณมูลสัตว์ จำนวนสัตว์เลี้ยงและที่ส่งโรงฆ่าสัตว์ ชนิดและปริมาณพืชที่ใช้ ระยะเวลาเลี้ยง ปริมาณและระยะเวลาให้นม และไข่ พลังงานที่ใช้ในโรงเรือน และการขนส่ง ข้อมูลจากโรงฆ่าสัตว์คือ ร้อยละของเนื้อหลังการชำแหละ สัดส่วนของเครื่องใน กระดูก หัว คอ และอื่น ๆ ของสัตว์ และพลังงานที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์ที่อยู่ตามอำเภอ และกิ่งอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา โดยสรุปเป็นตารางบันทึกข้อมูลได้ดังแสดงในตารางที่ 3.9

3.4.2 ข้อมูลที่ต้องการจากห้องปฏิบัติการคือค่าปริมาณคาร์บอนจากการนำตัวอย่าง พืชอาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด ชี้นเนื้อ ผลิตภัณฑ์และมูลสัตว์ ของสัตว์แต่ละชนิด มาวิเคราะห์หาปริมาณของคาร์บอนด้วยเครื่อง CNS-2000 ELEMENTAL ANALYZER ซึ่งมีอยู่ที่อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3.4.3 เครื่องมือสำคัญที่ต้องใช้ในการทดสอบ ร้อยละของความชื้น ของแข็งระเหยง่าย และจีเอ็มได้แก่ ตาชั่งน้ำหนัก และเตาอบควบคุมอุณหภูมิ

### 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

3.5.1 อัตราการปลดปล่อยคาร์บอน (C-emitted) คือปริมาณคาร์บอนทั้งหมดที่ถูกขับถ่ายออกมาจากสัตว์ในรูปของมูลสัตว์ (C-output) และแก๊ส  $\text{CO}_2$ ,  $\text{CH}_4$  จากมูลสัตว์ การหายใจและการย่อยอาหารของสัตว์ (C-emission) เทียบกับเวลา ซึ่งอัตราการปลดปล่อยคาร์บอน (C-emitted) ของสัตว์แต่ละชนิดนี้ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันจะทำให้ทราบถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสัตว์ชนิดต่าง ๆ ได้ โดยสามารถคำนวณได้ดังสมการที่ 3.2

อัตราการปลดปล่อยคาร์บอน (C-emitted)

$$= (\text{ปริมาณ C ในมูลสัตว์} + \text{จากแก๊สที่เกิดจากมูลสัตว์} + \text{ปริมาณ C จากลมหายใจ} \\ \text{และการย่อยอาหารของสัตว์}) \text{ เทียบกับเวลา} \quad (3.2)$$

3.5.2 อัตราการตรึงคาร์บอนจากการถ่ายเทคาร์บอนจากพืชไปสู่สัตว์โดยน้ำนักพืชและน้ำนักสัตว์เทียบกับเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการที่ 3.3 ซึ่งอัตราการตรึงคาร์บอนนี้ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับกันทำให้สามารถจัดลำดับความสามารถในการใช้อาหารของสัตว์แต่ละชนิดได้ โดยสัตว์ที่มีความสามารถในการใช้อาหารสูงจะมีอัตราการตรึงคาร์บอนสูงด้วย

อัตราการตรึงคาร์บอน (C-fixation)

$$= (\text{ปริมาณ C ทั้งหมดในอาหารที่เลี้ยงสัตว์} - \text{ปริมาณ C ในมูลสัตว์} - \text{ปริมาณ C} \\ \text{จากแก๊สที่เกิดจากมูลสัตว์} - \text{ปริมาณ C จากลมหายใจ} \text{ และการย่อยอาหารของ} \\ \text{สัตว์}) \text{ เทียบกับเวลา} \quad (3.3)$$

3.5.3 การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผลิตเนื้อ นม ไข่ของสัตว์แต่ละชนิด เพื่อพิจารณาว่าปศุสัตว์ชนิดใดมีความเหมาะสมในการที่จะผลิตอาหารประเภท เนื้อ นม ไข่ มากกว่ากัน นั่นคือสัตว์ชนิดนั้นต้องมีค่าประสิทธิภาพในการใช้คาร์บอนสูงกว่าของสัตว์ชนิดอื่น ๆ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับกัน วิธีการหาค่าประสิทธิภาพการผลิตเนื้อ นม ไข่ สามารถคำนวณได้ดังนี้

ประสิทธิภาพในการใช้คาร์บอน

$$= (\text{คาร์บอน}_{\text{อาหารสัตว์}} - \text{คาร์บอน}_{\text{ที่ปลดปล่อย}}) \div \text{คาร์บอน}_{\text{อาหารสัตว์}} \quad (3.4)$$



ตารางที่ 3.9 ตัวอย่างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากปศุสัตว์แต่ละชนิดที่ต้องการ จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามฟาร์มของแต่ละอำเภอ และกิ่งอำเภอและ  
 โรงฆ่าสัตว์ต่าง ๆ

วัน/เดือน/ปี ...../...../.....

ชนิดสัตว์เลี้ยง ทางเศรษฐกิจ	พืชที่ใช้เลี้ยง (กิโลกรัม/ตัว/วัน)		เลี้ยงสัตว์ เกิด จนถึงส่ง โรงฆ่าสัตว์หรือขาย ตลาด		น้ำหนักเฉลี่ย ต่อตัว ที่ส่งฆ่าหรือ ตลาด (กิโลกรัม/ตัว)	น้ำหนัก หรือ ร้อยละ (% หรือ กิโลกรัม/ตัว)		เนื้อ นม ไข่ ที่ได้เฉลี่ย (ลิตรหรือ กิโลกรัม หรือ ฟอง/ ตัว/วัน)	ระยะเวลา ผลิต เนื้อ นม ไข่ (วัน/ ปี)	น้ำหนัก มูลสัตว์ที่ เกิดขึ้น (กิโลกรัม/ ตัว/วัน)	ปริมาณพลังงานเฉลี่ยที่ใช้สำหรับ (กิโลกรัมคาร์บอนต่อตัวต่อปี)			
	ชนิด	ปริมาณ แต่ละ ชนิด	ระยะเวล า (วัน)	จำนวน (ตัว)		ซากสัตว์	เนื้อสัตว์ จากซาก				ใน โรงเรือน เลี้ยงสัตว์	ขนส่งพืช เนื้อ นม ไข่	ฆ่าหรือทำ ความ สะอาด	รักษา อาหาร
เนื้อโค														
เนื้อกระบือ														
เนื้อสุกร														
เนื้อไก่														
โคนม														
ไก่ไข่														

หมายเหตุ : ปริมาณพลังงานไฟฟ้า หรือน้ำมัน สำหรับให้แสงสว่าง ควบคุมอุณหภูมิ ระบายอากาศ ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  
 ปริมาณพลังงานไฟฟ้า สำหรับใช้ในการฆ่าสัตว์  
 ปริมาณพลังงานไฟฟ้า หรือ แก๊ส สำหรับทำความเย็นเพื่อการเก็บรักษาเนื้อและน้ำมัน หรือความร้อนเพื่อใช้ในการกกลูกไก่หรือลูกสุกร  
 ปริมาณพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในการขนส่ง สัตว์จากฟาร์มไปส่งโรงฆ่าสัตว์ หรือส่งขายตลาด และขนส่งเนื้อ จากโรงฆ่าสัตว์ไปตลาดสด  
 หรือขนส่งนมไปสหกรณ์หรือโรงงานแปรรูป และขนส่งไข่ ไปขายตลาด

3.5.4 การวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของการปศุสัตว์แต่ละชนิดสำหรับการผลิตอาหารประเภท เนื้อ นม ไข่ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการเปรียบเทียบจากสัดส่วนระหว่างคาร์บอนที่ปลดปล่อยต่อคาร์บอนที่ถูกตรึงอยู่ในรูปอาหารของมนุษย์ นั้นหมายความว่าสัตว์ชนิดใดมีความเหมาะสมในการที่จะผลิตอาหารประเภท เนื้อ นม ไข่ จะต้องมีค่าสัดส่วนของการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสัดส่วนของการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสัตว์ชนิดอื่น ๆ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันซึ่งวิธีการหาค่าสัดส่วนของการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำได้โดย

$$\frac{\text{สัดส่วนของการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม}}{\text{เทียบกับการตรึงคาร์บอนที่เท่ากัน}} = \frac{\text{คาร์บอนที่ถูกปลดปล่อย}}{\text{คาร์บอนที่ถูกตรึง}} \quad (3.5)$$

$$\frac{\text{สัดส่วนของการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม}}{\text{เทียบกับปริมาณคาร์บอนในอาหารสัตว์ที่เท่ากัน}} = \frac{\text{คาร์บอนที่ถูกปลดปล่อย}}{\text{คาร์บอนในอาหารสัตว์}} \quad (3.6)$$

โดยที่ คาร์บอนที่ถูกตรึง = คาร์บอนที่วิเคราะห์ได้จากผลิตภัณฑ์สัตว์ในรูปของเนื้อ นม ไข่  
 คาร์บอนที่ถูกปลดปล่อย = คาร์บอนที่วิเคราะห์ได้ในรูปของการหายใจ การย่อยอาหาร และคาร์บอนจากมูลสัตว์  
 คาร์บอนในอาหารสัตว์ = คาร์บอนที่วิเคราะห์ได้จากหญ้า อาหารข้น และอาหารสำเร็จรูป

### 3.6 สรุปแนวทางในการดำเนินการวิจัย

การศึกษานี้จะต้องลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ทั้ง 6 ชนิด ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ สุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่ ที่มีการเลี้ยงอยู่จริงในฟาร์มของเกษตรกรโดยไม่ได้คำนึงถึงพันธุ์ของสัตว์ในแต่ละชนิด แต่สัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่ทำการศึกษจะต้องมีอายุอยู่ในช่วงที่จะใช้ประโยชน์หรือให้เนื้อ นม และไข่เท่านั้น การศึกษานี้เน้นที่สัตว์กินพืช และสัตว์ที่มีลักษณะของการกินที่ทราบชนิดและปริมาณของอาหารที่สัตว์กินในทุก ๆ อำเภอ และกิ่งอำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีด้วยกัน 26 อำเภอ 6 กิ่งอำเภอโดยจะเน้นแหล่งข้อมูลที่มีระบบการจัดการปศุสัตว์ในรูปของฟาร์มปศุสัตว์ที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นหลัก การประเมินและวิเคราะห์ระบบจะพิจารณาเสมือนระบบอยู่ในสถานะสมดุลโดยอาศัยหลักการของการถ่ายเทมวลคาร์บอน (carbon massflow concept)

การศึกษานี้เป็นการพิจารณาการถ่ายเทคาร์บอนจากพืชอาหารสัตว์ที่นิยมใช้เลี้ยงในฟาร์มปศุสัตว์ไปสู่สัตว์บกที่กินพืชเป็นหลักทั้ง 6 ชนิดที่ศึกษา ตามระยะเวลาการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด เพื่อ

ศึกษาการถ่ายเทคาร์บอนจากพืชที่สัตว์เอาไปใช้ได้จริง (หักลบด้วยปริมาณคาร์บอนในมูลสัตว์) มาสะสมที่สัตว์ในรูปของเนื้อ นม และไข่ เพื่อการบริโภคของคนต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 3.2 โดยมีพลังงานส่วนสำคัญใหญ่ 4 ส่วน ที่เกี่ยวข้องได้แก่

- ปริมาณพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันที่ใช้ในโรงเรือนเพื่อการเลี้ยงสัตว์ (กิโลกรัมคาร์บอนเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน) เช่น พลังงานความร้อนที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิของโรงเรือน พลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง และพลังงานที่ใช้ในการระบายความร้อน เป็นต้น


- ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการฆ่าสัตว์ และพลังงานความร้อนในการถอนขนหรือขูดขนสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ (กิโลกรัมคาร์บอนเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน)

- ปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุดในการเก็บรักษาเนื้อสัตว์แช่แข็ง และน้ำมันโค (กิโลกรัมคาร์บอนเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน)

- ปริมาณพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งตัวสัตว์ไปโรงฆ่าสัตว์ และขนส่งเนื้อสัตว์หลังฆ่าแหละไปยังตลาดหรือโรงงานแปรรูป หรือขนส่งน้ำมันโคจากฟาร์มไปสหกรณ์โคนมต่าง ๆ ในจังหวัด (กิโลกรัมคาร์บอนเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน)

การศึกษานี้จะเก็บข้อมูลภาคสนามจากฟาร์มปศุสัตว์เกี่ยวกับปริมาณพืชอาหารสัตว์ โดยทั่วไปที่สัตว์แต่ละชนิดกินต่อตัวต่อวัน จำนวน และน้ำหนักสัตว์แต่ละชนิดที่ส่งไปโรงฆ่าสัตว์ เพื่อพิจารณาการถ่ายเทคาร์บอนจากพืชมาสู่สัตว์ รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งโตเต็มที่พร้อมส่งโรงฆ่าสัตว์ได้ ระยะเวลาของการที่สัตว์ให้นมและไข่ โดยไม่ได้สนใจอายุและพันธุ์ของสัตว์ในแต่ละชนิด แต่จะจำกัดขอบเขตที่สัตว์ที่มีอายุในช่วงที่จะใช้ประโยชน์เท่านั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับคาร์บอนในอาหารประเภทเนื้อ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น มูลสัตว์ นม และไข่ รวมทั้งคาร์บอนในพืชอาหารสัตว์ จะอาศัยการวิเคราะห์หาค่าของคาร์บอนด้วยการทดสอบในห้องปฏิบัติการโดยเครื่องมือการวิเคราะห์ธาตุ ได้แก่ เครื่อง CNS-2000 ELEMENTAL ANALYZER ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อวัดปริมาณคาร์บอน (C) จากส่วนประกอบสารอินทรีย์หลายชนิด (Manlay et al., and Alhamd et al., 2004) เพื่อหาปริมาณคาร์บอนสะสมที่อยู่ในพืชอาหารสัตว์ ในเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์แต่ละชนิด ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนจากพืชไปสู่สัตว์เทียบกับเวลา



รูปที่ 3.2 แสดงขอบเขตการศึกษาการถ่ายเทและการปลดปล่อยคาร์บอนของการผลิตอาหารจากการทำปศุสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา

จากนั้นศึกษาความสัมพันธ์ของการทำปศุสัตว์แต่ละชนิดโดยการนำข้อมูลคาร์บอนต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ได้แก่ คาร์บอนในพืชที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ คาร์บอนในมูลสัตว์ คาร์บอนในเนื้อ นม ไข่ คาร์บอนในรูปของพลังงาน 4 กลุ่มและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเลี้ยงสัตว์โดยตรงและเป็นพลังงานส่วนใหญ่ที่ต้องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ฆ่าสัตว์ ขนส่ง และเก็บรักษา เนื้อและ

นม มาทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้คาร์บอน (กิโลกรัมคาร์บอนต่อตัวต่อปี) ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการผลิตอาหารประเภทเนื้อ นม และไข่ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของการทำปศุสัตว์แต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสม และบ่งบอกถึงสัดส่วนของการปลดปล่อยคาร์บอนต่อคาร์บอนที่ถูกตรึงอยู่ในรูปอาหาร เพื่อชี้ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากปริมาณคาร์บอนที่ถูกปลดปล่อย นอกจากนี้ยังสามารถประเมินอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนต่อหน่วยของพืชอาหารสัตว์มาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ในรูป เนื้อ นม ไข่ และอัตราการปลดปล่อยคาร์บอนต่อหน่วยของมูลสัตว์ การหายใจและการย่อยอาหารของสัตว์ และพลังงานที่ใช้ในการเลี้ยง การขนส่ง การฆ่าและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารจากการปศุสัตว์

## บทที่ 4

### ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผล


#### 4.1 การสำรวจปริมาณสัตว์แต่ละชนิดที่มีการทำฟาร์มในจังหวัดนครราชสีมา

ผลการศึกษาพบว่าสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญและเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดนครราชสีมาได้แก่ โคเนื้อ โคเนื้อ กระบือ สุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่ ตั้งแต่ปี 2544 - 2549 สัตว์แต่ละชนิดมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนการเลี้ยงโดยเฉพาะสุกร โคเนื้อ และไก่ไข่ ที่มีการเพิ่มจำนวนการเลี้ยง 2 - 3 เท่าดังตารางที่ 4.1 ซึ่งมีการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดกระจายอยู่ตามอำเภอ และกิ่งอำเภอต่าง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 4.1 - 4.6 โดยจากรูป 4.1 และ 4.4 พบว่าการเลี้ยงโคเนื้อและสุกรมีการเลี้ยงหนาแน่นมากที่อำเภอปากช่อง เกษตรที่เลี้ยงสุกรส่วนใหญ่จะเป็นลูกเล้าที่เลี้ยงให้กับบริษัท ซีพี ในขณะที่รูป 4.2 พบว่ามีการเลี้ยงโคเนื้อหนาแน่นมากที่อำเภอด่านขุนทดซึ่งมีจำนวนการเลี้ยงโคเนื้อมากที่สุดของประเทศไทย (กรมปศุสัตว์, 2548) และรูป 4.3 พบว่าการเลี้ยงกระบือมีการเลี้ยงหนาแน่นมากในอำเภอบัวใหญ่ นอกจากนี้รูปที่ 4.5 แสดงว่ามีการเลี้ยงไก่เนื้อหนาแน่นมากที่อำเภอสูงเนิน ในขณะที่ไก่ไข่มีการเลี้ยงหนาแน่นมากที่อำเภอบึงขัง ดังรูป 4.6 และผลจากการสำรวจสหกรณ์โคเนื้อ 9 แห่ง ที่กระจายอยู่ตามอำเภอ และกิ่งอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมาโดยสหกรณ์โคเนื้อที่มีการใช้พลังงานในการผลิตนมโคมากที่สุด ได้แก่ สหกรณ์โคเนื้อปากช่อง ในขณะที่โรงฆ่าสัตว์ใหญ่ โดยเฉพาะโคเนื้อ และกระบือ กระจายอยู่ตามอำเภอใหญ่ ๆ ทั้งสิ้น 17 แห่ง ทั้งที่มีใบอนุญาต และอยู่ในท้องที่ทุรกันดารซึ่งมีการฆ่าโคเนื้อ และกระบือ โดยเฉลี่ย 2 - 4 ตัวต่อวัน ส่วนโรงฆ่าสุกร และไก่เนื้อจะมีไม่มาก เนื่องจากปศุสัตว์ได้กำหนดให้มีการรวบรวมสุกร และไก่เนื้อมาฆ่าในที่เดียวกันเพื่อความสะดวกในการควบคุมโรค จากการสำรวจโรงฆ่าสุกรที่มีใบอนุญาตถูกต้องจำนวน 7 แห่ง โดยเฉพาะโรงฆ่าสุกรของบริษัท ราชสีมา - จอหอ โภกภัณฑ์ จำกัด มีการฆ่าสุกรประมาณ 250 - 370 ตัวต่อวัน โรงฆ่าไก่เนื้อขนาดใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมาที่มีใบอนุญาต และมีจำนวนการเชือดไก่เนื้อต่อวันสูงประมาณ 25,000 - 185,000 ตัวมีจำนวน 3 แห่งเท่านั้น ได้แก่ โรงเชือดไก่ของ บริษัท ซีพี และบริษัท เคพี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอโชคชัย และบริษัท แผลมทองที่ตั้งอยู่ในอำเภอสูงเนิน ซึ่งทั้งสามบริษัทนี้ส่วนใหญ่จะส่งผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อขายต่างประเทศ ในขณะที่โรงฆ่าไก่เนื้อขนาดเล็กที่ทำการศึกษากันจำนวน 18 แห่งมีการเชือดไก่เนื้อโดยเฉลี่ย 100 - 240 ตัวต่อวัน และยังพบว่ามีไก่เนื้อบางส่วนได้ถูกส่งไปเชือดที่จังหวัดอื่น ๆ เช่น สระบุรี ลพบุรี เป็นต้น ซึ่งเป็นไก่เนื้อของบริษัทต่าง ๆ เช่น สหฟาร์ม ซัลเวลเลย์ ซัลเนค เบทาโกร ชันฟู้ด เป็นต้น

ตารางที่ 4.1 ปริมาณสัตว์ชนิดต่าง ๆ ในแต่ละปีและแนวโน้มการทำฟาร์มในจังหวัดนครราชสีมา


ปี	จำนวน โคนม	จำนวน โคเนื้อ	จำนวน กระบือ	จำนวน สุกรขุน	จำนวน ไก่เนื้อ	จำนวน ไก่ไข่
2544	25,307	273,085	61,897	119,674	14,011,798	1,106,195
2545	27,744	283,023	63,304	114,834	15,515,004	779,648
2546	29,968	290,642	66,778	122,467	14,207,282	1,133,824
2547	32,390	343,152	65,886	111,629	14,232,915	1,141,978
2548	32,922	390,615	68,578	157,397	16,194,074	1,636,523
2549	32,916	570,215	71,830	336,507	17,414,013	2,118,649

ที่มา: กรมปศุสัตว์




รูปที่ 4.1 การเลี้ยงโคนมในอำเภอ และกิ่งอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา

(จาก <http://www.dld.go.th/index.html>, กรมปศุสัตว์, 2548)




รูปที่ 4.2 การเลี้ยงโคเนื้อในอำเภอ และกิ่งอำเภอต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา  
(จาก <http://www.dld.go.th/index.html>, กรมปศุสัตว์, 2548)







รูปที่ 4.3 การเลี้ยงกระบือในอำเภอ และกิ่งอำเภอต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา  
(จาก <http://www.dld.go.th/index.html>, กรมปศุสัตว์, 2548)



รูปที่ 4.4 การเลี้ยงสุกรในอำเภอ และกิ่งอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา  
(จาก <http://www.dld.go.th/index.html>, กรมปศุสัตว์, 2548)



รูปที่ 4.5 การเลี้ยงไก่เนื้อในอำเภอ และกิ่งอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา  
(จาก <http://www.dld.go.th/index.html>, กรมปศุสัตว์, 2548)



รูปที่ 4.6 การเลี้ยงไก่ไข่ในอำเภอ และกิ่งอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา  
(จาก <http://www.dld.go.th/index.html>, กรมปศุสัตว์, 2548)

#### 4.2 ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนและอัตราการถ่ายเทปริมาณคาร์บอนจากการเลี้ยงสัตว์

การเปรียบเทียบค่าการปลดปล่อยคาร์บอนต่อวันจากสัตว์ชนิดต่าง ๆ ดังกล่าว โดยเทียบจากน้ำหนักสัตว์ที่เท่ากันในหน่วยกิโลกรัมคาร์บอนต่อกิโลกรัมน้ำหนักสัตว์ต่อวัน (กก.C/กก.นน.สัตว์/วัน) พบว่าไก่ไข่มีค่าการปลดปล่อยคาร์บอนต่อวันสูงสุดเท่ากับ  $8.377 \times 10^{-3}$  กก.C/กก.นน.สัตว์/วัน เนื่องจากในบรรดาสัตว์แต่ละชนิดที่ทำการศึกษาพบว่า ไก่ไข่เป็นสัตว์ที่มีการรับคาร์บอนจากพืชอาหารโดยการกินมากที่สุดถึง  $21.99 \times 10^{-3}$  กก.C/กก.นน.สัตว์/วัน ในขณะที่สุกรจะมีค่าการปลดปล่อยคาร์บอนต่อวันต่ำสุดเท่ากับ  $2.477 \times 10^{-3}$  กก.C/กก.นน.สัตว์/วัน เพราะที่สุกรรับคาร์บอนจากพืชอาหารโดยการกินต่ำสุดเพียง  $8.71 \times 10^{-3}$  กก.C/กก.นน.สัตว์/วัน ในขณะที่มีความสามารถในการตรึงคาร์บอนไว้ในร่างกายได้ถึง 71.22% นับเป็นอันดับสองรองจากกระบือ และเมื่อนำค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจากสัตว์ชนิดดังกล่าวที่น้ำหนักเท่ากันมาเปรียบเทียบกัน พบว่าจะสามารถเรียงลำดับค่าการปลดปล่อยคาร์บอนของสัตว์แต่ละชนิดจากมากไปหาน้อยตามลำดับ ได้แก่ <math>\langle \text{ไก่ไข่} > \langle \text{ไก่เนื้อ} > \langle \text{โคนม} > \langle \text{โคเนื้อ} > \langle \text{กระบือ} > \langle \text{สุกร}</math> ดังแสดงในตารางที่ 4.2 และตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.2 อัตราการถ่ายเท การตรึง และการปลดปล่อยปริมาณคาร์บอนของสัตว์ชนิดต่าง ๆ

ชนิดสัตว์	น้ำหนักสัตว์มีชีวิตเฉลี่ย (กก./ตัว)	$C_{plant}$ (กก.C/ตัว/วัน)	$C_{plant}$ ที่นิน.สัตว์ เท่ากัน (กก.C <sub>plant</sub> / กก.นิน.สัตว์/วัน)	$C_{fixation}$ (กก. C/ตัว/วัน)	$C_{fixation}$ ที่นิน.สัตว์ เท่ากัน (กก.C <sub>fixation</sub> /กก.นิน. สัตว์/วัน)	$C_{emitted}$ (กก.C/ตัว/วัน)	$C_{emitted}$ ที่นิน.สัตว์ เท่ากัน (กก. C <sub>emitted</sub> /กก.นิน.สัตว์/ วัน)	$C_{emitted}$ /C <sub>plant</sub> (%)	$C_{emitted}$ /C <sub>fixation</sub> (%)	ประสิทธิภาพการ ตรึง C = (C <sub>plant</sub> - C <sub>emitted</sub> )/C <sub>plant</sub> (%)
โคนม	449.19 ± 53.99	6.933 ± 1.282	15.43x10 <sup>-3</sup>	4.257	9.48x10 <sup>-3</sup>	2.676 ± 0.571	5.96x10 <sup>-3</sup>	38.60	62.86	61.40
โคเนื้อ	302.25 ± 100.72	4.46 ± 1.93	14.76x10 <sup>-3</sup>	3.09	10.22x10 <sup>-3</sup>	1.376 ± 0.36	4.57x10 <sup>-3</sup>	30.85	44.53	69.15
กระบือ	456.10 ± 134.38	6.51 ± 3.14	14.27x10 <sup>-3</sup>	4.72	10.35x10 <sup>-3</sup>	1.801 ± 0.51	3.95x10 <sup>-3</sup>	27.67	38.16	72.33
สุกร	100.91 ± 6.31	0.879 ± 0.30	8.71x10 <sup>-3</sup>	0.626	6.20x10 <sup>-3</sup>	0.253 ± 0.058	2.48x10 <sup>-3</sup>	28.78	40.42	71.22
ไก่เนื้อ	2.34 ± 0.34	0.043 ± 0.007	18.38x10 <sup>-3</sup>	0.026	11.11x10 <sup>-3</sup>	0.017 ± 0.006	7.27x10 <sup>-3</sup>	39.53	65.38	60.47
ไก่ไข่	1.91 ± 0.15	0.042 ± 0.004	21.99x10 <sup>-3</sup>	0.026	13.61x10 <sup>-3</sup>	0.016 ± 0.003	8.38x10 <sup>-3</sup>	38.10	61.54	61.90


ตารางที่ 4.3 การปลดปล่อยคาร์บอนต่อตัวต่อวันและการปลดปล่อยคาร์บอนต่อวันเทียบจากน้ำหนักสัตว์แต่ละชนิดที่เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

ชนิดสัตว์	น้ำหนักมูลสดที่ขับถ่าย (กก./ตัว/วัน)	ร้อยละมูลที่ ขับถ่ายต่อน้ำหนัก ตัว	ค่าการปลดปล่อย คาร์บอน (กก.C/ตัว/วัน)	น้ำหนักสัตว์มีชีวิต เฉลี่ยในฟาร์ม (กก./ตัว)	ค่าการปลดปล่อยคาร์บอนเทียบจาก น้ำหนักที่เท่ากัน (กก.C/กก.นิน.สัตว์/วัน) x 10 <sup>-3</sup>	ค่าเฉลี่ยน้ำหนักนมโค และไข่ไก่ (กก./ตัว/วัน)
โคนม	18.85 ± 3.41	4.20	2.68 ± 0.57	449.19 ± 53.99	5.96	11.14 ± 2.70
โคเนื้อ	14.27 ± 4.94	4.72	1.38 ± 0.36	302.25 ± 100.72	4.57	-
กระบือ	20.79 ± 8.08	4.56	1.80 ± 0.51	456.10 ± 134.38	3.95	-
สุกร	1.59 ± 0.33	1.58	0.25 ± 0.06	100.91 ± 6.31	2.48	-
ไก่เนื้อ	0.08 ± 0.01	3.42	0.017 ± 0.01	2.34 ± 0.34	7.27	-
ไก่ไข่	0.14 ± 0.01	7.33	0.016 ± 0.00	1.91 ± 0.15	8.38	0.047 ± 0.009

นอกจากนี้ผลการสำรวจพบว่า สัตว์แต่ละชนิดมีค่าเฉลี่ยการปลดปล่อยคาร์บอนรวมต่อตัวต่อวันแตกต่างกันโดยมีค่าสูงสุดที่โคนม ซึ่งมีการปลดปล่อยคาร์บอนรวมเท่ากับ  $2.676 \pm 0.571$  กก.C/ตัว/วัน ซึ่งปริมาณคาร์บอนส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปมูลโคนมเป็นหลักคิดเป็น 72.76% ของปริมาณคาร์บอนที่ถูกปลดปล่อยออกมาทั้งหมดดังในรูปที่ 4.7 ส่วนปริมาณคาร์บอนที่อยู่ในรูปของแก๊ส  $\text{CO}_2$  และ  $\text{CH}_4$  จากลมหายใจและการย่อยอาหารของโคนมคิดเป็น 26.01% ของปริมาณคาร์บอนที่ถูกปลดปล่อยออกมาทั้งหมด ในขณะที่ไก่ไข่ 1 ตัวมีค่าการปลดปล่อยคาร์บอนรวมต่ำสุดเท่ากับ  $0.0158 \pm 0.003$  กก.C/ตัว/วัน ซึ่งปริมาณคาร์บอนส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของมูลไก่ไข่เป็นหลักคิดเป็น 87.88% ของปริมาณคาร์บอนที่ถูกปลดปล่อยออกมาทั้งหมด ในขณะที่ปริมาณคาร์บอนที่อยู่ในรูปของแก๊ส  $\text{CO}_2$  และ  $\text{CH}_4$  จากลมหายใจ และการย่อยอาหารของไก่ไข่คิดเป็น 11.93% ของปริมาณคาร์บอนที่ถูกปลดปล่อยออกมาทั้งหมดดังแสดงในรูปที่ 4.7 เช่นกัน

ค่าเฉลี่ยของแก๊ส  $\text{CO}_2$  และ  $\text{CH}_4$  ที่เกิดจากมูล การย่อยอาหารและการหายใจของสัตว์ชนิดต่าง ๆ ดังกล่าวแสดงไว้ในตารางที่ 4.4 ซึ่งถ้าเทียบจากสัตว์ทุกชนิดที่ทำการศึกษาพบว่าตัวไก่ไข่มีส่วนการปลดปล่อยแก๊ส  $\text{CH}_4$  ต่อ  $\text{CO}_2$  มากที่สุดถึง  $3.141 \times 10^{-4}$  เท่าเมื่อคิดเทียบที่น้ำหนักตัวเท่ากันซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าแก๊ส  $\text{CH}_4$  มีศักยภาพในการทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน (Global Warming Potentials [GWPs]) ได้มากกว่าแก๊ส  $\text{CO}_2$  ถึง 23 เท่า (IPCC, 2001)

นอกจากนี้ ถ้าเปรียบเทียบสัดส่วนของการปลดปล่อยแก๊ส  $\text{CH}_4$  และ  $\text{CO}_2$  ที่เกิดขึ้นจากมูลสัตว์ การย่อยอาหาร และการหายใจระหว่างสัตว์แต่ละชนิดจะได้ดังรูปที่ 4.8 จะเห็นว่าที่น้ำหนักตัวเท่ากันโคนมมีส่วนของการปลดปล่อยแก๊ส  $\text{CH}_4$  จากมูลและจากการย่อยอาหารกับการหายใจสูงสุดคิดเป็น 35 - 36% ของการปลดปล่อยแก๊ส  $\text{CH}_4$  จากสัตว์ชนิดต่าง ๆ รองลงมาได้แก่ กระบือ และโคนมตามลำดับเนื่องจากโคนม โคนม กระบือเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องซึ่งทราบกันดีว่าจะมีการขับไล่แก๊ส  $\text{CH}_4$  ออกจากการย่อยสลายอาหารจำพวกเส้นใยหรือเซลลูโลสของแบคทีเรียกลุ่มสร้าง  $\text{CH}_4$  ที่อยู่ในกระเพาะรูเมน ดังนั้นจึงทำให้สามารถกล่าวได้ว่าภายใน 1 วันโคนม 1 ตัวจากการเลี้ยงตามสภาพของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา จะมีส่วนในการก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนจากการปล่อยแก๊ส  $\text{CH}_4$  ได้มากกว่าสัตว์ชนิดอื่น ๆ รวมทั้งกระบือ และโคนมตามลำดับ ในขณะที่ผลการศึกษากการปล่อยแก๊ส  $\text{CO}_2$  พบว่าโคนมมีส่วนของการปลดปล่อยแก๊ส  $\text{CO}_2$  จากมูลและจากการย่อยอาหารกับการหายใจสูงสุด โดยการปล่อยแก๊ส  $\text{CO}_2$  จากการย่อยอาหารและการหายใจของโคนมใกล้เคียงกันกับโคนม และกระบือคิดเป็น 20 - 21% ของการปล่อยแก๊ส  $\text{CO}_2$  จากสัตว์ชนิดต่าง ๆ ส่วนการปล่อยแก๊ส  $\text{CO}_2$  จากมูลสัตว์นั้น พบว่าโคนมมีการปล่อยแก๊ส  $\text{CO}_2$  สูงสุดถึง 40% รองลงมาเป็นกระบือ 23% และโคนม 17% ตามลำดับ




รูปที่ 4.7 สัดส่วนการปลดปล่อยคาร์บอนต่อตัวต่อวันจากแหล่งต่าง ๆ ของสัตว์แต่ละชนิด

ตารางที่ 4.4 แก๊สที่เกิดจากสัตว์แต่ละชนิดที่เลี้ยงในฟาร์มต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา (ค่าเฉลี่ย  $\pm$  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

ชนิดสัตว์	ค่าเฉลี่ยของแก๊สจาก	CH <sub>4</sub> (กก./ตัว/วัน)	CO <sub>2</sub> (กก./ตัว/วัน)	สัดส่วน CH <sub>4</sub> : CO <sub>2</sub>		CH <sub>4</sub> : CO <sub>2</sub> ที่น้ำหนักสัตว์เท่ากัน
โคนม	มูล	0.004 $\pm$ 0.001	0.110 $\pm$ 0.022	0.036	รวม 2 แหล่ง = 0.055	1.224 x 10 <sup>-4</sup>
	การย่อยอาหารและการหายใจ	0.123 $\pm$ 0.037	2.211 $\pm$ 0.459	0.056		
โคนเนื้อ	มูล	0.004 $\pm$ 0.002	0.031 $\pm$ 0.015	0.129	รวม 2 แหล่ง = 0.073	2.415 x 10 <sup>-4</sup>
	การย่อยอาหารและการหายใจ	0.104 $\pm$ 0.063	1.440 $\pm$ 0.618	0.072		
กระบือ	มูล	0.005 $\pm$ 0.003	0.062 $\pm$ 0.035	0.081	รวม 2 แหล่ง = 0.062	1.359 x 10 <sup>-4</sup>
	การย่อยอาหารและการหายใจ	0.127 $\pm$ 0.068	2.069 $\pm$ 0.942	0.061		
สุกร	มูล	0.0001 $\pm$ 0.0000	0.0010 $\pm$ 0.0003	0.132	รวม 2 แหล่ง = 0.028	2.775 x 10 <sup>-4</sup>
	การย่อยอาหารและการหายใจ	0.0071 $\pm$ 0.0074	0.2536 $\pm$ 0.1286	0.028		
ไก่เนื้อ	มูล	0.000003 $\pm$ 0.000002	0.000148 $\pm$ 0.000156	0.020	รวม 2 แหล่ง = 0.0004	1.710 x 10 <sup>-4</sup>
	การย่อยอาหารและการหายใจ	N.D.	0.006727 $\pm$ 0.000000	0.000		
ไก่ไข่	มูล	0.000004 $\pm$ 0.000000	0.000080 $\pm$ 0.000027	0.049	รวม 2 แหล่ง = 0.0006	3.141 x 10 <sup>-4</sup>
	การย่อยอาหารและการหายใจ	N.D.	0.006954 $\pm$ 0.000000	0.000		

หมายเหตุ : Hartung (1992), Klarenbeek (1988) และ Tamminga (1992) พบว่า จากการดำรงชีวิตของสัตว์เลี้ยงได้แก่ โคนมที่น้ำหนักตัวเฉลี่ย 650 กก. ปล่อยแก๊ส CH<sub>4</sub> = 0.274 กก./ตัว/วัน โคนเนื้อที่น้ำหนักตัวเฉลี่ย 450 กก. ปล่อยแก๊ส CH<sub>4</sub> = 0.137 กก./ตัว/วัน สุกรขุนที่น้ำหนักตัวเฉลี่ย 7.5 กก. ปล่อยแก๊ส CH<sub>4</sub> = 0.0008 กก./ตัว/วัน ไก่ไข่ที่น้ำหนักตัวเฉลี่ย 5 กก. และไก่เนื้อที่น้ำหนักตัวเฉลี่ย 0.5 กก. ไม่ปล่อยแก๊ส CH<sub>4</sub> จากการดำรงชีวิต  
N.D. = มีค่าน้อยมาก ๆ ไม่มีนัยสำคัญ





รูปที่ 4.8 ร้อยละสัดส่วนของการปลดปล่อยแก๊ส CH<sub>4</sub> และ CO<sub>2</sub> จากมูลสัตว์ การย่อยอาหารและการหายใจของสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่นำหนักตัวเท่ากัน

จากสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่นำหนักตัวเท่ากัน ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าสัตว์เคี้ยวเอื้องซึ่งในที่นี้ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ โคนม มีส่วนในการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก CH<sub>4</sub> และ CO<sub>2</sub> ได้มากกว่าสัตว์เศรษฐกิจประเภทอื่นซึ่งในที่นี้คือ สุกกร ใ้เก๋เนื้อ และใ้เก๋ใจ โดยที่โคเนื้อมีส่วนในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้มากที่สุดจากการปลดปล่อยแก๊ส CH<sub>4</sub>

เมื่อพิจารณาถึงชนิดของอาหารที่โคนม โคเนื้อ และกระบือกิน พบว่าส่วนใหญ่โคเนื้อและกระบือจะกินแต่เฉพาะอาหารหยาบประเภทหญ้า และฟาง ในขณะที่โคนมจะกินอาหารข้นเสริมด้วยในทุกมื้อของอาหาร แสดงว่าชนิดของอาหารมีผลต่อการเกิดแก๊ส CH<sub>4</sub> ซึ่งจะเห็นได้จากการที่โคนมกินอาหารข้นจะทำให้การเกิดแก๊ส CH<sub>4</sub> น้อยกว่าโคเนื้อ และกระบือที่กินเฉพาะหญ้าและฟางเท่านั้น ซึ่งตรงกับที่ เมธา วรรณพัฒน์ (2533) ได้กล่าวในหนังสือโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องว่าอาหารหยาบหรืออาหารข้นที่ถูกหมักในรูเมนจะให้ผลผลิตสุดท้ายแตกต่างกัน โดยเฉพาะอาหารหยาบจะได้กรดอะซิเตทสูงกว่าอาหารข้น ซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดแก๊ส CH<sub>4</sub> สูงตามไปด้วย ดังนั้นการควบคุมการใช้อาหารหยาบ และอาหารข้นในสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อลดการปล่อยแก๊ส CH<sub>4</sub> เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ ประกอบกับอาหารกลุ่มที่มีเซลลูโลส เช่น หญ้าแห้งหรือฟางจะมีส่วนสนับสนุนการผลิตแก๊ส CH<sub>4</sub> มากกว่าอาหารพวกแป้ง (Moe and Tyrell, 1979)

ในขณะที่ Czerkowski (1986) ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า การเกิดแก๊ส  $\text{CH}_4$  ในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอื้องจากการย่อยอาหารหยาบจะมากกว่าอาหารข้น โดยการย่อยอาหารหยาบจะเกิดแก๊ส  $\text{CH}_4$  1.75 โมลต่อกิโลกรัม ส่วนอาหารข้นจะทำให้เกิดแก๊ส  $\text{CH}_4$  1.40 โมลต่อกิโลกรัมที่โคเนื้อ มีการผลิตแก๊ส  $\text{CH}_4$  250 ลิตรต่อตัวต่อวัน และถ้าเปรียบเทียบระหว่างโคเนื้อ และกระบือซึ่งถึงแม้ว่าจะกินอาหารเหมือนกันแต่จากผลการศึกษาก็จะเห็นได้ว่า กระบือจะก่อให้เกิดแก๊ส  $\text{CH}_4$  น้อยกว่าโคเนื้อ ซึ่งคล้ายกันกับ Ichhponani et al. (1971) สังเกตว่า กระบือจะย่อยเซลลูโลสได้ดีกว่าในโคเนื้อ

ผลจากการศึกษาการปลดปล่อยคาร์บอนรวมจากตัวสัตว์แต่ละชนิดดังตารางที่ 4.5 และ UNECE TFEIP (2004) ได้อธิบายถึง การปลดปล่อยมวลคาร์บอนโดยอาศัยหลักการอนุรักษ์มวลจะทำให้สามารถบ่งบอกถึงปริมาณคาร์บอนรวมทั้งหมดที่ปลดปล่อยออกจากตัวสัตว์ (ตันคาร์บอนต่อปี) ซึ่งในที่นี้ได้แก่โคเนื้อ โคเนื้อ กระบือ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ที่สัมพันธ์กับปริมาณของการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดได้ดังสมการที่ 4.1

$$\text{C-emitted}_{(\text{ตัวสัตว์})} = (0.98)\text{Dairy cows} + (0.50)\text{Oxen} + (0.66)\text{Buffaloes} + (0.09)\text{Pigs} + (0.0062)\text{Chickens} + (0.0058)\text{Hens} \quad (4.1)$$

โดยที่  $\text{C-emitted}_{(\text{ตัวสัตว์})}$  = ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนรวมทั้งหมดจากตัวของโคเนื้อ โคเนื้อ กระบือ สุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่ (ตันคาร์บอนต่อปี)

Dairy cows = จำนวนโคเนื้อที่เลี้ยง (ตัว)

Oxen = จำนวนโคเนื้อที่เลี้ยง (ตัว)

Buffaloes = จำนวนกระบือที่เลี้ยง (ตัว)

Pigs = จำนวนสุกรที่เลี้ยง (ตัว)

Chickens = จำนวนไก่เนื้อที่เลี้ยง (ตัว)

Hens = จำนวนไก่ไข่ที่เลี้ยง (ตัว)

ส่วนการศึกษ้อัตราการถ่ายเทมวลคาร์บอนทั้งหมดจากพืชอาหารไปสู่สัตว์ชนิดต่าง ๆ ดังกล่าวด้วยการกิน แล้วมาสะสมเป็นร่างกาย และอวัยวะต่าง ๆ ตลอดจนถึงขับถ่ายของสัตว์ในช่วงระยะเวลาของการเลี้ยงได้ถูกแสดงไว้ในตารางที่ 4.5 ด้วยเช่นกันโดยจะเห็นได้ว่าโคเนื้อ กระบือ โคเนื้อ ซึ่งเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมาก จะมีการถ่ายเทมวลคาร์บอนจากพืชอาหารไปสู่ตัวสัตว์หรือมีการบริโภคคาร์บอนต่อวันต่อตัวสูงกว่า สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่า และเมื่อนำค่าการถ่ายเทมวลคาร์บอน ( $\text{C-input}$  จากพืชอาหารหรือ  $\text{C}_{\text{plant}}$ ) ของสัตว์แต่ละชนิดมาเปรียบเทียบที่น้ำหนักตัวเท่ากัน จะพบว่าสามารถเรียงลำดับค่าการถ่ายเทมวลคาร์บอนจาก

มากไปหาน้อยได้โดยไล่>ไล่เนื้อ>โคนม>โคเนื้อ>กระบือ>สุกร ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นว่าลำดับของสัตว์ที่มีการบริโภคคาร์บอนที่น้ำหนักตัวเท่ากันนี้จะเหมือนกันกับลำดับของการปลดปล่อยคาร์บอนจากตัวสัตว์ในแต่ละชนิดแสดงว่าปริมาณการบริโภคคาร์บอน (C-input) มีความสัมพันธ์กันกับปริมาณคาร์บอนที่ถูกปลดปล่อยออกจากตัวสัตว์ (C-emitted<sub>ตัวสัตว์</sub>) ดังกราฟ และผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสัตว์แต่ละชนิดที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ในรูปที่ 4.9 และภาคผนวก ญ. โดยที่ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการปลดปล่อยคาร์บอน (C-emitted) จากตัวของโคนมกับปริมาณคาร์บอนที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวโคนมโดยการกิน (C-input) สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันมาก (multiple R=0.876) หรือมีความสัมพันธ์กัน 76.7% ( $R^2_{adj}=0.77$ ) ดังในภาคผนวก ญ. และสามารถอธิบายการทดสอบสมมติฐานได้โดยกำหนด

$H_0 : \beta_1 = 0$  หรือ  $H_0$  : ค่า C-emitted จากตัวโคนมไม่ขึ้นกับ C-input โดยการกินของโคนม

$H_1 : \beta_1 \neq 0$  หรือ  $H_1$  : ค่า C-emitted จากตัวโคนมขึ้นกับ C-input โดยการกินของโคนม

ซึ่งจากผลลัพธ์ในรูปจะได้  $F = \frac{MSR}{MSE} = 1316.691$  ดังนั้นจะปฏิเสธ  $H_0$  เพราะ  $F > F_{0.95;1,398} = 3.84$

หรือสามารถพิจารณาจากค่า significance F =  $2.707 \times 10^{-128}$  ซึ่งน้อยกว่าค่า  $\alpha = 0.05$  จึงปฏิเสธ  $H_0$  นั่นคือการปลดปล่อยคาร์บอนจากตัวโคนมมีความสัมพันธ์ในรูปเชิงเส้นกับปริมาณคาร์บอนที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวโคนมโดยการกินที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ส่วนการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการตัดแกน y จะทำได้โดยการกำหนดสมมติฐาน  $H_0 : \beta_0 = 0$  และ  $H_1 : \beta_0 \neq 0$

ซึ่งจากการพิจารณาค่า P-value =  $1.59 \times 10^{-27} < 0.05$  จึงปฏิเสธ  $H_0$  หรือ  $\beta_0 \neq 0$  ดังนั้นจากผลการวิเคราะห์โดยสถิติทดสอบสามารถสรุปได้ว่าสมการถดถอยซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง C-emitted กับ C-input ของโคนมคือ


$$C\text{-emitted}_{\text{โคนม}} = 0.2907 (C\text{-input}_{\text{กิน}}) + 0.6612 \quad (4.2)$$

โดยที่  $C\text{-emitted}_{\text{โคนม}}$  = ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนจากตัวโคนม (กิโลกรัมคาร์บอน/ตัว/วัน)  
 $C\text{-input}_{\text{กิน}}$  = ปริมาณคาร์บอนในพืชอาหารสัตว์ที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวโคนมเพศเมียด้วยการกินในช่วงอายุที่กำลังให้นมโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง  $6.933 \pm 1.282$  (กิโลกรัมคาร์บอน/ตัว/วัน)

ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ยปริมาณคาร์บอนที่ถูกถ่ายเท ( $C_{plant}$ ) ตรึงสะสมในสัตว์ ( $C_{fixation}$ ) ปลดปล่อยออกจากสัตว์ ( $C_{emitted}$ ) ในมูลสัตว์ ( $C_{output}$ ) และ  $C_{emission}$  ของแก๊ส  $CO_2$  และ  $CH_4$  จากมูล การหายใจและการย่อยอาหาร (ค่าเฉลี่ย  $\pm$  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

ชนิดสัตว์	ปริมาณ C ที่ถูกถ่ายเทจากพืชอาหารที่สัตว์กิน (กก.C/ตัว/วัน)	ปริมาณ C ที่ถูกตรึงสะสม (กก.C/ตัว/วัน)					ปริมาณ C ที่ถูกปลดปล่อย (กก.C/ตัว/วัน)			
		น้ำนมโคหรือไขไก่	รวม C สะสมในร่างกาย (สมมูลมวล)	เนื้อสัตว์	เครื่องใน	กระดูก หนัง เลือดและอื่น ๆ (สมมูลมวล)	รวม C ถูกปลดปล่อยจากสัตว์	มูลสัตว์แห้ง	C-emission ของแก๊ส $CO_2$ และ $CH_4$	
									มูลสัตว์	การย่อยอาหารและการหายใจ
โคนม	6.933 $\pm$ 1.282	0.716 $\pm$ 0.173	3.541 $\pm$ 1.371	N.D.	N.D.	N.D.	2.676 $\pm$ 0.571	1.947 $\pm$ 0.603	0.033 $\pm$ 0.006	0.696 $\pm$ 0.110
โคเนื้อ	4.46 $\pm$ 1.93	N.D.	3.09 $\pm$ 1.97	0.031	0.0040	3.055	1.376 $\pm$ 0.360	0.894 $\pm$ 0.31	0.011 $\pm$ 0.005	0.471 $\pm$ 0.188
กระบือ	6.51 $\pm$ 3.14	N.D.	4.72 $\pm$ 3.14	0.0198	0.0039	4.696	1.801 $\pm$ 0.51	1.120 $\pm$ 0.440	0.021 $\pm$ 0.012	0.660 $\pm$ 0.277
สุกร	0.879 $\pm$ 0.300	N.D.	0.626 $\pm$ 0.256	0.047	0.007	0.572	0.253 $\pm$ 0.058	0.178 $\pm$ 0.044	0.0004 $\pm$ 0.0001	0.075 $\pm$ 0.037
ไก่เนื้อ	0.043 $\pm$ 0.007	N.D.	0.026 $\pm$ 0.007	0.0046	0.0008	0.021	0.017 $\pm$ 0.006	0.015 $\pm$ 0.006	0.00004 $\pm$ 0.00004	0.0018 $\pm$ 0.0000
ไก่ไข่	0.042 $\pm$ 0.004	0.013 $\pm$ 0.003	0.013 $\pm$ 0.004	N.D.	N.D.	N.D.	0.016 $\pm$ 0.003	0.014 $\pm$ 0.003	0.00003 $\pm$ 0.00001	0.0019 $\pm$ 0.0000

หมายเหตุ : N.D. = ไม่ได้ตรวจวิเคราะห์



รูปที่ 4.9 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคาร์บอนที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวสัตว์โดยการกิน ( $C_{\text{plant}}$ ) กับปริมาณคาร์บอนปลดปล่อยออกจากตัวสัตว์ (C-emitted) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ส่วนผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง C-emitted กับ C-input ของโคเนื้อ กระบือ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ได้แสดงไว้ในภาคผนวก ตารางที่ ฎ.1 – ฎ.3 ตามลำดับซึ่งจะทำให้ได้สมการความถดถอย ที่แสดงความสัมพันธ์ดังกล่าวของสัตว์แต่ละชนิดดังสมการที่ 4.3 - 4.7

$$C\text{-emitted}_{\text{โคเนื้อ}} = 0.1853 (C\text{-input}_{\text{พืช}}) + 0.5515 \tag{4.3}$$

โดยที่  $C\text{-emitted}_{\text{โคเนื้อ}}$  = ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนจากตัวโคเนื้อ (กิโลกรัมคาร์บอน/ตัว/วัน)  
 $C\text{-input}_{\text{พืช}}$  = ปริมาณคาร์บอนในพืชอาหารสัตว์ที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวโคเนื้อด้วยการกิน ในช่วงอายุที่กำลังให้เนื้อ หรือมีอายุเฉลี่ย  $711.75 \pm 121.55$  วัน โดยมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง  $4.455 \pm 1.933$  (กิโลกรัมคาร์บอน/ตัว/วัน)

$$C\text{-emitted}_{\text{กระบือ}} = 0.1607 (C\text{-input}_{\text{พืช}}) + 0.7559 \tag{4.4}$$

โดยที่  $C\text{-emitted}_{\text{กระบือ}}$  = ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนจากตัวกระบือ (กิโลกรัมคาร์บอน/ตัว/วัน)  
 $C\text{-input}_{\text{พืช}}$  = ปริมาณคาร์บอนในพืชอาหารสัตว์ที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวกระบือด้วยการกิน  
 ในช่วงอายุที่กำลังให้เนื้อ หรือมีอายุเฉลี่ย  $1277.50 \pm 226.48$  วัน  
 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง  $6.514 \pm 3.138$  (กิโลกรัมคาร์บอน/ตัว/วัน)

$$C\text{-emitted}_{\text{สุกร}} = 0.1737 (C\text{-input}_{\text{พืช}}) + 0.1007 \quad (4.5)$$

โดยที่  $C\text{-emitted}_{\text{สุกร}}$  = ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนจากตัวสุกร (กิโลกรัมคาร์บอน/ตัว/วัน)  
 $C\text{-input}_{\text{พืช}}$  = ปริมาณคาร์บอนในพืชอาหารสัตว์ที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวสุกรด้วยการกิน  
 ในช่วงอายุที่กำลังให้เนื้อ หรือมีอายุเฉลี่ย  $131.24 \pm 22.64$  วัน โดยมี  
 ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง  $0.879 \pm 0.297$  (กิโลกรัมคาร์บอน/ตัว/วัน)

$$C\text{-emitted}_{\text{ไก่เนื้อ}} = 0.6572 (C\text{-input}_{\text{พืช}}) - 0.0112 \quad (4.6)$$

โดยที่  $C\text{-emitted}_{\text{ไก่เนื้อ}}$  = ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนจากตัวไก่เนื้อ (กิโลกรัมคาร์บอน/ตัว/วัน)  
 $C\text{-input}_{\text{พืช}}$  = ปริมาณคาร์บอนในพืชอาหารสัตว์ที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวไก่เนื้อด้วยการกิน  
 ในช่วงอายุที่กำลังให้เนื้อ หรือมีอายุเฉลี่ย  $42.51 \pm 4.48$  วัน โดย  
 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง  $0.043 \pm 0.007$  (กิโลกรัมคาร์บอน/ตัว/วัน)

$$C\text{-emitted}_{\text{ไก่ไข่}} = 0.6283 (C\text{-input}_{\text{พืช}}) - 0.0107 \quad (4.7)$$

โดยที่  $C\text{-emitted}_{\text{ไก่ไข่}}$  = ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนจากตัวไก่ไข่ (กิโลกรัมคาร์บอน/ตัว/วัน)  
 $C\text{-input}_{\text{พืช}}$  = ปริมาณคาร์บอนในพืชอาหารสัตว์ที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวไก่ไข่ด้วยการกิน  
 ในช่วงอายุที่กำลังให้ไข่ หรือมีอายุเฉลี่ย  $400.63 \pm 109.72$  วัน โดยมี  
 ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง  $0.042 \pm 0.004$  (กิโลกรัมคาร์บอน/ตัว/วัน)

และจากการสมดุลมวลคาร์บอนพบว่า การสะสมปริมาณคาร์บอนในร่างกายต่อวันของสัตว์แต่ละชนิดดังกล่าวจากปริมาณคาร์บอนที่อยู่ในรูปของพืชอาหารสัตว์ถูกถ่ายเทเข้าสู่ตัวสัตว์โดยการกินต่อวันหักออกด้วยปริมาณคาร์บอนในมูล และในแก๊สที่เกิดจากมูลสัตว์ การย่อยอาหารและการหายใจของสัตว์ต่อวัน ดังข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 4.5 ตามที่ได้นำเสนอไว้แล้ว

และเป็นที่น่าสนใจที่พบว่า ปริมาณคาร์บอนที่ถูกตรึงสะสมอยู่ในร่างกายของสัตว์แต่ละชนิดต่อวัน ไม่ได้ถูกใช้เพื่อการเจริญเติบโตทั้งหมด โดยที่สัตว์แต่ละชนิดจะใช้อาหารที่ได้รับในแต่ละวันสร้างประโยชน์หลัก ๆ 4 ประการ (พานิช ทินนิมิต, 2535) คือ

- เพื่อใช้เป็นโครงสร้างหรือรูปร่างของสัตว์เช่น เนื้อเยื่อ กระดูก ฟัน ผิวหนัง เอ็น ขน เขา และกีบ เป็นต้น

- เพื่อการดำรงชีวิต ควบคุมกระบวนการต่าง ๆ ในร่างกาย

- เพื่อบำรุงเลี้ยงร่างกาย ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เนื่องจากเนื้อเยื่อของร่างกายจะมีการสร้างและการสลายตลอดเวลา

- เพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เนื้อ นม ไข่ ขน หนัง เป็นต้น และสะสมไขมันในร่างกายโดยพลังงานที่ร่างกายได้รับจากอาหาร จะต้องถูกนำไปเป็นพลังงานสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ประมาณ 93% อีก 7% เป็นพลังงานที่ร่างกายเก็บสะสมไว้ใช้ยามขาดแคลน

พัชรา วีระกะลัส (2544) กล่าวว่า กระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายของสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ที่มีเอนไซม์เป็นตัวเร่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปของสารในอาหารที่บริโภคให้กลายเป็นสารในรูปแบบเซลล์และพลังงาน ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต เช่น การเจริญเติบโต และการดำรงชีวิต พลังงานเคมีในรูปของสารอาหารจะถูกเปลี่ยนรูป และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนรูป จะมีการสูญเสียพลังงานไปในรูปของความร้อนเสมอ ซึ่งเป็นไปตามกฎแห่งการลดน้อยถอยลง (Law of Entropy) ของการถ่ายทอดพลังงาน ความร้อนที่สูญเสียเป็นความร้อนที่มีอนุภาคต่ำ ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก สรุปได้ว่าพลังงานเคมีในรูปของสารอาหารที่ส่งต่อไปยังตัวสัตว์จากการกินอาหารของสัตว์นั้น จะเหลือเพียงส่วนน้อยที่ใช้ในการเจริญเติบโต เนื่องจากมีพลังงานที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้ 3 ส่วนคือ พลังงานในส่วนที่กินไม่ได้ พลังงานในส่วนที่ย่อยไม่ได้ และพลังงานที่ถูกเปลี่ยนรูปเป็นความร้อน ซึ่งกระบวนการหมุนเวียนของธาตุอาหารเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการถ่ายทอดพลังงาน โดยธาตุที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตในการสร้างโมเลกุล ได้แก่ ไฮโดรเจน คาร์บอน และออกซิเจน มีสัดส่วนรวมกันถึง 99.47% ของธาตุทั้งหมดที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต (Marsh and Grossa, 1996); Odum (1971); Cunningham and Saigo (2001) ได้อธิบายไว้ว่า สารอาหารในมวลชีวภาพของสิ่งมีชีวิตจะถูกใช้ในการดำรงชีวิต ใช้ในกิจกรรมประจำวัน และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ รวมทั้งจะมีการสูญเสียพลังงานไปในรูปของความร้อนเสมอ มิใช่ทุกส่วนของพืชหรือสัตว์จะถูกกิน และใช้ในกระบวนการเมตาบอลิซึมสร้างเนื้อเยื่อของผู้บริโภคเพื่อการเจริญเติบโตทั้งหมด

ดังนั้นไม่ว่าปริมาณคาร์บอนที่ถูกตรึงอยู่ในร่างกายของสัตว์จากการทำสมดุลคาร์บอน ( $C_{\text{fixation}} = C_{\text{plant}} - C_{\text{emitted}}$ ) จะถูกนำไปใช้ในการสร้างเนื้อเยื่อเพื่อการเจริญเติบโตของสัตว์ทั้งหมด

แต่จะมีปริมาณคาร์บอนบางส่วนถูกใช้ไปในการสร้างเนื้อเยื่อ ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และปริมาณคาร์บอนบางส่วนจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานด้วยกระบวนการเมตาบอลิซึม เพื่อใช้ในการดำรงชีวิต ในขณะที่บางส่วนก็จะสูญเสียไปทุกครั้งจากการเปลี่ยนรูปในลักษณะของความร้อน ซึ่งในเอกสารประกอบคำบรรยายวิชาเคมีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2538) กล่าวไว้ว่า โปรตีนและไขมัน เป็นสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยธาตุ C : H : O เป็นองค์ประกอบสำคัญ และโปรตีน 1 กรัม จะให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี ในขณะที่ไขมันให้พลังงานประมาณ 9.45 กิโลแคลอรีต่อกรัมมากกว่าคาร์โบไฮเดรตถึง 2.25 เท่า (Brody, 1945)

จากการเปรียบเทียบร้อยละของสัดส่วนปริมาณคาร์บอนเฉลี่ยที่ถูกตรึงสะสมอยู่ในร่างกายและน้ำนม โคหรือไขไก่ต่อปริมาณคาร์บอนเฉลี่ยจากพืชอาหารที่สัตว์แต่ละชนิดกินต่อวัน ( $C_{\text{fixation}}/C_{\text{plant}}$ ) พบว่า กระบือมีการตรึงปริมาณคาร์บอนจากพืชอาหารมาสะสมไว้ในร่างกายได้มากที่สุดถึง 72.33% แม้ว่ากระบือจะมีสัดส่วนของเนื้อรวมที่ได้น้อยที่สุดก็ตามเมื่อเทียบจากสัตว์ให้เนื้อที่ทำการศึกษา ดังผลการศึกษาร้อยละของเนื้อ เครื่องในรวม และหนัง เลือด กระดูกของสัตว์ชนิดต่าง ๆ ดังกล่าวจากโรงฆ่าสัตว์ดังตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 สัดส่วนเนื้อรวมและเครื่องในของสัตว์แต่ละชนิด (ค่าเฉลี่ย  $\pm$  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

ชนิดสัตว์	สัดส่วนเนื้อรวม (%)	สัดส่วนเครื่องในรวม (%)	สัดส่วนหนัง เลือด กระดูก หัว และอื่น ๆ	$C_{\text{fixation}}/C_{\text{พืช}}$
โคเนื้อ	46.55 $\pm$ 11.96	8.52 $\pm$ 2.61	44.93%	69.15%
กระบือ	34.65 $\pm$ 7.14	8.32 $\pm$ 1.06	57.03%	72.33%
สุกร	39.61 $\pm$ 1.64	7.77 $\pm$ 0.74	52.62%	71.22%
ไขไก่เนื้อ	48.64 $\pm$ 10.09	11.29 $\pm$ 1.91	38.85%	60.47%

ซึ่งผลจากการศึกษาอัตราการถ่ายเทมวลคาร์บอนจากพืชอาหารสัตว์ไปสู่สัตว์ชนิดต่าง ๆ ดังกล่าวโดยการกิน ในช่วงอายุที่ให้ประโยชน์ และปริมาณคาร์บอนที่ถูกตรึงอยู่ในร่างกายของสัตว์แต่ละชนิดรวมทั้งน้ำนมโค และไขไก่ ที่สัมพันธ์กับปริมาณของการเลี้ยงสัตว์ในแต่ละชนิดนั้น และหลักการอนุรักษ์มวล (UNECE TFEIP, 2004) จะทำให้สามารถบ่งบอกถึงการถ่ายเทมวลคาร์บอนทั้งหมดจากปริมาณการกินอาหารของสัตว์ทุกชนิดที่ทำการศึกษาดังสมการที่ 4.8 รวมถึงการตรึงคาร์บอนไว้ในร่างกายของสัตว์ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งน้ำนมโค และไขไก่ ดังสมการที่ 4.9



$$C_{\text{plant}} = (2.53)\text{Dairy cows} + (1.63)\text{Oxen} + (2.38)\text{Buffaloes} + (0.32)\text{Pigs} \\ + (0.016)\text{Chickens} + (0.015)\text{Hens} \quad (4.8)$$

$$C_{\text{fixation}} = (1.55)\text{Dairy cows} + (1.13)\text{Oxen} + (1.72)\text{Buffaloes} + (0.23)\text{Pigs} + \\ (0.0095)\text{Chickens} + (0.0095)\text{Hens} \quad (4.9)$$

โดยที่

$$C_{\text{plant}} = \text{มวลคาร์บอนที่ถ่ายเทจากอาหารสัตว์ไปสู่ตัวสัตว์ จากการกินอาหาร} \\ \text{ของสัตว์แต่ละชนิด ในช่วงอายุที่ให้ประโยชน์ (ตันคาร์บอนต่อปี)}$$

$$C_{\text{fixation}} = \text{ปริมาณมวลคาร์บอนที่ถูกตรึงอยู่ในร่างกายของสัตว์แต่ละชนิดรวมทั้ง} \\ \text{น้ำนมโค และไข่ไก่ (ตันคาร์บอนต่อปี)}$$

$$\text{Dairy cows} = \text{จำนวนโคนมที่เลี้ยง (ตัว)}$$

$$\text{Oxen} = \text{จำนวนโคเนื้อที่เลี้ยง (ตัว)}$$

$$\text{Buffaloes} = \text{จำนวนกระบือที่เลี้ยง (ตัว)}$$

$$\text{Pigs} = \text{จำนวนสุกรที่เลี้ยง (ตัว)}$$

$$\text{Chickens} = \text{จำนวนไก่เนื้อที่เลี้ยง (ตัว)}$$

$$\text{Hens} = \text{จำนวนไก่ไข่ที่เลี้ยง (ตัว)}$$

และจากกราฟในรูปที่ 4.10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคาร์บอนที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวสัตว์ โดยการกินกับปริมาณคาร์บอนที่ตรึงอยู่ในตัวสัตว์ชนิดต่าง ๆ (C-fixed) ซึ่งจะทำได้สมการถดถอย ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวดังสมการที่ 4.10 - 4.15 โดยอาศัยผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังในภาคผนวก ก. ดังนี้

$$C\text{-fixed}_{\text{โคนม}} = 0.8466 (C\text{-input}_{\text{พืช}}) - 1.6117 \quad (4.10)$$


โดยที่

$$C\text{-fixed}_{\text{โคนม}} = \text{คาร์บอนถูกตรึงอยู่ในตัวของโคนมและน้ำนมโค (กิโลกรัมคาร์บอน/ตัว/วัน)}$$

$$C\text{-input}_{\text{พืช}} = \text{ปริมาณคาร์บอนในพืชอาหารสัตว์ที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวโคนมเพศเมียด้วยการ} \\ \text{กินในช่วงอายุที่กำลังให้นม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง } 6.933 \pm 1.282 \\ \text{(กิโลกรัมคาร์บอน/ตัว/วัน)}$$

$$C\text{-fixed}_{\text{โคเนื้อ}} = 1.0174 (C\text{-input}_{\text{พืช}}) - 1.4537 \quad (4.11)$$

โดยที่  $C\text{-fixed}_{\text{โคเนื้อ}}$  = คาร์บอนที่ถูกตรึงอยู่ในร่างกายของโคเนื้อ (กิโลกรัมคาร์บอน/ตัว/วัน)  
 $C\text{-input}_{\text{พืช}}$  = ปริมาณคาร์บอนในพืชอาหารสัตว์ที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวโคเนื้อด้วยการกิน  
 ในช่วงอายุที่กำลังให้เนื้อ หรือมีอายุเฉลี่ย  $711.75 \pm 121.55$  วัน โดยมี  
 ค่าเฉลี่ยในช่วง  $4.455 \pm 1.933$  (กิโลกรัมคาร์บอน/ตัว/วัน)



รูปที่ 4.10 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคาร์บอนที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวสัตว์โดยการกิน ( $C_{\text{plant}}$ ) กับปริมาณคาร์บอนที่ตรึงอยู่ในตัวสัตว์ชนิดต่าง ๆ ( $C\text{-fixed}$ ) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

$$C\text{-fixed}_{\text{กระบือ}} = 0.9956 (C\text{-input}_{\text{พืช}}) - 1.7698 \quad (4.12)$$

โดยที่  $C\text{-fixed}_{\text{กระบือ}}$  = คาร์บอนที่ถูกตรึงอยู่ในร่างกายของกระบือ (กิโลกรัมคาร์บอน/ตัว/วัน)  
 $C\text{-input}_{\text{พืช}}$  = ปริมาณคาร์บอนในพืชอาหารสัตว์ที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวกระบือด้วยการกิน ในช่วงอายุที่กำลังให้เนื้อ หรือมีอายุเฉลี่ย  $1277.50 \pm 226.48$  วัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง  $6.514 \pm 3.138$  (กิโลกรัมคาร์บอน/ตัว/วัน)

$$C\text{-fixed}_{\text{สุกร}} = 0.8598 (C\text{-input}_{\text{พืช}}) - 0.1301 \quad (4.13)$$

โดยที่  $C\text{-fixed}_{\text{สุกร}}$  = คาร์บอนที่ถูกตรึงอยู่ในร่างกายของสุกร (กิโลกรัมคาร์บอน/ตัว/วัน)  
 $C\text{-input}_{\text{พืช}}$  = ปริมาณคาร์บอนในพืชอาหารสัตว์ที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวสุกรด้วยการกินในช่วงอายุที่กำลังให้เนื้อ หรือมีอายุเฉลี่ย  $131.24 \pm 22.64$  วัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง  $0.879 \pm 0.297$  (กิโลกรัมคาร์บอน/ตัว/วัน)

$$C\text{-fixed}_{\text{ไก่เนื้อ}} = 0.9 (C\text{-input}_{\text{พืช}}) - 0.0128 \quad (4.14)$$

โดยที่  $C\text{-fixed}_{\text{ไก่เนื้อ}}$  = คาร์บอนที่ถูกตรึงอยู่ในร่างกายของไก่เนื้อ (กิโลกรัมคาร์บอน/ตัว/วัน)  
 $C\text{-input}_{\text{พืช}}$  = ปริมาณคาร์บอนในพืชอาหารสัตว์ที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวไก่เนื้อด้วยการกิน ในช่วงอายุที่กำลังให้เนื้อ หรือมีอายุเฉลี่ย  $42.51 \pm 4.48$  วัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง  $0.043 \pm 0.007$  (กิโลกรัมคาร์บอน/ตัว/วัน)

$$C\text{-fixed}_{\text{ไก่ไข่}} = 0.619 (C\text{-input}_{\text{พืช}}) \quad (4.15)$$

โดยที่  $C\text{-fixed}_{\text{ไก่ไข่}}$  = คาร์บอนที่ถูกตรึงอยู่ในตัวของไก่ไข่และไข่ไก่ (กิโลกรัมคาร์บอน/ตัว/วัน)  
 $C\text{-input}_{\text{พืช}}$  = ปริมาณคาร์บอนในพืชอาหารสัตว์ที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวไก่ไข่ด้วยการกิน ในช่วงอายุที่กำลังให้ไข่ หรือมีอายุเฉลี่ย  $400.63 \pm 109.72$  วัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง  $0.042 \pm 0.004$  (กิโลกรัมคาร์บอน/ตัว/วัน)

โดยที่ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคาร์บอนที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวไก่ไข่ โดยการกิน (C-input หรือ  $C_{\text{plant}}$ ) กับปริมาณคาร์บอนที่ถูกตรึงอยู่ในรูปของไข่ไก่และในร่างกายของไก่ไข่ (C-fixed) สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันมาก (multiple  $R=0.95$ ) หรือมีความสัมพันธ์กัน 90.46% ( $R^2_{\text{adj}}=0.90$ ) ดังแสดงในภาคผนวก ฎ. และสามารถอธิบายการทดสอบสมมติฐานได้โดยกำหนด

$$H_0: \beta_1 = 0 \quad \text{หรือ} \quad H_0: \text{ค่า C-fixed ไม่ขึ้นกับ C-input โดยการกินของไก่ไข่}$$

$$H_1: \beta_1 \neq 0 \quad \text{หรือ} \quad H_1: \text{ค่า C-fixed ขึ้นกับ C-input โดยการกินของไก่ไข่}$$

$$\text{ซึ่งจากผลลัพธ์ในรูปจะเห็นได้ว่า } F = \frac{MSR}{MSE} = 3785.211 \text{ มากกว่า } F_{0.95;1,398} = 3.84 \text{ ดังนั้น}$$

จะปฏิเสธ  $H_0$  หรือถ้าพิจารณาจากค่า significance  $F = 2.0874 \times 10^{-205}$  ซึ่งน้อยกว่าค่านัยสำคัญที่กำหนด ( $\alpha = 0.05$ ) จึงปฏิเสธ  $H_0$  นั่นคือ ปริมาณคาร์บอนที่ตรึงอยู่ในรูปไข่ไก่ และในร่างกายของไก่ไข่มีความสัมพันธ์ในรูปเชิงเส้นกับปริมาณคาร์บอนที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวไก่ไข่โดยการกินที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ส่วนการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการตัดแกน  $y$  จะทำได้โดยการกำหนดสมมติฐาน


$$H_0: \beta_0 = 0$$

$$H_1: \beta_0 \neq 0$$

ซึ่งจากการพิจารณาค่า  $P\text{-value} = 0.477 > 0.05$  จึงยอมรับ  $H_0$  หรือ  $\beta_0 = 0$  ดังนั้นจากการวิเคราะห์โดยสถิติทดสอบสามารถสรุปได้ว่า สมการความถดถอยซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง C-fixed กับ C-input ของไก่ไข่คือ  $C\text{-fixed}_{\text{ไก่ไข่}} = 0.619 (C\text{-input}_{\text{ไก่ไข่}})$

นอกจากนี้ผลตรวจวัดน้ำหนักร่างกายและกระป๋องที่อายุต่าง ๆ จากสภาพการเลี้ยงจริงของเกษตรกรเพื่อหาระยะเวลาการเลี้ยงที่เหมาะสม และมีการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดจากปริมาณคาร์บอนที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากโคเนื้อ และกระบือ โดยเฉพาะในรูปมูล แก๊ส  $\text{CH}_4$  และ  $\text{CO}_2$  จากมูลสัตว์ การย่อยอาหาร และการหายใจ เนื่องจากกระบือ และโคพื้นเมืองหรือโคลูกผสมบราห์มัน ซึ่งมีจำนวนโดยประมาณคิดเป็น 70% ของโคเนื้อทั้งหมดโดยเกษตรกรจะเลี้ยงเป็นเหมือนกระป๋องอมสินในลักษณะปล่อยตามพื้นที่สาธารณะ ทุ่งนา ช้างถนน ที่รกร้าง ป่าชายเขา รวมทั้งบนภูเขา ลักษณะการเลี้ยงเป็นการไล่ต้อนไปตามแหล่งอาหารธรรมชาติโดยไม่มีการเสริมอาหารชั้น (ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ, 2551) และไม่มีกำหนดเวลาในการขายเพื่อนำเข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ที่แน่นอน ทำให้ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้คาร์บอน อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยจากปริมาณคาร์บอนที่เหลือจากการตรึงไว้ในร่างกายแล้วถูกปลดปล่อยออกมา ซึ่งสอดคล้องกับที่ภาควิชาสัตวบาล (2525) ได้กล่าวไว้ว่า การใช้อาหารเปลี่ยนเป็นเนื้อจากการเลี้ยงโคเนื้อ และกระบือ จะมากกว่าการเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่น


และนั่นหมายความว่า การเลี้ยงที่ไม่ทราบระยะเวลาการเลี้ยงที่แน่นอนเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นจึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงโคเนื้อ และกระบือดังกล่าว การขายโคจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเกษตรกรต้องการใช้เงินจริง ๆ (กัญญา ตันติวิสุทธิกุล, 2551)



รูปที่ 4.11 ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักเฉลี่ยของโคเนื้อและกระบือที่อายุต่าง ๆ

ผลจากการศึกษาพบว่า โคเนื้อมีน้ำหนักตัวที่วัดได้อยู่ในช่วง 61 - 608 กิโลกรัม/ตัวและมีอายุอยู่ในช่วงประมาณ 2 เดือนถึง 14.84 ปี ส่วนกระบือมีน้ำหนักตัวอยู่ในช่วง 63 - 861 กิโลกรัม/ตัว และมีอายุอยู่ในช่วงประมาณ 2 เดือนถึง 20 ปี ซึ่งจะสามารถบ่งบอกอัตราการเจริญเติบโตได้จากการสังเกตอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักตัวต่ออายุเฉลี่ยของโคเนื้อ และกระบือหรือจากความชันของกราฟในรูปที่ 4.11 ทำให้สามารถบอกได้ว่าที่อายุเท่ากันกระบือจะมีน้ำหนักมากกว่าโคเนื้อยกเว้นในช่วงประมาณ 0.8 ปีแรกเท่านั้นที่โคเนื้อจะมีน้ำหนักมากกว่ากระบือ นอกจากนี้ความชันของกราฟในรูปที่ 4.11 ยังแสดงให้เห็นว่า โคเนื้อสามารถสะสมปริมาณคาร์บอนจากในพืชอาหารมาเก็บไว้ในร่างกายได้สูงสุดในช่วงอายุ 0 - 2 ปี ในขณะที่กระบือจะอยู่ที่ 0 - 4 ปี ดังนั้นจึงควรที่จะขายโคเนื้อหรือกระบือเข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ในช่วงอายุไม่เกินไปจากนี้ เพราะหลังจากนี้โคเนื้อ และกระบือจะมีอัตราการสะสมคาร์บอนไว้ในร่างกายลดลง

ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของธำรงค์ เมฆโหรา (2551) โดยพื้นที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเมื่อประเมินมูลค่าของโคไทยพื้นเมืองและลูกผสมบราห์มันต์ต่อตัวพบว่า ระยะเวลาสำหรับโครุ่นไทยพื้นเมืองควรอยู่ที่ 1 - 1.5 ปี ส่วนลูกผสม บราห์มันต์ควรอยู่ที่ 1.5 ปี



รูปที่ 4.12 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยของโคเนื้อและกระบือที่อายุต่าง ๆ


และจากกราฟรวมทั้งผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นในรูปที่ 4.12 และ ในภาคผนวก ข. ตามลำดับ ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเจริญเติบโตที่อายุต่าง ๆ ของกระบือ และโคเนื้อ มีสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน multiple R = 0.80 และ 0.73 ตามลำดับ โดยมีค่า significance F และ P-value < 0.05 ทำให้สามารถบอกได้ว่าในช่วง 4.5 ปีแรกโคเนื้อจะมีอัตราการเจริญเติบโตมากกว่ากระบือที่อายุเท่ากัน หรือนั่นคือโคเนื้อจะมีการสะสมปริมาณคาร์บอนไว้ในร่างกายได้มากกว่ากระบือในช่วง 4.5 ปีแรกของการเลี้ยง แต่หลังจากนั้นกระบือจะมีอัตราสะสมคาร์บอนได้ดีกว่าโคเนื้อดังสมควร

$$\text{อัตราการเจริญเติบโตของกระบือ} = -16.227 (\text{อายุกระบือ}) + 194.25 \quad (4.16)$$


$$\text{อัตราการเจริญเติบโตของโคเนื้อ} = -21.835 (\text{อายุโคเนื้อ}) + 218.44 \quad (4.17)$$

นอกจากนี้ยังพบว่าโคเนื้อในช่วงการเจริญเติบโตสั้นกว่ากระบือโดยโคเนื้อและกระบือที่มีอายุประมาณตั้งแต่ 10 และ 12 ปีขึ้นไปตามลำดับ จะหยุดการเจริญเติบโต นั่นคือคาร์บอนจากหญ้าที่โคเนื้อ และกระบือกินเข้าไปต่อวันนั้นส่วนใหญ่จะไม่ได้ถูกสะสมไว้ในร่างกายเนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตของโคเนื้อ และกระบือไม่เพิ่มขึ้น หมายความว่าคาร์บอนส่วนใหญ่ที่ถ่ายเทจากพืชไปสู่สัตว์จากการกิน จะถูกปลดปล่อยออกมาในรูปแบบของมูลสัตว์มากกว่าในช่วงที่ยังคงมีการเจริญเติบโตอยู่ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมตามมามากกว่าช่วงที่ยังคงมีการเจริญเติบโตอยู่

นอกจากนี้ในกราฟรูปที่ 4.13 - 4.18 แสดงถึงสัดส่วนของปริมาณคาร์บอนจากพืชอาหารที่ถ่ายเทไปสู่สัตว์แต่ละชนิดที่ทำการศึกษาโดยการกินซึ่งจะถูกตรึงอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายสัตว์มูลสัตว์ และแก๊ส  $\text{CO}_2$ ,  $\text{CH}_4$  จากการย่อยอาหาร และการหายใจต่อตัวต่อวัน ซึ่งจากกราฟจะเห็นว่าปริมาณคาร์บอนในพืชอาหารสัตว์ 100 ส่วนเมื่อถูกถ่ายเทมาสู่สัตว์จะถูกตรึงอยู่ในร่างกายหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ซึ่งในที่นี้ได้แก่ โคนม โคนเนื้อ กระบือ สุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่ เท่ากับ 61.4% 69.18% 72.38% 71.18% 60.69% และ 62.00% ตามลำดับ และปริมาณคาร์บอนบางส่วนที่เหลือจากการตรึงจะถูกปลดปล่อยออกมาจากตัวสัตว์โดยมีส่วนในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 38.6% 30.82% 27.62% 28.82% 39.31% และ 38.00% ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นว่ากระบือสามารถตรึงคาร์บอนไว้ในร่างกายได้สูงสุดในขณะที่ปลดปล่อยคาร์บอนออกมาต่ำสุด ดังนั้นจึงอาจพูดได้ว่าในแต่ละวันกระบือ 1 ตัว มีส่วนทำให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมในแง่ของการปลดปล่อยคาร์บอนน้อยกว่าสัตว์ชนิดอื่น ๆ ที่ทำการศึกษาโดยเฉพาะไก่เนื้อ ซึ่งในแต่ละวันไก่เนื้อ 1 ตัวจะมีร้อยละของการปลดปล่อยคาร์บอนสูงสุดถึง 39.31% จากปริมาณคาร์บอนในอาหารที่กินเข้าไป ดังนั้นการเลี้ยงไก่เพื่อผลิตเนื้อ จึงมีส่วนในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูงมากกว่าการผลิตเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ




รูปที่ 4.13 ร้อยละสัดส่วนปริมาณ C จากส่วนต่าง ๆ ของโคนมที่ถ่ายเทมาจากพืชอาหารสัตว์ต่อวัน




รูปที่ 4.14 ร้อยละสัดส่วนปริมาณ C จากส่วนต่าง ๆ ของโคเนื้อที่ถ่ายเทมาจากพืชอาหารสัตว์ต่อวัน







รูปที่ 4.15 ร้อยละสัดส่วนปริมาณ C จากส่วนต่าง ๆ ของกระบือที่ถ่ายเทมาจากพืชอาหารสัตว์ต่อวัน



รูปที่ 4.16 ร้อยละสัดส่วนปริมาณ C จากส่วนต่าง ๆ ของสุกรที่ถ่ายเทมาจากพืชอาหารสัตว์ต่อวัน



รูปที่ 4.17 ร้อยละสัดส่วนปริมาณ C จากส่วนต่าง ๆ ของไก่เนื้อที่ถ่ายเทมาจากพืชอาหารสัตว์ต่อวัน



รูปที่ 4.18 ร้อยละสัดส่วนปริมาณ C จากส่วนต่าง ๆ ของไก่ไข่ที่ถ่ายเทมาจากพืชอาหารสัตว์ต่อวัน

#### 4.3 การปลดปล่อยคาร์บอนจากการใช้พลังงานที่มีส่วนสำคัญในการผลิตเนื้อ นม ไข่

จากการสำรวจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ ดังกล่าวและโรงฆ่าสัตว์รวมทั้งสหกรณ์โคนมในจังหวัดนครราชสีมาพบว่า ฟาร์มแต่ละแห่งนั้นมีการใช้พลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ต่อตัวต่อวันน้อยมากยกเว้นฟาร์มเลี้ยงสุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ซึ่งการใช้พลังงานจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ ในแต่ละแห่งที่พบได้แก่ พลังงานไฟฟ้าปั๊มน้ำและแสงสว่าง พลังงานน้ำมันในการขนส่งน้ำมัน ไข่ไก่ ในแต่ละวัน ขนส่งอาหารสัตว์ รวมทั้งขนส่งตัวสัตว์มายังฟาร์มและเข้าโรงฆ่าสัตว์และพลังงานน้ำมันที่ใช้ในการตัดหญ้าและขนหญ้ามาใช้เป็นอาหารของโคนม โคเนื้อและกระบือรวมทั้งพลังงานจากการใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สปิโตรเลียมเหลวที่ใช้ในการกกลูกหมูหรือลูกไก่ตามลำดับ ซึ่งปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนต่อตัวต่อวันจากการใช้พลังงานทั้ง 3 ส่วนนี้ของฟาร์มเลี้ยงสุกรสูงที่สุดเท่ากับ 0.83 กก.C/ตัว/วันโดยส่วนใหญ่เกิดจากการใช้พลังงานน้ำมันในการขนส่งอาหารและลูกสุกรเข้าฟาร์ม และสุกรเข้าโรงฆ่าสัตว์ แต่ถ้าพิจารณาเทียบที่น้ำหนักสัตว์เท่ากันพบว่า การปลดปล่อยคาร์บอนจากการใช้พลังงานของฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่จะสูงที่สุดเท่ากับ  $36.65 \times 10^{-3}$  กก.C/กก.น้ำหนักสัตว์เฉลี่ย/วัน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการใช้พลังงานน้ำมันในการขนส่งอาหาร ตัวไก่ไข่รุ่นพร้อมเริ่มไข่ที่อายุ 18 สัปดาห์เข้าฟาร์มและขนส่งไข่ไก่ไปขายดังแสดงในตารางที่ 4.7

ในขณะที่โรงฆ่าสัตว์รวมทั้งสหกรณ์โคนมมีประเภทของการใช้พลังงานที่พบได้แก่ พลังงานไฟฟ้าปั๊มน้ำ แสงสว่างกับพลังงานน้ำมันในการขนส่งเนื้อและน้ำมันโค รวมทั้งการใช้ฟืน แกลบหรือแก๊ส LPG ในการต้มน้ำร้อนเพื่อลวก ถอนขนสุกรและไก่เนื้อ ซึ่งค่าการปลดปล่อยคาร์บอนต่อตัวต่อวันจากพลังงานทั้ง 3 ส่วนนี้ที่ใช้ในการผลิตเนื้อจะสูงที่สุดเท่ากับ 2.34 กก.C/ตัว/วัน สำหรับการผลิตเนื้อสุกร โดยส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ฟืนหรือแกลบเพื่อต้มน้ำร้อนลวกขูดขน และถ้าคิดเทียบที่น้ำหนักสัตว์เท่ากันพบว่าพลังงานที่ใช้ในการผลิตเนื้อไก่มีค่าสูงสุดโดยมีค่าปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนเท่ากับ  $56.92 \times 10^{-3}$  กก.C/กก.น้ำหนักสัตว์เฉลี่ย/วัน ดังแสดงในตารางที่ 4.7 เช่นกัน

และถ้าพิจารณาเปรียบเทียบพลังงานรวมที่ใช้จากทั้ง 2 แห่งคือ ฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์หรือสหกรณ์โคนมพบว่า โคนมโคเนื้อ กระบือ และไก่ไข่จะมีการปลดปล่อยคาร์บอนต่อตัวต่อวันส่วนใหญ่จากการใช้พลังงานน้ำมันขนส่ง ในขณะที่สุกรและไก่เนื้อจะมีการปลดปล่อยคาร์บอนต่อตัวต่อวันจากการใช้พลังงานส่วนใหญ่เกิดที่โรงฆ่าสัตว์จากการใช้ฟืนหรือแกลบดังแสดงในรูปที่ 4.19 โดยที่การผลิตเนื้อสุกรจะมีปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนต่อตัวต่อวันจากการใช้พลังงานรวมทั้งหมดมีค่าสูงสุดเท่ากับ 3.17 กก.C/ตัว/วัน


ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย C-emission จากพลังงานที่ฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์หรือสหกรณ์โคนมใช้ (ค่าเฉลี่ย  $\pm$  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

ค่าเฉลี่ยปริมาณคาร์บอนจากพลังงาน		C-emission (กก. C /ตัว/วัน)					
		โคนม	โคเนื้อ	กระบือ	สุกร	ไก่เนื้อ	ไก่ไข่
ฟาร์ม	ไฟฟ้า *	$0.08 \pm 0.03$	$0.00 \pm 0.01$	$0.00 \pm 0.00$	$0.02 \pm 0.02$	$0.002 \pm 0.00$	$0.002 \pm 0.00$
	น้ำมันขนส่ง **	$0.01 \pm 0.00$	$0.00 \pm 0.00$	$0.01 \pm 0.01$	$0.81 \pm 0.85$	$0.044 \pm 0.03$	$0.066 \pm 0.03$
	น้ำมันที่เครื่องจักรกลใช้*** หรือ LPG****	$0.12 \pm 0.04$	$0.09 \pm 0.13$	$0.07 \pm 0.16$	N.D.	$0.003 \pm 0.00$	$0.002 \pm 0.00$
	รวม C จากพลังงาน/ตัว/วัน	0.21	0.10	0.08	0.83	0.049	0.07
	รวม C จากพลังงาน/น้ำหนักสัตว์/วัน	$0.46 \times 10^{-3}$	$0.33 \times 10^{-3}$	$0.18 \times 10^{-3}$	$8.25 \times 10^{-3}$	$20.95 \times 10^{-3}$	$36.65 \times 10^{-3}$
โรงฆ่าสัตว์หรือสหกรณ์โคนม	ไฟฟ้า *	$0.10 \pm 0.05$	$0.22 \pm 0.37$	$0.12 \pm 0.04$	$0.05 \pm 0.04$	$0.009 \pm 0.004$	N.D.
	น้ำมันขนส่ง **	$0.24 \pm 0.16$	$0.30 \pm 0.26$	$0.32 \pm 0.39$	$0.01 \pm 0.00$	$0.0015 \pm 0.0016$	N.D.
	ฟืน แกลบหรือแก๊ส LPG****	N.D.	N.D.	N.D.	$2.28 \pm 1.02$	$0.1227 \pm 0.1708$	N.D.
	รวม C จากพลังงาน/ตัว/วัน	0.34	0.52	0.44	2.34	0.1332	N.D.
	รวม C จากพลังงาน/น้ำหนักสัตว์/วัน	$0.75 \times 10^{-3}$	$1.72 \times 10^{-3}$	$0.96 \times 10^{-3}$	$23.19 \times 10^{-3}$	$56.92 \times 10^{-3}$	N.D.
รวม C <sub>emission</sub> จากการใช้พลังงานของทั้ง 2 แห่ง	กก.C/ตัว/วัน	0.55	0.62	0.52	3.17	0.1822	0.07
	กก.C/น้ำหนักสัตว์/วัน	$1.21 \times 10^{-3}$	$2.05 \times 10^{-3}$	$1.14 \times 10^{-3}$	$31.41 \times 10^{-3}$	$77.86 \times 10^{-3}$	$36.65 \times 10^{-3}$


หมายเหตุ : \* รายงานไฟฟ้าและแผนภูมิระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ปี2548 (2548) และนพภาพร พานิช และคณะ (2547) วิเคราะห์ได้ว่า CO<sub>2</sub>-emission จากการใช้พลังงานไฟฟ้า = 0.18 กก. C / kWh, \*\* National Transportation Statistics (2000) CO<sub>2</sub>-emission จากพลังงานน้ำมันในการขนส่ง = 74.5 kg CO<sub>2</sub> / 1 ตันน้ำหนักบรรทุกทุก 500 กิโลเมตร, \*\*\* U.S. EPA, AP-42 (1995) และ WHO. (1993) ระบุว่า CO<sub>2</sub>-emission จากน้ำมันดีเซล = 0.61 kg C/L (2.24 kg.CO<sub>2</sub>/L) น้ำมันเบนซิน = 0.57 kg C/L (2.10 kg.CO<sub>2</sub>/L) และจากการใช้แก๊ส LPG จะเกิด CO<sub>2</sub>-emission = 3.259 kg.CO<sub>2</sub>/ 1 kg. LPG (0.889 kg. C/ 1 kg. LPG), \*\*\*\*นพภาพร พานิช และคณะ (2547) วิเคราะห์ได้ว่าการใช้แก๊ส LPG 1 กิโลกรัม จะเกิด CO<sub>2</sub>-emission = 3.0102 kg.CO<sub>2</sub>/ 1 kg. LPG (0.821 kg. C/ 1 kg. LPG) และการเผาไหม้ของธาตุคาร์บอน 1 kg ที่เผาไหม้ได้ในเชื้อเพลิงจะได้สารที่เกิดจากการเผาไหม้เป็น CO<sub>2</sub> หนัก 3.667 kg.

แต่เมื่อเทียบที่น้ำหนักสัตว์เท่ากันพบว่า ไก่เนื้อปลดปล่อยคาร์บอนจากการใช้พลังงานรวมของฟาร์ม และ โรงเชือดไก่ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตเนื้อมากที่สุด คิดเป็น 51.80% ของปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนทั้งหมดจากการใช้พลังงานสำหรับการผลิตเนื้อ นม ไข่ จากสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่ทำการศึกษาดังแสดงในรูป 4.20 โดยจะมีการปลดปล่อยคาร์บอนรวมสูงสุดเท่ากับ  $77.86 \times 10^{-3}$  กก.C/กก.น้ำหนักสัตว์เฉลี่ย/วัน สำหรับการผลิตเนื้อไก่ดังที่ได้แสดงไว้แล้วในตารางที่ 4.7 โดยพบว่า โรงเชือดไก่จะมีการปลดปล่อยคาร์บอนสูงสุด และสูงกว่าฟาร์มไก่ 2.72 เท่าดังรูปที่ 4.21 ดังนั้นผลรวมของปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนจากพลังงานที่ใช้ทั้งหมดของฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์หรือสหกรณ์โคนม จึงสามารถสรุปได้ว่า การผลิตเนื้อไก่มีส่วนในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเมื่อคิดเทียบที่น้ำหนักตัวเท่ากัน ดังแสดงในรูปที่ 4.20 ซึ่งผลการศึกษานี้จะทำให้สามารถบ่งบอกถึงการปลดปล่อยคาร์บอนรวมจากการใช้พลังงานที่ฟาร์ม และ โรงฆ่าสัตว์หรือสหกรณ์โคนมสำหรับการผลิตนํานมโค เนื้อโค เนื้อกระบือ เนื้อสุกร เนื้อไก่ และ ไข่ไก่ ดังสมการที่ 4.18


$$\begin{aligned} \text{C-emission}_{(\text{พลังงาน})} = & (0.20)\text{Dairy cows} + (0.23)\text{Oxen} + (0.19)\text{Buffaloes} + (1.16)\text{Pigs} + \\ & (0.0665)\text{Chickens} + (0.0255)\text{Hens} \end{aligned} \quad (4.18)$$



รูปที่ 4.19 ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนรวมจากการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมัน และแก๊ส LPG ผลิตเนื้อสัตว์ นํานมโค และไข่ไก่ โดยเทียบที่น้ำหนักสัตว์เท่ากัน



รูปที่ 4.20 สัดส่วนการปลดปล่อยคาร์บอนจากการใช้พลังงานผลิตเนื้อสัตว์ น้านมโค และไข่ไก่ของฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์หรือสหกรณ์โคนมโดยเทียบที่น้ำหนักสัตว์เท่ากัน



รูปที่ 4.21 การปลดปล่อยคาร์บอนของการใช้พลังงานผลิตเนื้อสัตว์ น้านมโค และไข่ไก่ระหว่างฟาร์มกับโรงฆ่าสัตว์หรือสหกรณ์โคนม โดยเทียบที่น้ำหนักสัตว์เท่ากัน

โดยที่  $C\text{-emission}_{(\text{พลังงาน})}$  = ปริมาณคาร์บอนรวมที่ถูกปลดปล่อยจากการใช้พลังงานเพื่อการผลิตเนื้อ นม ไข่ (ตันคาร์บอนต่อปี)

Dairy cows	=	จำนวนโคนมที่เลี้ยง	(ตัว)
Oxen	=	จำนวนโคเนื้อที่เลี้ยง	(ตัว)
Buffaloes	=	จำนวนกระบือที่เลี้ยง	(ตัว)
Pigs	=	จำนวนสุกรที่เลี้ยง	(ตัว)
Chickens	=	จำนวนไก่เนื้อที่เลี้ยง	(ตัว)
Hens	=	จำนวนไก่ไข่ที่เลี้ยง	(ตัว)

#### 4.4 ความสัมพันธ์ระหว่าง ร้อยละของคาร์บอนกับคุณสมบัติต่าง ๆ ของพืชอาหารสัตว์ เนื้อ นม ไข่ และมูลจากสัตว์ และการวิเคราะห์เพื่อป้องกันปัญหาทางสิ่งแวดล้อมจากชนิดของการเลี้ยงสัตว์

ผลการศึกษาค่าเฉลี่ยน้ำหนักแห้งของพืชอาหารที่สัตว์กินและมูลแห้งที่สัตว์ขับถ่ายใน 1 วันต่อตัว รวมทั้งน้ำหนักสัตว์มีชีวิตเฉลี่ยจากฟาร์มต่าง ๆ ที่ศึกษา จะทำให้ได้สัดส่วนความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักมูลสัตว์แห้งที่ขับถ่ายออกมาต่อน้ำหนักแห้งเฉลี่ยของพืชอาหารที่สัตว์กินเข้าไปในแต่ละวัน โดยจะเห็นได้ว่าไก่จะขับถ่ายมูลออกมามากที่สุดถึง 42.27% ของน้ำหนักพืชอาหารสัตว์ที่ไก่กินเข้าไป รองลงมาได้แก่ไก่เนื้อ 33.69% สุกร 26.17% โคเนื้อ 24.36% กระบือ 23.40% และโคนม 21.52% ตามลำดับดังแสดงในตารางที่ 4.8 และจากความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักแห้งของพืชอาหารที่สัตว์กินต่อน้ำหนักสัตว์มีชีวิตเฉลี่ย และน้ำหนักแห้งของมูลสัตว์ที่ถ่ายออกมาต่อน้ำหนักสัตว์มีชีวิตเฉลี่ยจะเห็นได้ว่าไก่และไก่เนื้อเป็นกลุ่มที่กินอาหารมากและขับถ่ายมูลออกมามากด้วย ในขณะที่สุกรกินอาหารเพียง 1.94% และขับถ่ายมูลออกมาน้อยที่สุดแค่ 0.51% ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง C-input และ C-emitted<sub>ตัวสัตว์</sub> โดยสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน


และถ้าพิจารณาเฉพาะสัตว์กลุ่มที่ไก่เนื้อพบว่า กระบือจะขับถ่ายมูลออกมาน้อยที่สุดเท่ากับ 23.40% เมื่อคิดเทียบจากน้ำหนักของพืชอาหารที่สัตว์กินเข้าไปเท่ากันดังแสดงในตารางที่ 4.8 ประกอบกับในมูลกระบือแห้งมีผลการวิเคราะห์ร้อยละของคาร์บอนจากห้องปฏิบัติการต่ำสุดเท่ากับ  $30.14 \pm 6.07$  โดยน้อยกว่าสัตว์ชนิดอื่น ๆ อีกด้วยดังแสดงในรูปที่ 4.22 แสดงว่ากระบือสามารถใช้ประโยชน์จากคาร์บอนในพืชอาหารที่กินได้มากกว่าสัตว์ให้เนื้อชนิดอื่น ซึ่งสอดคล้องกับสัดส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคาร์บอนในมูลสัตว์แต่ละชนิดขับถ่ายออกมาเทียบกับปริมาณคาร์บอนจากพืชอาหารที่สัตว์กินต่อวัน พบว่ากระบือมีร้อยละของสัดส่วนดังกล่าวต่ำสุดเท่ากับ 17.20 ดังในตารางที่ 4.8 เช่นกัน

ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยและความสัมพันธ์ของคาร์บอน น้ำหนักแห้ง (นน.) ของพืชอาหารที่สัตว์กินและมูลสัตว์ที่ขับถ่ายออกมาต่อตัวต่อวันและระยะเวลาการเลี้ยงเฉลี่ยของสัตว์แต่ละชนิด (ค่าเฉลี่ย  $\pm$  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

ชนิดสัตว์	ระยะเวลาการเลี้ยงเฉลี่ยจากฟาร์มที่ทำการศึกษา (วัน)	นน. มูลสัตว์แห้งที่ขับถ่าย (กก./ตัว/วัน)	นน. แห้งพืชอาหารที่สัตว์กิน (กก./ตัว/วัน)	นน. CH <sub>4</sub> จากสัตว์ต่อ นน. พืชอาหารแห้ง	นน. แห้งของพืชอาหารที่กินต่อ นน. สัตว์มีชีวิต	นน. แห้งของมูลต่อ นน. สัตว์มีชีวิต	นน. แห้งของมูลต่อ นน. แห้งของพืชอาหารที่สัตว์กิน	C ในรูปแก๊ส CO <sub>2</sub> + CH <sub>4</sub> ต่อ C พืชอาหาร	C มูลสัตว์ต่อ C พืชอาหาร
โคนม	N.D.หรือจนกว่าผสมเทียมไม่ติด	3.532	16.41 $\pm$ 0.58	0.75%	3.65%	0.79%	21.52%	10.51%	28.08%
โคเนื้อ	711.75 $\pm$ 121.55 หรือตามความต้องการใช้เงินของเกษตรกร	2.694	11.06 $\pm$ 5.07	0.94%	3.66%	0.89%	24.36%	10.81%	20.04%
กระบือ	1277.50 $\pm$ 226.48 หรือตามความต้องการใช้เงินของเกษตรกร	3.746	16.01 $\pm$ 7.77	0.79%	3.51%	0.82%	23.40%	10.46%	17.20%
สุกร	131.24 $\pm$ 22.64	0.513	1.96 $\pm$ 0.68	0.36%	1.94%	0.51%	26.17%	8.58%	20.25%
ไก่เนื้อ	42.51 $\pm$ 4.48	0.031	0.092 $\pm$ 0.02	0.00%	3.93%	1.32%	33.69%	4.28%	34.88%
ไก่ไข่	400.63 $\pm$ 109.72	0.041	0.097 $\pm$ 0.01	0.00%	5.08%	2.15%	42.27%	4.59%	33.33%



จากการศึกษายังพบว่าร้อยละของสัดส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคาร์บอนในรูปของแก๊ส  $\text{CO}_2$  และ  $\text{CH}_4$  ต่อปริมาณคาร์บอนในพืชอาหารที่สัตว์กินของโคเนื้อมากที่สุดถึง 10.81 และมากกว่ากระบือ ซึ่งสอดคล้องกับที่ Czerkawski (1986) ได้ให้ข้อมูลไว้ในหนังสือ An Introduction to Rumen Studies ว่าที่ปริมาณอาหารที่สัตว์กินเท่ากัน 3600 กก./ตัว/ปี โคเนื้อจะมีการขับไล่แก๊ส  $\text{CH}_4$  (Eructation) มากกว่ากระบือ โดยจะเกิดแก๊ส  $\text{CH}_4$  จากโคเนื้อและกระบือเท่ากับ 91 และ 73 ลูกบาศก์เมตร/ตัว/ปี ตามลำดับ นอกจากนี้ในรูปที่ 4.22 จะเห็นได้ว่าในเนื้อกระบือจะมีปริมาณคาร์บอนมากกว่าในเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ รวมทั้งนมโคและไข่ไก่ด้วยดังนั้นจึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งสนับสนุนผลการศึกษาที่ว่า กระบือปลดปล่อยคาร์บอนสร้างปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้น้อยกว่าสัตว์ชนิดอื่น ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่ากระบือสามารถตรึงคาร์บอนไว้ในร่างกายได้ดีกว่าสัตว์ชนิดอื่นที่ทำการศึกษา และในตารางที่ 4.9 จะแสดงถึงค่าร้อยละของความชื้น ของแข็งระเหย ไขมัน และปริมาณคาร์บอนในพืชอาหารสัตว์ชนิดต่าง ๆ น้มนมโค ไข่ไก่ เนื้อสัตว์ เครื่องในต่าง ๆ และมูลของสัตว์แต่ละชนิดที่ทำการศึกษา รวมทั้งยังแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของของแข็งระเหย (%TVS) กับร้อยละของปริมาณคาร์บอน (%C) อีกด้วย ซึ่งจะช่วยทำให้สามารถวิเคราะห์หาค่าร้อยละของปริมาณคาร์บอนของสารต่าง ๆ ดังกล่าวจากห้องปฏิบัติการได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นเมื่อทราบค่าร้อยละของของแข็งระเหย เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีการวิเคราะห์หาค่าร้อยละของคาร์บอน (%C) ยังคงต้องใช้เครื่องมือเฉพาะและมีราคาค่อนข้างสูง



รูปที่ 4.22 เปอร์เซ็นต์คาร์บอนในพืชอาหารสัตว์ นม เนื้อ ไข่ และมูลของสัตว์ชนิดต่าง ๆ

ตารางที่ 4.9 ความสัมพันธ์ของความชื้น ของแข็งระเหย และปริมาณคาร์บอนของพืชอาหารสัตว์  
 มุลสัตว์ น้านมโค เนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ และไข่ไก่ (ค่าเฉลี่ย  $\pm$  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

ชนิด	ความชื้น (%)	ของแข็งระเหย (% TVS)	ชี้ถ้ำ (%)	ปริมาณคาร์บอน (% C)	ความสัมพันธ์ %TVS และ %C	R <sup>2</sup>
หญ้าธูซี่	71.20 $\pm$ 1.58	85.41 $\pm$ 2.07	14.59 $\pm$ 2.07	41.55 $\pm$ 0.31	%TVS= 5.02(%C) - 123.13	0.56
หญ้าขน	69.42 $\pm$ 5.77	86.40 $\pm$ 1.54	13.60 $\pm$ 1.54	43.05 $\pm$ 0.17	%TVS= 9.07(%C) - 303.74	0.92
หญ้างินนี้	65.50 $\pm$ 3.67	77.23 $\pm$ 5.04	22.77 $\pm$ 5.04	40.46 $\pm$ 2.19	%TVS= 3.24(%C) - 53.16	0.91
หญ้าสตาร์	61.49 $\pm$ 6.06	79.33 $\pm$ 2.69	20.67 $\pm$ 2.69	44.03 $\pm$ 1.85	%TVS= 1.35(%C) + 19.92	0.86
หญ้านาเปียร์	72.68 $\pm$ 4.20	80.95 $\pm$ 1.20	19.05 $\pm$ 1.20	41.33 $\pm$ 0.62	%TVS= 2.05(%C) - 3.90	0.91
ฟางแห้ง/ฟางก้อน	7.79 $\pm$ 1.39	70.19 $\pm$ 2.74	29.81 $\pm$ 2.74	40.13 $\pm$ 1.47	%TVS= 1.54(%C) + 8.26	0.69
ข้าวโพดแห้ง	9.00 $\pm$ 1.09	79.72 $\pm$ 1.58	20.28 $\pm$ 1.58	42.79 $\pm$ 2.16	%TVS= 0.50(%C) + 58.19	0.71
ต้นข้าวโพดหมัก	70.51 $\pm$ 6.99	76.96 $\pm$ 2.52	23.04 $\pm$ 2.52	43.43 $\pm$ 0.14	%TVS= 15.58(%C) - 599.97	0.96
หัวมันสำปะหลัง	10.79 $\pm$ 0.14	83.45 $\pm$ 1.12	16.55 $\pm$ 1.12	41.88 $\pm$ 1.12	%TVS= 0.55(%C) + 60.33	0.92
ใบต้นมันสำปะหลัง	62.87 $\pm$ 0.16	73.38 $\pm$ 4.20	26.62 $\pm$ 4.20	43.67 $\pm$ 0.19	%TVS= 20.82(%C) - 835.75	0.89
เปลือกหัวมันสำปะหลัง	74.85 $\pm$ 2.27	75.4 $\pm$ 6.79	24.6 $\pm$ 6.79	43.43 $\pm$ 3.91	%TVS= 1.62(%C) + 5.84	0.97
กากมันสำปะหลัง	75.11 $\pm$ 0.28	76.78 $\pm$ 8.81	23.22 $\pm$ 8.81	41.32 $\pm$ 0.47	%TVS= 16.60(%C) - 609.15	0.79
รำข้าว	8.86 $\pm$ 1.07	68.84 $\pm$ 5.78	31.16 $\pm$ 5.78	40.58 $\pm$ 6.77	%TVS= 0.82(%C) + 35.59	0.92
อาหารข้นโคนม	9.51 $\pm$ 0.94	71.26 $\pm$ 2.91	28.74 $\pm$ 2.91	45.01 $\pm$ 1.39	%TVS= 2.05(%C) - 21.03	0.96
อาหารหมักโคนม (TMR)	38.81 $\pm$ 8.97	71.32 $\pm$ 0.22	28.68 $\pm$ 0.22	42.16 $\pm$ 1.97	%TVS= 0.11(%C) + 66.69	0.99
น้านมโค	88.35 $\pm$ 0.31	85.21 $\pm$ 3.30	14.79 $\pm$ 3.30	53.90 $\pm$ 1.39	%TVS= 2.26(%C) - 36.87	0.91
มูลวัวนม	81.26 $\pm$ 4.71	70.95 $\pm$ 6.49	29.05 $\pm$ 6.49	44.24 $\pm$ 2.53	%TVS= 2.45(%C) - 37.54	0.91
หญ้าโคเนื้อและกระบือ	76.64 $\pm$ 7.99	75.20 $\pm$ 3.45	24.80 $\pm$ 3.45	40.42 $\pm$ 1.33	%TVS= 3.54(%C) - 68.59	0.89
อาหารข้นโคเนื้อ	8.64 $\pm$ 1.03	65.60 $\pm$ 2.26	34.40 $\pm$ 2.26	39.99 $\pm$ 2.22	%TVS= 1.21(%C) + 17.26	0.94
เนื้อโค	73.05 $\pm$ 5.59	83.34 $\pm$ 4.20	16.66 $\pm$ 4.20	58.99 $\pm$ 0.25	%TVS= 16.40(%C) - 884.11	0.94
หัวใจโคเนื้อ	76.98 $\pm$ 2.95	85.94 $\pm$ 3.50	14.06 $\pm$ 3.50	63.22 $\pm$ 0.10	%TVS=33.05(%C) - 2003.50	0.88
ปอดโคเนื้อ	82.45 $\pm$ 1.46	86.35 $\pm$ 4.49	13.65 $\pm$ 4.49	50.15 $\pm$ 0.14	%TVS= 30.95(%C) - 1465.60	0.96
ตับโคเนื้อ	75.31 $\pm$ 2.42	81.42 $\pm$ 1.52	18.58 $\pm$ 1.52	59.41 $\pm$ 0.16	%TVS= 8.36(%C) - 415.58	0.74
ไตโคเนื้อ	77.67 $\pm$ 4.73	83.95 $\pm$ 4.09	16.05 $\pm$ 4.09	55.23 $\pm$ 0.05	%TVS= 70.67(%C) - 3819.60	0.87
ม้ามโคเนื้อ	79.03 $\pm$ 1.30	87.11 $\pm$ 6.67	12.89 $\pm$ 6.67	56.34 $\pm$ 0.15	%TVS= 29.53(%C) - 1576.90	0.57
กระเพาะโคเนื้อ	81.86 $\pm$ 3.54	84.38 $\pm$ 2.23	15.62 $\pm$ 2.23	51.07 $\pm$ 0.12	%TVS= 18.06(%C) - 837.74	0.94

ตารางที่ 4.9 ความสัมพันธ์ของความชื้น ของแข็งระเหย และปริมาณคาร์บอนของพืชอาหารสัตว์  
 มวลสัตว์ นมโค เนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์และไข่ไก่ (ต่อ)

ชนิด	ความชื้น (%)	ของแข็งระเหย (% TVS)	ชี้ถ้ำ (%)	ปริมาณคาร์บอน (% C)	ความสัมพันธ์ %TVS และ %C	R <sup>2</sup>
ผ้าชีร์วนอกโคเนื้อ	81.44 ± 3.37	86.71 ± 2.91	13.29 ± 2.91	67.98 ± 0.15	%TVS=18.09(%C) - 1143.35	0.86
ผ้าชีร์วในโคเนื้อ	86.13 ± 1.42	84.99 ± 3.67	15.01 ± 3.67	51.58 ± 1.19	%TVS= 2.50(%C) - 44.10	0.66
ลำไส้โคเนื้อ	83.10 ± 4.16	86.30 ± 3.22	13.70 ± 3.22	49.17 ± 0.21	%TVS= 0.91(%C) + 82.19	0.48
มูลโคเนื้อ	81.12 ± 3.78	62.18 ± 10.48	37.82 ± 10.48	33.47 ± 5.08	%TVS= 2.65(%C) - 26.35	0.89
เครื่องในรวม โคนเนื้อ	80.44 ± 3.44	85.24 ± 1.79	14.76 ± 1.79	56.02 ± 6.45	%TVS= 0.03(%C) + 83.52	0.30
เนื้อกระบือ	76.71 ± 1.85	86.61 ± 3.29	13.39 ± 3.29	68.67 ± 0.21	%TVS= 14.90(%C) - 936.50	0.88
หัวใจกระบือ	79.24 ± 1.97	85.08 ± 3.14	14.92 ± 3.14	62.16 ± 0.32	%TVS= 8.57(%C) - 447.53	0.74
ปอดกระบือ	79.82 ± 3.66	88.18 ± 2.23	11.82 ± 2.23	71.46 ± 0.06	%TVS= 33.04(%C) - 2273.10	0.81
ตับกระบือ	73.71 ± 2.08	83.60 ± 1.88	16.40 ± 1.88	58.49 ± 0.21	%TVS= 7.82(%C) - 373.73	0.73
ไตกระบือ	80.27 ± 2.85	83.06 ± 5.51	16.94 ± 5.51	78.88 ± 0.20	%TVS= 19.24(%C) - 1434.36	0.47
ม้ามกระบือ	76.46 ± 5.43	85.23 ± 3.30	14.77 ± 3.30	51.36 ± 0.36	%TVS= 5.78(%C) - 211.63	0.82
กระเพาะกระบือ	82.19 ± 1.44	85.17 ± 3.09	14.83 ± 3.09	72.03 ± 0.27	%TVS= 10.98(%C) - 705.64	0.91
ผ้าชีร์วนอกกระบือ	78.77 ± 4.11	86.80 ± 2.88	13.20 ± 2.88	55.48 ± 0.68	%TVS= 3.80(%C) - 124.03	0.81
ผ้าชีร์วในกระบือ	85.37 ± 2.21	84.86 ± 4.55	15.14 ± 4.55	67.63 ± 0.67	%TVS= 4.89(%C) - 245.97	0.66
ลำไส้กระบือ	79.27 ± 4.49	89.33 ± 3.21	10.67 ± 3.21	55.00 ± 0.10	%TVS= 26.07(%C) - 1344.52	0.90
มูลกระบือ	81.98 ± 4.42	54.45 ± 11.23	45.55 ± 11.23	30.14 ± 6.07	%TVS= 2.31(%C) - 14.933	0.95
เครื่องในรวม กระบือ	79.46 ± 3.28	85.70 ± 2.05	14.30 ± 2.05	63.61 ± 9.36	%TVS= -0.08(%C) + 90.63	0.34
อาหารผสมสุกร	10.48 ± 2.22	70.28 ± 2.42	29.72 ± 2.42	45.02 ± 2.05	%TVS= 0.93(%C) + 28.43	0.62
เนื้อสุกร	68.74 ± 5.63	82.62 ± 3.67	17.38 ± 3.67	48.00 ± 5.09	%TVS= 0.70(%C) + 48.97	0.94
หัวใจสุกร	75.45 ± 2.40	82.15 ± 0.22	17.85 ± 0.22	49.94 ± 0.71	%TVS= 0.30(%C) + 67.00	0.97
ตับสุกร	72.08 ± 1.72	82.40 ± 1.35	17.60 ± 1.35	50.77 ± 7.21	%TVS= 0.15(%C) + 74.84	0.64
เชิงจี่สุกร	80.49 ± 1.60	81.11 ± 0.90	18.89 ± 0.90	48.23 ± 3.84	%TVS= 0.17(%C) + 73.07	0.51
ม้ามสุกร	77.98 ± 3.36	79.05 ± 0.07	20.95 ± 0.07	46.91 ± 2.45	%TVS= 0.03(%C) + 77.65	0.91
กระเพาะสุกร	75.09 ± 1.70	83.18 ± 0.25	16.82 ± 0.25	47.31 ± 4.73	%TVS= 0.05(%C) + 80.72	0.94
ไส้อ่อนสุกร	79.46 ± 1.70	78.31 ± 0.29	21.69 ± 0.29	42.42 ± 4.09	%TVS= 0.07(%C) + 75.32	0.98

ตารางที่ 4.9 ความสัมพันธ์ของความชื้น ของแข็งระเหย และปริมาณคาร์บอนของพืชอาหารสัตว์  
มูลสัตว์ นมโค เนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ และไข่ไก่ (ต่อ)

ชนิด	ความชื้น (%)	ของแข็งระเหย (% TVS)	ขี้เถ้า (%)	ปริมาณคาร์บอน (% C)	ความสัมพันธ์ %TVS และ %C	R <sup>2</sup>
ไส้ตันสุกร	82.04 ± 1.70	79.46 ± 1.20	20.54 ± 1.20	46.06 ± 5.85	%TVS = 0.20(%C) + 70.44	0.91
มูลสุกร	67.71 ± 5.54	61.30 ± 3.40	38.7 ± 3.4	35.98 ± 1.83	%TVS = 1.78(%C) - 2.78	0.92
เครื่องในรวม สุกร	77.51 ± 3.49	80.86 ± 1.83	19.14 ± 1.83	47.67 ± 4.95	%TVS = 0.25(%C) + 69.00	0.45
แกลบ	11.12 ± 1.01	60.67 ± 5.45	39.33 ± 5.45	35.56 ± 3.33	%TVS = 1.64(%C) + 2.99	0.95
อาหารไก่เนื้อ	10.45 ± 1.25	72.82 ± 2.07	27.18 ± 2.07	44.06 ± 4.52	%TVS = 0.40(%C) + 55.01	0.78
เนื้อไก่	65.71 ± 6.57	84.37 ± 4.01	15.63 ± 4.01	48.40 ± 6.21	%TVS = 0.59x + 55.97	0.83
เอ็นไก่	51.08 ± 8.22	90.97 ± 1.26	9.03 ± 1.26	44.88 ± 0.79	%TVS = 1.56(%C) + 20.87	0.97
ตับไก่	71.92 ± 0.86	85.63 ± 1.31	14.37 ± 1.31	46.71 ± 1.18	%TVS = 1.05(%C) + 36.61	0.90
หัวใจไก่	72.66 ± 0.36	85.73 ± 0.96	14.27 ± 0.96	49.78 ± 0.28	%TVS = 3.38(%C) - 82.67	0.99
กึ๋นไก่	80.94 ± 0.28	80.04 ± 1.09	19.96 ± 1.09	45.14 ± 0.79	%TVS = 1.16(%C) + 27.72	0.70
หนังไก่	48.49 ± 2.12	92.50 ± 0.88	7.50 ± 0.88	48.30 ± 1.94	%TVS = 0.45(%C) + 70.96	0.58
ปลายปีกไก่	60.45 ± 0.99	77.11 ± 0.81	22.89 ± 0.81	46.18 ± 1.26	%TVS = 0.61(%C) + 48.94	0.89
ตีนไก่	60.79 ± 1.63	73.45 ± 0.61	26.55 ± 0.61	41.92 ± 2.24	%TVS = 0.26(%C) + 62.48	0.92
ข้อขาไก่	65.07 ± 0.82	79.97 ± 1.76	20.03 ± 1.76	46.19 ± 1.01	%TVS = 1.16(%C) + 26.43	0.44
มูลไก่เนื้อ	61.51 ± 22.31	66.39 ± 9.16	33.61 ± 9.16	34.07 ± 6.13	%TVS = 0.97(%C) + 33.23	0.42
เครื่องในรวม ไก่เนื้อ	75.17 ± 5.01	83.80 ± 3.26	16.20 ± 3.26	47.21 ± 2.36	%TVS = 1.15(%C) + 29.05	0.63
อาหารไก่ไข่	10.57 ± 0.62	68.31 ± 3.15	31.69 ± 3.15	45.58 ± 4.05	%TVS = 0.73(%C) + 34.92	0.89
ไข่ไก่	40.55 ± 10.62	92.89 ± 2.51	7.11 ± 2.51	50.99 ± 1.17	%TVS = 2.01(%C) - 9.43	0.88
มูลไข่ไก่	70.38 ± 12.21	57.85 ± 7.41	42.15 ± 7.41	34.09 ± 2.56	%TVS = 2.37(%C) - 22.80	0.57

หมายเหตุ : \*คิดจากการรวมค่าเฉลี่ยของเครื่องในแต่ละอย่าง

และผลของการศึกษานี้ยังสามารถใช้วิเคราะห์เพื่อตัดสินใจบ่งชี้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมจากชนิดของการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ที่ทำการศึกษาซึ่งจะอาศัยการจัดผลลัพธ์ในรูปของแมทริกซ์ (payoff matrix) โดยการนำเอาทางเลือกต่าง ๆ ได้แก่การทำปุ๋ยสัตว์ชนิดต่าง ๆ และสถานการณ์ของการปลดปล่อยคาร์บอนมาเรียงกันดังตารางที่ 4.10 แล้วทำการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจโดยอาศัยทฤษฎีหรือกฎต่าง ๆ (ไพบูลย์ เข้มเฟื่อน, 2542 และ Sullivan et al., 2003) ดังนี้

ตารางที่ 4.10 ผลการปลดปล่อยคาร์บอนในสถานการณ์ต่าง ๆ จากการทำปศุสัตว์ในรูปแบบเมทริกซ์

ทางเลือกของการทำปศุสัตว์	สถานการณ์การปลดปล่อยคาร์บอน (กก.C/นน.สัตว์/วัน)	
	C-emitted จากตัวสัตว์	C-emission จากการใช้พลังงาน
โคนม	$5.96 \times 10^{-3}$	$1.21 \times 10^{-3}$
โคเนื้อ	$4.57 \times 10^{-3}$	$2.05 \times 10^{-3}$
กระบือ	$3.95 \times 10^{-3}$	$1.14 \times 10^{-3}$
สุกร	$2.48 \times 10^{-3}$	$31.41 \times 10^{-3}$
ไก่เนื้อ	$7.27 \times 10^{-3}$	$77.86 \times 10^{-3}$
ไก่ไข่	$8.38 \times 10^{-3}$	$36.65 \times 10^{-3}$

การวิเคราะห์โดยประยุกต์กฎของลาปลาซ (Laplace rule) มาใช้เพื่อบ่งชี้ชนิดของปศุสัตว์ที่สร้างปัญหาทางสิ่งแวดล้อมสูงสุด สามารถทำได้โดยการกำหนดค่าความน่าจะเป็นของแต่ละสถานการณ์ให้เท่า ๆ กัน ซึ่งหมายความว่า ให้ความสำคัญของสถานการณ์ต่าง ๆ เท่ากันหมด (ในที่นี้  $n = 2$ ) ดังผลลัพธ์ในตารางที่ 4.10 (ก) ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเลี้ยง และผลิตเนื้อกระบือจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ส่วนทางเลือกในการเลี้ยง และผลิตเนื้อไก่จะก่อให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเมื่อประยุกต์ใช้กฎของลาปลาซในการวิเคราะห์

ตารางที่ 4.10 (ก) ผลลัพธ์จากการประยุกต์ใช้กฎของลาปลาซ

ทางเลือกของการทำปศุสัตว์	(C-emitted + C-emission)/n
โคนม	$(5.96+1.21)/2 \times 10^{-3}$
โคเนื้อ	$(4.57+2.05)/2 \times 10^{-3}$
กระบือ	$(3.95+1.14)/2 \times 10^{-3}$
สุกร	$(2.48+31.41)/2 \times 10^{-3}$
ไก่เนื้อ*	$(7.27+77.86)/2 \times 10^{-3}$
ไก่ไข่	$(8.38+36.65)/2 \times 10^{-3}$

หมายเหตุ : \*ปศุสัตว์ที่ถูกเลือกบ่งชี้ว่าก่อให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมสูงสุด

ในขณะเดียวกันเมื่อนำกฎสูงสุดจากสูงสุด (maximax rules) มาประยุกต์ใช้เพื่อบ่งชี้ปัญหาจากการทำปศุสัตว์ชนิดต่าง ๆ ด้วยการเลือกสถานการณ์จากที่แสดงอยู่ในตารางที่ 4.10 ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุด จากนั้นจะนำมาเลือกทางเลือกที่ให้ผลลัพธ์สูงสุดของทุกทางเลือกอีกครั้งหนึ่ง โดยสามารถแสดงด้วยรูปแบบทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้

$$\max_i \left[ \max_j P_{ij} \right]$$

ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ดังในตารางที่ 4.10 (ข) โดยจะเห็นได้ว่าการเลี้ยงและผลิตเนื้อกระบือจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ส่วนทางเลือกในการเลี้ยงและผลิตเนื้อไก่จะก่อให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมสูงสุด

ตารางที่ 4.10 (ข) ผลลัพธ์จากการประยุกต์ใช้กฎสูงสุดจากสูงสุด

ทางเลือกของการทำปศุสัตว์	$\frac{\max P_{ij}}{i(x)}$
โคนม	$5.96 \times 10^{-3}$
โคเนื้อ	$4.57 \times 10^{-3}$
กระบือ	$3.95 \times 10^{-3}$
สุกร	$31.41 \times 10^{-3}$
ไก่เนื้อ*	$77.86 \times 10^{-3}$
ไก่ไข่	$36.65 \times 10^{-3}$

หมายเหตุ : \*ปศุสัตว์ที่ถูกเลือกบ่งชี้ว่าก่อให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมสูงสุด

และเมื่อนำกฎต่ำสุดจากค่าสูงสุดของความเสียใจ (minimax regret rule) มาประยุกต์ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงจากความเสียใจที่ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ด้อยกว่า ด้วยการเลือกผลลัพธ์สูงสุดในแต่ละสถานการณ์แล้วนำเอาผลลัพธ์ดังกล่าวตั้งลบด้วยค่าผลลัพธ์ทุก ๆ ตัวของแต่ละสถานการณ์และจัดให้อยู่ในรูปเมทริกซ์ดังตารางที่ 4.10 (ค) แล้วเลือกค่าเสียใจสูงสุดของแต่ละทางเลือกจากนั้นนำมาเลือกหาค่าต่ำสุดของแต่ละทางเลือกอีกครั้งหนึ่ง โดยสามารถแสดงด้วยรูปแบบทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้

$$\min_i \left[ \frac{\max R_{ij}}{j} \right]$$

ซึ่งจะทำให้ได้ผลลัพธ์ดังในตารางที่ 4.10 (ง) โดยจะเห็นได้ว่าการผลิตเนื้อจากการเลี้ยงกระบือและการผลิตนํ้านมโคจากการเลี้ยงโคนมจะเป็นทางเลือกที่ควรสนใจเลือกทำ ส่วนทางเลือกในการเลี้ยงและผลิตเนื้อไก่จะก่อให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมสูงสุดจากการประยุกต์ใช้วิธีกฎต่ำสุดจากค่าสูงสุดของความเสียใจนี้เช่นกัน

ตารางที่ 4.10 (ค) ค่าความเสียหายของแต่ละทางเลือกในการทำปุ๋ยสัตว์

ทางเลือกของการทำปุ๋ยสัตว์	สถานการณ์การปลดปล่อยคาร์บอน (กก.C/น.สัตว์/วัน)	
	C-emitted จากตัวสัตว์	C-emission จากการใช้พลังงาน
โคนม	$2.42 \times 10^{-3}$	$76.75 \times 10^{-3}$
โคเนื้อ	$3.81 \times 10^{-3}$	$75.81 \times 10^{-3}$
กระบือ	$4.43 \times 10^{-3}$	$76.72 \times 10^{-3}$
สุกร	$5.9 \times 10^{-3}$	$46.45 \times 10^{-3}$
ไก่เนื้อ	$1.11 \times 10^{-3}$	0
ไก่ไข่	0	$41.21 \times 10^{-3}$

ตารางที่ 4.10 (ง) ค่าสูงสุดของความเสียหายในแต่ละทางเลือกทำปุ๋ยสัตว์

ทางเลือกของการทำปุ๋ยสัตว์	$\frac{\max R_{ij}}{j}$
โคนม	$76.75 \times 10^{-3}$
โคเนื้อ	$75.81 \times 10^{-3}$
กระบือ	$76.72 \times 10^{-3}$
สุกร	$46.45 \times 10^{-3}$
ไก่เนื้อ*	$1.11 \times 10^{-3}$
ไก่ไข่	$41.21 \times 10^{-3}$

หมายเหตุ : \*ปุ๋ยสัตว์ที่ถูกเลือกบ่งชี้ว่าก่อให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมสูงสุด

ดังนั้นจากผลของการวิเคราะห์โดยอาศัยทฤษฎีและกฎต่าง ๆ อันได้แก่ การจัดผลลัพธ์ในรูปของเมทริกซ์ การประยุกต์กฎของลาปลาซ กฎสูงสุดจากสูงสุด และกฎต่ำสุดจากค่าสูงสุดของความเสียหาย เพื่อตัดสินใจบ่งชี้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมจากชนิดของการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ที่ทำการศึกษาพบว่า การเลี้ยงและผลิตเนื้อกระบือ จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ส่วนทางเลือกในการเลี้ยงและผลิตเนื้อไก่ จะก่อให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

#### 4.5 แนวทางการวิเคราะห์ เพื่อลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนจากการผลิตเนื้อโค เนื้อ กระบือ เนื้อสุกร เนื้อไก่ นมโค และไข่ไก่ รวมทั้งแนวโน้มจากการทำปศุสัตว์ ทั้ง 6 ชนิดในจังหวัดนครราชสีมา

จากผลรวมค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจากตัวสัตว์แต่ละชนิดในรูปของมูลสัตว์ แก๊ส CO<sub>2</sub> CH<sub>4</sub> จากการหายใจและการย่อยอาหารของสัตว์แต่ละชนิดดังแสดงในตารางที่ 4.5 รวมทั้งจากการใช้พลังงานของฟาร์มเลี้ยงสัตว์และโรงฆ่าสัตว์หรือสหกรณ์โคนมในจังหวัดนครราชสีมาดังตารางที่ 4.7 พบว่า ค่าการปลดปล่อยคาร์บอนรวมต่อตัวต่อปีของการผลิตนมโค เนื้อโค เนื้อกระบือ เนื้อสุกร เนื้อไก่ และไข่ไก่เท่ากับ 1.18, 0.73, 0.85, 1.25, 0.07 และ 0.03 ตันC./ตัว/ปี ตามลำดับ ซึ่งจากหลักการอนุรักษ์มวล (UNECE TFEIP, 2004) และผลการศึกษานี้ทำให้สามารถบ่งชี้ถึงปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนรวมสำหรับการผลิตเนื้อสัตว์ นมโค และไข่ไก่ ดังสมการที่ 4.19–4.21 ตามลำดับดังนี้

ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนรวมจากการผลิตเนื้อโค เนื้อกระบือ เนื้อสุกรและเนื้อไก่

$$C\text{-emitted}_{(\text{ตัวสัตว์+พลังงานที่ใช้})} = (0.73)\text{Oxen} + (0.85)\text{Buffaloes} + (1.25)\text{Pigs} + (0.07)\text{Chickens} \quad (4.19)$$

โดยที่  $C\text{-emitted}_{(\text{ตัวสัตว์+พลังงานที่ใช้})}$  = ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนรวมทั้งหมดจากตัวสัตว์แต่ละชนิดและจากการใช้พลังงานสำหรับการผลิตเนื้อสัตว์ (ตันคาร์บอนต่อปี)

Oxen = จำนวนโคเนื้อ (ตัว)

Buffaloes = จำนวนกระบือ (ตัว)

Pigs = จำนวนสุกร (ตัว)

Chickens = จำนวนไก่เนื้อ (ตัว)

ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนรวมจากการผลิตนมโค

$$C\text{-emitted}_{(\text{ตัวโคนม+พลังงานที่ใช้})} = (1.18)\text{Dairy cows} \quad (4.20)$$

โดยที่  $C\text{-emitted}_{(\text{ตัวโคนม+พลังงานที่ใช้})}$  = ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนรวมทั้งหมดจากโคนมและจากการใช้พลังงานสำหรับการผลิตนมโค (ตันคาร์บอนต่อปี)



Dairy cows = จำนวนโคนม (ตัว)

ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนรวมจากการผลิตไข่ไก่


$$C\text{-emitted}_{(\text{ตัวไก่ไข่+พลังงานที่ใช้})} = (0.03)\text{Hens} \quad (4.21)$$

โดยที่  $C\text{-emitted}_{(\text{ตัวไก่ไข่+พลังงานที่ใช้})} =$  ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนรวมทั้งหมดจากตัวไก่ไข่  
และจากการใช้พลังงานสำหรับการผลิตไข่ไก่  
(ตันคาร์บอนต่อปี)


Hens = จำนวนไก่ไข่ (ตัว)

หรือถ้าคิดเทียบที่น้ำหนักสัตว์เท่ากัน สำหรับการผลิตเนื้อ นม ไข่ จากสัตว์ชนิดต่าง ๆ ดังกล่าวจะพบว่าค่าการปลดปล่อยคาร์บอนรวมจากตัวสัตว์ และจากการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมัน แก๊สปิโตรเลียมเหลว และฟืนหรือแกลบของฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์หรือสหกรณ์โคนมเท่ากับ 2.62, 2.42, 1.86, 12.37, 31.07 และ 16.43 ตันC./ตัน<sub>นน.สัตว์</sub>/ปี ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นว่าการผลิตเนื้อไก่จะทำให้เกิดการปลดปล่อยคาร์บอนรวมสูงสุดคิดเป็น 46.53% ของการผลิตเนื้อ นม ไข่ทั้งหมดในขณะที่การผลิตเนื้อกระบือจะมีการปลดปล่อยคาร์บอนรวมต่ำสุดคิดเป็นแค่ 2.79% ของการผลิตเนื้อ นม ไข่ เท่านั้นดังแสดงในรูปที่ 4.23 และในรูปที่ 4.24 แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของการปลดปล่อยคาร์บอนระหว่างตัวสัตว์แต่ละชนิด รวมทั้งจากการใช้พลังงานเพื่อการผลิตเนื้อ นม ไข่ของสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่น้ำหนักเท่ากัน ซึ่งจะพบว่า โคนม โคเนื้อ และกระบือ เป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก ใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน ในการผลิตเนื้อและนม น้อย ซึ่งปริมาณคาร์บอนที่ปลดปล่อยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของมูลสัตว์ การย่อยอาหาร และการหายใจ ในขณะที่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ จะมีการปลดปล่อยคาร์บอนส่วนใหญ่จากการใช้พลังงาน

ซึ่งจากรูปที่ 4.24 จะเห็นว่า การผลิตเนื้อสุกรมีการปลดปล่อยคาร์บอนจากการใช้พลังงานสูงสุดคิดเป็น 92.60% โดยเฉพาะที่เกิดจากการใช้ฟืนหรือแกลบในการต้มน้ำร้อนเพื่อลวกทำความสะอาดและชุดขน โดยที่เหลืออีก 7.40% เกิดจากตัวของสุกรเอง ซึ่งใกล้เคียงกับค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจากการใช้พลังงานเพื่อการดังกล่าวในการผลิตเนื้อไก่เช่นกัน ดังในตารางที่ 4.11 ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนการปลดปล่อยคาร์บอนจากตัวสัตว์ และจากการใช้พลังงานเพื่อการผลิตเนื้อ นม ไข่ ของสัตว์แต่ละชนิด โดยจะเห็นว่าการปลดปล่อยคาร์บอนสำหรับการผลิตเนื้อสุกร เนื้อไก่ และไข่ไก่ จากการใช้พลังงานมากกว่าจากตัวสัตว์



รูปที่ 4.23 เปรียบเทียบสัดส่วนการปลดปล่อยคาร์บอนรวมทั้งหมดจากตัวสัตว์และจากการใช้พลังงานของการผลิตเนื้อ นม ไข่จากสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่นำหนักเท่ากัน



รูปที่ 4.24 สัดส่วนการปลดปล่อยคาร์บอนรวมทั้งหมดต่อตัวต่อวัน สำหรับการผลิตเนื้อ นม ไข่

ตารางที่ 4.11 การเปรียบเทียบสัดส่วนการปลดปล่อยคาร์บอนระหว่างจากตัวสัตว์กับการใช้พลังงานของฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์หรือสหกรณ์โคนมใช้ในการผลิตเนื้อ นม ไข่ ของสัตว์ชนิดต่าง ๆ

สัดส่วนคาร์บอนที่ถูกปลดปล่อยออกจาก	โคนม	โคเนื้อ	กระบือ	สุกร	ไก่เนื้อ	ไก่ไข่
ตัวสัตว์ (%)	82.95	69.28	77.60	7.40	8.46	18.54
การใช้พลังงาน (%)	17.05	30.72	22.40	92.60	91.54	81.46

ดังนั้นการพิจารณาเพื่อลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอน ควรสนใจที่ประเด็นของการลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงหรือเปลี่ยนแนวทางในการใช้เชื้อเพลิง ก็จะสามารถลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนสำหรับการผลิตเนื้อสุกรและเนื้อไก่ลงได้ เช่นการใช้แก๊สหุงต้มหรือแก๊สปิโตรเลียมเหลวในการต้มน้ำร้อนแทนการใช้ฟืนหรือแกลบ เนื่องจากแก๊สหุงต้มมีประสิทธิภาพการเผาไหม้สูงเกิดเขม่าน้อย ไม่มีขี้เถ้าเกิดขึ้นจากการเผาไหม้ ซึ่งเชื้อเพลิงแก๊สเป็นเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศน้อยที่สุด โดยคุณสมบัติของแก๊สปิโตรเลียมเหลวจะให้ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง 11,832 - 12,034 Kcal/kg หรือเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า 13.70 kWh/kg ในขณะที่แกลบ 1 กิโลกรัมเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดเท่ากับ 0.49 kWh ส่วนเศษไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อปานกลางมีน้ำหนัก  $748.23 \pm 116.42 \text{ kg/m}^3$  ประมาณ 0.5 ลูกบาศก์เมตรเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า 0.21 kWh/kg (นพภาพร พานิช และคณะ, 2547) และกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (1999) กล่าวว่าแกลบ 1 kg เทียบเท่าพลังงาน 14.27 MJ/kg (3,410.611 Kcal/kg) หรือจากพื้นฐานการคำนวณการเผาไหม้ ซึ่งการเผาไหม้เป็นปฏิกิริยาเคมีชนิดหนึ่ง ดังนั้นจึงสามารถนำเอาหลักการ และกฎการทำปฏิกิริยาเคมีทั่วไปมาใช้ได้ ซึ่งจะได้ว่าการเผาไหม้โพรเพน (มีสัดส่วน 70% ของการผลิตแก๊สหุงต้ม) จะเกิดพลังงาน 499,000 Kcal/Kmol ดังสมการที่ 4.22 แสดงสมการปฏิกิริยาการเผาไหม้โพรเพน



ในขณะที่การเผาไหม้ของคาร์บอนซึ่งอยู่ในรูปของฟืนหรือแกลบที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงจะเกิดพลังงาน 97,000 Kcal/Kmol ดังสมการที่ 4.23 แสดงสมการปฏิกิริยาการเผาไหม้คาร์บอน



ดังนั้นการใช้แก๊ส LPG ในการต้มน้ำร้อนจะให้พลังงานความร้อนสูงกว่าและมีมลพิษทางอากาศต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นฟืนหรือแกลบจึงสามารถใช้แก๊ส LPG แทนการใช้ฟืนหรือแกลบในการต้มน้ำร้อนของโรงฆ่าสุกรและไก่ เพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนจากการใช้พลังงานลงได้

ในขณะที่โคนม โคนเนื้อ กระบือมีการปลดปล่อยคาร์บอนจากตัวสัตว์มากกว่าจากการใช้พลังงาน ดังนั้นแนวทางการลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนโดยเฉพาะแก๊ส  $\text{CH}_4$  จึงควรพิจารณาที่ลักษณะของอาหารที่ใช้หรือปรับลดสัดส่วนปริมาณอาหารหยาบต่ออาหารข้น โดยเฉพาะอาหารหยาบจำพวกฟางหรือหญ้าแห้งที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเคี้ยวเอื้องนานย่อยยากและมีเซลลูโลสสูงเพื่อลดปริมาณแก๊ส  $\text{CH}_4$  ที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากระบวนการย่อยอาหารของแบคทีเรียกลุ่มที่ผลิตแก๊ส  $\text{CH}_4$  (methanogenic bacteria) เนื่องจากอาหารกลุ่มที่มีเซลลูโลสจะมีส่วนสนับสนุนการผลิตแก๊ส  $\text{CH}_4$  มากกว่าอาหารพวกแป้ง (Moe and Tyrell, 1979)

นอกจากนี้ถ้าเปรียบเทียบการปลดปล่อยแก๊ส  $\text{CH}_4$  ที่เกิดขึ้นจากมูลสัตว์ การย่อยอาหารและการหายใจระหว่างสัตว์แต่ละชนิดดังรูปที่ 4.8 จะเห็นว่าที่น้ำหนักสัตว์เท่ากัน โคนเนื้อมีส่วนของการปลดปล่อยแก๊ส  $\text{CH}_4$  จากมูลและจากการย่อยอาหารกับการหายใจสูงสุดคิดเป็น 35 - 36% ของการปลดปล่อยแก๊ส  $\text{CH}_4$  จากสัตว์ชนิดต่าง ๆ รองลงมาได้แก่กระบือและโคนมตามลำดับ เนื่องจาก โคนเนื้อ กระบือและโคนมเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องซึ่งทราบกันดีว่าจะมีการขับไล่แก๊ส  $\text{CH}_4$  ออกจากการย่อยสลายอาหารจำพวกเส้นใยหรือเซลลูโลสของแบคทีเรียกลุ่มสร้าง  $\text{CH}_4$  ที่อยู่ในกระเพาะรูเมน ในขณะที่สุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่มีการปลดปล่อยแก๊ส  $\text{CH}_4$  จากการย่อยอาหารน้อยมากจนไม่มีนัยสำคัญ

เมื่อพิจารณาถึงชนิดของอาหารที่โคนม โคนเนื้อ และกระบือกิน จากการศึกษาตามสภาพการเลี้ยงของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา พบว่าส่วนใหญ่โคนเนื้อและกระบือจะกินแต่เฉพาะอาหารหยาบประเภทหญ้าและฟาง ในขณะที่โคนมจะกินอาหารข้นเสริมด้วยในทุกมื้อของอาหาร แสดงว่าชนิดของอาหารมีผลต่อการเกิดแก๊ส  $\text{CH}_4$  ซึ่งจะเห็นได้จากการที่โคนมกินอาหารข้นด้วยจะทำให้การเกิดแก๊ส  $\text{CH}_4$  น้อยกว่าโคนเนื้อและกระบือที่กินเฉพาะหญ้าและฟางเท่านั้น และเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนของการปลดปล่อยแก๊ส  $\text{CH}_4 : \text{CO}_2$  ของโคนม โคนเนื้อ และกระบือ ดังตารางที่ 4.4 จะเห็นว่าโคนเนื้อมีอัตราส่วนการปลดปล่อยแก๊ส  $\text{CH}_4 : \text{CO}_2$  สูงสุดเท่ากับ  $2.415 \times 10^{-4}$  ซึ่งคิดเป็น 2 เท่าของอัตราส่วนการปลดปล่อยแก๊ส  $\text{CH}_4 : \text{CO}_2$  จากกระบือ ซึ่งเท่ากับ  $1.359 \times 10^{-4}$  และโคนมเท่ากับ  $1.224 \times 10^{-4}$  ตามลำดับ ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่สนับสนุนผลการศึกษาที่ว่า การให้สัตว์เคี้ยวเอื้องกินอาหารข้น หรือทำการปรับสัดส่วนการให้อาหารหยาบและอาหารข้น แทนที่จะให้กินแต่อาหารหยาบเพียงอย่างเดียว เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยลดการปลดปล่อยแก๊ส  $\text{CH}_4$  จากระบวนการย่อยอาหารได้ และเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนการปลดปล่อยแก๊ส  $\text{CH}_4 : \text{CO}_2$  ระหว่าง

โคเนื้อและกระบือซึ่งถึงแม้ว่าจะกินอาหารหยาบเพียงอย่างเดียวเหมือนกัน แต่จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า กระบือจะก่อให้เกิดแก๊ส  $\text{CH}_4$  น้อยกว่าโคเนื้อ ซึ่งคล้ายกันกับ Ichhponani et al. (1971) สังเกตว่ากระบือจะย่อยเซลลูโลสได้ดีกว่าในโคเนื้อ

ซึ่งตรงกับที่ เมธา วรณพัฒน์ (2533) ได้กล่าวไว้ในหนังสือโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องว่า อาหารหยาบหรืออาหารข้นที่ถูกหมักในรูเมนจะให้ผลผลิตสุดท้ายแตกต่างกัน โดยเฉพาะอาหารหยาบจะได้กรดอะซิเตทมากกว่าอาหารข้น ซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดแก๊ส  $\text{CH}_4$  สูงตามไปด้วย และเป็นที่ยอมรับว่าอาหารหยาบหรืออาหารข้มนั้นจะถูกหมักอยู่ในกระเพาะรูเมนแล้วให้ผลผลิตสุดท้ายแตกต่างกัน โดยเฉพาะกรดไขมันที่ระเหยได้ (volatile fatty acids; VFA) ซึ่งอาหารหยาบจะได้กรดอะซิเตทสูงกว่าอาหารข้น และทำให้อัตราส่วนของกรดโพรพิอเนตต่ออะซิเตทต่ำกว่าในอาหารข้น จึงทำให้ผลผลิต  $\text{CH}_4$  สูงตามไปด้วย ดังนั้นการควบคุมการให้อาหารหยาบหรือสัดส่วนการให้อาหารหยาบต่ออาหารข้น เพื่อลดการเกิดแก๊ส  $\text{CH}_4$  และเพื่อให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการผลิตเนื้อเทียบกับปริมาณการเกิดแก๊ส  $\text{CH}_4$  เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ (เมธา วรณพัฒน์, 2533)

หรือใช้การแปรรูปอาหารหยาบเช่นการสับหรือหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ แทนการให้อาหารข้นเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายก็จะสามารถช่วยให้การย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้องเพิ่มขึ้นและลดการเกิดแก๊ส  $\text{CH}_4$  ได้เพราะว่าอาหารละเอียดจะทำให้สัตว์สามารถกินหญ้าแห้งหรือฟางได้มากขึ้น ระยะพักตัวของอาหารสั้นหรืออัตราการไหลผ่านของอาหารได้เร็วทำให้อาหารผ่านออกหรือพักตัวในกระเพาะรูเมนน้อยลง ซึ่งทำให้จุลินทรีย์มีเวลาในการเข้าย่อยสลายน้อยลงนั่นคือแก๊ส  $\text{CH}_4$  จะลดลงได้ (Reid, 1962; Church, 1979; Minson, 1980) นอกจากนี้ Chaturvedi et al. (1973) พบว่า การสับฟางและแช่น้ำค้างคืนทำให้โคและกระบือสามารถกินฟางได้มากขึ้น ซึ่งทำให้การผลิตกรดไขมันระเหยได้สูงขึ้นด้วย และเมธา วรณพัฒน์ (2533) ได้กล่าวไว้ว่า การบดหรือการสับอาหารให้เล็กลงนั้นจะมีผลทำให้ผลผลิตกรดไขมันระเหย และแก๊ส  $\text{CH}_4$  ในกระเพาะรูเมนเปลี่ยนไป โดยสัดส่วนของชนิดกรดโพรพิอเนตต่ออะซิเตทจะเพิ่มขึ้นและปริมาณแก๊ส  $\text{CH}_4$  ลดลง

นอกจากนี้แนวทางในการลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถทำได้โดยการจัดลำดับความสำคัญเล็อกชนิดของสัตว์ที่ควรส่งเสริมให้มีการเลี้ยงเพื่อการผลิตเนื้อเช่นส่งเสริมให้มีการเลี้ยงกระบือเพื่อการผลิตเนื้อแทนการเลี้ยงโคเนื้อ (เนื่องจากเนื้อสัตว์ทั้งสองชนิดนี้สามารถทดแทนกันได้) เพราะว่สัดส่วนการปลดปล่อยคาร์บอนทั้งหมดจากตัวกระบือรวมทั้งจากการใช้พลังงานเพื่อการผลิตเนื้อ (เลี้ยง ขนส่ง และฆ่า) มีค่าต่ำสุดตามผลการศึกษาที่ได้ ประกอบกับ Ichhponani et al. (1971) สังเกตว่ากระบือจะย่อยเซลลูโลสได้ดีกว่าโคเนื้อ และที่ปริมาณอาหารที่กินเท่ากัน โคเนื้อจะมีการขับไล่แก๊ส  $\text{CH}_4$  (eructation) มากกว่ากระบือ (Czerkawski, 1986) ซึ่งสอดคล้องกับผลของการศึกษานี้ และควรคำนึงถึงระยะเวลาที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ และกระบือให้เหมาะสมกับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ตามที่ได้เคยกล่าวถึงไว้แล้วเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนัก

ตัวเฉลี่ยของโคเนื้อและกระบือที่อายุต่าง ๆ ดังในกราฟรูปที่ 4.11 เพื่อลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนที่ไม่จำเป็นจากการเลี้ยงที่มีระยะเวลาเลี้ยงไม่เหมาะสม ซึ่งเกษตรกรส่วนมากจะขายเข้าโรงฆ่าสัตว์เมื่อต้องการใช้เงินจึงไม่มีกำหนดเวลาในการเลี้ยงที่แน่นอน (ญานิน โอภาสพัฒนกิจ, 2551) ส่วนการผลิตเนื้อจากสัตว์ขนาดเล็กควรส่งเสริมการผลิตเนื้อสุกรมากกว่าเนื้อไก่ ด้วยเหตุผลที่ว่า การผลิตเนื้อสุกรจะมีการปลดปล่อยคาร์บอนรวมทั้งหมดต่ำกว่าการผลิตเนื้อไก่ที่น้ำหนักตัวเท่ากันและควรจัดการลดปริมาณการใช้พลังงานหรือเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิงคัมน์ร้อนที่ใช้ในโรงฆ่าสุกรด้วย ตามที่ได้กล่าวถึงไว้แล้วในตอนต้นก็จะสามารถลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนจากการผลิตเนื้อสัตว์ขนาดเล็กลงได้

นอกจากนี้เมื่อนำค่าการปลดปล่อยคาร์บอนรวมในหน่วยตันต่อตัวต่อปีดังที่ได้เคยกล่าวแล้วมาคูณกับปริมาณการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดในแต่ละปีตามสถิติจำนวนปศุสัตว์ของจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่ปี 2544 ถึง ปี 2549 ดังที่ได้แสดงไว้ในตารางที่ 4.1 แล้วเขียนกราฟแสดงการปลดปล่อยคาร์บอนในแต่ละปีจากสัตว์ชนิดต่าง ๆ จะทำให้ได้สมการเชิงเส้น ซึ่งความชันของสมการเชิงเส้นนี้สามารถคาดการณ์แนวโน้มของการปลดปล่อยคาร์บอนรวมทั้งหมดจากตัวสัตว์และจากการใช้พลังงานเพื่อผลิตเนื้อ นม ไช้จากสัตว์ดังกล่าวได้ดังแสดงในรูปที่ 4.25 โดยมีสมการการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิในแต่ละปีจากการผลิตนํ้านมโค เนื้อโค เนื้อกระบือ เนื้อสุกร เนื้อไก่ และไข่ไก่ ในจังหวัดนครราชสีมาดังนี้

สมการการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิในแต่ละปีจากการผลิตนํ้านมโค ที่  $R^2 = 0.90$

$$C\text{-emitted}_{\text{นมโค}} = 1881.6(\text{ปี}) + 28939 \quad (4.24)$$

สมการการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิในแต่ละปีจากการผลิตเนื้อโค ที่  $R^2 = 0.78$


$$C\text{-emitted}_{\text{เนื้อโค}} = 38814(\text{ปี}) + 125824 \quad (4.25)$$

สมการการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิในแต่ละปีจากการผลิตเนื้อกระบือ ที่  $R^2 = 0.92$

$$C\text{-emitted}_{\text{เนื้อกระบือ}} = 1568.7(\text{ปี}) + 50931 \quad (4.26)$$

สมการการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิในแต่ละปีจากการผลิตเนื้อสุกร ที่  $R^2 = 0.53$

$$C\text{-emitted}_{\text{เนื้อสุกร}} = 42859(\text{ปี}) + 50355 \quad (4.27)$$



รูปที่ 4.25 ปริมาณคาร์บอนที่ถูกปลดปล่อยในแต่ละปีสำหรับการผลิตเนื้อ นม ไข่ จากสัตว์แต่ละชนิด

สมการการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิในแต่ละปีจากการผลิตเนื้อไก่ ที่  $R^2 = 0.56$

$$\text{C-emitted}_{\text{เนื้อไก่}} = 39619(\text{ปี}) + 970917 \quad (4.28)$$

สมการการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิในแต่ละปีจากการผลิตไข่ไก่ ที่  $R^2 = 0.73$

$$\text{C-emitted}_{\text{ไข่ไก่}} = 6549.5(\text{ปี}) + 16661 \quad (4.29)$$

ซึ่งจะพบว่านอกจากการผลิตเนื้อไก่จะมีค่าการปลดปล่อยคาร์บอนสูงสุดที่น้ำหนักสัตว์เท่ากันแล้ว จำนวนการเลี้ยงไก่เนื้อในแต่ละปียังมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้เส้นกราฟที่แสดงแนวโน้มการปลดปล่อยคาร์บอนรวมจากตัวสัตว์และจากการใช้พลังงานสำหรับการผลิตเนื้อสุกรมีความชันมากที่สุด แสดงว่าแนวโน้มของปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนสำหรับการผลิตเนื้อสุกรจะมากกว่าการผลิตเนื้อไก่ เนื้อโค และเนื้อกระบือตามลำดับ ซึ่งเมื่อประเมินแนวโน้มของการปลดปล่อยคาร์บอนจากการผลิตเนื้อสัตว์ทั้ง 4 ชนิดจากความชันของเส้นกราฟจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการปลดปล่อยคาร์บอนจากการผลิตเนื้อสุกร เนื้อไก่และเนื้อโคจะปลดปล่อยคาร์บอนออกมาในอัตราที่สูงและสูงกว่าการผลิตเนื้อกระบือมาก นั่นคือมีความเป็นไปได้ในการลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนจากการผลิตเนื้อ โดยเฉพาะเนื้อที่สามารถทดแทนกันได้ ด้วยการปรับลดจำนวนการเลี้ยงโคเนื้อลง แล้วเพิ่มจำนวนการเลี้ยงกระบือทดแทนเพื่อชดเชยปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์ให้มีอัตราเท่าเดิมดังนี้

การทำนายปริมาณคาร์บอนที่ถูกปลดปล่อยจากการผลิตเนื้อโคและเนื้อกระบือจะอาศัยการคาดการณ์จำนวนการเลี้ยงกระบือ และโคเนื้อ ในปี 2009 - 2010 ด้วยสมการและผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นซึ่งมีค่า sig. F และ P-value < 0.05 ดังภาคผนวก 2ฒ และ 3ฒ ตามลำดับ คุณกับปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนต่อหน่วยต่อปีของกระบือและโคเนื้อตามลำดับที่น้ำหนักตัวเท่ากัน และการประเมินจำนวนที่เหมาะสมของการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือที่ควรจะเป็นไปได้ดังตารางที่ 4.11 (ก) และ (ข) มาเขียนกราฟการปลดปล่อยคาร์บอนจากการผลิตเนื้อโคและเนื้อกระบือที่ละสัดส่วนของจำนวนการปรับเพิ่มหรือลดการเลี้ยงกระบือและโคเนื้อดังรูปที่ 4.26 ซึ่งจากรูปจะเห็นว่า มีเส้นกราฟอยู่ 3 กลุ่ม โดยในกลุ่มแรก (กลุ่มที่อยู่ล่างสุด) จะเป็นกราฟที่แสดงปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนจากการเลี้ยงกระบือจำนวน 10% - 100% ของผลรวมจำนวนการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ส่วนเส้นกราฟในกลุ่มที่สอง (กลุ่มที่อยู่ตรงกลาง) จะเป็นกราฟแสดงปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนจากการเลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 10% - 100% ของผลรวมจำนวนการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ และเส้นกราฟในกลุ่มสุดท้าย (กลุ่มที่อยู่บนสุด) จะเป็นกราฟแสดงปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนรวมจากจำนวนการเลี้ยงสัตว์ทั้งสองชนิด โดยมีสัดส่วนจำนวนโคเนื้อ : กระบือ



ตารางที่ 4.11 (ก) การทดลองปรับสัดส่วนจำนวนการเลี้ยงโคเนื้อ : กระบือ

ปีที่	โคเนื้อ +กระบือ	โคเนื้อ (ปกติ)	จำนวนโคเนื้อจากการทดลองปรับสัดส่วนจำนวนการเลี้ยงโคเนื้อ : จำนวนกระบือ									
			10 : 90	20 : 80	30 : 70	40 : 60	50 : 50	60 : 40	70 : 30	80 : 20	90 : 10	100 : 0
2001	334,982	273,085										
2002	346,327	283,023										
2003	357,420	290,642										
2004	409,038	343,152										
2005	459,193	390,615										
2006	642,045	570,215										
2007	617,384	544,549	61,738	123,477	185,215	246,954	308,692	370,431	432,169	493,908	555,646	617,384
2008	672,400	597,719	67,240	134,480	201,720	268,960	336,200	403,440	470,680	537,920	605,160	672,400
2009	727,415	650,888	72,741	145,483	218,224	290,966	363,707	436,449 <sup>a</sup>	509,190 <sup>b</sup>	581,932 <sup>c</sup>	654,673	727,415
2010	782,430	704,058	78,243	156,486	234,729	312,972	391,215	469,458 <sup>a</sup>	547,701 <sup>b</sup>	625,944 <sup>c</sup>	704,187	782,430

<sup>a</sup> จำนวนโคเนื้อที่ควรเลี้ยงของ CER<sub>1</sub> (จำนวนโคเนื้อ: กระบือ = 60 : 40)

<sup>b</sup> จำนวนโคเนื้อที่ควรเลี้ยงของ CER<sub>2</sub> (จำนวนโคเนื้อ: กระบือ = 70 : 30)

<sup>c</sup> จำนวนโคเนื้อที่ควรเลี้ยงของ CER<sub>3</sub> (จำนวนโคเนื้อ: กระบือ = 80 : 20)

ตารางที่ 4.11 (ข) สัดส่วนของการทดลองปรับจำนวนการเลี้ยงกระบือ : จำนวน โคนเนื้อ

ปีที่	จำนวน กระบือ (ปกคิ)	จำนวนกระบือจากสัดส่วนจำนวนกระบือ : จำนวนโคนเนื้อที่ถูกปรับ เพื่อให้จำนวนโคนเนื้อและกระบือเท่าเดิม									
		10 : 90	20 : 80	30 : 70	40 : 60	50 : 50	60 : 40	70 : 30	80 : 20	90 : 10	100 : 0
2001	61,897										
2002	63,304										
2003	66,778										
2004	65,886										
2005	68,578										
2006	71,830										
2007	72,835	61,738	123,477	185,215	246,954	308,692	370,431	432,169	493,908	555,646	617,384
2008	74,681	67,240	134,480	201,720	268,960	336,200	403,440	470,680	537,920	605,160	672,400
2009	76,527	72,741	145,483 <sup>c</sup>	218,224 <sup>b</sup>	290,966 <sup>a</sup>	363,707	436,449	509,190	581,932	654,673	727,415
2010	78,372	78,243	156,486 <sup>c</sup>	234,729 <sup>b</sup>	312,972 <sup>a</sup>	391,215	469,458	547,701	625,944	704,187	782,430

<sup>a</sup> จำนวนกระบือที่ควรเลี้ยงของ CER<sub>i</sub> (จำนวนโคนเนื้อ: กระบือ = 60 : 40)

<sup>b</sup> จำนวนกระบือที่ควรเลี้ยงของ CER<sub>i</sub> (จำนวนโคนเนื้อ: กระบือ = 70 : 30)


<sup>c</sup> จำนวนกระบือที่ควรเลี้ยงของ CER<sub>i</sub> (จำนวนโคนเนื้อ: กระบือ = 80 : 20)

สัดส่วนโคเนื้อ : กระบือ ตั้งแต่ (100 : 0) (90 : 10) (80 : 20) (70 : 30) (60 : 40)...(0 : 100) ซึ่งจากกราฟจะพบว่ามีสัดส่วนการปรับลดหรือเพิ่มจำนวนโคเนื้อ : จำนวนกระบือ 3 สัดส่วนคือ (80 : 20) (70 : 30) (60 : 40) ที่ให้ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นเป็นจริงซึ่งจะทำให้สามารถลดการปลดปล่อยคาร์บอนจากการทำปศุสัตว์ลงได้ (certified emission reduction: CER) ดังรูปที่ 4.26

ซึ่งจากการพิจารณารูปที่อยู่ในกลุ่มตรงกลางจะเห็นว่ามีส่วนกราฟอยู่ 3 เส้นคือเส้นกราฟแสดง C-emitted จากจำนวนการเลี้ยงโคเนื้อ 60% 70% และ 80% ของผลรวมจำนวนการเลี้ยงสัตว์ทั้งสองชนิดที่ทำให้ค่า  $C-emitted_{(โคเนื้อ+กระบือ)}$  รวมลดลงและทำให้ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นมีค่า sig. F < 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังภาคผนวก ญ

และจากสัดส่วนจำนวนการเลี้ยงโคเนื้อที่มีความเป็นไปได้และทำให้  $C-emitted_{(โคเนื้อ+กระบือ)}$  รวมลดลง จึงได้ทำการตรวจสอบความเป็นไปได้ของเส้นกราฟที่แสดง C-emitted จากจำนวนการเลี้ยงกระบือที่ 20% 30% และ 40% ตามลำดับ ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นมีค่า sig. F < 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ด้วยดังภาคผนวก ญ


ดังนั้นการปรับสัดส่วนลดจำนวนการเลี้ยงโคเนื้อแล้วเพิ่มจำนวนการเลี้ยงกระบือทดแทนในสัดส่วนจำนวนการเลี้ยงโคเนื้อ : กระบือเท่ากับ (80 : 20) (70 : 30) และ (60 : 40) จะทำให้สามารถลดค่า  $C-emitted_{(โคเนื้อ+กระบือ)}$  รวมลงได้ โดยผลของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นของค่า  $C-emitted_{(โคเนื้อ+กระบือ)}$  รวมจากการปรับสัดส่วนจำนวนโคเนื้อ:กระบือ = 80 : 20 นี้มีค่า significance F < 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังภาคผนวก ญ ซึ่งจะช่วยให้สามารถบอกได้ว่าในปี 2010 จำนวนโคเนื้อโดยประมาณที่ควรเลี้ยงเท่ากับ 625,944 ตัว ดังแสดงในตารางที่ 4.11 (ก) และจำนวนกระบือที่ควรเลี้ยงโดยประมาณเท่ากับ 156,486 ตัว ดังแสดงในตารางที่ 4.11 (ข) โดยจะทำให้ได้ค่า  $CER_{2010}$  (80 : 20) เมื่อเทียบกับค่า  $C-emitted_{(โคเนื้อ+กระบือ)}$  รวมปกติที่ไม่มีมีการปรับสัดส่วนจำนวนการเลี้ยงสัตว์ทั้งสองชนิดดังแสดงในรูปที่ 4.26 และผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นที่สัดส่วน 70 : 30 จะได้ค่า sig. F < 0.05 ดังภาคผนวก ญ ซึ่งจะช่วยให้สามารถบอกได้ว่าในปี 2010 จำนวนการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือโดยประมาณควรเท่ากับ 547,701 และ 234,729 ตัวตามลำดับและผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นที่สัดส่วน 60 : 40 จะได้ค่า sig. F < 0.05 เช่นกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังภาคผนวก ญ ซึ่งจะช่วยให้กล่าวได้ว่าในปี 2010 จำนวนการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือโดยประมาณควรเท่ากับ 469,458 และ 312,972 ตัวตามลำดับดังแสดงในตารางที่ 4.11 (ก) และ (ข) โดยที่สัดส่วนนี้จะทำให้ได้ค่า  $CER_{2010}$  (60 : 40) สูงสุดดังรูปที่ 4.26




รูปที่ 4.26 เปรียบเทียบการลดลงของการปลดปล่อยคาร์บอนจากการผลิตเนื้อโคและเนื้อกระบือที่น้ำหนักตัวเท่ากัน โดยการปรับเพิ่มจำนวนกระบือและลดจำนวนโคเนื้อ

#### 4.6 สรุปภาพรวมการถ่ายเท การตรึง และการปลดปล่อยคาร์บอนของสัตว์ชนิดต่างๆ

ผลการศึกษาการปลดปล่อยคาร์บอนจากตัวสัตว์ การตรึงคาร์บอน และการถ่ายเทปริมาณคาร์บอนจากพืชอาหาร โดยการกินรวมทั้งการปลดปล่อยคาร์บอนจากการใช้พลังงานสามารถสรุปภาพรวมสำหรับการผลิตเนื้อ นม ไข่ ได้ดังรูปที่ 4.27 – 4.32




รูปที่ 4.27 ภาพรวมของการถ่ายเท ตรึง และปลดปล่อยคาร์บอนสำหรับการผลิตน้ำนมโค




รูปที่ 4.28 ภาพรวมของการถ่ายเท ตรึง และปลดปล่อยคาร์บอนสำหรับการผลิตเนื้อโค




รูปที่ 4.29 ภาพรวมของการถ่ายเท ตรึง และปลดปล่อยคาร์บอนสำหรับการผลิตเนื้อกระบือ



รูปที่ 4.30 ภาพรวมของการถ่ายเท ตรึง และปลดปล่อยคาร์บอนสำหรับการผลิตเนื้อสุกร



รูปที่ 4.31 ภาพรวมของการถ่ายเท คาร์บอน และปลดปล่อยคาร์บอนสำหรับการผลิตเนื้อไก่



รูปที่ 4.32 ภาพรวมของการถ่ายเท คาร์บอน และปลดปล่อยคาร์บอนสำหรับการผลิตไข่ไก่

## บทที่ 5

### สรุปผลการศึกษา

#### 5.1 สรุปผลการศึกษา

การศึกษาเปรียบเทียบค่าการปลดปล่อยคาร์บอนต่อวันจากสัตว์ชนิดต่าง ๆ ดังกล่าวโดยเทียบจากน้ำหนักสัตว์ที่เท่ากันในหน่วยกิโลกรัมคาร์บอนต่อกิโลกรัมน้ำหนักสัตว์ต่อวัน (กก.C/กก.นน.สัตว์/วัน) พบว่า ไก่ไข่มีค่าการปลดปล่อยคาร์บอนต่อวันสูงสุดเท่ากับ  $8.377 \times 10^{-3}$  กก.C/กก.นน.สัตว์/วัน ประกอบกับไก่ไข่เป็นสัตว์ที่มีการรับคาร์บอนจากพืชอาหารโดยการกินมากที่สุดถึง  $21.99 \times 10^{-3}$  กก.C/กก.นน.สัตว์/วัน ในขณะที่สุกรจะมีค่าการปลดปล่อยคาร์บอนต่อวันต่ำสุดเท่ากับ  $2.477 \times 10^{-3}$  กก.C/กก.นน.สัตว์/วัน เพราะสุกรรับคาร์บอนจากพืชอาหารโดยการกินต่ำสุดเพียง  $8.71 \times 10^{-3}$  กก.C/กก.นน.สัตว์/วัน ในขณะที่มีความสามารถในการตรึงคาร์บอนไว้ในร่างกายได้มากถึง 71.22% นับเป็นอันดับสองรองจากกระบือ และเมื่อนำค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจากสัตว์ชนิดดังกล่าวที่น้ำหนักเท่ากันมาเปรียบเทียบกัน ซึ่งปริมาณคาร์บอนส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปมูลสัตว์เป็นหลักพบว่า สามารถเรียงลำดับค่าการปลดปล่อยคาร์บอนของสัตว์แต่ละชนิดจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ไก่ไข่ > ไก่เนื้อ > โคนม > โคเนื้อ > กระบือ > สุกร

และที่น้ำหนักตัวสัตว์เท่ากันนี้ โคนมมีสัดส่วนของการปลดปล่อยแก๊ส  $CH_4$  จากมูลและจากการย่อยอาหารกับการหายใจสูงสุดคิดเป็น 35 - 36% ของการปลดปล่อยแก๊ส  $CH_4$  จากสัตว์ชนิดต่าง ๆ รองลงมา ได้แก่ กระบือ และ โคนมตามลำดับ จึงสามารถสรุปได้ว่าภายใน 1 วัน โคนม 1 ตัวจากการเลี้ยงตามสภาพของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมามีส่วนในการก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนจากการปล่อยแก๊ส  $CH_4$  ได้มากกว่าสัตว์ชนิดอื่น ๆ อีก 5 ชนิด

ผลจากการศึกษาการปลดปล่อยปริมาณคาร์บอนจากการเลี้ยงสัตว์ และหลักการอนุรักษ์มวลทำให้ได้แนวทางในการบ่งชี้ถึงปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนรวมจากตัวของ โคนม โคเนื้อ กระบือ สุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่ ซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดดังสมการที่ 5.1

$$C\text{-emitted}_{(\text{ตัวสัตว์รวมทุกชนิด})} = (0.98)\text{Dairy cows} + (0.50)\text{Oxen} + (0.66)\text{Buffaloes} + (0.09)\text{Pig} + (0.0062)\text{Chickens} + (0.0058)\text{Hens} \quad (5.1)$$



โดยที่ $C_{\text{emitted}}$ (ตัวสัตว์รวมทุกชนิด)	= ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนรวมทั้งหมดจากตัวของโคนม โคเนื้อ กระบือ สุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่ (ต้นคาร์บอนต่อปี)
Oxen	= จำนวนโคเนื้อที่เลี้ยง (ตัว)
Buffaloes	= จำนวนกระบือที่เลี้ยง (ตัว)
Pigs	= จำนวนสุกรที่เลี้ยง (ตัว)
Chickens	= จำนวนไก่เนื้อที่เลี้ยง (ตัว)
Dairy cows	= จำนวนโคนมที่เลี้ยง (ตัว)
Hens	= จำนวนไก่ไข่ที่เลี้ยง (ตัว)

ส่วนการศึกษาอัตราการถ่ายเทมวลคาร์บอนทั้งหมดจากพืชอาหารไปสู่สัตว์ชนิดต่าง ๆ ดังกล่าวด้วยการกิน แล้วมาสะสมเป็นร่างกายและอวัยวะต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งขับถ่ายของสัตว์ในช่วงระยะเวลาของการเลี้ยง ซึ่งจากการเปรียบเทียบผลการศึกษาประสิทธิภาพการตรึงคาร์บอน ( $C_{\text{plant}} - C_{\text{emitted}}$ ) /  $C_{\text{plant}}$  พบว่า กระบือมีประสิทธิภาพการตรึงปริมาณคาร์บอนจากหญ้ามาสะสมไว้ในร่างกายได้มากที่สุดถึง 72.33% ในขณะที่ไก่เนื้อมีประสิทธิภาพในการตรึงคาร์บอนจากอาหารสัตว์ต่ำที่สุดเพียงแค่ 60.47%

นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบร้อยละของสัดส่วนปริมาณคาร์บอนที่ถูกปลดปล่อยต่อปริมาณคาร์บอนจากพืชอาหารที่ถ่ายเทไปสู่สัตว์แต่ละชนิดที่ทำการศึกษาโดยการกินจะเห็นได้ว่าปริมาณคาร์บอนในพืชอาหารสัตว์บางส่วนที่เหลือจากการตรึงจะถูกปลดปล่อยออกมาโดยมีส่วนในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากตัวไก่เนื้อเท่ากับ 39.53% โคนม 38.60% ไก่ไข่ 38.10% โคเนื้อ 30.85% สุกร 28.78% และต่ำสุด ได้แก่ กระบือเท่ากับ 27.67% ตามลำดับ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าในแต่ละวันกระบือ 1 ตัว มีความสามารถในการปลดปล่อยคาร์บอนออกจากร่างกายได้น้อยกว่าสัตว์ทุกชนิดดังกล่าวเมื่อเทียบจากปริมาณคาร์บอนที่กินเข้าไปเท่านั้น ดังนั้นกระบือจึงมีส่วนทำให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมในแง่ของการปลดปล่อยคาร์บอนน้อยกว่าสัตว์ชนิดอื่น ๆ ที่ทำการศึกษา ในขณะที่ไก่เนื้อ 1 ตัวมีร้อยละของการปลดปล่อยคาร์บอนต่อวันสูงสุดถึง 65.38% เทียบจากปริมาณคาร์บอนที่ถูกตรึงไว้ในตัวไก่เนื้อเอง ดังนั้นการเลี้ยงไก่เพื่อผลิตเนื้อจึงมีส่วนในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูงกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่น ๆ อีก 5 ชนิด

ผลจากการศึกษาอัตราการถ่ายเทมวลคาร์บอนจากพืชอาหารสัตว์ไปสู่สัตว์ชนิดต่าง ๆ โดยการกินที่สัมพันธ์กับปริมาณของการเลี้ยงสัตว์ในแต่ละชนิดและหลักการอนุรักษ์มวลนั้นทำให้สามารถบ่งบอกถึงปริมาณการถ่ายเทมวลคาร์บอนทั้งหมดจากปริมาณการกินอาหารของสัตว์แต่ละชนิดที่ทำการศึกษาดังสมการที่ 5.2 และปริมาณการตรึงคาร์บอนไว้ในร่างกายสัตว์รวมทั้งนมโค และไข่ไก่ดังสมการที่ 5.3

$$C_{\text{plant จากสัตว์ทุกชนิด}} = (2.53)\text{Dairy cows} + (1.63)\text{Oxen} + (2.38)\text{Buffaloes} + (0.32)\text{Pigs} + (0.016)\text{Chickens} + (0.015)\text{Hens} \quad (5.2)$$

$$C_{\text{fixation จากสัตว์ทุกชนิด}} = (1.55)\text{Dairy cows} + (1.13)\text{Oxen} + (1.72)\text{Buffaloes} + (0.23)\text{Pigs} + (0.0095)\text{Chickens} + (0.0095)\text{Hens} \quad (5.3)$$

โดยที่	$C_{\text{plant จากสัตว์ทุกชนิด}}$	= ปริมาณมวลคาร์บอนที่ถูกถ่ายเทจากพืชอาหารสัตว์ไปสู่สัตว์จากปริมาณการกินพืชอาหารของสัตว์ทุกชนิด (ตันคาร์บอนต่อปี)
	$C_{\text{fixation จากสัตว์ทุกชนิด}}$	= ปริมาณมวลคาร์บอนที่ถูกตรึงอยู่ในร่างกายของสัตว์ทุกชนิดรวมทั้งนมโคและไข่ไก่ (ตันคาร์บอนต่อปี)
	Oxen	= จำนวนโคเนื้อที่เลี้ยง (ตัว)
	Buffaloes	= จำนวนกระบือที่เลี้ยง (ตัว)
	Pigs	= จำนวนสุกรที่เลี้ยง (ตัว)
	Chickens	= จำนวนไก่เนื้อที่เลี้ยง (ตัว)
	Dairy cows	= จำนวนโคนมที่เลี้ยง (ตัว)
	Hens	= จำนวนไก่ไข่ที่เลี้ยง (ตัว)

และจากการสำรวจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ ดังกล่าวและโรงฆ่าสัตว์รวมทั้งสหกรณ์โคนมในจังหวัดนครราชสีมาพบว่า มีการใช้พลังงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเนื้อโค เนื้อกระบือ และนมโคน้อยมากซึ่งมีปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนจากการใช้พลังงานรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 1.36% 0.76% และ 0.80% ตามลำดับเมื่อคิดเทียบจากสัตว์ทุกชนิดที่ทำการศึกษาโดย

- โคนมโคเนื้อ กระบือ และไก่ไข่ มีการปลดปล่อยคาร์บอนส่วนใหญ่จากการใช้พลังงานน้ำมันขนส่ง

- สุกร และไก่เนื้อมีการปลดปล่อยคาร์บอนส่วนใหญ่จากการใช้ฟืน หรือแกลบเพื่อต้มน้ำร้อนลวกชุดหรือถอนขน ซึ่งการปลดปล่อยคาร์บอนจากการใช้พลังงานส่วนใหญ่เกิดที่โรงฆ่าสัตว์มากกว่าจากฟาร์ม

และเมื่อเทียบที่น้ำหนักสัตว์เท่ากันพบว่า ไก่เนื้อมีการปลดปล่อยคาร์บอนจากการใช้พลังงานรวมของฟาร์ม และโรงเชือดไก่ที่เกี่ยวข้องในการผลิตเนื้อมากที่สุดคิดเป็น 51.80% ของปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนทั้งหมดจากการใช้พลังงานสำหรับการผลิตเนื้อ นม ไข่ จากสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่ทำการศึกษา ดังนั้นจากผลรวมของปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนจากพลังงานที่ใช้

ทั้งหมดของฟาร์ม และโรงฆ่าสัตว์หรือสหกรณ์โคนม จึงสามารถสรุปได้ว่า การผลิตเนื้อ ไก่มีส่วนในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเมื่อคิดเทียบที่น้ำหนักสัตว์เท่ากัน

ผลการศึกษา<sup>11</sup>และจากหลักการอนุรักษ์มวลทำให้สามารถบ่งบอกถึงปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนรวมจากพลังงานที่ฟาร์ม และโรงฆ่าสัตว์หรือสหกรณ์โคนมใช้ในการผลิตน้ำนมโค เนื้อโค เนื้อกระบือ เนื้อสุกร เนื้อไก่ และไข่ไก่ ดังสมการที่ 5.4

$$\text{C-emission}_{\text{(พลังงานจากการผลิตเนื้อ นม ไข่)}} = (0.20)\text{Dairy cows} + (0.23)\text{Oxen} + (0.19)\text{Buffaloes} + (1.16)\text{Pigs} + (0.0665)\text{Chickens} + (0.0255)\text{Hens} \quad (5.4)$$

โดยที่	$\text{C-emission}_{\text{(พลังงานจากการผลิตเนื้อ นม ไข่)}}$	= ปริมาณคาร์บอนรวมที่ถูกปลดปล่อยจากการใช้พลังงานเพื่อการผลิตเนื้อ นม ไข่(ตันคาร์บอนต่อปี)
Oxen		= จำนวนโคเนื้อที่เลี้ยง (ตัว)
Buffaloes		= จำนวนกระบือที่เลี้ยง (ตัว)
Pigs		= จำนวนสุกรที่เลี้ยง (ตัว)
Chickens		= จำนวนไก่เนื้อที่เลี้ยง (ตัว)
Dairy cows		= จำนวนโคนมที่เลี้ยง (ตัว)
Hens		= จำนวนไก่ไข่ที่เลี้ยง (ตัว)

นอกจากนี้ถ้าคิดเทียบที่น้ำหนักสัตว์เท่ากันสำหรับการผลิตนมโค เนื้อโค เนื้อกระบือ เนื้อสุกร เนื้อไก่ และไข่ไก่ พบว่าปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนรวมทั้งจากตัวสัตว์และจากการใช้พลังงานเท่ากับ 2.62, 2.41, 1.86, 12.38, 31.07 และ 16.43 ตันC./ตัน<sub>นม.สัตว์</sub>/ปี ตามลำดับ ซึ่งเห็นว่าการผลิตเนื้อไก่ทำให้เกิดการปลดปล่อยคาร์บอนรวมสูงสุดคิดเป็น 46.53% ของการผลิตเนื้อ นม ไข่ทั้งหมด ในขณะที่การผลิตเนื้อกระบือมีการปลดปล่อยคาร์บอนรวมต่ำสุดคิดเป็นแค่ 2.79% ของการผลิตเนื้อ นม ไข่ เท่านั้น และผลการศึกษา<sup>11</sup>ยังทำให้สามารถระบุถึงปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนรวมสำหรับการผลิตเนื้อสัตว์ นมโค และไข่ไก่ ได้ดังสมการที่ 5.5 – 5.7 ตามลำดับดังนี้

ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนรวมจากการผลิตเนื้อโค เนื้อกระบือ เนื้อสุกรและเนื้อไก่

$$\text{C-emitted}_{\text{(ตัวสัตว์+พลังงานที่ไข่)}} = (0.73)\text{Oxen} + (0.85)\text{Buffaloes} + (1.25)\text{Pigs} + (0.07)\text{Chickens} \quad (5.5)$$

โดยที่ C-emitted <sub>(ตัวสัตว์+พลังงานที่ใช้)</sub>	= การปลดปล่อยคาร์บอนทั้งหมดจากตัวสัตว์แต่ละชนิดและจากพลังงานที่ใช้ในการผลิตเนื้อสัตว์ (ตันคาร์บอนต่อปี)
Oxen	= จำนวนโคเนื้อ (ตัว)
Buffaloes	= จำนวนกระบือ (ตัว)
Pigs	= จำนวนสุกร (ตัว)
Chickens	= จำนวนไก่เนื้อ (ตัว)

ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนรวมจากการผลิตนมโค

$$\text{C-emitted}_{\text{(ตัวโคนม+พลังงานที่ใช้)}} = (1.18)\text{Dairy cows} \quad (5.6)$$

โดยที่ C-emitted<sub>(ตัวโคนม+พลังงานที่ใช้)</sub> = ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนรวมทั้งหมดจากโคนมและจากพลังงานที่ใช้สำหรับการผลิตนมโค (ตันคาร์บอนต่อปี)

$$\text{Dairy cows} = \text{จำนวนโคนม (ตัว)}$$

ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนรวมจากการผลิตไข่ไก่

$$\text{C-emitted}_{\text{(ตัวไก่ไข่+พลังงานที่ใช้)}} = (0.03)\text{Hens} \quad (5.7)$$

โดยที่ C-emitted<sub>(ตัวไก่ไข่+พลังงานที่ใช้)</sub> = ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนรวมทั้งหมดจากตัวไก่ไข่และจากพลังงานที่ใช้สำหรับการผลิตไข่ไก่ (ตันคาร์บอนต่อปี)

$$\text{Hens} = \text{จำนวนไก่ไข่ (ตัว)}$$

## 5.2 สรุปแนวทางการลดการปลดปล่อยคาร์บอนสำหรับการผลิตเนื้อ นม และไข่

ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าเนื่องจากโคนม โคเนื้อ กระบือ เป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก ใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันในการผลิตเนื้อและนม น้อย ซึ่งปริมาณคาร์บอนที่ปลดปล่อยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของมูลสัตว์ การย่อยอาหารและการหายใจ ในขณะที่สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่จะมีการปลดปล่อยคาร์บอนส่วนใหญ่จากการใช้พลังงาน ดังนั้นการพิจารณาเพื่อลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอน จากการผลิตเนื้อสุกร และเนื้อไก่ ควรสนใจที่ประเด็นของการลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงหรือเปลี่ยนแนวทางในการใช้เชื้อเพลิงของโรงฆ่าสุกรและไก่ ก็จะสามารถลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนสำหรับการผลิตเนื้อสุกรและเนื้อไก่ลงได้ เช่นการใช้แก๊สหุงต้ม (LPG) ในการต้มน้ำร้อนแทนการใช้ฟืนหรือแกลบ

ในขณะที่โคนม โคน้ำ กระบือมีการปลดปล่อยคาร์บอนจากตัวสัตว์มากกว่าจากการใช้พลังงาน ดังนั้นแนวทางเลือกเพื่อลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอน แนวทางที่หนึ่งที่สามารถทำได้ โดยการจัดลำดับความสำคัญเลือกชนิดของสัตว์ที่ควรส่งเสริมให้มีการเลี้ยงเพื่อการผลิตเนื้อ เช่น ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงกระบือเพื่อการผลิตเนื้อแทนการเลี้ยงโคนม (เนื่องจากเนื้อสัตว์ทั้งสองชนิดนี้สามารถทดแทนกันได้) เพราะว่าสัดส่วนการปลดปล่อยคาร์บอนทั้งหมดจากตัวกระบือรวมกับจากการใช้พลังงานเพื่อการผลิตเนื้อ (เลี้ยง ขนส่ง และฆ่า) มีค่าต่ำสุดตามผลการศึกษาที่ได้ ส่วนการผลิตเนื้อจากสัตว์ขนาดเล็กควรส่งเสริมการผลิตเนื้อสุกรมากกว่าเนื้อไก่ ด้วยเหตุผลที่ว่า การผลิตเนื้อสุกรจะมีการปลดปล่อยคาร์บอนรวมทั้งหมดต่ำกว่าการผลิตเนื้อไก่ที่น้ำหนักตัวเท่ากัน

แนวทางที่สองที่สามารถทำได้ โดยคำนึงถึงระยะเวลาที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม และกระบือให้เหมาะสมกับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น เพื่อลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนที่ไม่จำเป็นจากการเลี้ยงที่มีระยะเวลาเลี้ยงไม่เหมาะสม โดยโคนมสามารถสะสมปริมาณคาร์บอนจากในหญ้ามาเก็บไว้ในร่างกายได้สูงสุดในช่วงอายุ 0 - 2 ปี ในขณะที่กระบือจะอยู่ที่ 0 - 4 ปี ดังนั้นจึงควรที่จะขายโคนมหรือกระบือเข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ในช่วงอายุไม่เกิน 4 ปี เพราะหลังจากนี้ โคนมและกระบือจะมีอัตราการสะสมคาร์บอนไว้ในร่างกายลดลง

ส่วนแนวทางเลือกที่สาม เมื่อประเมินแนวโน้มของการปลดปล่อยคาร์บอนจากการผลิตเนื้อสัตว์ทั้ง 4 ชนิดจากความชันของเส้นกราฟจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการปลดปล่อยคาร์บอนจากการผลิตเนื้อสุกร เนื้อไก่ และเนื้อโค จะปลดปล่อยคาร์บอนออกมาในอัตราที่สูงและสูงกว่าการผลิตเนื้อกระบือมาก นั่นคือมีความเป็นไปได้ในการลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนจากการผลิตเนื้อ โดยเฉพาะเนื้อโค และเนื้อกระบือที่สามารถทดแทนกันได้ ด้วยการปรับลดจำนวนการเลี้ยงโคเนื้อลง แล้วเพิ่มจำนวนการเลี้ยงกระบือทดแทนเพื่อชดเชยปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์ให้มีอัตราเท่าเดิม ซึ่งผลจากการศึกษา เพื่อประเมินการลดปริมาณคาร์บอนในปี 2010 จากการปรับสัดส่วนจำนวนการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือของจังหวัดนครราชสีมา ในปัจจุบัน สามารถสรุปได้ว่า

- จากการปรับสัดส่วนจำนวนโคนม : กระบือ = 80 : 20
  - โคนม โดยประมาณที่ควรเลี้ยงเท่ากับ 625,944 ตัว
  - จำนวนกระบือที่ควรเลี้ยงโดยประมาณเท่ากับ 156,486 ตัว
  - C-emitted ลดลง = 43 Ton C/ปี (คิดที่สัตว์หนัก 1 kg./ตัว)
- ที่สัดส่วน 70 : 30
  - จำนวนการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือโดยประมาณควรเท่ากับ 547,701 และ 234,729 ตัวตามลำดับ
  - C-emitted ลดลง = 87 Ton C/ปี (คิดที่สัตว์หนัก 1 kg./ตัว)

- ที่สัดส่วน 60 : 40
  - จำนวนการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือโดยประมาณควรเท่ากับ 469,458 และ 312,972 ตัวตามลำดับ
  - C-emitted ลดลง = 130 Ton C/ปี (คิดที่สัตว์หนัก 1 kg./ตัว)

เนื่องจากสัดส่วนจำนวนการเลี้ยงโคเนื้อ : กระบือ ในปัจจุบันของจังหวัดนครราชสีมาอยู่ที่ 90 : 10 ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ถ้ามีการปรับสัดส่วน ลดจำนวนการเลี้ยงโคเนื้อและเพิ่มจำนวนการเลี้ยงกระบือ 3 สัดส่วนคือ (80 : 20) (70 : 30) (60 : 40) ที่ให้ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นเป็นจริง ดังนั้นการปรับสัดส่วนลดจำนวนการเลี้ยงโคเนื้อแล้วเพิ่มจำนวนการเลี้ยงกระบือทดแทน ในสัดส่วนจำนวนการเลี้ยงโคเนื้อ : กระบือเท่ากับ (80 : 20) (70 : 30) และ (60 : 40) จะทำให้สามารถลดค่า C-emitted<sub>(โคเนื้อ+กระบือ)</sub> รวมลงได้ตามลำดับความเป็นไปได้ที่จะสามารถบริหารจัดการได้จากง่ายไปหายาก ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์และเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ชนิดดังกล่าว

ซึ่งแนวทางเลือกบริหารจัดการจำนวนการเลี้ยงโคเนื้อ และกระบือในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อปรับสัดส่วนจำนวนการเลี้ยงโคเนื้อ : กระบือ = 80 : 20 เป็นแนวทางเลือกหนึ่งที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด เมื่อคิดถึงปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย เพื่อลดการปลดปล่อยปริมาณคาร์บอนจากการผลิตเนื้อ แต่แนวทางเลือกดังกล่าวก็เป็นเพียงแค่แนวทางเลือกหนึ่งเท่านั้น โดยที่ยังไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ เช่นทางด้านสังคมและเศรษฐศาสตร์ประกอบ ซึ่งควรมีการศึกษาต่อยอดงานวิจัยเพิ่มเติมต่อไป

## รายการอ้างอิง

- กันยา ตันติวิสุทธิกุล. (2551). โคนื้อเขื่อน. **ประชาคมวิจัย** ปีที่ 13. ฉบับที่ 78.
- กรมการค้าภายใน. (7 กรกฎาคม 2549). ราคาพืชไร่และวัตถุดิบอาหารสัตว์ และราคาขายปลีกเนื้อสัตว์ ไข่ และราคาสัตว์น้ำ. **หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก**.
- กรมปศุสัตว์. (2548). **ข้อมูลสถิติปศุสัตว์** [ออนไลน์]. ได้จาก: [http:// www.dld.go.th/index.html](http://www.dld.go.th/index.html)
- กรมปศุสัตว์. กองอาหาร. (2548). **การเลี้ยงโคและสุกร** [ออนไลน์]. ได้จาก: [http:// www.dld.go.th/ict](http://www.dld.go.th/ict)
- กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน. (2542). **Biomass Energy in Asia: A Study on Selected Technologies and Policy Options**. อ้างถึงในนพภาพร พานิช และคณะ. (2547). ตำรา ระบบบำบัดมลพิษอากาศ (หน้า 3-1 ถึง 3-79) พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- กัลยา วานิชย์บัญชา. (2545). **หลักสถิติ**. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
- เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์. (2543). **วิศวกรรมกรน้ำเสีย เล่มที่ 4**. มหาวิทยาลัยรังสิต.
- จงจิตร ผลประเสริฐ (2546). เราควรทำอะไร สำหรับพิธีสารเกียวโตในการลดปริมาณระบายแก๊สเรือนกระจก. **การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 2. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย**. (หน้า 167-175). ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- จรัญ จันทถักขณา. (2526). **การพัฒนาปศุสัตว์เพื่อชนบท**. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
- เฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ. (2549). สภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ นโยบาย กฎระเบียบ กระบวนการ และข้อดีของกลไกการพัฒนาที่สะอาด. **การสัมมนาวิชาการ “ผู้ประกอบการได้อะไร...จากโครงการด้านกลไกการพัฒนาที่สะอาด: Clean Development Mechanism, CDM”**. (หน้า 1-31). สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาพอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ.
- ชวนิศนดากร วรวรรณ, ม.ร.ว. และคณะ. (2528). **หลักการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป**. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย
- ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ. (2551). ระบบการผลิตโคเนื้อของประเทศไทย. **ประชาคมวิจัย** ปีที่ 13. ฉบับที่ 78.

- ครุณี เอ็ดเวิร์ดส. (2534). เทคโนโลยีการผลิตอาหาร. พิมพ์ครั้งที่ 8. ภาควิชาอุตสาหกรรมอาหาร  
บริการ. คณะบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ทิม พรรณศิริ. (2531). ชนิดของสัตว์เลี้ยง. สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 12.
- ชนากร ฤทธิ์ไธสง. (2546). การเลี้ยงกวางเป็นสัตว์เศรษฐกิจ. สัตว์เศรษฐกิจเงินล้าน. บริษัท นาคา  
อินเตอร์มีเดีย จำกัด.
- ธีรรงค์ เมฆโหรา. (2551). จากฟาร์มสู่ตลาดของโคไทย. ประชาคมวิจัย ปีที่ 13. ฉบับที่ 78.
- นิตยา เลาะห์จินดา. (2549). นิเวศวิทยา: พื้นฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:  
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- นภาพร พานิช และคณะ. (2547). ตำราระบบบำบัดมลพิษอากาศ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ:  
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประทีป เต็ดแก้ว วนิตา วาเกริกกุลชัย สุกานดา โพธิ์ศรี และชาติ เกสรกุล. (2540). การศึกษาการ  
จัดการการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โรงฆ่าสัตว์. วารสารการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย  
สิ่งแวดล้อม ปีที่ 20 ฉบับที่ 3.
- ประชาชน เกิดกล้า. (2549). ความต้องการฝึกอบรมของอาสาพัฒนาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านในจังหวัด  
น่าน. [ออนไลน์]. ได้จาก: <http://www.dld.go.th/person/information/wor10/192.doc>
- ประภาพร ตั้งชนธานี. (2545). สรีรวิทยาระบบทางเดินอาหารและลำไส้. ภาควิชาสรีรวิทยา คณะ  
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- ปรารณายศสุข. (2551). การสุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจัย. [ออนไลน์]. ได้จาก: [http://sas.mjuknow.org  
/modules/extcal/event.php?event=2](http://sas.mjuknow.org/modules/extcal/event.php?event=2)
- พวงพร โชติโกกร. (2534). จุลชีววิทยาของอาหารและนม. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พานิช ทินนิมิตร. (2535). หลักการเลี้ยงสัตว์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ
- พัชรา วีระกะลัศ. (2544). พลังงานและเมแทบอลิซึม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์-  
มหาวิทยาลัย. 438 หน้า
- ไพบุลย์ เข้มเพื่อน. (2542). เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ซีเอ็ด  
ยูเคชั่น จำกัด
- ภาควิชาสัตวบาล. (2525). หลักการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2538). เอกสารประกอบคำบรรยาย วิชาเคมี ของโครงการส่งเสริม  
ความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน Brand's Summer Camp'95. โครงการ Brand's Summer  
Camp พ.ศ.2538. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. (2545). เอกสารการสอนชุดวิชา การผลิตสัตว์ หน่วยที่ 1 – 15. นนทบุรี : มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมมาธิราช.
- เมธา วรรณพัฒน์. (2533). โภชนศาสตร์สัตว์เลี้ยงเอื้อง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ ฟีนิกซ์พับลิชชิง.
- มุกดา สุขสมาน. (2536). ชีวิตกับสภาพแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- มัลลิกา บุนนาค. (2551). สถิติเพื่อการวิจัยและตัดสินใจ. พิมพ์ครั้งที่ 7. ภาควิชาสถิติ. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- เยาวลักษณ์ สุรพันธ์พิศิษฐ์. (2536). เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ วรรณวิทย์ วนิชาภิชาติ. (2525). ไช้และการฟักไข่. พิมพ์ครั้งที่ 1. ภาควิชาสัตวศาสตร์. คณะทรัพยากรธรรมชาติ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- วรรณวิทย์ วนิชาภิชาติ. (2528). นมและผลิตภัณฑ์นม. ว.สงขลานครินทร์ 7: (3): 325-334
- วินัย กาญจนมาลา. (2549). โลกสัตว์เลี้ยง. [ออนไลน์]. ได้จาก: <http://www.vet.ku.ac.th>.
- วิฑูรย์ โมพี. (2540). เอกสารประกอบการสอน โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดียว. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
- วิฑูรย์ ธารชลาณุกิจ. (2527). การใช้มูลสุกรเลี้ยงปลา. สัตว์เศรษฐกิจ. 2 (11): 18-26.
- ศรเทพ ชัมวาสร. (2545). กลยุทธ์การวิจัยทางสัตว์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อักษรสยามการพิมพ์.
- ศิริพันธ์ โมราถบ และสมบูรณ์ เต๋นวานิช. (2539). อุตสาหกรรมการผลิตไก่เนื้อ และเนื้อไก่. การพัฒนาปศุสัตว์ไทย. สมาคมสัตว์บาลแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- ศุภา กานตวนิชกูร. (2538). การบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยา. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2547). สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี ๒๕๔๗. เอกสารสถิติการเกษตร เลขที่ ๔๑๐. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ.
- สมคิด สลัดยะนันท์, วสันต์ จอมภักดี และสัมพันธ์ ไชยเทพ. (2535). การใช้ประโยชน์จากแก๊สชีวภาพ. เอกสารประกอบการสัมมนาแก๊สชีวภาพในประเทศไทย: สถานภาพปัจจุบันและศักยภาพในอนาคต. 27-28 กุมภาพันธ์. เชียงใหม่.
- สมพงษ์ ธรรมถาวร. (2541). หลักชีววิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาชีววิทยา. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

- สมโภชน์ ทับเจริญ. (2528). การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตอายุการเป็นหนุ่ม และคุณภาพน้ำเชื้อของโคลูกผสมพันธุ์ไฮสไตน์ฟรีเซียน กับโคไทยสายเลือดซิมู ระดับสายเลือดร้อยละ 50, 75, และ 87.5. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาสัตวศาสตร์ สัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- สาโรช คำเจริญ. (2542). อาหารและการให้อาหารสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง. ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- สัญญาชัย จตุรสิทธิ์. (2547). **Meat Management**. ภาควิชาสัตวศาสตร์. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- สุรัชชัย ชาศรีรัตน์. (2529). หลักการผลิตสัตว์โดยภาพถ่าย. สัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- สุรินทร์ นิยมามกุล. (2542). เทคนิคการสูมตัวอย่าง. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เกษตรศาสตร์
- สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (1994). **Thailand's National Greenhouse Gas Inventory**. [ออนไลน์]. ได้จาก: <http://www.thaiwikidata.org/wiki/index.php>
- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา. (2549). สถิติปศุสัตว์รายอำเภอตั้งแต่ปี 2539-2548. จังหวัดนครราชสีมา. [ออนไลน์]. ได้จาก: [http://www.dld.go.th/pvlo\\_nak](http://www.dld.go.th/pvlo_nak)
- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จังหวัดนครราชสีมา. (2549). การคำนวณอัตราการผลิตและอัตราการบริโภคของปศุสัตว์. (เอกสารที่ไม่ได้พิมพ์เผยแพร่)
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 5 จังหวัดนครราชสีมา. (2547). **ทางเลือกในการผลิตทางการเกษตรปี 2547 จังหวัดนครราชสีมา**. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- อรรถชัย จินตะเวช. (2547). การสะสมคาร์บอน. คณะเกษตรศาสตร์. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- อุแก้ว ประกอบไวทยกิจ บีเวอร์. (2531). นิเวศวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
- Abstract from: **Department of Livestock Development**. (2004). [online]. Available on <http://www.thaifeed.net/>
- Abstract from: **Kyoto Protocol to United Nations Framework Convention on Climate Change** [online]. Available on <http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.html> and <http://unfccc.int/resource/conv/>
- Abstract from [online]. Available on [http://www.mypyramid.gov/pyramid/meat\\_amount](http://www.mypyramid.gov/pyramid/meat_amount)
- Acker, D. and Cunningham, M. (1991). **Animal science and industry**. 4<sup>th</sup> Edition. New Jersey: Prentice Hall, Englewood cliffs.

- Agrawal, R.C. and Heady, E.O. (1972). **Operations Research Methods for Agricultural Decisions**. Iowa: The Iowa State University Press.
- Alhamd, L., Arakaki, S., and Hagihara, A. (2004). Decomposition of leaf litter of four tree species in a subtropical evergreen broad-leaved forest, Okinawa Island, Japan. **Forest Ecology and Management**. 202: 1-11.
- APHA, AWWA, WEF. (1992). **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**. 18<sup>th</sup> Edition. Wash. D.C., USA: American Public Health Assoc.
- Bishop, Paul L. (2000). **Pollution Prevention - Fundamentals and Practice**. New York: McGraw-Hill
- Bouwman, A. F. (1998). Nitrogen oxides and tropical agriculture. **Nature**. 392: 866-867
- Brody, S. (1945). **Bioenergetics and Growth**. New York: Hafner.
- Bunyavejchewin, P., Rompopak, W., Vechabusakorn, O., Khumnerdetch, W., Pikulthong, P., and Chantalakhana, C. (1985). **Comparative Efficiency of Tapes for Estimation of Weight of Swamp Buffaloes and Cattle**. **Annual Report 1985**. The National Buffalo Research and Development Center Project. Bangkok, Thailand.
- Buswell, A. M., and Mueller, H. F. (1952). Mechanisms of methane fermentation. **Industrial Engineering Chemistry**. 44:550-552.
- Casey, T. J. (1981). Developments in anaerobic digestion. **Transactions of the Institute of Engineers in Ireland**. 105:25-32.
- Cavana, R. Y., Delahaye, B. L. and Sekaran, U. (2000). **Applied Business Research: Qualitative and Quantitative Methods**. New York: John Wiley&Sons.
- Canadell, Josep G. and Noble, Ian. (2001). Challenges of a changing Earth. **Trends in Ecology & Evolution**. 16(12): 664-666.
- Canadell, Josep G. and Pataki, Diane. (2002). New advances in carbon cycle research. **Trends in Ecology & Evolution**. 17(4): 156-158.
- Chaturvedi, M.L., Singh, U.B., and Ranjhan, S.K. (1973). **Journal of Agricultural Science**. Camb. 80: 393.
- Church, D.C. (1979). **Livestock Feeds and Feeding**. **O&B Books**. Oregon, U.S.A.: Corvallis.

- Cole, H. H. (1966). **Introduction to Livestock Production, Including Dairy and Poultry**. Second Edition. San Francisco&London: W.H. Freeman and Company.
- Crill, P. M., Keller, M., Weitz, A., Grauel, B, and Veldkamp, E. (2000). Intensive field measurements of nitrous oxide emissions from a tropical agricultural soil. **Global Biogeochem. Cycles**. 14: 85-95.
- Cunningham, W. P. and Saigo, B. W. (2001). **Environmental Science: A global concern** McGraw-Hill higher education. Singapore. p 646.
- Czerkawski, J.W. (1986). **An Introduction to Rumen Studies**. Pregamon. U.K.: Oxford.
- Dämmgen, U., and Webb, J. (2006). The development of the EMEP/CORINAIR Guidebook with respect to the emissions of different nitrogen and carbon species from animal production. **Agriculture, Ecosystems and Environment**. 112: 241-248.
- Davidson, E.A., and Ackerman, I.L.(1993). Changes in soil carbon inventories following cultivation of previously untilled soils. **Biogeochemistry**. 20: 161-193.
- Davis, Jessica and Paustian, Keith. (2002). The greenhouse effect and carbon sequestration. **Publication of Cooperative Extension**. Department of Soil & Crop Sciences. Colorado State University. 22(2).
- De Boer, I.J.M. (2003). Environmental impact assessment of conventional and organic milk production. **Livestock Production Science**. 80: 69-77.
- Devore, Jay L. (1995). **Probability and Statistics for Engineering and the Sciences**. 4<sup>th</sup> edition. USA.: Wadsworth.
- Dunn, M. S., Camien, M. N., Malin, R. B., Murphy, E. A., and Reiner, P. J. (1949). Percentages of twelve amino acids in blood, carcass, heart, kidney, liver, muscle, and skin of eight animals. **University of California publications in Physiology**. 8: 293-325.
- Eghball, B., Power, J. F., Gilley, J. E., and Doran, J. W. (1997). Nutrients, carbon, and mass loss during composting of beef cattle feed lot manure. **Journal of Environmental Quality**. 26: 189-193.
- Foley, R. C., Bath, D. L., Dickenson, F. N., and Tucker, H. A. (1972). **Dairy Cattle, Principles, Practices, Problems, Profiles**. 693. Philadelphia: Lea & Febiger.

- Follett, R., Samson-Liebig, S. E., Kimble, J. M., Pruessner, E. G., and Waltman, S. W. (2001). Carbon sequestration under the CRP in the historic grassland soils in the USA. pp 27-40. In: Lal, R. and McSweeney, K. **Soil Management for Enhancing Carbon Sequestration, Soil Science Society of America Special Publication**, Madison, WI.
- Garton, Bryan L. and Birkenholz, Robert J. (1998). **Global Climate Change and Environmental Stewardship by Ruminant Livestock Producers**. (Environmental Protection Agency Report NO. CX824859-01-0) The United States Environmental Protection Agency in Cooperation with The National Council for Agricultural Education, and The National Future Farmers of America Foundation.
- Guérin, H., Richard, D., Lefevre, P., Friot, D., and Mbaye, N. (1989). Prévission de la valeur nutritive des fourrages ingérés sur parcours naturels par les ruminants domestiques sahéliens et soudaniens. In: **XVIth International Grassland Congress. Institut National de la Recherche Agronomique**. pp. 879-880. 4-11 Octobre. France: Nice.
- Hanzade, et al. (2001). **Energy Conversion & Management**. 42:11-20
- Harden, J.W., Sharpe, J.M., Parton, W.J., Ojima, D.S., Fries, T.L., Huntington, T.G., and Dabney, S.M. (1999). Dynamic replacement and loss of soil carbon on eroding cropland. **Global Biogeochemical Cycles**. 13: 855-901.
- Hartung, J. (1992). Emission and control of gases and odorous substances from animal housing and manure stores. **Ziegler, Biersack and Littmark Hygiene**. 192(5): 389-418.
- Hartung, J. and Phillips, V.R. (1994). Control of gaseous emissions from livestock buildings and manure stores. **Journal of Agricultural Engineering Research**. 57(3): 173-189.
- Hashizume, T., Masubuchi, T., Hamada, T., Abe, M., Chiba, H., and Yokota, C. (1963). Studies of energy metabolism in cattle. I. Influence of temperature on the resting metabolism of dry Hostein cows. **Bulletin of National Institute of Animal Industry**. In Japanese. 2: 61-68.
- Herren, R.V. (1994). **The science of animal agriculture**. New York: Delmar publishers Inc.
- Herren, R.V. (1998). **The science of animal agriculture**. 2<sup>nd</sup> ed., New York: Deimar. p 260.

- Hirota, M., Tang, Y., Hu, Q., Kato, T., Hirata, S., Mo, W., Cao, G., and Mariko, S. (2005). **The potential importance of grazing to the fluxes of carbon dioxide and methane in an alpine wetland on the Qinghai-Tibetan Plateau.** *Atmospheric Environment*. 39: 5255-5259.
- Hogan, K.B. (1993). **Anthropogenic Methane Emissions in the United States: Estimates for 1990 Report to Congress.** (Environmental Protection Agency Report No. 430-R-93-003). Washington, DC: United States Environmental Protection Agency-Office of Air and Radiation.
- Hogberg, M.G., Fales, S.L., Kirschenmann, F.L., Honeyman, M.S., Miranowski, J.A., and Lasley, P. (2005). Interrelationships of animal agriculture, the environment, and rural communities. **Journal of Animal Science**. 83: E13-E17.
- Houghton, R.A., and Hackler, J.L. (2000). Changes in terrestrial carbon storage in the United States, I, The roles of agriculture and forestry. **Global Ecology and Biogeography**. 9: 125-144.
- Howden, S.M., Mc Keon, G.M., Walker, L., Carter, J.O., Conroy, J.P., Day, K.A., Hall, W.B., Ash, A.J., and Ghannoum, O. (1999). Global change impacts on native pastures in south-east Queensland, Australia. **Environmental Modelling & Software**. 14: 307-316.
- Ichhponani, J.S., Makkar, G.S., and Sidu, G.S. (1971). **Indian Veterinary**. 1: 809.
- Ickowicz, A., Usengumuremyi, J., Badiane, A., Richard, D., Colleye, F., and Dupressoir, D. (1998). Interactions entre jachère et systèmes d'alimentation des bovines en zone soudanaise du Sénégal: choix techniques et dynamique de développement (zone soudanaise, Sénégal). In: **Floret, C., Pontanier, R. (eds.), Jachère et Systèmes Agraires, Niamey, Niger**. pp. 123-138. 30 Septembre – 2 Octobre. ORSTOM: Dakar
- Ickowicz, A., Richard, D., and Usengumuremyi, J. (1999). Estimation of organic matter transfers by cattle in a Senegalese village. In: **Proceedings of the VIth International Rangeland Congress**. pp. 500-502. 19-23 July. Australia: Townsville.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (1995). **Climate Change 1995, The Science of Climate Change**. Contribution of Working Group I to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, U.K.: Press Syndicate of the University of Cambridge.

- Intergovernmental Panel on Climate Change. (1996). **Guidelines for National Greenhouse Gas Inventory**. [On-line]. Available: <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/invs1.htm>  
(อ้างอิงใน นพภาพร พานิช และคณะ. (2547). ดำราระบบบำบัดมลพิษอากาศ: การจัดทำบัญชีแหล่งกำเนิดมลพิษอากาศ (หน้า 8-11). พิมพ์ครั้งที่ 1-2547. กรุงเทพฯ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.)
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2001). **Climate Change 2001, The Scientific Basis**. The Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, U.K.: Press Syndicate of the University of Cambridge.
- Izac, A.-M.N., and Swift, M.J. (1994). On agricultural sustainability and its measurement in small-scale farming in sub-Saharan Africa. **Ecological Economics**. 11:105-125.
- Iwasaki, K., Haryu, T., Tano, R., Terada, F., Itoh, M., and Kameoka, K. (1982). New animal metabolism facility especially the description of respiration apparatus. **Bulletin of National Institute of Animal Industry**. In Japanese. 39: 41-78.
- Johnson, D.E., Ward, G.M., and Bernal, G. (1997). Biotechnology mitigating the environmental effects of dairying: greenhouse gas emissions. In: Welch, R.A.S., Burns, D.J.W., Davis, S.R., Popay, A.I., Prosser, C.G. (eds.). **Milk Composition, Production and Biotechnology**. CAB International. Wallingford. UK, 497-511.
- Johnson, D.E., Phetteplace, H.W. and Seidl, A.F. (2001). Methane, nitrous oxide and carbon dioxide emissions from ruminant livestock production systems. **Proceeding 1<sup>st</sup> International Conference Greenhouse Gases and Animal Agriculture.**, Obihiro, Japan.
- Kawashima, T., Kurihara, M., Sumamal, W., Pholsen, P., Chaithiang, R., and Boonpakdee, W. (2000). Comparative study on rumen physiology between Brahman cattle and swamp buffalo fed with Ruzi grass hay with or without filter cake and rice bran mixture. In: Japan International Research Center for Agricultural Sciences, Japan and Department of Livestock Development, Thailand (eds.). **Improvement of cattle production with locally available feed resources in Northeast Thailand**. 67-73.

- Kawashima, T., Terada, F., Shibata, M. (2000). Respiration experimental system. In: Japan International Research Center for Agricultural Sciences, Japan and Department of Livestock Development, Thailand (eds.). **Improvement of cattle production with locally available feed resources in Northeast Thailand.** 1-21.
- Keller, M., Veldkamp, E., Weitz, A. M. and Reiners, W. A. (1993). Effect of pasture age on soil trace-gas emissions from a deforested area of Costa Rica. **Nature.** 365: 244-246.
- Kerr, S., Liu, S., Pfaff, Alexander S.P., and Hughes, R. Flint. (2003). Carbon dynamics and land-use choices: building a regional-scale multidisciplinary model. **Journal of Environmental Management.** 69: 25-37.
- Kirchgessner, M., Windisch, W., and Miller, H.L. (1995). Nutritional factors for the quantification of methane production. In: Engelhardt, W.V., Leonhard-Marek, S., Breves, G., Giesecke, D. (eds.). **Ruminant Physiology: Digestion, Metabolism, Growth and Reproduction.** Ferdinand Enke Verlag. Stuttgart. 333-348.
- Kirkwood, R.C. and Longley. (1995). **Clean Technology and The Environment.** London: Blackie Academic.
- Klarenbeek, J.V. and Pain, B.F. (1988). **Anglo-Dutch experiments on odor and ammonia emissions from landspreading livestock wastes.** IMAG Research Report 88-2, Wageningen, Netherlands.
- Koike, M., Sumamal, W. and Kawashima, T. (2000). Dairy development in Northeast Thailand. In: Japan International Research Center for Agricultural Sciences, Japan and Department of Livestock Development, Thailand (eds.). **Improvement of cattle production with locally available feed resources in Northeast Thailand.** 179-187.
- Krejcie, Robert V. and Morgan, Earyle W. (1970). **Educational and Psychological Measurement.** 608-609.
- Krogh, L. (1997). Field and village nutrient balances in millet cultivation in northern Burkina Faso: a village case study. **Journal of Arid Environments.** 35(1):147-159.
- Kupchella, C. E. and Hyland, M. C. (1989). **Environmental Science: Living within the system of nature.** 2<sup>nd</sup> edition. Boston: Allyn and Bacon. p 637.



- Landais, E., Lhoste, P. (1993). Systèmes d'élevage et transferts de fertilité dans la zone des savanes africaines. II. Les systèmes de gestion de la fumure animaux et leur insertion dans les relations entre l'élevage et l'agriculture. **Cahiers Agricultures**. 2: 9-25.
- Leng, P.A.(1991). **Improving Ruminant Production and Reduction Methane Emissions From Ruminants by Strategic Supplementation**. (Report No. EPA/400//91/004). Washington, DC: United States Environmental Protection Agency-Office of Air and Radiation.
- Levin, E., Collins, V., Varner, D. S., Williams, G., and Hardenbrook, H. J. (1973). Dietary protein for man and animal. **Illinois Veterinarian**. 16: 10-14.
- Liang, J. B., Terada, F., and Hamaguchi, I. (1989). Efficacy of using the face mask technique for the estimation of daily heat production of cattle. In: van der Honig, Y., and Close, W. H. (eds.). **Energy Metabolism of Farm Animals**. Pudoc Wageningen 348-351.
- Loh, Jonathan (2000). **Living Planet Report 2000**. World Wide Fund for Nature. Gland. Switzerland.
- Loladze, Irakli (2002). Rising atmospheric CO<sub>2</sub> and human nutrition: toward globally imbalanced plant stoichiometry? **Trends in Ecology & Evolution**. 17(10): 457-461
- Malhi, Yadvinder and Grace, John (2000). Tropical forests and atmospheric carbon dioxide. **Tree**. 15(8): 332-337.
- Manlay, R. J., Kairé, M., Masse, D., Chotte, J.-L., Ciornei, G., and Floret, C. (2002a). Carbon, nitrogen and phosphorus allocation in agro-ecosystems of a West African savanna I. The plant component under semi-permanent cultivation. **Agriculture Ecosystems and Environment**. 88(3): 215-232.
- Manlay, R. J., Chotte, J.-L., Masse, D., Laurent, J.-Y., and Feller, C. (2002b). Carbon, nitrogen and phosphorus allocation in agro-ecosystems of a West African savanna II. Plant and soil components under continuous cultivation. **Agriculture Ecosystems and Environment**. 88(3): 249-269.
- Manlay, Raphaël J., Ickowicz, Alexandre, Masse, Dominique, Floret, Christian, Richard, Didier and Feller, Christian (2004). Spatial carbon, nitrogen and phosphorus budget of a village in the West African savanna-I. Element pools and structure of a mixed-farming system. **Agricultural Systems**. 79: 55-81.

- Manlay, Raphaël J., Ickowicz, Alexandre, Masse, Dominique, Feller, Christian and Richard, Didier (2004). Spatial carbon, nitrogen and phosphorus budget in a village of the West African savanna-II. Element flows and functioning of a mixed-farming system. **Agricultural Systems**. 79: 83-107.
- Marks, G. R. (1982). **Designing a Research Project**. Belmont, California: Lifetime Learning.
- Marsh, William. M., and John Grossa, Jr. (1996). **Land Use and Earth Systems. Environmental Geography Science**. New York: John Wiley & Sons.
- Martin, Bthel Austin. (1965). **ตำราโภชนาการเบื้องต้น. แปลและเรียบเรียงโดย ชวลิต รัตนกุล**. New York. USA: Holt Rinehart and Winston.
- Masters, Gilbert M. (1998). **Introduction to Environmental Engineering and Science**. 2<sup>nd</sup> ed. Upper Saddle River. New Jersey: Prentice-Hall.
- Maynard, L. A. and Loosli, J. K. (1969). **Animal Nutrition**. New York: McGraw-Hill.
- McBean, Edward A. and Rovers, Frank A. (1998). **Statistical Procedures for Analysis of Environmental Monitoring Data and Risk Assessment**. New Jersey: Prentice-Hall.
- Misra, K.B. (1996). **Clean Production - Environmental and Economic Perspectives**. Berlin: Springer-Verlag.
- Ministry of Science, Technology and Environment (MoSTE). (2000). **Thailand's Initial National Communication under the United Nations Framework Convention on Climate Change**. Bangkok: MoSTE.
- Minson, D.J. (1980). In: **Grazing Animals** (Ed. F.H.W. Morky). Elsevier Pub. Comp., The Netherlands: Amsterdam.
- Moe, P.W., and Tyrell, H.F. (1979). **Journal of Dairy Science**. 62: 1583.
- National Transportation Statistics. (2000). **C-emission from petrol used for transporting**. [On-line]. Available : <http://www.vcacarfueldata.org.uk/downloads>. and <http://www.gdrc.org/uem/CO2-Cal/CO2-Calculator.html>.
- NASS. (2002). Census of Agriculture. **National Agricultural Statistics Service**, United States Department of Agriculture, Washington, DC.
- National Oceanic and Atmospheric Administration; NOAA (2009). **Trends in Atmospheric Carbon Dioxide-Global**. [On-line]. Available: <http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends>. Accessed date: May 2009.

- Odai, M., Sumamal, W., Narmsilee, R., Pholsen, P., Chuenpreecha, T., and Indramanee, S. (2005). An investigation into the reproductive ratio of dairy farming in Northeast Thailand. In: Japan International Research Center for Agricultural Sciences, Japan and Department of Livestock Development, Thailand (eds.). **Improvement of dairy cattle production with locally available feed resources in Northeast Thailand**. 55-64.
- Odai, M., Sumamal, W. (2005). A farmer trial of feces management system to improve Northeast Thailand time and milk quality at a small dairy farming in Northeast Thailand. In: Japan International Research Center for Agricultural Sciences, Japan and Department of Livestock Development, Thailand (eds.). **Improvement of dairy cattle production with locally available feed resources in Northeast Thailand**. 65-70.
- Odum, E. P. (1971). **Fundamentals of Ecology**. London: W.B. Saunders.
- Paillat, Jean-Marie, Robin, P., Hassouna, M. and Leterme, P. (2005). Predicting ammonia and carbon dioxide emissions from carbon and nitrogen biodegradability during animal waste composting. **Atmospheric Environment**. 39: 6833-6842.
- Peters, Charles R. and Vogel, John C. (2005). Africa's wild C<sub>4</sub> plant foods and possible early hominid diets. **Journal of Human Evolution**. 48: 219-236.
- Pfaff, Alexander. S. P., Kerr, S., Hughes, R. F., Liu, S., Sanchez-Azofeifa, G. A., Schimel, D., Tosi, J., and Watson, V. (2000). The Kyoto protocol and payments for tropical forest: An interdisciplinary method for estimating carbon-offset supply and increasing the feasibility of a carbon market under the CDM. **Ecological Economics**. 35: 203-221.
- Plant, R. A. J., and Bouman, B. A. M. (1999). Modeling nitrogen oxide emissions from current and alternative pastures in Costa Rica. **Journal of Environmental Quality**. 28(3): 866-872.
- Pollution Control Department. (2003). **Acid Deposition Control Strategy in the Kingdom of Thailand**. Japan International Cooperation Agency.
- Polprasert, Chongrak (1996). **Organic Waste Recycling**. 2<sup>nd</sup> ed. Chichester: Wiley.
- Ramankutty, N., and Foley, J. (1999). Estimating historical changes in global land cover: Croplands from 1700-1992. **Global Biogeochemical Cycles**. 13: 997-1027.

- Reid, R.L. (1962). **Final Report United States Department of Agriculture Contract 12-14-100-4524**. W. Va. Exp. Sta. Morgantown.  
(อ้างอิงในเมธา วรรณพัฒน์. (2533). โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง (หน้า 146). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พี่น้องพิมพ์ลิขซึ่ง)
- Reiners, W.A., Liu, S., Gerow, K.G., Keller, M., and Schimel, D.S. (2002). Historical and future land use effects on N<sub>2</sub>O and NO emissions using an ensemble modeling approach: Costa Rica's Caribbean lowlands as an example, **Global Biogeochemical Cycles**. 16 (4): 1068. doi: 10.1029/2001GB001437.
- Ricklefs, R. E. (1973). **Ecology**. Massachusetts: Chirm Press.  
(อ้างอิงในอุ่งแก้ว ประกอบไวยทกิจ บีเวอร์. (2531). นิเวศวิทยา (หน้า 115-117). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช)
- Robert (1978). **Meat, Poultry, and Seafood Technology**. New Jersey. USA: Prentice-Hall.
- Sauerbeck, D.R. (2001). CO<sub>2</sub> emissions and C sequestration by agriculture-perspectives and limitations. **Nutrient Cycling in Agroecosystems**. 60: 253-266.
- Schalk, A.F., and Amadon, R.S., (1928). **North Dakota. Bull. No. 216**.  
(อ้างอิงในเมธา วรรณพัฒน์. (2533). โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง (หน้า 47). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พี่น้องพิมพ์ลิขซึ่ง)
- Schimel, D.S. (1995). Terrestrial ecosystems and the global carbon cycle. **Global Change Biology**. 1: 77-91.
- Sere, C., and Steinfeld, H., (1996). World livestock production systems: current status, issues and trends. **Animal Production and Health Paper**. Vol. 127. Rome. FAO.
- Simpson, James R. (1993). Urbanization, agro-ecological zones and food production sustainability. **Outlook on Agriculture**. 22: 233-239.
- Smith, R.L. (1974). **Ecology and Field Biology**. 2<sup>nd</sup> ed. New York. Harper and Row 850.  
(อ้างอิงใน นิตยา เลาะห์จินดา. (2549). นิเวศวิทยา: พื้นฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา (หน้า 46). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
- Sommer, S.G., Peteren, S.O., and Sogaard, H.T. (2000) Greenhouse gas emission from stored livestock slurry. **Journal of Environmental Quality**. 29: 744-751.
- Stallard, R.F. (1998). Terrestrial sedimentation and the carbon cycle: Coupling weathering and erosion to carbon burial. **Global Biogeochemical Cycles**. 12: 231-257.

- Stumm, Werner and Morgan, James J. (1996). **Aquatic Chemistry – Chemical Equilibria and Rates in Natural Waters**. 3<sup>rd</sup> ed. New York: Wiley.
- Stuth, Jerry W., Lyons, Robert K., and Kreuter, Urs P. (1993). Animal/plant interactions: Nutrient acquisition and use by ruminants. In: Mark Powell (ed.). **Proceedings of Conference on Livestock and Sustainable Nutrient Cycling in Mixed Farming Systems of Sub-Saharan Africa**. ILCA. Addis Ababa. Ethiopia.
- Sullivan, William G., Wicks, Elin M., and Luxhoj, James T. (2003). **Engineering Economy**. 12<sup>th</sup> ed. New Jersey: Pearson Education.
- Sundquist, E.T., Stallard, R.F., Bliss, N.B., Markewich, H.W., Harden, J.W., Pavich, M.J., and W.E. Dean Jr. (1998). Mississippi basin carbon project science plan. Open-File Report, OF 98-0177. **U.S. Geological Survey**. Reston, Va.
- Tamminga, S. (1992). Feeding management for dairy cows as a means to contribute to environmental pollution control. **Journal of Dairy Science**. 75: 345-357.
- Tamminga, S. (1992). Gaseous pollutants by farm animal enterprises. In: Phillips, C., Piggins, D. (eds.), **Farm Animals and the Environment**. (pp 345-357). CAB International, UK: Wallingford
- Tamminga, S. (2003). Pollution due to nutrient losses and its control in European animal production. **Livestock Production Science**. 84: 101-111.
- Tissot, Bernard P. and Welte, Dietrich H. (1984). **Petroleum Formation and Occurrence**. 2<sup>nd</sup> ed. Berlin: Springer-Verlag.
- UNECE. (2004). **Task Force on Emission Inventories and Projections**. [On-line]. Available: <http://tfeip-secretariat.org/unece.htm>
- U.S. EPA, AP-42. (1995). **Compilation of Air Pollutant Emission Factors**. [On - line]. Available: <http://www.epa.gov/ttn/chieff/ap42/index.htm>
- (อ้างอิงใน นพภาพร พานิช และคณะ. (2547). ตำราระบบบำบัดมลพิษอากาศ: การจัดทำบัญชีแหล่งกำเนิดมลพิษอากาศ (หน้า 8-11). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: กรมโรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- U.S. Environmental Protection Agency. (2002). **Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks: 1990-2000**.

- van Noordwijk, M., Cerri, C., Wooster, P. L., Nugroho, K., and Bernoux, M. (1997). Soil carbon dynamics in the humid tropical forest zone. **Geoderma**. 79: 187-225.
- van Noordwijk, M., Murdiyarso, D., Hairiah, K., Wasrin, U. R., Rachman, A., and Tomich, T. P. (1998). Forest soil under alternatives to slash and burn agriculture in sumatra, Indonesia. In. A. Schulte and D. Ruhiyat (eds.). **Soils of Tropical Forest Ecosystems: Characteristics, Ecology and Management**. (pp 175-185). Berlin: Springer-Verlag.
- van Soest, P.J. (1982). **Nutritional Ecology of the Ruminant**. O & B Books, Inc., Corvallis, Oregon, U.S.A.
- Veldkamp, E., Weitz, A. M., Staritsky, and Huising, E. J. (1992). Deforestation trends in the Atlantic Zone of Costa Rica: A case study, **Land Degrad. Rehabil.** 3: 71-84.
- Veldkamp, E., Davidson, E. A., Erickson, H. E., Keller, M., and Weitz, A. M. (1999). Soil nitrogen cycling and nitrogen oxide emissions along a pasture chronosequence in the humid tropics of Costa Rica. **Soil Biology and Biochemistry**. 31: 387-394.
- Verchot, L. V., Davidson, E. A., Cattanio, J. H., Ackerman, I. L., Davidson, H. E., and Keller, M. (1999). Land use change and biogeochemical controls of nitrogen oxide emissions from soils in eastern Amazonia. **Global Biogeochemical Cycles**. 15: 31-46.
- Vermoesen, A., Van Cleemput, O., and Hofman, G. (1996). Long term measurements of N<sub>2</sub>O emissions. **Energy Conversion and Management**. 37: 1279-1284.
- Waisanen, P.J., and Bliss, N.B. (2000). Changes in population and agricultural land in conterminous United States counties, 1790-1997. **Global Biogeochemical Cycles**. 16(4): 1137. doi: 10.1029/2001 GB 001843.
- Ward, G. M. and Muscoto, T. (1978). Processing cattle waste for recycling as animal feed; in ruminant nutrition. **FAO Animal Production and Health Paper**. 12: 75-79. **FAO, Via delle Terme di Caracalla** (00100): 160. Rome. Italy.
- Watson, R.T., Noble, L.R., Bolin, B, Ravindranath, N.H., Verardo, D.J., and Dokken, D.J. (2000). Land use, land-use change, and forestry. **A Spec. Rep. IPCC. Published for the Intergovernment Panel on Climate Change**. New York: Cambridge Univ. Press.
- Werner, U., Stoehr, U., and Hees, N. (1989). **Biogas plants in animal husbandry**. A publication of the Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH-1989.

- Wilkerson, V.A., Casper, D.P., Mertens, D.R., and Tyrell, H.F. (1994). Evaluation of several methane producing equations for dairy cows. In: Aguilera, J.F. (ed.). **Energy Metabolism of Farm Animals**. Granada. Spain. EAAP. 76.
- Williams, H. H., Curtin, L. V., Abraham, J., Loosli, J. K., and Maynard, L. A. (1954). Estimation of growth requirements for amino acids by assay of the carcass. **Journal of Biological Chemistry**. 208: 277-286.
- World Health Organization. (1993). **Assessment of Source of Air, Water and Land Pollution**. [On-line]. Available: [http://www.who.int/environmental\\_information/Information\\_resources/on-line\\_general.htm](http://www.who.int/environmental_information/Information_resources/on-line_general.htm).
- (อ้างอิงใน นพภาพร พานิช และคณะ. (2547). ตำราระบบบำบัดมลพิษอากาศ: การจัดทำบัญชีแหล่งกำเนิดมลพิษอากาศ (หน้า 8-11). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: กรมโรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- World Wide Sires. (1986). Boar Sire Directory. P.O. Box 149. Hanford California 93232. USA. 57.
- Wortmann, Ulrich Georg, Herrle, Jens Olaf, and Weissert, Helmut (2004). Altered carbon cycling and coupled changes in Early Cretaceous weathering patterns: Evidence from integrated carbon isotope and sandstone records of the western Tethys. **Earth and Planetary Science Letters**. 220: 69-82.
- Yamane, Taro. (1973). **Mathematics for Economists: An Elementary Survey**. 2<sup>nd</sup> ed. New Delhi: Prentice-Hall.

ภาคผนวก ก

ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวไก่ไข่และน้ำหนักไข่เฉลี่ยเทียบกับ  
อายุไก่ อายุไข่ และสัดส่วนองค์ประกอบของไข่ไก่



ตารางที่ ก.1 ความสัมพันธ์ของน้ำหนักตัวไก่ไข่และน้ำหนักไข่เฉลี่ยกับอายุไก่และอายุไข่

อายุไก่ (สัปดาห์)	อายุไข่ (สัปดาห์)	น้ำหนักเฉลี่ย(กรัม)		%ไข่/ตัว /วัน	จำนวนไข่ สะสม/ตัว	น้ำหนักไข่เฉลี่ย (กรัม)
		ตัวไก่	ตัวไก่มาตรฐาน*			
19	0	1,420	1,600	0.05	0.00	
20	1	1,562	1,700	0.40	0.03	45.00
21	2	1,615	1,750	1.35	0.13	50.00
22	3	1,668	1,800	4.03	0.41	50.00
23	4	1,783	1,830	10.65	1.15	52.67
24	5	1,815	1,860	26.53	3.01	53.81
25	6		1,890	48.44	6.39	56.38
26	7		1,920	70.01	11.27	58.66
27	8		1,940	83.83	17.11	59.14
28	9		1,955	89.78	23.36	59.99
29	10		1,962	92.98	29.82	61.24
30	11		1,972	94.64	36.39	62.00
31	12		1,972	94.62	42.95	62.67
32	13		1,972	94.79	49.51	62.67
33	14		1,976	90.86	55.79	62.67
34	15		1,976	94.80	62.34	62.67
35	16		1,976	92.41	68.72	62.67
36	17		1,976	89.31	74.87	62.67
37	18		1,980	87.28	80.88	62.67
38	19		1,980	89.83	87.05	62.95
39	20		1,980	90.41	93.25	63.33
40	21		1,980	95.16	99.74	63.71
41	22		1,980	90.67	105.92	64.00
42	23		1,980	89.72	112.01	63.81


ตารางที่ ก.1 ความสัมพันธ์ของน้ำหนักตัวไก่ไข่และน้ำหนักไข่เฉลี่ยกับอายุไก่และอายุไข่ (ต่อ)

อายุไก่ (สัปดาห์)	อายุไข่ (สัปดาห์)	น้ำหนักเฉลี่ย(กรัม)		%ไข่/ตัว/วัน	จำนวนไข่สะสม/ตัว	น้ำหนักไข่เฉลี่ย (กรัม)
		ตัวไก่	ตัวไก่มาตรฐาน			
43	24		1,980	90.62	118.15	64.00
44	25		1,980	85.15	123.90	62.67
45	26		1,980	75.59	129.00	62.48
46	27		1,980	76.23	134.12	61.81
47	28		1,980	74.33	139.08	60.67
48	29		1,980	77.62	144.25	61.62
49	30		1,980	83.57	149.80	62.86
50	31	1,835	1,980	78.31	154.99	62.86
51	32	1,833	1,985	75.24	159.95	61.62
52	33	1,875	1,985	73.70	164.80	61.67
53	34	1,849	1,985	81.05	170.11	63.38
54	35	1,861	1,985	83.22	175.55	64.60
55	36	1,891	1,990	74.03	180.38	64.86
56	37	1,918	1,990	73.96	185.19	65.52
57	38	1,896	1,990	83.19	190.58	66.00
58	39	1,918	1,990	85.27	196.10	66.00
59	40	1,883	1,990	84.37	201.54	65.81
60	41	1,893	1,990	85.20	207.03	66.00
61	42	1,932	2,000	84.93	212.48	66.00
62	43	1,919	2,000	85.25	217.94	66.00
63	44	1,896	2,000	84.42	223.34	66.10
64	45	1,942	2,000	83.95	228.69	66.00
65	46	1,924	2,000	85.13	234.08	66.00
66	47	1,957	2,000	85.68	239.50	66.00


ตารางที่ ก.1 ความสัมพันธ์ของน้ำหนักตัวไก่ไข่และน้ำหนักไข่เฉลี่ยกับอายุไก่และอายุไข่ (ต่อ)

อายุไก่ (สัปดาห์)	อายุไข่ (สัปดาห์)	น้ำหนักเฉลี่ย(กรัม)		%ไข่/ตัว/วัน	จำนวนไข่สะสม/ตัว	น้ำหนักไข่เฉลี่ย (กรัม)
		ตัวไก่	ตัวไก่มาตรฐาน			
67	48	1,949	2,000	85.27	244.87	66.00
68	49	1,938	2,000	83.96	250.13	66.00
69	50	1,912	2,000	83.78	255.36	66.00
70	51	1,930	2,000	83.23	260.54	66.00
71	52	1,930	2,000	80.76	265.54	66.00
72	53	1,938	2,000	81.99	270.60	66.00
73	54	1,929	2,000	80.58	275.55	66.00
74	55	1,931	2,000	81.52	280.54	66.00
75	56	1,915	2,000	80.79	285.47	66.19
76	57	1,912	2,000	77.11	290.15	66.00
77	58	1,938	2,000	76.54	294.77	66.00
78	59	1,925	2,000	74.14	299.22	66.00
79	60	1,941	2,000	75.50	303.73	66.00
80	61	1,944	2,000	73.92	308.11	66.00
ค่าเฉลี่ย		1,868	1,954	75.67	148.83	62.79
S.D.		117.78	94.81	24.05	98.06	4.45

หมายเหตุ: \* ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



รูปที่ ก.1 ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวไก่เฉลี่ยกับอายุไข



รูปที่ ก.2 สัดส่วนองค์ประกอบของไข่ไก่โดยเฉลี่ย

ภาคผนวก ข

ชนิดรถบรรทุกและน้ำหนักรถเปล่าที่มีการใช้งาน

ตารางที่ ข.1 ชนิดรถบรรทุกและน้ำหนักรถเปล่าที่มีการใช้งาน

ชนิดรถ	รถอู่เต็น	รถกระบะ	6 ล้อ ช่วงสั้น	6 ล้อ ช่วงยาว	6 ล้อตู้ ส่งไก่ช่วงยาว	รถไซโล ส่งอาหาร	10 ล้อ	รถเบ้าท์ (bulk) ใส่อาหาร	10 ล้อ พ่วง	18 ล้อ
น้ำหนักรถเปล่า (กิโลกรัม)	1380	1755	2560	3700	6000	6000	9000	16800	19400	21000
	1300	1600	2600	4100	8000	8000	9630		17500	
	1230	1570		4500	7000	9300	9700			
	1200			4000			9855			
	1500			4070			9955			
	1100			5020			10000			
							10195			
							10200			
							10270			
							10610			
							10620			
							10630			
							10720			
							10750			
							10790			
							10860			
							10990			
							11000			
							11010			
							11200			
							11320			
							11330			
							11380			
						11390				
						11540				
						11580				
						11595				
						11660				
						11750				
						11785				
						11920				
ค่าเฉลี่ย	1285	1642	2580	4232	7000	7767	10814	16800	18450	21000
S.D.	141	99	28	463	1000	1662	738	-	1343	-

## ภาคผนวก ค

แหล่งคาร์บอนที่ถูกตรึงไว้ในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์แต่ละชนิด

## แหล่งคาร์บอนที่ถูกตรึงไว้ในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์แต่ละชนิด

สิ่งสำคัญมากต่อกำไรหรือขาดทุนของฟาร์มคือ ประสิทธิภาพของการเปลี่ยนอาหารให้เป็นผลผลิต ได้แก่ น้ำหนักสด (1 กก.) ของเนื้อ หรือนม หรือผลผลิตต่อปริมาณอาหาร (วัตถุดิบแห้ง, กก.) ที่สัตว์บริโภค ทั้งนี้เนื่องจากต้นทุนในการผลิตสัตว์ สุกรและโคเนื้อประมาณ 70% โคนมประมาณ 51% เป็นค่าอาหารสัตว์ โดยในตารางที่ ค.1 ได้แสดงประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารให้เป็นผลผลิตของสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ

1. เนื้อสัตว์แต่ละชนิดจะมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของส่วนประกอบทางโภชนาการซึ่งได้แก่ %ของโปรตีน และ %ไขมัน ที่อยู่ในเนื้อสัตว์แต่ละชนิด ดังในตารางที่ ค.2 จะแสดงส่วนประกอบทางด้านโภชนะในเนื้อสัตว์แต่ละประเภทดังรายละเอียดในตาราง และข้อมูลน้ำหนักเฉลี่ยต่อตัวของสัตว์แต่ละชนิดที่ส่งขายตลาด ระยะเวลาที่ใช้ในการเลี้ยง และหลักเกณฑ์ทางโภชนะของเนื้อ %ซากหลังจากการชำแหละแล้ว สัดส่วน %ส่วนประกอบที่เป็น กระดูก เนื้อและไขมันซึ่งมักมีค่าไม่แน่นอนในซากของสัตว์แต่ละชนิดและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ของสัตว์แต่ละชนิดที่ถูกเลี้ยงอยู่ตามอำเภอ และกิ่งอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมาสามารถสรุปได้ดังแสดงในตารางที่ ค.3

2. ระยะเวลาโดยประมาณของการตรึงคาร์บอนให้อยู่ในรูปของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เป็นระยะเวลาที่ถูกจำกัดในการเก็บรักษาเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ โดยเมื่อผ่านพ้นระยะเวลาสูงสุด ที่สามารถตรึงคาร์บอนไว้ได้ คาร์บอนเหล่านั้นก็จะกระจายสู่สิ่งแวดล้อมหรือบรรยากาศ อันเนื่องจากการผลิตเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์มากเกินไปเกินกว่าความต้องการที่จะใช้บริโภคของคน คาร์บอนก็จะถูกแปรสภาพโดยจุลินทรีย์เปลี่ยนไปเป็นสารอินทรีย์คาร์บอนในดิน หลังจากนั้นบางส่วนก็จะเปลี่ยนสภาพไปเป็นแก๊สลอยขึ้นไปสู่บรรยากาศในรูปของ  $CH_4$  และ  $CO_2$  ซึ่งก็จะกลายเป็นปัญหาของโลกในที่สุดไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการใช้ศักยภาพทางชีวภาพเกินความจำเป็น หรือปัญหาโลกร้อนจากแก๊สเรือนกระจก ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงคาร์บอน จึงมีความสำคัญ โดยในตารางที่ ค.4 ได้แสดงระยะเวลาสูงสุดของการตรึงคาร์บอนในรูปของอาหารที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส โดยคุณภาพของอาหารคงเดิม



ตารางที่ ค.1 ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารในสัตว์เลี้ยงประเภทต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล

ประเภทของสัตว์	ประสิทธิภาพการใช้อาหาร เปลี่ยนเป็นผลผลิต (กก.)
โคนมพันธุ์แท้ (ดีเลิศ) <sup>1</sup>	1 : 0.9
โคนมพันธุ์แท้ (ดีปานกลาง) <sup>1</sup>	1 : 1.2
สุกรพันธุ์เนื้อ (ดีเลิศ) <sup>2</sup>	1 : 2
สุกรพันธุ์เนื้อ (ดีปานกลาง) <sup>2</sup>	1 : 2.5
สุกรพันธุ์เนื้อ (ดีพอควร) <sup>3</sup>	1 : 3
โคเนื้อพันธุ์แท้มาตรฐาน <sup>4</sup>	1 : 8
โคลูกผสมพันธุ์ไฮสไตน์ฟรีเชียนกับโคไทย สายเลือดซิมูเพคส์ <sup>5</sup>	1 : 8.65-9.65

หมายเหตุ : <sup>1</sup> Foley, R.C. et al., 1972. <sup>2</sup> World Wide Sires, 1986. Boar Sire Directory.

<sup>3</sup> Cole, H.H. 1966. <sup>4</sup> ภาควิชาสัตวบาล. 2525. <sup>5</sup> สมโภชน์ ทับเจริญ. 2528.

ตารางที่ ค.2 ส่วนประกอบของโภชนะในเนื้อสัตว์ประเภทต่าง ๆ

ชนิดผลิตภัณฑ์จากสัตว์ แต่ละชนิด	% น้ำ	% C, H, O	แคลอรี (มิลลิกรัม)	% ไขมันเทียบ จากนน.สัตว์	% โปรตีนเทียบ จากนน.สัตว์
เนื้อโค	55.2	0	240.0*	17.65*	27.06*
ซี่โครงโค	55.9	0	319	28.2	15.1
เลือดโค	75.6	0	103	1.1	21.9
เครื่องในโค	75.66	1.9	125.89	5.5	16.3
เนื้อกระบือ	75.6	2.0	106	1.6	19.6
เนื้อไก่	64.7	0	140.0*	3.53*	31.76*
กึ๋น, ตับ, หัวใจ ของไก่	73.6	2.2	124.3	3.63	19.5
เนื้อสุกร	49.4	0	275.0*	22.35*	28.24*
ซี่โครงสุกร	55	0	326.5	29	15.2
เลือดสุกร	85.5	1.5	57	0.1	11.7
เครื่องในสุกร	79.52	2.4	98.1	3.27	14.4

หมายเหตุ : \* กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์, Martin. (1965; 1963). ตำราโภชนาการเบื้องต้น แปล  
และเรียบเรียงโดย ชาวลิต รัตน์กุล

ตารางที่ ค.3 รายละเอียดของสัตว์เลี้ยงทางเศรษฐกิจแต่ละชนิดในจังหวัดนครราชสีมา

ชนิดสัตว์ เลี้ยงทาง เศรษฐกิจ	ราคาขาย (บาท/กิโลกรัม)	พื้นที่ที่ใช้เลี้ยง (m <sup>2</sup> /ตัว)	อัตราการให้ ลูกเฉลี่ยต่อปี	เวลาเลี้ยงสัตว์ เกิด-ส่งตลาด	นน.เฉลี่ยต่อตัว ที่ส่งขายที่ตลาด (กก./ตัว)	% ซากสัตว์ (เนื้อ+ไขมัน +กระดูก)	% เนื้อสัตว์ จากซาก	%เนื้อ โปรตีน	%ซาก ไขมัน	% กระดูก	ผลิตภัณฑ์ที่ได้ เฉลี่ย (ลิตร, กก., ฟอง/ตัว/ปี)	ระยะเวลาผลิต ผลิตภัณฑ์ (วัน/ ปี)
เนื้อโค	52.45	880	55%	10-12 เดือน	350	55%	60 <sup>x</sup>	27.06	17.65 <sup>x</sup>	14 <sup>x</sup>	นม = 3660	305
เนื้อกระบือ	42.65	4,800-8,000	45%		450	45%		17.7 <sup>x</sup>		12-30 <sup>s</sup>	--	--
เนื้อสุกร	93 <sup>#</sup>	100	19.4 ตัว/ปี	0.5-0.58 ปี	100	75%	76*	28.24	11.2*	12.8*	--	--
											คนไทยบริโภคไข่ไก่คนละ 100 ฟอง/ปี <sup>///</sup>	
เนื้อไก่	53.62	0.9	5.335 รุ่น/ปี	0.096-0.153 ปี	2.2	63%		31.76	3.53		ไข่ = 275*0.97=267	ราคา 2.25 บาท/ฟอง

หมายเหตุ : / สัตว์ชัย จตุรสิทธิ์ (2547), /// ศิริพันธ์ โมราถบ และสมบูรณ์ เค่นวานิช (2539), <sup>x</sup>กรมอนามัย, กองโภชนาการ (2521), <sup>#</sup> กรมการค้าภายใน (2549)

\* Robert, 1978, <sup>s</sup>เยวาลักษณ์ สุรพันธ์พิเชียร, 2536

ตารางที่ ค.4 ระยะเวลาสูงสุดของการตรึงคาร์บอนในรูปของอาหารที่อุณหภูมิ -18 °ซ โดย  
คุณภาพของอาหารคงเดิม

ชนิดอาหาร	ระยะเวลาโดยประมาณของการเก็บรักษาอาหาร (เดือน)
ชิ้นเนื้อ โคหั่นชิ้นใหญ่	12
เนื้อ โคนด/สับ	3
ชิ้นเนื้อลูกโคหั่นชิ้นใหญ่	4
ชิ้นเนื้อสุกรหั่นชิ้นใหญ่	4
เนื้อไก่ ผ่า/ตัด	9
ตับไก่	3
ไก่ทั้งตัว	12
เนื้อสำเร็จรูปพร้อมทำอาหาร	3

หมายเหตุ : ครุณี เอ็ดเวิร์ดส (2534)

3. คาร์บอนที่สะสมอยู่ในรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากสัตว์ โดยผลพลอยได้จากสัตว์ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในอาหารสัตว์และอาหารสัตว์เลี้ยง การฆ่าและสัตว์แต่ละชนิดแต่ละตัวพบว่ามีส่วนของผลผลิตพลอยได้ที่มีประโยชน์เช่น เครื่องในสัตว์ เลือด กระดูก ไขมัน หนังหมู และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์โดยตรงจำพวก นม ไข่ และของเสียที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ซึ่งได้จากสัตว์ในรูปของมูลสัตว์ เขียวลักษณะ สุรพันธ์พิศิษฐ์ (2536) ได้พูดถึงการใช้ประโยชน์จากเครื่องในสัตว์ เลือด กระดูก และไขมันไว้ดังนี้

3.1 เครื่องในสัตว์ (Offals) หมายถึง ส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ตายที่ถูกกำจัดออกจากซาก ในขั้นตอนการฆ่าและชำแหละซาก ดังนั้นส่วนของเลือดและไขมันจากสัตว์ตามคำจำกัดความนี้จึงจัดเป็นเครื่องในสัตว์ด้วย ซึ่งประเทศอังกฤษได้แบ่งเครื่องในออกเป็น 2 กลุ่มตามการใช้งานคือ

**กลุ่มที่ 1** เครื่องในสัตว์ที่สามารถนำมาใช้งานประกอบอาหารได้ ได้แก่ กระบังลม เนื่องจากส่วนหัวและหาง หัวใจ ปอด ลิ้น

**กลุ่มที่ 2** เครื่องในสัตว์ที่ไม่อนุญาตให้นำมาประกอบอาหาร เพราะอาจมีอันตรายเนื่องจากมีแบคทีเรียปนเปื้อนอยู่มาก ได้แก่ เลือด พลาสมา สมอ ลำไส้ใหญ่ ปอด หลอดอาหาร ไส้ตรง ม้าม กระเพาะอาหาร และอื่น ๆ

แต่สำหรับคนไทย เครื่องในแทบทุกส่วนถูกนำมาใช้เพื่อการบริโภค เช่น ต้ม แฉับ ตีอฮวน ลาบ ฯลฯ

3.2 เลือด (Blood) เป็น Colloidal Solution ของโปรตีน ซึ่งเลือดมีส่วนประกอบเป็นน้ำอยู่ร้อยละ 80 และมีโปรตีนร้อยละ 18-20 โดยทั่วไปสัตว์จะมีเลือดอยู่ประมาณร้อยละ 3 ของน้ำหนักตัว แต่เลือดก็เป็นอาหารที่เน่าเสียได้ง่ายมาก ถ้าเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 3 องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่า จะสามารถเก็บไว้ได้นาน 48 ชั่วโมง การใช้ประโยชน์จากเลือดที่แปรรูปแล้ว นิยมใช้ในด้านผลิตภัณฑ์อาหารและด้านอาหารสัตว์เพราะมีคุณสมบัติเหมือนโปรตีนจากแหล่งอื่น ถึงแม้จะเป็นส่วนน้อยและในสัตว์บางชนิดก็ไม่ได้ได้รับความนิยมในการนำมาใช้บริโภค แต่เพื่อให้เกิดการศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดคาร์บอนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงได้นำมาแสดงรายละเอียดไว้ในตารางที่ ค.5

3.3 กระดูก (Bone) ประกอบด้วย โปรตีน ไขมัน และสารพวกเกลือแร่ นิยมนำมาใช้ทำเป็นกระดูกป่น หรือสกัดโปรตีนจากกระดูกเพื่อใช้เป็นสารเสริมคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เนื้อ

3.4 ไขมัน (Fat) ส่วนใหญ่ที่ใช้ประโยชน์ในการบริโภคคือ น้ำมันหมู น้ำมันวัว และไขมันในรูปของหนังสัตว์ซึ่งมีไขมันร้อยละ 10-15 ส่วนโปรตีนของหนังส่วนใหญ่เป็นพวกคอลลาเจน ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการไม่แน่ชัด

3.5 น้่านม สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมให้น้่านมที่มีส่วนประกอบไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ ดังแสดงในตารางที่ ค.6 สัตว์ที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง หรือมีช่วงชีวิตสั้นเช่น สุกร โค กระบือ ในน้่านมจะมีโปรตีน ไขมัน และแร่ธาตุอยู่มากกว่าในน้่านมของคน ซึ่งพันธุ์และชนิดของสัตว์ให้น้่านมในการให้น้่านมเฉลี่ยกิโลกรัมต่อปี แสดงดังในตารางที่ ค.7

ตารางที่ ค.5 ปริมาตรของโลหิตสัตว์

สัตว์	%โลหิตของน้ำหนักตัว	เศษส่วนของน้ำหนักตัว	ความถ่วงจำเพาะ
โค	7.7	1/13	1.06
กระบือ	7.7	1/13	1.06
สุกร	4.6	1/22	1.06

หมายเหตุ : พานิช ทินนimit (2535)

ตารางที่ ค.6 สัดส่วนของส่วนประกอบในน้ำนมจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่ละชนิด

ชนิดสัตว์เลี้ยง ลูกด้วยนม	ส่วนประกอบในน้ำนม (%)				
	น้ำ	โปรตีน	ไขมัน	น้ำตาลแล็กโทส	แร่ธาตุ
คน	87.41	2.00	3.78	6.21	0.30
โค	87.00	3.30	4.00	5.00	0.70
กระบือ	82.05	4.00	7.98	5.18	0.79
สุกร	81.82	6.19	6.85	5.00	0.98

หมายเหตุ : วรวิทย์ วณิชชาภิชาติ (2528)

ตารางที่ ค.7 พันธุ์และชนิดของสัตว์ให้นมในการให้น้ำนมเฉลี่ยกิโลกรัมต่อปี

ชนิด	พันธุ์	ให้นมเฉลี่ย/ตัว	% ไขมันในนมเฉลี่ย
พันธุ์โคนม (มีระยะเวลา ให้นมนาน 305 วัน)	โฮลสไตน์ (Holstein)*	5266	3.65
	เจอร์ซี่ (Jersey)*	3450	5.26
	เกอรันซี (Guernsey)	3540	4.54
	แอร์ชาयर (Ayrshire)	4100	4.12
	บราวน์สวิส (Brown Swiss)*	4695	4.15
	เรดเดน (Red Dane)*	4500	4.20
	เยอรมันบราวน์ (German Brown)*	4000	4.20
	ออสเตรเลียน อิตลาวารา ซอร์ดฮอนน์	3300	4.50
น้ำนมเฉลี่ยกิโลกรัมต่อปี และ% ไขมันในนมเฉลี่ย		<b>4382</b>	<b>4.30</b>
โคนมลูกผสมของไทยสามารถให้นมได้ประมาณ 8-9 กก./ตัว/วันหรือ 2600 กก./ตัว/ปี			
กระบือนม	มูราห์ (Murrah)	1975	7.5

หมายเหตุ : \* พานิช ทินนิมิตร (2535)

3.6 ไขมันและเนื้อสัตว์ปีก โดยไขมันเป็นอาหารที่มีโปรตีนและไขมันสูงมากโดยปกติ น้ำหนักไขมันจะอยู่ระหว่าง 45-65 กรัม โดยไขมันทั้งฟองจะมีส่วนประกอบทางเคมี ดังแสดงไว้ในตารางที่ ค.8 และตารางที่ ค.9 แสดงน้ำหนักไขมันขนาดต่าง ๆ

ผลิตภัณฑ์เนื้อจากสัตว์ปีกมีหลายชนิดเช่น เนื้อไก่ และเครื่องในเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมบริโภคกันในประเทศไทย น้ำหนักของสัตว์ปีกที่ให้เนื้อแต่ละชนิด โดยเฉพาะไก่ รวมทั้งจำนวนไข่ ดังแสดงไว้ในตารางที่ ค.10

ตารางที่ ค.8 สัดส่วนของส่วนประกอบทางเคมีของไข่ทั้งฟอง

%ส่วนประกอบ	ไข่	ไข่ไก่
น้ำ	66	72.7
โปรตีน	12	12.7
ไขมัน	10	11.9
คาร์โบไฮเดรต	1	1.7
แคลอรี (มิลลิกรัม)	-	169

หมายเหตุ : วรวิทย์ วณิชากิชาติ (2525), Bthel Austin Martin. (1965, 1963). ตำราโภชนาการเบื้องต้น แปลและเรียบเรียงโดย ชวลิต รัตนกุล

ตารางที่ ค.9 น้ำหนักไข่ต่อฟองของไข่ขนาดต่าง ๆ

ขนาดไข่	น้ำหนัก (กรัมต่อฟอง)
ขนาดยักษ์ (Jumbo)	71
ใหญ่พิเศษ (Extra Large)	64
ใหญ่ (Large)	57
กลาง (Medium)	50 (มีมากที่สุด)
เล็ก (Small)	42
จิ๋ว (Pewee)	35

หมายเหตุ : พานิช ทินนimit (2535)

ตารางที่ ค.10 น้ำหนักของสัตว์ปีกที่ให้เนื้อแต่ละชนิดรวมทั้งจำนวนไข่ที่ออกต่อปี

ชนิดสัตว์ปีก	น้ำหนักโดยประมาณก่อนชำแหละ	อายุประมาณ	จำนวนไข่ที่ออกต่อปี
ไก่กระทง	0.8-1.5 กิโลกรัม	35-70 วัน	(ไข่เนื้อ)
ไก่คละเพศ	2.5-3.5 กิโลกรัม	70-112 วัน	(ไข่เนื้อ)
ไก่ตอน	3.0-4.0 กิโลกรัม	81 วัน	(ไข่เนื้อ)
ไก่ไข่			275 ฟอง/ปี/ตัว*

หมายเหตุ : พานิช ทินนimit (2535), \*ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

3.7 มูลสัตว์เช่นมูลไก่แห้งมีโปรตีนสูงมาก (25-35%) มูลสุกรมีโปรตีนปานกลาง และมูลโคมีโปรตีนต่ำสุดคือ 13-20% ของวัตถุแห้ง โดยในตารางภาคผนวก 11ค ได้แสดงปริมาณของปัสสาวะโดยประมาณของสัตว์ชนิดต่าง ๆ

สุกรจะขับถ่ายของเสีย มีปริมาณตามน้ำหนักตัว ดังแสดงในตารางภาคผนวก 12ค ซึ่งตลอดช่วงในการขุนสุกรส่งตลาด สุกร 1 ตัวจะขับถ่ายมูลสดรวมทั้งสิ้น 300 กก. และปัสสาวะ 300 กก. ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นอาหารปลาได้เช่น ในพื้นที่บ่อ 1 ไร่ สามารถปล่อยปลาสวยได้ประมาณ 1000 ตัว และเลี้ยงสุกรได้ระหว่าง 10-15 ตัว เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี จะได้น้ำหนักปลาสวยหนักประมาณ 1 กก./ตัวหรือสามารถปล่อยปลาตะเพียนได้ประมาณ 4000 ตัวหรือปลานิล 5000 ตัว โดยไม่ปรากฏว่าเกิดภาวะน้ำเสียขึ้นแต่อย่างใด (สุรชัย ชาตรีรัตน์, 2529)

โค-กระบือ จะขับถ่ายของเสีย (ปัสสาวะและมูล) ประมาณ 8% ของน้ำหนักตัวของโค ดังแสดงในตารางภาคผนวก 13ค ซึ่งโคนมน้ำหนัก 500 กก. กินหญ้า : อาหารข้น (83 : 17) และโคขุนน้ำหนักตัว 364 กก.กินข้าวโพดหมัก และอาหารข้นวันละ 0.4 กก./วัน

ตารางที่ ค.11 จำนวนปัสสาวะที่ถ่ายใน 24 ชั่วโมง คิดเป็นลิตรโดยประมาณ

สัตว์	โค	กระบือ	สุกร
จำนวนเฉลี่ย (ลิตร/วัน)	11	11	4.0

หมายเหตุ : พานิช ทินนมิตร (2535)

ตารางที่ ค.12 ปริมาณมูลสด และปัสสาวะที่ถูกขับถ่ายออกมาจากสุกร

น้ำหนัก สุกรมีชีวิต (กิโลกรัม)	ปริมาณของเสียจากสุกรที่ถูกขับถ่ายออกมา (กก./ตัว/วัน)		
	ปัสสาวะ	มูลสด	รวมน้ำหนักสด
5.5-18.2	0.86	0.70	1.56
18.3-36.3	1.29	1.44	2.73
36.4-54.5	2.43	2.75	5.18
54.6-72.5	2.99	3.77	6.76
72.6-90.0	4.23	4.59	8.82

หมายเหตุ : วิทย์ ธารชลาณุกิจ, ศาสตราจารย์ (2527)

ตารางที่ ค.13 ปริมาณมูลสดและมูลอบแห้งที่โค กระบือขับถ่ายต่อวัน

	กระบือ โคนม (นน. 500 กก.)	กระบือ โคขุน (นน. 364 กก.)
มูลสด (กก./วัน)	22.2	8.67
มูลอบแห้ง (กก./วัน)	3.9	1.89
% โปรตีนรวมของมูลอบแห้ง	12.9	13.0
% ไขมันละลายในอีเทอร์	2.8	0.9
% เยื่อใย	41.3	20.4
% น้ำตาลและคาร์โบไฮเดรต	24.8	44.3
% แร่ธาตุ	29.7	21.2
เมื่อคิดเฉพาะมูลสดอย่างเดียวในโคนม จะมีค่าประมาณ 4.44% และปีสสาวะประมาณ 3.6% ของน้ำหนักตัว ซึ่งใกล้เคียงกับค่าการขับถ่ายของสุกรมากคือ ปีสสาวะ : มูล มีค่า 50 : 50		

หมายเหตุ : Ward G.M. and T. Muscoto. 1978.



**ภาคผนวก ง**

**ข้อมูลประกอบรายงานตามข้อกำหนดของ UNFCCC ที่เกี่ยวกับ  
การถ่ายเทมวลคาร์บอนสำหรับการผลิตอาหารจากการทำฟาร์มปศุสัตว์  
และโรงฆ่าสัตว์รวมทั้งสหกรณ์โคนมในจังหวัดนครราชสีมา**

ตารางที่ ง.1 รายงานเกี่ยวกับภาคพลังงานที่มีส่วนในการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก จากการถ่ายเทมวลคาร์บอนสำหรับการผลิตเนื้อโค กระบือ สุกร ไก่ นมโค และไข่ไก่

จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย ปี 2006

ชนิดของแหล่งเก็บกักและแหล่งของการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก	คาร์บอน	จำนวนโคนม	จำนวนโคเนื้อ	จำนวนกระบือ	จำนวนสุกรขุน	จำนวนไก่เนื้อ	จำนวนไข่ไก่
	(Ton)	(ตัว)					
		32,916	570,215	71,830	336,507	17,414,013	2,118,649
<b>พลังงานทั้งหมด</b>	<b>1,748,770.60</b>	<b>6,607.89</b>	<b>126,958.37</b>	<b>13,633.33</b>	<b>389,355.42</b>	<b>1,158,084.11</b>	<b>54,131.48</b>
<b>ก. กิจกรรมการเผาเชื้อเพลิง</b>	<b>646,210.70</b>	<b>5,166.17</b>	<b>108,226.81</b>	<b>11,798.08</b>	<b>109,314.30</b>	<b>359,120.48</b>	<b>52,584.87</b>
<b>1. อุตสาหกรรมพลังงาน</b>	<b>131,158.63</b>	<b>2,162.58</b>	<b>45,788.26</b>	<b>3,146.15</b>	<b>8,597.75</b>	<b>69,917.26</b>	<b>1,546.61</b>
1.1 การผลิตไฟฟ้าและความร้อน	131,158.63	2,162.58	45,788.26	3,146.15	8,597.75	69,917.26	1,546.61
1.2 ปิโตรเลียม							
1.3 เชื้อเพลิงแข็ง และอุตสาหกรรมพลังงานอื่น ๆ							
<b>2. อุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้าง</b>							
<b>3. การขนส่ง</b>	<b>515,052.07</b>	<b>3,003.59</b>	<b>62,438.54</b>	<b>8,651.92</b>	<b>100,716.55</b>	<b>289,203.22</b>	<b>51,038.25</b>
3.1 เครื่องบินพลเรือน							
3.2 การขนส่งทางถนน	515,052.07	3,003.59	62,438.54	8,651.92	100,716.55	289,203.22	51,038.25
3.3 รถไฟ							
3.4 การเดินเรือ							
<b>4. ภาคส่วนอื่น ๆ</b>							
4.1 เกี่ยวกับการค้าหรือสถาบัน							

ตารางที่ ง.1 รายงานเกี่ยวกับภาคพลังงานที่มีส่วนในการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก จากการถ่ายเทมวลคาร์บอนสำหรับการผลิตเนื้อ โค กระบือ สุกร ไก่ นมโค และไข่ไก่ (ต่อ)

จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย ปี 2006

ชนิดของแหล่งเก็บกักและแหล่งของการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก	คาร์บอน	จำนวนโคนม	จำนวนโคเนื้อ	จำนวนกระบือ	จำนวนสุกรขุน	จำนวนไก่เนื้อ	จำนวนไข่ไก่
	(Ton)	(ตัว)					
		32,916	570,215	71,830	336,507	17,414,013	2,118,649
5. อื่น ๆ							
ข. การปลดปล่อยจากเชื้อเพลิง	1,102,559.90	1,441.72	18,731.56	1,835.26	280,041.13	798,963.62	1,546.61
1. เชื้อเพลิงแข็ง							
1.1 ถ่านหิน							
1.2 การเปลี่ยนรูปของเชื้อเพลิงแข็ง							
1.3 อื่น ๆ							
2. น้ำมันและแก๊สธรรมชาติ	42,623.50	1,441.72	18,731.56	1,835.26	-	19,068.34	1,546.61
2.1 น้ำมันที่ใช้กับเครื่องจักรกลในฟาร์ม	22,008.54	1,441.72	18,731.56	1,835.26	-	-	-
2.2 แก๊สธรรมชาติ							
2.3 อื่น ๆ (แก๊ส LPG)	20,614.96	-	-	-	-	19,068.34	1,546.61
3. การปลดปล่อยคาร์บอนจากชีวมวล (ฟืนหรือแกลบ)	1,059,936.40	-	-	-	280,041.13	779,895.28	-

ตารางที่ ง.2 รายงานเกี่ยวกับภาคเกษตรกรรมที่มีส่วนในการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากการถ่ายเทมวลคาร์บอนสำหรับการผลิตเนื้อ นม ไข่

จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย ปี 2006

ชนิดของแหล่งเก็บกักและแหล่งของการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก	CH <sub>4</sub>	CO <sub>2</sub>	CO
	(Ton)		
<b>ภาคเกษตรกรรมทั้งหมด</b>	<b>28,370.968</b>	<b>470,321.710</b>	<b>0.000</b>
<b>ก. การหมักภายในลำไส้</b>	<b>27,324.863</b>	<b>459,797.242</b>	<b>0.000</b>
1. โค	23,123.125	326,268.710	0.000
โคนมเจริญเติบโตเต็มที่	1,477.764	26,563.706	0.000
โคเนื้อเจริญเติบโตเต็มที่	21,645.361	299,705.004	0.000
2. กระบือ	3,329.680	54,244.939	0.000
3. สุกร	872.058	31,148.434	0.000
4. ไก่	-	48,135.160	0.000
ไก่เนื้อ	-	42,757.584	0.000
ไก่ไข่	-	5,377.576	0.000
5. อื่น ๆ			

ตารางที่ ง.2 รายงานเกี่ยวกับภาคเกษตรกรรมที่มีส่วนในการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากการถ่ายเทมวลคาร์บอนสำหรับการผลิตเนื้อ นม ไข่ (ต่อ)

จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย ปี 2006

ชนิดของแหล่งเก็บกักและแหล่งของการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก	CH <sub>4</sub>	CO <sub>2</sub>	CO
	(Ton)		
<b>ข. การจัดการมูลสัตว์</b>	<b>1,046.105</b>	<b>10,524.468</b>	<b>0.000</b>
1. โค	880.571	7,773.560	0.000
โคนม	48.057	1,321.577	0.000
โคเนื้อ	832.514	6,451.983	0.000
2. กระบือ	131.090	1,625.513	0.000
3. สุกร	12.283	122.825	0.000
4. ไก่	22.162	1,002.570	0.000
ไก่เนื้อ	19.068	940.705	0.000
ไก่ไข่	3.093	61.865	0.000
5. อื่น ๆ			

ตารางที่ ๓.3 รายงานเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของภาคเกษตรกรรมจากการถ่ายเทมวลคาร์บอนสำหรับการผลิตเนื้อ นม ไข่ การหมักภายในลำไส้ และการหายใจ  
 จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย ปี 2006  
 ตารางเสริมข้อมูลเฉพาะสัตว์ที่เกี่ยวข้อง

ชนิดของแหล่ง เก็บกักและ แหล่งของการ ปลดปล่อยแก๊ส เรือนกระจก	ข้อมูลกิจกรรมและอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง				สัมประสิทธิ์การ ปลดปล่อย CH <sub>4</sub> (กิโลกรัม CH <sub>4</sub> /ตัว/ปี)	สัมประสิทธิ์การ ปลดปล่อย CO <sub>2</sub> (กิโลกรัม CO <sub>2</sub> / ตัว/ปี)	น้ำหนัก เฉลี่ย ของ สัตว์ (กก./ ตัว)	น้ำหนัก เฉลี่ยการ ป้อน อาหาร (กก./ตัว/ วัน)	การให้ นม เนื้อ (กก./ ตัว/วัน)
	จำนวน (ตัว)	ค่าเฉลี่ยของการ เกิด CO <sub>2</sub> + CH <sub>4</sub> (กก.C/ตัว/วัน)	ค่าเฉลี่ยคาร์บอน ที่สัตว์กินทั้งหมด (กก.C/ตัว/วัน)	สัดส่วน CO <sub>2</sub> + CH <sub>4</sub> กับคาร์บอน ที่กินทั้งหมด (%)					
1. โค									
โคนม	32,916	0.696	6.933	10.039	44.895	807.015	449.190	16.410	11.140
โคเนื้อ	570,215	0.471	4.460	10.561	37.960	525.600	302.250	11.060	0.425
2. กระบือ	71,830	0.660	6.510	10.138	46.355	755.185	456.100	16.010	0.357
3. สุกร	336,507	0.075	0.879	8.532	2.592	92.564	100.910	1.960	0.769
4. ไก่									
ไก่เนื้อ	17,414,013	0.002	0.043	4.186	0.000	2.455	2.340	0.092	0.055
ไก่ไข่	2,118,649	0.002	0.042	4.524	0.000	2.538	1.910	0.097	0.047
5. อื่น ๆ									

ตารางที่ ง.4 รายงานข้อมูลพื้นฐานของภาคเกษตรกรรมจากการถ่ายเทมวลคาร์บอนสำหรับการผลิตเนื้อ นม ไข่ การปลดปล่อย CH<sub>4</sub>+CO<sub>2</sub> จากมูลสัตว์

จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย ปี 2006

ชนิดของแหล่งเก็บกักและแหล่งของการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก	ข้อมูลกิจกรรมและอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง						สัมประสิทธิ์การปลดปล่อย CH <sub>4</sub> (กิโลกรัม CH <sub>4</sub> / ตัว/ปี)	สัมประสิทธิ์การปลดปล่อย CO <sub>2</sub> (กิโลกรัม CO <sub>2</sub> / ตัว/ปี)
	จำนวน (ตัว)	น้ำหนักเฉลี่ยมูลสัตว์ (kg/ตัว/วัน)	สัดส่วนมูลแห้งต่อ น้ำหนักตัวสัตว์ (%)	น้ำหนักเฉลี่ยของสัตว์ (kg/ตัว)	ค่าเฉลี่ยของแข็งระเหยในสิ่งขับถ่ายแต่ละวัน (kg นน.แห้ง/ตัว/วัน)	ค่าเฉลี่ยความสามารถสูงสุดในการเกิด CH <sub>4</sub> +CO <sub>2</sub> จากมูลสัตว์ (kg. C/ kg VS)		
1. โค								
โคนม	32,916	3.532	0.008	449.190	2.506	0.013	1.460	40.150
โคเนื้อ	570,215	2.694	0.009	302.250	1.675	0.007	1.460	11.315
2. กระบือ	71,830	3.746	0.008	456.100	2.040	0.010	1.825	22.630
3. สุกร	336,507	0.513	0.005	100.910	0.314	0.001	0.037	0.365
4. ไก่								
ไก่เนื้อ	17,414,013	0.031	0.013	2.340	0.021	0.002	0.001	0.054
ไก่ไข่	2,118,649	0.041	0.021	1.910	0.024	0.001	0.001	0.029
5. อื่น ๆ								

ภาคผนวก จ

แหล่งคาร์บอนที่ถูกตรึงไว้ในพืชอาหารสัตว์แต่ละชนิด



## แหล่งคาร์บอนที่ถูกตรึงไว้ในพืชอาหารสัตว์แต่ละชนิด

คาร์บอนถูกตรึงหรือเคลื่อนย้ายจากชั้นบรรยากาศสู่พืช และจากพืชสู่สัตว์ในรูปของสารอาหารที่อยู่ในพืชอาหารสัตว์แต่ละชนิด ซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็มีความต้องการอาหารสัตว์ที่แตกต่างกันไปตามชนิดของสัตว์ การดูดซับคาร์บอนของพืชอาหารสัตว์มีบทบาทสำคัญ ช่วยแบ่งเบาปัญหาหรือชะลอการเพิ่มขึ้นของแก๊ส CO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ และเป็นแหล่งสะสมคาร์บอนในระบบนิเวศ เพื่อไว้ใช้ในการถ่ายทอดคาร์บอนไปตามห่วงโซ่อาหาร ซึ่งสัตว์ที่กินพืช หรือสัตว์ที่กินสัตว์ด้วยกัน ก็จะนำคาร์บอนในพืชเหล่านั้นเปลี่ยนรูปเป็นเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากสัตว์อีกทอดหนึ่ง

สัตว์ใช้อาหารสร้างประโยชน์หลัก ๆ 4 ประการคือ

- เพื่อใช้เป็นโครงสร้างหรือรูปร่างของสัตว์ เช่น เนื้อเยื่อ กระดูก ฟัน ผิวหนัง เอ็น ผม ขน เขา และกีบ เป็นต้น
- เพื่อการดำรงชีวิต ควบคุมกระบวนการต่าง ๆ ในร่างกาย
- เพื่อบำรุงเลี้ยงร่างกาย ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ สะสมไขมันในร่างกาย
- เพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เนื้อ นม ไข่ ขน หนัง เป็นต้น

อาหารสัตว์โดยทั่วไปประกอบด้วยสารอาหาร (Nutrient) ที่สำคัญ 6 ประการคือ น้ำ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน แร่ธาตุและวิตามิน สารอาหารที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบได้แก่สารอาหารประเภท โปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ดังนั้นจะเห็นว่าคาร์บอนจะมียอยู่ในอาหารแต่ละชนิดที่มีสารอาหาร โปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรตอยู่ แต่ในปริมาณที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับชนิดของอาหาร ซึ่งพืชอาหารสัตว์ทั่ว ๆ ไปจะประกอบด้วยวัตถุหลัก 2 อย่างคือ น้ำ และวัตถุแห้ง (dry matter) ซึ่งวัตถุแห้งนี้จะประกอบด้วยคาร์บอนที่อยู่ในส่วนประกอบทางเคมีของพืชอาหารสัตว์แต่ละชนิด ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ จ.1 นอกจากนี้ในตารางที่ จ.2 ได้แสดงถึง เปอร์เซ็นต์ของสารอาหารที่มีคาร์บอน เป็นองค์ประกอบ รวมทั้งแหล่งอาหารของสารอาหารแต่ละชนิด ซึ่งความต้องการอาหารของสัตว์ แตกต่างและแปรเปลี่ยนไปตามปัจจัยต่าง ๆ หลายประการเช่น ชนิดของสัตว์ ประเภทของสัตว์ ขนาดหรือน้ำหนักของสัตว์ อายุของสัตว์ สภาพทางสรีรวิทยาของสัตว์ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เทคนิคต่าง ๆ หลายวิธีเช่น การศึกษาความเจริญเติบโต การทดลองการย่อยได้ การหาสมดุลของอาหาร การศึกษาจากซากสัตว์ และส่วนประกอบต่าง ๆ เป็นต้น จนในที่สุดก็ได้ตารางซึ่งแสดงมาตรฐานของความต้องการทางอาหารของสัตว์ดังกล่าว

ตารางที่ จ.1 ส่วนประกอบทางเคมีของอาหาร

ชนิดอาหาร	เปอร์เซ็นต์ของส่วนประกอบทางเคมีของอาหารแต่ละชนิด					
	วัตถุแห้ง	โปรตีน	ไขมัน	เยื่อใย	แป้งน้ำตาล	แร่ธาตุ
หญ้าขน (แห้ง)	90.2	4.6	0.9	33.6	45.5	6.6
หญ้านเนเปียร์ (แห้ง)	89.1	3.2	1.8	34.0	34.6	10.6
ข้าวโพด (ต้นแห้ง)	90.6	5.9	1.6	30.8	46.5	5.8
ฟางข้าว (แห้ง)	92.5	3.9	1.4	33.5	39.2	14.5
ใบกระถินแห้ง	91.5	24.4	4.6	14.9	39.4	7.9
หญ้าขนสด	27.8	1.8	0.4	10.0	12.7	2.9
หญ้างินนิสด	26.8	1.4	0.4	11.5	10.5	3.0
หญ้านเนเปียร์สด	21.9	1.1	0.3	9.0	8.9	2.6
ข้าวโพด (ต้นสด)	22.7	1.3	0.4	6.0	13.6	1.4
ใบกระถินสด	32.5	6.1	0.7	12.3	11.2	2.2
ผักตบชวาสด	9.8	1.1	0.1	2.2	4.9	1.5
เมล็ดข้าวโพด	85.0	8.7	3.9	6.2	60.2	1.2
ข้าวฟ่าง	89.6	10.8	2.8	2.3	71.1	2.0
รำละเอียด	85.7	15.2	13.2	9.9	34.6	12.8
ปลายข้าว	88.3	7.5	1.6	1.6	78.8	1.8
มันสำปะหลัง (มันเส้น)	88.3	1.9	0.7	3.0	80.5	2.2
ปลาป่นจืด	90.1	58.3	7.4	0.7	3.4	19.9
หางนมผง	94.2	34.7	1.2	0.2	50.3	7.8
กากถั่วเหลือง	90.9	44.3	5.3	5.7	29.6	6.0
กากถั่วลิสง	93.0	47.1	1.5	14.9	25.0	4.5
กากเนื้อเมล็ดในปาล์ม	91.4	19.2	6.7	11.9	49.7	3.9
กากเนื้อเมล็ดในขางพารา	91.1	28.8	9.2	10.0	37.6	5.5

หมายเหตุ : ชวนิศนดากร วรวรรณ, ม.ร.ว. และคณะ (2528)

ตารางที่ จ.2 เปรอ์เซ็นต์สารอาหารที่สัตว์ต่อตัวต้องการและแหล่งอาหารที่สำคัญ

ชนิดสัตว์	ความต้องการ	%หรือน้ำหนักของอาหารทั้งหมดต่อวัน	แหล่งของสารอาหาร
สุกร (1-5 กก.)	อาหารแห้ง	250 กรัมต่อวัน	สุกรควรให้อาหารประมาณ 1.8% ของนน.ตัว โค กระบือ ให้อาหารชั้น 1% ของนน.ตัว (ไก่ไข่ ให้นน. อาหารแห้ง 110 กรัมต่อวัน)
สุกร (10-20 กก.)		1000 กรัมต่อวัน	
สุกร (60-100 กก.)		3000 กรัมต่อวัน	
ไก่เนื้อ		2100-3800 กรัม/วัน	
โคเนื้อตอน (200 กก.)		5800 กรัมต่อวัน	
โคนมสาว (300 กก.)		7200 กรัมต่อวัน	
ไก่เนื้อ (0-8 สัปดาห์)	พลังงาน	3200 kcal/kg	-
ไก่ไข่		2850 kcal/kg	
สุกร (25-90 กก.)		3150 kcal/kg	
สุกร (15-25 กก.)		3250 kcal/kg	
โคเนื้อตอน (200 กก.)	TDN	3.4 กก.ต่อวัน	-
โคนมสาว (200 กก.)		3.2 กก.ต่อวัน	
สัตว์ทั่วไป	คาร์โบไฮเดรต	50-70 %	ธัญพืชชนิดต่าง ๆ พวกแป้ง น้ำตาล พืชหัว เยื่อใยใบพืช
สัตว์ทุกชนิด	ไขมันในอาหาร	2-5 %	น้ำมันพืช ไขมันสัตว์ น้ำมันตับปลา เมล็ดพืช กากเมล็ดถั่ว และไขมันสะสมในร่างกาย
ไก่เนื้อ (แรกเกิด-ส่งตลาด)		≥ 4%	
ไก่ไข่ (5 สัปดาห์ขึ้นไป)		≥ 3%	
สุกร (แรกเกิด- 3 เดือน)		≥ 4%	
สุกร (60 กก. ขึ้นไป)		≥ 2%	
โค (แรกเกิด-15 กก.)		≥ 5%	
โคนม		≥ 3%	

ตารางที่ จ.2 เปรูเซ็นต์สารอาหารที่สัตว์ต่อตัวต้องการและแหล่งอาหารที่สำคัญ (ต่อ)

ชนิดสัตว์	ความต้องการ	%หรือน้ำหนักของอาหารทั้งหมดต่อวัน	แหล่งของสารอาหาร
ไก่เนื้อ (0-8 สัปดาห์)	โปรตีนในอาหารสัตว์	22%	อาหารสัตว์ทั่วไป กากถั่วต่าง ๆ ปลา ป่น เลือดป่น เศษเนื้อ ป่น หางนมผง และ ขนไก่ป่น
ไก่ไข่		$\geq 16\%$	
สุกรแรกเกิดถึงน้ำหนัก 15 กิโลกรัม		$\geq 20-22\%$	
สุกร (15-25 กก.)		$\geq 18\%$	
สุกร (30-60 กก.)		$\geq 15\%$	
สุกร (60 กก. ขึ้นไป)		$\geq 12\%$	
โค (แรกเกิด- 3 เดือน)		$\geq 22\%$	
โค (18 เดือนขึ้นไป)		$\geq 10\%$	
โคนม		$\geq 14-16\%$	
โคอายุ 3 ปีขึ้นไป	9%		
โคนม น้ำหนักตัว 400 กก.	โปรตีนเพื่อ การดำรงชีพ	318 (กรัม/วัน)	-
โคนม น้ำหนักตัว 450 กก.		341 (กรัม/วัน)	
โคนม น้ำหนักตัว 500 กก.		364 (กรัม/วัน)	
โคนม	โปรตีนเพื่อการผลิตนม 1 กิโลกรัม	87 (กรัม/วัน)	-
โคนม (ต้องการ โปรตีนเพิ่ม น้ำหนัก 1 กิโลกรัม)	โปรตีน	320 (กรัม/วัน)	-
โคเนื้อขุน น้ำหนักตัว 150-250 กิโลกรัม	เพื่อเพิ่มน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม	690 (กรัม/วัน)	-

หมายเหตุ : พานิช ทินนิมิตร, 2535

## ภาคผนวก จ

ตัวอย่างตัวคูณการปล่อยมลพิษสำหรับแหล่งกำเนิดประเภทสันดาปเชื้อเพลิง  
พลังงานไฟฟ้า และปริมาณการใช้คาร์บอนในรูปของพลังงานต่าง ๆ

ตารางที่ จ.1 ตัวอย่างตัวคูณการปล่อยมลพิษสำหรับแหล่งกำเนิดประเภทสันดาปเชื้อเพลิง

ชนิดเชื้อเพลิง	ตัวคูณการปล่อยมลพิษ (กก./1000 ลิตร)	
	CO	CO <sub>2</sub>
น้ำมันเบนซิน	848.3	2,102
น้ำมันดีเซล	12.9	2,237
น้ำมันเตา NO. 1-3	0.6	-
น้ำมันเตา NO. 4	0.6	-
น้ำมันเตา NO.5-6	0.6	-
ลิกไนท์ (กก./ตัน)	0.25	-
แก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG)	0.4	1,760
แก๊สธรรมชาติ กก./10 <sup>6</sup> ม <sup>3</sup> .	560	1,900,000

หมายเหตุ : U.S. EPA, AP-42 (1995), WHO, Assessment of Source of Air, Water and Land Pollution, 1993

และจากบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมมีการปลดปล่อยมลพิษจากการผลิตไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและปิโตรเลียม อ้างอิงจากฐานข้อมูลบัญชีรายการการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งประเทศ (Life cycle inventory of grid mix in Thailand: TEI, 2003) ร่วมกับฐานข้อมูลบัญชีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากฐานข้อมูล SIMPRO 7.0 พบว่าการผลิตไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะมีการปลดปล่อยมลพิษดังแสดงในตารางที่ จ.2

ตารางที่ จ.2 ตัวอย่างการปล่อยมลพิษสำหรับการผลิตไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในปี 2003

วัตถุดิบ	ปริมาณที่ใช้	มลพิษอากาศ	ปริมาณที่ปลดปล่อย
ลิกไนท์	$2.07 \times 10^{-1}$ กิโลกรัม	CO <sub>2</sub>	$7.15 \times 10^{-1}$ กิโลกรัม
น้ำมันเชื้อเพลิง	$1.17 \times 10^{-2}$ ลิตร	CO	$1.92 \times 10^{-4}$ กิโลกรัม
น้ำมันดีเซล	$2.26 \times 10^{-4}$ ลิตร	CH <sub>4</sub>	$2.14 \times 10^{-5}$ กิโลกรัม
แก๊สธรรมชาติ	7.06 ฟุต <sup>3</sup>		

ตารางที่ ๓.3 การวิเคราะห์ค่า C-input จากการผลิตพลังงานไฟฟ้า 1 kWh จากสัดส่วนของแหล่งเชื้อเพลิงที่ใช้ในปี 2548

สัดส่วนของแหล่งพลังงาน ที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า ของประเทศไทย*	การผลิตพลังงานไฟฟ้า		ความสัมพันธ์ของปฏิกิริยากับ ผลิตภัณฑ์	C-input จากการใช้พลังงาน ไฟฟ้า	CO <sub>2</sub> emission จากการใช้ พลังงานไฟฟ้า
	ความสามารถของ เชื้อเพลิง	ความหนาแน่นของเชื้อเพลิง			
น้ำมันเตา 6.6%	11.05 kWh/ลิตร	น้ำมันเตาชนิดเบา ที่ 15°ซ = 930 กรัม/ลิตร	น้ำมันเตา C <sub>n</sub> H <sub>2n+2</sub> (C=14-20) = 168/198*930/11.05	0.072 กก. C <sub>C20H42</sub> /kWh	1.969 (lb CO <sub>2</sub> / kWh)
				0.0714 กก. C <sub>C14H30</sub> /kWh	
น้ำมันดีเซล 0.25%	10.12 kWh/ลิตร	น้ำมันดีเซล ที่ 20°ซ = 850 กรัม/ลิตร	น้ำมันดีเซล (C <sub>12</sub> H <sub>26</sub> ) = 144/170*850/10.12	0.0711 กก. C <sub>C12H26</sub> /kWh	1.969 (lb CO <sub>2</sub> / kWh)
ถ่านหินลิกไนต์ 15.01%	2.91 kWh/kg	ถ่านหินลิกไนต์***มี %C = 73%โดยน้ำหนัก		0.30 กก.C <sub>ถ่านหิน</sub> /kWh	2.095 (lb CO <sub>2</sub> / kWh)
แก๊สธรรมชาติ (CH <sub>4</sub> ) 72.5%	0.29 kWh/m <sup>3</sup> (36.14 MJ/m <sup>3</sup> )	1 m <sup>3</sup> CH <sub>4</sub> หนัก 0.667 kg (ที่สภาวะมาตรฐาน 20°ซ 1atm)	1g C <sub>CH4</sub> =2.9/667*16/12	0.173 กก.C <sub>CH4</sub> /kWh	1.321 (lb CO <sub>2</sub> / kWh)
			1 kg C <sub>CH4</sub> = 5.783 kWh		
Biomass 3.99%	3.52 kWh/kg	Biomass*** (ชานอ้อย+แกลบ,เซลลูโลส) มี %C = 45%โดยน้ำหนัก		0.14 กก.C <sub>biomass</sub> /kWh	1.378 (lb CO <sub>2</sub> / kWh)
พลังงานน้ำ 1.65%				-	-
พลังงานลม+แสงอาทิตย์ น้อยมาก				-	-
ดังนั้น การใช้พลังงานไฟฟ้า 1 kWh จะมี				0.18 กก. C / kWh	0.18 กก. C / kWh (0.66 กก. CO <sub>2</sub> / kWh)

หมายเหตุ: \* รายงานไฟฟ้าและแผนภูมิระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยปี2548 (2548) และนพภาพร พานิชและคณะ (2547)

\*\* Hanzade et al. (2001)

\*\*\* Brody (1945) และ Maynard and Loosli (1969)

ตารางที่ จ.4 ค่าเฉลี่ย C-input จากพลังงานที่ฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์หรือสหกรณ์โคนมใช้

ค่าเฉลี่ยปริมาณคาร์บอนจากพลังงาน		C <sub>input</sub> (กก. C /ตัว/วัน)					
		โคนม	โคนม	กระบือ	สุกร	ไก่เนื้อ	ไก่ไข่
ฟาร์ม	ไฟฟ้า*	0.08 ± 0.03	0.00 ± 0.01	0.00 ± 0.00	0.02 ± 0.02	0.002 ± 0.00	0.002 ± 0.00
	น้ำมันขนส่ง**	0.01 ± 0.00	0.00 ± 0.00	0.01 ± 0.01	0.96 ± 0.99	0.052 ± 0.04	0.078 ± 0.034
	น้ำมันที่ใช้กับเครื่องจักรกล** หรือแก๊ส LPG***	0.14 ± 0.04	0.11 ± 0.16	0.09 ± 0.19	N.D.	0.003 ± 0.00	0.002 ± 0.00
	รวม C จากพลังงาน/ตัว/วัน	0.23	0.12	0.10	0.98	0.057	0.082
	รวม C จากพลังงาน/น้ำหนักสัตว์/วัน	0.51×10 <sup>-3</sup>	0.40×10 <sup>-3</sup>	0.22×10 <sup>-3</sup>	9.71×10 <sup>-3</sup>	24.37×10 <sup>-3</sup>	42.93×10 <sup>-3</sup>
โรงฆ่าสัตว์ หรือ สหกรณ์ โคนม	ไฟฟ้า*	0.10 ± 0.05	0.22 ± 0.37	0.12 ± 0.04	0.05 ± 0.03	0.009 ± 0.004	N.D.
	น้ำมันขนส่ง**	0.29 ± 0.19	0.35 ± 0.30	0.38 ± 0.46	0.01 ± 0.00	0.0018 ± 0.0019	N.D.
	ฟีน แกลบ หรือแก๊ส LPG***	N.D.	N.D.	N.D.	2.28±1.02	0.1227 ± 0.1708	N.D.
	รวม C จากพลังงาน/ตัว/วัน	0.38	0.57	0.49	2.34	0.1335	N.D.
	รวม C จากพลังงาน/น้ำหนักสัตว์/วัน	0.85×10 <sup>-3</sup>	1.88×10 <sup>-3</sup>	1.07×10 <sup>-3</sup>	23.19×10 <sup>-3</sup>	57.05×10 <sup>-3</sup>	N.D.
รวม C จากพลังงานของฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์หรือ สหกรณ์โคนม/ตัว/วัน		0.611	0.69	0.59	3.32	0.1905	0.082
รวม C จากพลังงานของฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์หรือ สหกรณ์โคนม/น้ำหนักสัตว์/วัน		1.36×10 <sup>-3</sup>	2.28×10 <sup>-3</sup>	1.29×10 <sup>-3</sup>	32.90×10 <sup>-3</sup>	81.41×10 <sup>-3</sup>	42.93×10 <sup>-3</sup>

หมายเหตุ: N.D. = ไม่ได้ตรวจวิเคราะห์ CO<sub>2</sub> 1 ppm = 1.96 mg/m<sup>3</sup> CH<sub>4</sub> 1 ppm = 0.71 mg/m<sup>3</sup>

\* รายงานไฟฟ้าและแผนภูมิระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยปี2548 (2548) และ นพภาพร พานิชและคณะ (2547) วิเคราะห์ได้ว่า C-input จากการใช้พลังงานไฟฟ้า = 0.18 กก. C / kWh

\*\*U.S. EPA, AP-42 (1995) และWHO. (1993) วิเคราะห์ได้ว่า C-input จากการใช้ น้ำมันดีเซล 1 ลิตรมี C<sub>C<sub>12</sub>H<sub>26</sub></sub> = 0.72 kg/Lและน้ำมันเบนซิน 1 ลิตรมี C = 0.67 kg/L

\*\*\*นพภาพร พานิชและคณะ (2547) วิเคราะห์จากสมการปฏิกิริยาการเผาไหม้ได้ว่าการใช้แก๊ส LPG 1 กิโลกรัมคิดเป็น C-input = 0.821 kg. C โดยการผลิตแก๊สหุงต้มที่ใช้ ในครัวเรือน (LPG) จะอัดแก๊สใส่ถังด้วยสัดส่วนของแก๊สโพรเพน (C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>) 70% และบิวเทน (C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>) 30% ซึ่งการเผาไหม้โพรเพน 1 kg จะเกิด CO<sub>2</sub> 3 kg.CO<sub>2</sub> ในขณะที่การเผาไหม้ บิวเทน 1 kg จะเกิด CO<sub>2</sub> 3.034 kg.CO<sub>2</sub>



การเผาไหม้เชื้อเพลิงแก๊ส เชื้อเพลิงเหลวหรือเชื้อเพลิงแข็งที่ไม่สมบูรณ์จะทำให้เกิดคาร์บอนอิสระ เนื่องจากการแตกตัวด้วยความร้อนในกระบวนการเผาไหม้ทำให้มีเขม่า CO ไฮโดรเจนหรือ  $\text{CH}_4$  ขึ้นในไอเสียจากการเผาไหม้ ซึ่งในการเกิดเขม่า เขม่าที่ถูกระบายออกมาจากปล่องเป็นเขม่าเพียงบางส่วน แต่ยังมีที่สะสมอยู่ที่ด้านในของปล่องควันหรือท่อไอเสียทำให้การวัดปริมาณอย่างเที่ยงตรงเป็นไปได้ยาก ซึ่งปริมาณไฮโดรเจนหรือ  $\text{CH}_4$  ในไอเสียจะมีเพียงเล็กน้อย

ในกรณีของเครื่องยนต์ดีเซล ส่วนมากแล้วมักจะเกิดเขม่าหรือเถ้าขึ้นเนื่องจากเชื้อเพลิงได้รับความร้อนในสถานะและบริเวณบางส่วนที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอทำให้เผาไหม้ไม่หมด นอกจากนี้เชื้อเพลิงที่พุ่งไปปะทะผนังห้องเผาไหม้ซึ่งมีอุณหภูมิค่อนข้างต่ำทำให้เชื้อเพลิงไม่แตกเป็นละอองอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเถ้าที่เกิดขึ้นเหล่านี้เกิดขึ้นจากสภาพการขาดออกซิเจนเป็นบางส่วน แม้ว่าโดยรวมแล้วจะมีอากาศส่วนเกินสำหรับการเผาไหม้อยู่ก็ตาม

กลไกการเกิดเขม่าหรือเถ้าในกระบวนการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงประเภทไฮโดรคาร์บอนยังไม่เป็นที่ทราบอย่างชัดเจนแต่มีการสันนิษฐานกันว่ามีการแยกตัวของไฮโดรเจนจนทำให้เกิดการต่อตัวของโมเลกุลและการจับตัวกันเป็นวงของกลุ่มอะโรแมติกจนเกิดเป็นสารที่มีปริมาณคาร์บอนสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ จนสุดท้ายก็กลายเป็นคาร์บอน คุณสมบัติของเชื้อเพลิงมีผลกระทบอย่างมากต่อการเกิดคาร์บอนหรือเขม่า ซึ่งเชื้อเพลิงที่มีอัตราส่วนระหว่างคาร์บอนต่อไฮโดรเจนมากจะทำให้เกิดเขม่าได้ง่าย และสารไฮโดรคาร์บอนที่แตกตัวหรือเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันง่ายจะก่อให้เกิดเขม่า น้อย นั่นคือหากเชื้อเพลิงมีอันดับสูงขึ้นเท่าไรก็จะยิ่งทำให้เกิดเขม่าได้ง่ายขึ้นเท่านั้น ซึ่งทำให้แก๊สธรรมชาติ (เป็นแหล่งเชื้อเพลิงส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย) และแก๊ส LPG มีเขม่าเกิดขึ้นจากการเผาไหม้น้อยที่สุด

ภาคผนวก ข

การวิเคราะห์หาค่าคาร์บอนด้วยเครื่อง CNS – 2000 หรือ CHNS – 932 Analyzer

## การใช้เครื่อง CNS – 2000 หรือ CHNS – 932 Analyzer สำหรับวิเคราะห์หาคาร์บอน หลักการ

เครื่อง CNS – 2000 หรือ CHNS – 932 Analyzer เป็นเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และซัลเฟอร์ ซึ่งตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์ได้แก่ สารประกอบอินทรีย์ ประเภทเนื้อ นม และไข่ โดยจะต้องเตรียมตัวอย่างก่อนใช้เครื่อง ซึ่งจะต้องทำให้ตัวอย่างแต่ละชนิดแห้งและเป็นเนื้อเดียวกัน การวิเคราะห์ตัวอย่างจะต้องชั่งตัวอย่างประมาณ 2 มิลลิกรัมใส่ลงในภาชนะเฉพาะรูปทรงกระบอกที่ทำจากสังกะสี (tin capsule) หรือทำจากเงิน (silver capsule) ปิดปากภาชนะด้วยคีมและม้วนพับปากภาชนะให้สนิทเรียบร้อย จากนั้นนำภาชนะที่บรรจุตัวอย่างไปใส่ลงในช่องสำหรับป้อนเข้าเตาเผา (loading chamber) โดยสารตัวอย่างต้องทำ 2-3 ซ้ำตามความเหมาะสม แล้วใช้อากาศ (air) และออกซิเจนจากในถัง ช่วยในการเผาไหม้ จะได้  $\text{CO}_2$ ,  $\text{H}_2$ ,  $\text{N}_2$ , และ  $\text{SO}_2$  ซึ่งแก๊สฮีเลียมเป็นตัวพาเข้าสู่ระบบตรวจสอบ คาร์บอน ไฮโดรเจน ซัลเฟอร์ จะถูกตรวจสอบโดย infrared absorption ใน IR cell ขณะที่ไนโตรเจนถูกตรวจสอบโดย thermal conductivity มีการนำ  $\text{CO}_2$  และ  $\text{H}_2\text{O}$  ออกไปโดย lecosorb และ anhydron ตามลำดับ ค่าที่ได้ออกมาเป็น %C, %H, %N และ %S

### ขั้นตอนการเตรียม Blank ของสารตัวอย่าง

Blank ของสารตัวอย่างไม่ต้องใส่อะไร ซึ่งใช้ capsule เปล่า ใส่ลงไปใน loading chamber โดย Blank ต้องทำ 3 ซ้ำ

### ขั้นตอนการเตรียม Standard ของสารตัวอย่าง

Standard ของสารตัวอย่าง จะต้องมีการชั่งน้ำหนักของคาร์บอนที่ต้องการวิเคราะห์มากกว่าสารตัวอย่าง เพื่อให้ค่าที่ออกมามีความถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ชั่ง Standard ของสารตัวอย่างมาประมาณ 2 มิลลิกรัมจำนวน 3 ซ้ำ ใส่ลงไปใน capsule
2. นำ Standard ที่ชั่งมา ใส่ลงไปใน loading chamber

### ขั้นตอนการใช้เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และซัลเฟอร์

1. เปิดปุ่มของเครื่อง
2. เปิดแก๊สฮีเลียม และแก๊สออกซิเจน
3. เปิด power supplies ในตัวเครื่องทั้งสองส่วน

4. ในตัวเครื่องจะต้องกดสวิทช์ OFF ANALYZE ไปที่ ANALYZE STANDBY
5. ตั้งเครื่องให้เป็นอัตโนมัติ และให้สังเกตตำแหน่งที่มีไฟสีแดงในตัวเครื่องทั้งสามปุ่ม กระพริบตลอดเวลา ซึ่งเป็นสัญญาณว่าเครื่องพร้อมทำงานแล้ว (อุณหภูมิของเตา oxidation และ reduction furnace temperature = 1000<sup>o</sup>ซ)
6. หน้าจอคอมพิวเตอร์จะขึ้นว่า Please Enter Security Access ให้กด Enter
7. จากนั้นหน้าจอคอมพิวเตอร์จะขึ้นว่า Please Enter Your name ให้ใส่ชื่อแล้วกด Enter ไปที่ Special
8. สุดท้ายจะต้องเลือกพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์หาคาร์บอน ซึ่งจะต้องใช้พารามิเตอร์ ที่เป็น Chan# 1 โดยใช้วิธีสัมผัสไปที่ View, System folder, System update, ANALYSIS CONST., Select Channel 1, Analysis Elements, Exit

#### ขั้นตอนการทำ Blank ของตัวอย่างในตัวเครื่อง

1. นำ capsule เปล่าโดยปิดปากให้เรียบร้อย ใส่องลงใน loading chamber
2. เข้าที่ Login แล้วคลิกคำว่า ID'S
3. คลิกเลือกคำว่า Blank แล้วคลิก ESC
4. เข้าไปที่ weight เพื่อใส่น้ำหนักของ blank = 2 มิลลิกรัม แล้วกด Enter และให้กด Analyze หลังจากนั้นให้ดูว่าค่าที่ได้คงที่หรือไม่ ถ้าไม่ให้กด Enter เพื่อเพิ่มจำนวน blank จนกว่าค่าที่วิเคราะห์ได้คงที่ (ทำ blank 3 ซ้ำ)

#### การวิเคราะห์ Standard มีขั้นตอนดังนี้

1. เข้า Login ไปที่ ID เลือก Standard ที่ต้องการหาแล้วไปที่ Exit บอกน้ำหนักของ Standard ที่ชั่งมาแล้วกด Return และไปที่ Analyze
2. เมื่อ Analyze เสร็จแล้วให้ไปที่ view, system folder, system update, standard cal. แล้วเปลี่ยนเป็น Adjust Y/N, Process, Include Standard 3 ครั้ง, Process Result, ESC, Exit

#### ขั้นตอนการวิเคราะห์สารตัวอย่าง

1. เข้า Login ไปที่ ID เลือก Sample แล้วพิมพ์น้ำหนักของตัวอย่างนั้น แล้วกด Return เมื่อเสร็จแล้วให้ไปที่ ANALYZE

## ภาคผนวก ข

แบบตารางที่ใช้ในการสำรวจข้อมูลภาคสนามจากฟาร์มเลี้ยงและโรงฆ่าสัตว์ชนิดต่าง ๆ

ตารางบันทึกข้อมูล ไร่ / ไร่เนื้อ (วงกลมเล็ก) สำหรับลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามฟาร์มต่าง ๆ ของ อำเภอ.....								วันที่ / เดือน / ปี .....		พลังงาน ของ C-input ที่ใช้ หน้า.....	
ชื่อฟาร์ม	C-input (kg C./head/day)	C-fixation (kg C./head/day) ที่ไร่				C-output (kg C./head/day)		ไฟฟ้าที่ใช้		น้ำมันขนส่งอาหารไร่หรือไร่	
	ปริมาณอาหารแต่ละ ชนิดที่ให้ ไร่ (kg/วัน)หรือ (kg/เดือน)	น้ำหนักเฉลี่ย ไร่ (กก./ตัว)	น้ำหนักไร่ เฉลี่ย (กก./ฟอง)	จำนวนไร่ที่ได้ (ฟอง/วัน)	ไร่ที่ไร่ออก/ ตัว/วัน (ฟอง/ตัว/วัน)	นม.เฉลี่ยไร่ไร่ (กก./ตัว/วัน)	จำนวนไร่ใน ไร่(ตัว/ไร่)	วัตต์ หลอด ไฟ (วัตต์)	เวลาเปิด/ วัน (ชั่วโมง/ วัน)	น้ำมัน/เที่ยว (ลิตร/เที่ยว)	ระยะทางขนส่ง อาหารไร่(km)
								วัตต์ pump (วัตต์)	เวลาใช้ pump ต่อเครื่อง (hr)	นม. ไร่ไร่ที่ บรรทุก (กก.) หรือ (จำนวนฟองx นม.กก.ต่อฟอง)	ระยะทางขนส่ง ไร่ไร่(กิโลเมตร)
จำนวน ไร่ ไร่ไร่/ เนื้อ (ตัว)	ระยะเวลาไร่ไร่ไร่ (วัน)	C-fixation (kg C./head/day) ที่ไร่ไร่เป็นเนื้อและร่างกาย									
	(เริ่มไร่ทั้งหมดไร่) =	นม.ไร่ไร่ไร่ ฟอง	น้ำหนักไร่ ไร่	เวลาไร่ไร่ (วัน เดือน สัปดาห์)	นม.ไร่ไร่ไร่ ไร่	รอบเวลาเก็บ ไร่ (week เดือน วัน)	นม.ไร่ไร่ไร่ (กก./เวลา)			นม.ไร่ไร่ ไร่ไร่ไร่ (กก.)	ระยะทางขนส่ง ไร่ไร่
		แรก (กก./ ตัว)	เริ่มไร่ (กก./ ตัว)					วัตต์ไร่ ลม (วัตต์)	เวลาไร่ไร่ ลม ต่อเครื่อง (hr)	(จำนวนตัวนม. กก.ต่อตัว)	ไร่ไร่(km)

ตารางบันทึกข้อมูล เลือกวงรอบ วัวนื้อ / กระบือ สำหรับลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามฟาร์มต่าง ๆ ของ												วันที่/เดือน/ปี																	
อำเภอ.....										หน้า.....																			
ชื่อฟาร์ม / น้ำหนัก โค/ควาย  (กก./ตัว)	พืชและอาหาร เสริมที่ใช้ ขุนโค/ควายเนื้อ (กก./ตัว/วัน)  ปริมาณแต่ละชนิด	จำนวนขุน (ตัว)		ระยะเวลา การขุน (วัน/ เดือน)	ระยะทางจาก ฟาร์มถึงโรงฆ่า /ตลาดนัด (km)	ค่าไฟฟ้าโรงฆ่า บาท/เดือน			พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์			น้ำหนัก มูลสัตว์ (กก./ ตัว/วัน)	น้ำมัน ที่ ใช้กับ เครื่องจักร ในฟาร์ม (บาท ,ลิตร/วัน)	GHG หายใจ															
		วัวนื้อ	โค/ เลี้ยง ทั้งหมด			วัตต์	จำนวน	เวลาเปิด (hr/วัน)	กำลัง วัตต์	จำนวน	ระยะเวลา การเปิด หลอดไฟ (ชั่วโมง)			หลอดไฟ	หลอดไฟ	CO2 ppm	CH4 ppm												
																		หลอดไฟ	หลอด										
นน. ก่อน ขุน  กก.		ชนิด ซาก	น้ำหนัก ละ	% ซาก/ ตัว	โรงฆ่า - ตลาด  กม.																								
		เนื้อ																											
					ชนิดสัตว์ ฆ่า	จำนวนฆ่า/เดือน	ชนิด	/เดือน	น้ำหนัก																				
จำนวนที่ ขาย/ปี  ตัว/ปี	อายุโค/ควายที่ขาย ปีแต่ละตัว	เครื่อง ใน ของเสีย	กระดูก	กระบือ	โค		LPG																						
	1)																												
	2)																												


ตารางบันทึกข้อมูล หมู สำหรับแปลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามฟาร์มต่าง ๆ ของ อำเภอ.....							วันที่ / เดือน / ปี .....		พลังงาน ที่ใช้ หน้า.....			
C-input (kg C./head/day)	C-fixation (kg C./head/day) Average Daily Gain, ADG			C-output (kg C./head/day)						น้ำมันขนอาหารหมู		
อาหารแต่ละชนิดที่ให้ หมู (kg/วัน)	นน.ตัวหมูเพิ่มเฉลี่ย ADG(กก./ตัว/วัน)	นน.เฉลี่ย เริ่มต้น (กก./ตัว)	นน.หมูเฉลี่ย สิ้นสุด (กก./ตัว)	นน.เฉลี่ยซี่ หมู (กก./ตัว/วัน)	จำนวนหมูใน เล้า(ตัว/เล้า)	นน.ซี่หมูที่ เกิดขึ้นในเล้า ต่อเวลากักซี่ (kg / เวลา)	จำนวน หลอด ไฟ (หลอด)	วัตต์ หลอด ไฟ (วัตต์)	เวลาเปิด/ วัน (ชั่วโมง/ วัน)	นน.อาหารหมูที่ บรรทุก (กก.) หรือ (จำนวนถุงxนน. กก./ถุง)	ระยะทางขนส่ง อาหารหมู(km)	
	ระยะเวลาเลี้ยง	เวลาใช้ pump	วัตต์ของ pump							ความถี่ในการซื้ออาหารหมูต่อรุ่น		
จำนวน pump	(วัน)			กำลังวัตต์ของเครื่องเดิมอากาศ = วัตต์						(เที่ยวต่อรุ่นหมู) =		
จำนวนรุ่นหมูที่เลี้ยงต่อปี = รุ่น/ปี				LPG	kg		(เครื่อง)	(วัตต์)	ต่อเครื่อง (hr)	(จำนวนหมูxนน.กก. ต่อตัว)	หมูไปโรงฆ่า(Km)	
จำนวนหมูขุน ที่เลี้ยงอยู่ (ตัว)	GHG จากการหายใจของหมู											
	จำนวน หลอดไฟ	CO2 (ppm)	CH <sub>4</sub> (ppm)		จำนวนครั้งหายใจ/นาที							
วัตต์หลอดไฟ	เวลาเปิดไฟ/วัน	pump น้ำ	จำนวนหมูที่ฆ่าต่อวัน		ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้		จำนวนพัค ลม (เครื่อง)	วัตต์พัค ลม (วัตต์)	เวลาใช้พัค ลม ต่อเครื่อง (hr)	นน.เนื้อหมบบรรทุก (กก.)หรือ (จำนวนซากxนน.กก. ต่อตัว)	ระยะทางขนส่ง ซาก เนื้อหมูไปตลาด (km)	
					(ตัว/วัน)							




ตัวอย่างฟาร์มโคนมใน อำเภอ.....				ระยะทาง จาก	นน.นม เฉลี่ยที่	ค่า ไฟฟ้า เฉลี่ย							น้ำมันที่ใช้	น้ำหนักมูล สัตว์	GHG EMISSION จาก	
อาหารหยาบและชั้นที่ ใช้เลี้ยง		นน.เฉลี่ย วันนม (กก./ตัว)	จำนวนวัว รีดนม (ตัว)	ปริมาณ น้ำนมที่ได้ เฉลี่ย (กก./ตัว-วัน)	ฟาร์มถึง สหกรณ์ (กิโลเมตร)	ขนส่ง (เข้า- บ่าย) (กิโลกรัม)	ใน ฟาร์ม (บาท/ เดือน)	หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง			เครื่องรีดนม		เครื่องจักรกล (ลิตร/วัน)	ที่เกิดขึ้น (กก./ตัว- วัน)	ลมหายใจสัตว์ (ppm)	
ชนิด	ปริมาณ (กก./ ตัว-วัน)							วัตต์	จำนวน	เวลา เปิด	วัตต์	เวลา			CO <sub>2</sub>	CH <sub>4</sub>
						เข้า บ่าย รวม							การจัดการ มูลสัตว์			
						เข้า บ่าย รวม							การจัดการ มูลสัตว์			

ภาคผนวก ฅ

แนวโน้มนการเกิดแก๊ส CO<sub>2</sub> จากการหายใจของไก่เนื้อและไก่ไข่



รูปที่ ฅ.1 แนวโน้มการเกิดแก๊ส CO<sub>2</sub> จากการหายใจของไม้เนื้อ



รูปที่ ฅ.2 แนวโน้มการเกิดแก๊ส CO<sub>2</sub> จากการหายใจของไม้ไผ่

### ภาคผนวก ญ

ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการปลดปล่อยคาร์บอนกับคาร์บอน  
ที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ตารางที่ ๑.1 ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการปลดปล่อยคาร์บอนกับคาร์บอนที่ถ่ายเทเข้าสู่  
ตัวโคนมที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

SUMMARY OUTPUT				C-emitted & C-input of Dairies				
<i>Regression Statistics</i>				Observations	400			
Multiple R		0.876292309		R Square	0.76788821			
<b>Adjusted R Square</b>		<b>0.767305015</b>		Standard Error	0.188906036			
ANOVA	df	SS	MS	F	<i>Significance F</i>			
Regression	1	46.986765	46.98676469	1316.691	<b>2.707E-128 &lt; 0.05 (OK)</b>			
Residual	398	14.202825	0.035685491					
Total	399	61.18959						
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	<b>0.661244846</b>	0.056333	11.7382	<b>1.59E-27 &lt; 0.05 (OK)</b>	0.5505	0.77199	0.5504977	0.771992
X Variable 1	<b>0.290733222</b>	0.0080122	36.2862	<b>2.7E-128 &lt; 0.05 (OK)</b>	0.2750	0.30648	0.2749817	0.3064848

ตารางที่ ๑.2 ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการปลดปล่อยคาร์บอนกับคาร์บอนที่ถ่ายเทเข้าสู่  
ตัวโคนเนื้อที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

SUMMARY OUTPUT				C-emitted & C-input of Oxen				
<i>Regression Statistics</i>				Observations	400			
Multiple R		0.988565768		R Square	0.977262278			
<b>Adjusted R Square</b>		<b>0.977205148</b>		Standard Error	0.054554089			
ANOVA	df	SS	MS	F	<i>Significance F</i>			
Regression	1	50.909857	50.90985751	17105.95	<b>0 &lt; 0.05 (OK)</b>			
Residual	398	1.1845072	0.002976149					
Total	399	52.094365						
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	<b>0.551460901</b>	0.0068752	80.2102	<b>8.3E-248 &lt; 0.05 (OK)</b>	0.5379446	0.5649771	0.5379447	0.56497715
X Variable 1	<b>0.185277106</b>	0.0014166	130.790	<b>0 &lt; 0.05 (OK)</b>	0.1824921	0.1880621	0.1824921	0.18806207

ตารางที่ ๓.3 ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการปลดปล่อยคาร์บอนกับคาร์บอนที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวกระบือที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

SUMMARY OUTPUT				C-emitted & C-input of Buffaloes				
<i>Regression Statistics</i>				Observations	400			
Multiple R		0.996735092		R Square	0.993480844			
<b>Adjusted R Square</b>		<b>0.993464465</b>		Standard Error	0.03782013			
ANOVA	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>			
Regression	1	86.75554618	86.75554618	60652.85	<b>0 &lt; 0.05 (OK)</b>			
Residual	398	0.569284163	0.001430362					
Total	399	87.32483035						
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	<b>0.755874704</b>	0.004652596	162.4630	<b>&lt; 0.05 (OK)</b>	0.746728	0.76502144	0.746728	0.7650214
X Variable 1	<b>0.16072628</b>	0.000652621	246.278	<b>&lt; 0.05 (OK)</b>	0.1594433	0.1620093	0.1594433	0.1620093

ตารางที่ ๓.4 ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการปลดปล่อยคาร์บอนกับคาร์บอนที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวสุกรที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

SUMMARY OUTPUT				C-emitted & C-input of Pigs				
<i>Regression Statistics</i>				Observations	400			
Multiple R		0.882210387		R Square	0.778295167			
<b>Adjusted R Square</b>		<b>0.777738119</b>		Standard Error	0.015091334			
ANOVA	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>			
Regression	1	0.31820538	0.31820538	1397.18	<b>2.9181E-132 &lt; 0.05 (OK)</b>			
Residual	398	0.090643851	0.000227748					
Total	399	0.408849231						
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	<b>0.100694196</b>	0.004153148	24.2453	<b>2.1E-80 &lt; 0.05 (OK)</b>	0.092529	0.1088590	0.0925293	0.10885904
X Variable 1	<b>0.173674828</b>	0.004646338	37.3789	<b>2.9E-132 &lt; 0.05 (OK)</b>	0.164540	0.1828092	0.1645404	0.18280926

ตารางที่ ๕.5 ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการปลดปล่อยคาร์บอนกับคาร์บอนที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวไก่เนื้อที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

SUMMARY OUTPUT				C-emitted & C-input of Chickens				
<i>Regression Statistics</i>				Observations	400			
Multiple R		0.794076054		R Square	0.63055678			
<b>Adjusted R Square</b>		<b>0.62962853</b>		Standard Error	0.002808397			
ANOVA	df	SS	MS	F	<i>Significance F</i>			
Regression	1	0.0053577	0.005357676	679.2968	<b>4.39767E-88 &lt; 0.05 (OK)</b>			
Residual	398	0.0031391	7.88709E-06					
Total	399	0.0084967						
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	<b>-0.011172638</b>	0.0010944	-10.209	<b>6.87E-22 &lt; 0.05 (OK)</b>	-0.013324	-0.009021	-0.0133241	-0.009021
X Variable 1	<b>0.657185232</b>	0.0252149	26.0633	<b>4.4E-88 &lt; 0.05 (OK)</b>	0.607614	0.706756	0.6076141	0.706756

ตารางที่ ๕.6 ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการปลดปล่อยคาร์บอนกับคาร์บอนที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวไก่ไข่ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

SUMMARY OUTPUT				C-emitted & C-input of Hens				
<i>Regression Statistics</i>				Observations	400			
Multiple R		0.93421438		R Square	0.872756505			
<b>Adjusted R Square</b>		<b>0.872436798</b>		Standard Error	0.000368847			
ANOVA	df	SS	MS	F	<i>Significance F</i>			
Regression	1	0.00037139	0.000371392	2729.861	<b>2.8419E-180 &lt; 0.05 (OK)</b>			
Residual	398	5.41471E-05	1.36048E-07					
Total	399	0.000425539						
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	<b>-0.010736</b>	0.000507764	-21.1450	<b>4.57E-67 &lt; 0.05 (OK)</b>	-0.01173	-0.0097	-0.01173	-0.0097
X Variable 1	<b>0.62833733</b>	0.012026038	52.2481	<b>2.8E-180 &lt; 0.05 (OK)</b>	0.60469	0.65198	0.6046948	0.6519798

### ภาคผนวก ฎ

ข้อมูลดิบระหว่าง C-input กับ C-emitted และ C-input กับ C-fixation ของโคนม โค  
เนื้อ กระบือ สุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่ ที่ทำการศึกษาในปี 2550 - 2551



ตารางที่ ๑.1 ข้อมูลคียบ C-input กับ C-emitted ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551

ลำดับ	Dairy cows		Oxen		Buffaloes	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)
1	5.037	1.199	0.944	0.413	1.626	0.858
2	5.037	1.508	1.453	0.591	1.626	0.895
3	5.037	1.525	1.464	0.608	2.097	0.936
4	5.037	1.629	1.511	0.663	2.146	0.937
5	5.037	1.649	1.556	0.683	2.146	0.987
6	5.037	1.790	1.558	0.687	2.146	1.000
7	5.037	1.820	1.662	0.698	2.254	1.019
8	5.037	1.823	1.662	0.702	2.341	1.077
9	5.037	1.846	1.683	0.704	2.341	1.078
10	5.037	1.870	1.754	0.717	2.436	1.094
11	5.037	1.920	1.787	0.729	2.452	1.104
12	5.037	1.930	1.794	0.767	2.503	1.126
13	5.037	1.930	1.846	0.788	2.503	1.139
14	5.037	1.955	1.865	0.796	2.536	1.154
15	5.037	1.977	1.888	0.799	2.575	1.155
16	5.037	1.988	1.888	0.809	2.621	1.162
17	5.037	1.988	1.888	0.822	2.630	1.164
18	5.037	1.995	1.888	0.836	2.664	1.170
19	5.037	1.995	1.888	0.843	2.682	1.171
20	5.037	2.017	1.888	0.844	2.691	1.179
21	5.037	2.017	1.888	0.873	2.780	1.181
22	5.037	2.017	1.983	0.874	2.859	1.184
23	5.037	2.035	1.983	0.878	2.861	1.196
24	5.037	2.055	2.005	0.892	2.861	1.201
25	5.037	2.071	2.005	0.914	2.865	1.214
26	5.037	2.072	2.028	0.933	2.926	1.216
27	5.037	2.111	2.073	0.935	2.926	1.223
28	5.037	2.114	2.073	0.936	2.926	1.226
29	5.037	2.114	2.077	0.938	2.926	1.228
30	5.037	2.114	2.077	0.945	2.926	1.230

ตารางที่ ฎ.1 ข้อมูลคียบ C-input กับ C-emitted ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Dairy cows		Oxen		Buffaloes	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)
31	5.037	2.114	2.077	0.955	2.926	1.236
32	5.037	2.114	2.096	0.961	2.926	1.237
33	5.037	2.114	2.096	0.962	2.926	1.249
34	5.037	2.114	2.216	0.962	2.926	1.262
35	5.376	2.114	2.256	0.968	3.028	1.263
36	5.417	2.114	2.256	0.968	3.121	1.267
37	5.466	2.124	2.256	0.975	3.166	1.268
38	5.507	2.162	2.266	0.978	3.219	1.269
39	5.522	2.162	2.266	0.982	3.251	1.276
40	5.608	2.162	2.266	0.983	3.313	1.280
41	5.670	2.162	2.361	0.984	3.313	1.284
42	5.672	2.162	2.361	0.987	3.414	1.285
43	5.722	2.210	2.361	0.989	3.451	1.287
44	5.722	2.210	2.361	0.996	3.451	1.290
45	5.726	2.210	2.463	0.998	3.495	1.290
46	5.741	2.210	2.463	1.000	3.495	1.291
47	5.742	2.210	2.463	1.002	3.495	1.296
48	5.830	2.210	2.463	1.005	3.548	1.299
49	5.878	2.210	2.485	1.008	3.606	1.300
50	5.887	2.211	2.485	1.008	3.609	1.303
51	5.895	2.211	2.493	1.009	3.658	1.307
52	5.937	2.211	2.555	1.012	3.658	1.310
53	5.948	2.211	2.555	1.014	3.658	1.310
54	5.984	2.249	2.555	1.016	3.732	1.315
55	6.032	2.249	2.606	1.021	3.755	1.322
56	6.090	2.249	2.619	1.026	3.758	1.327
57	6.134	2.255	2.631	1.026	3.801	1.329
58	6.141	2.259	2.631	1.034	3.901	1.329
59	6.151	2.259	2.674	1.042	3.901	1.333
60	6.208	2.270	2.707	1.043	3.901	1.333

ตารางที่ ฎ.1 ข้อมูลคิบ C-input กับ C-emitted ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Dairy cows		Oxen		Buffaloes	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)
61	6.267	2.281	2.707	1.049	3.901	1.337
62	6.267	2.288	2.742	1.051	3.901	1.340
63	6.333	2.304	2.833	1.051	3.901	1.346
64	6.338	2.304	2.833	1.054	3.901	1.353
65	6.358	2.308	2.833	1.055	3.901	1.353
66	6.358	2.365	2.833	1.061	3.901	1.353
67	6.429	2.365	2.833	1.061	3.901	1.360
68	6.429	2.365	2.833	1.062	3.926	1.364
69	6.436	2.365	2.833	1.065	3.954	1.365
70	6.436	2.365	2.833	1.070	3.954	1.365
71	6.438	2.375	2.833	1.073	3.954	1.365
72	6.438	2.375	2.833	1.082	3.954	1.367
73	6.438	2.375	2.833	1.083	3.954	1.370
74	6.455	2.375	2.849	1.084	4.036	1.375
75	6.455	2.375	2.880	1.085	4.036	1.384
76	6.455	2.375	2.885	1.085	4.047	1.384
77	6.471	2.375	2.902	1.088	4.064	1.384
78	6.478	2.404	2.902	1.089	4.180	1.390
79	6.478	2.418	2.902	1.096	4.180	1.401
80	6.478	2.472	2.911	1.098	4.194	1.412
81	6.491	2.477	2.914	1.100	4.194	1.415
82	6.491	2.514	2.920	1.108	4.276	1.421
83	6.496	2.516	2.920	1.110	4.292	1.422
84	6.503	2.523	2.938	1.110	4.292	1.422
85	6.509	2.545	2.939	1.115	4.292	1.424
86	6.520	2.549	2.939	1.117	4.292	1.429
87	6.527	2.550	2.939	1.122	4.292	1.429
88	6.527	2.559	2.980	1.126	4.292	1.429
89	6.529	2.580	3.009	1.126	4.292	1.438
90	6.540	2.580	3.045	1.126	4.292	1.439

ตารางที่ ฎ.1 ข้อมูลคิบ C-input กับ C-emitted ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Dairy cows		Oxen		Buffaloes	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)
91	6.547	2.580	3.045	1.126	4.292	1.442
92	6.551	2.580	3.045	1.127	4.292	1.446
93	6.552	2.580	3.056	1.129	4.292	1.447
94	6.556	2.580	3.077	1.130	4.292	1.449
95	6.561	2.580	3.077	1.132	4.292	1.452
96	6.565	2.580	3.077	1.134	4.298	1.462
97	6.570	2.580	3.105	1.135	4.325	1.465
98	6.574	2.580	3.116	1.136	4.335	1.470
99	6.581	2.580	3.116	1.140	4.335	1.472
100	6.584	2.580	3.116	1.143	4.354	1.473
101	6.587	2.580	3.120	1.146	4.357	1.479
102	6.592	2.580	3.124	1.148	4.389	1.483
103	6.592	2.580	3.124	1.149	4.389	1.484
104	6.602	2.580	3.145	1.149	4.389	1.487
105	6.606	2.580	3.160	1.151	4.389	1.488
106	6.606	2.580	3.185	1.152	4.389	1.492
107	6.611	2.580	3.185	1.160	4.389	1.500
108	6.616	2.580	3.193	1.166	4.389	1.503
109	6.620	2.580	3.193	1.170	4.389	1.510
110	6.627	2.580	3.248	1.174	4.389	1.518
111	6.633	2.580	3.248	1.176	4.418	1.518
112	6.638	2.580	3.248	1.179	4.463	1.522
113	6.643	2.580	3.277	1.179	4.463	1.526
114	6.643	2.580	3.284	1.183	4.464	1.535
115	6.653	2.580	3.305	1.185	4.464	1.537
116	6.658	2.580	3.357	1.186	4.584	1.537
117	6.659	2.580	3.357	1.189	4.584	1.541
118	6.661	2.580	3.399	1.189	4.719	1.546
119	6.663	2.580	3.427	1.192	4.765	1.546
120	6.663	2.580	3.427	1.193	4.765	1.549

ตารางที่ ฎ.1 ข้อมูลคิป C-input กับ C-emitted ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Dairy cows		Oxen		Buffaloes	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)
121	6.672	2.580	3.447	1.194	4.776	1.552
122	6.678	2.580	3.447	1.197	4.877	1.553
123	6.684	2.580	3.450	1.198	4.877	1.555
124	6.688	2.580	3.468	1.204	4.877	1.556
125	6.693	2.580	3.494	1.205	4.877	1.560
126	6.698	2.580	3.504	1.208	4.877	1.564
127	6.703	2.580	3.504	1.210	4.877	1.568
128	6.703	2.580	3.504	1.210	4.877	1.568
129	6.703	2.580	3.513	1.211	4.877	1.571
130	6.708	2.580	3.513	1.211	4.877	1.578
131	6.718	2.580	3.513	1.216	4.877	1.588
132	6.723	2.580	3.541	1.216	4.877	1.589
133	6.723	2.580	3.541	1.216	4.877	1.598
134	6.733	2.580	3.541	1.217	4.877	1.603
135	6.738	2.580	3.541	1.217	4.877	1.606
136	6.738	2.580	3.542	1.217	4.877	1.614
137	6.748	2.580	3.542	1.217	4.877	1.618
138	6.753	2.580	3.542	1.218	4.877	1.622
139	6.759	2.580	3.542	1.218	4.877	1.625
140	6.759	2.580	3.542	1.219	4.877	1.625
141	6.769	2.580	3.550	1.223	4.881	1.625
142	6.771	2.580	3.571	1.224	5.012	1.627
143	6.774	2.580	3.571	1.225	5.012	1.629
144	6.776	2.580	3.584	1.230	5.020	1.629
145	6.776	2.580	3.584	1.230	5.029	1.630
146	6.776	2.580	3.588	1.233	5.056	1.631
147	6.779	2.580	3.610	1.234	5.056	1.633
148	6.788	2.580	3.632	1.234	5.364	1.637
149	6.793	2.580	3.682	1.237	5.370	1.638
150	6.798	2.580	3.693	1.237	5.393	1.644

ตารางที่ ฎ.1 ข้อมูลคิบ C-input กับ C-emitted ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Dairy cows		Oxen		Buffaloes	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)
151	6.803	2.580	3.777	1.241	5.393	1.644
152	6.808	2.580	3.777	1.242	5.437	1.645
153	6.808	2.580	3.777	1.242	5.459	1.646
154	6.809	2.580	3.777	1.244	5.462	1.650
155	6.814	2.580	3.777	1.253	5.475	1.651
156	6.815	2.580	3.827	1.254	5.524	1.654
157	6.819	2.580	3.827	1.257	5.568	1.655
158	6.824	2.580	3.854	1.259	5.651	1.655
159	6.827	2.580	3.877	1.261	5.651	1.657
160	6.830	2.580	3.877	1.262	5.651	1.658
161	6.835	2.580	3.878	1.264	5.690	1.661
162	6.840	2.580	3.899	1.266	5.722	1.664
163	6.846	2.580	3.899	1.269	5.752	1.667
164	6.851	2.580	3.923	1.271	5.846	1.668
165	6.857	2.580	3.973	1.275	5.852	1.670
166	6.862	2.580	4.013	1.278	5.852	1.674
167	6.864	2.580	4.013	1.279	5.852	1.676
168	6.866	2.580	4.013	1.280	5.852	1.679
169	6.867	2.580	4.014	1.280	5.852	1.679
170	6.870	2.580	4.014	1.281	5.852	1.688
171	6.871	2.580	4.060	1.281	5.852	1.690
172	6.874	2.580	4.060	1.282	5.852	1.695
173	6.875	2.580	4.060	1.285	5.852	1.697
174	6.879	2.580	4.060	1.289	5.947	1.707
175	6.880	2.580	4.060	1.290	5.967	1.708
176	6.881	2.580	4.060	1.292	5.987	1.709
177	6.881	2.580	4.060	1.298	6.291	1.709
178	6.882	2.580	4.060	1.298	6.291	1.715
179	6.884	2.580	4.060	1.300	6.331	1.718
180	6.884	2.580	4.060	1.300	6.331	1.723

ตารางที่ ฎ.1 ข้อมูลคิบ C-input กับ C-emitted ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Dairy cows		Oxen		Buffaloes	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)
181	6.887	2.580	4.060	1.305	6.340	1.730
182	6.887	2.580	4.060	1.307	6.340	1.730
183	6.888	2.580	4.060	1.308	6.340	1.732
184	6.889	2.580	4.060	1.310	6.340	1.743
185	6.889	2.580	4.060	1.315	6.340	1.745
186	6.890	2.580	4.155	1.320	6.340	1.750
187	6.890	2.580	4.155	1.321	6.340	1.751
188	6.893	2.580	4.155	1.324	6.437	1.757
189	6.893	2.580	4.155	1.326	6.437	1.759
190	6.894	2.580	4.155	1.328	6.437	1.767
191	6.894	2.592	4.155	1.330	6.437	1.769
192	6.894	2.592	4.155	1.337	6.437	1.770
193	6.894	2.592	4.155	1.340	6.437	1.771
194	6.894	2.592	4.155	1.341	6.437	1.772
195	6.895	2.592	4.155	1.342	6.437	1.773
196	6.897	2.592	4.155	1.348	6.437	1.775
197	6.897	2.592	4.155	1.351	6.437	1.779
198	6.897	2.592	4.155	1.351	6.437	1.783
199	6.897	2.592	4.155	1.355	6.437	1.793
200	6.897	2.592	4.155	1.357	6.437	1.796
201	6.898	2.592	4.190	1.357	6.437	1.797
202	6.899	2.592	4.207	1.358	6.437	1.799
203	6.899	2.592	4.249	1.359	6.437	1.799
204	6.901	2.592	4.249	1.359	6.437	1.802
205	6.903	2.592	4.249	1.359	6.437	1.803
206	6.904	2.592	4.249	1.363	6.437	1.803
207	6.907	2.592	4.249	1.364	6.437	1.803
208	6.909	2.592	4.249	1.367	6.437	1.803
209	6.909	2.592	4.249	1.372	6.437	1.803
210	6.912	2.592	4.249	1.374	6.437	1.803

ตารางที่ ฎ.1 ข้อมูลคิบ C-input กับ C-emitted ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Dairy cows		Oxen		Buffaloes	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)
211	6.915	2.592	4.257	1.377	6.437	1.803
212	6.916	2.592	4.287	1.377	6.437	1.803
213	6.918	2.598	4.287	1.378	6.437	1.803
214	6.920	2.598	4.304	1.378	6.437	1.803
215	6.922	2.598	4.304	1.378	6.502	1.803
216	6.923	2.598	4.327	1.379	6.514	1.803
217	6.926	2.598	4.378	1.381	6.514	1.803
218	6.929	2.598	4.402	1.381	6.514	1.803
219	6.931	2.598	4.402	1.381	6.514	1.803
220	6.931	2.598	4.438	1.382	6.514	1.803
221	6.931	2.598	4.438	1.384	6.514	1.803
222	6.931	2.616	4.438	1.386	6.514	1.803
223	6.931	2.634	4.438	1.386	6.514	1.803
224	6.931	2.636	4.455	1.391	6.514	1.803
225	6.931	2.642	4.455	1.392	6.514	1.803
226	6.931	2.676	4.460	1.392	6.514	1.803
227	6.931	2.676	4.460	1.393	6.514	1.803
228	6.931	2.692	4.460	1.394	6.514	1.803
229	6.931	2.694	4.460	1.394	6.514	1.803
230	6.931	2.704	4.460	1.397	6.514	1.803
231	6.931	2.722	4.460	1.402	6.514	1.803
232	6.931	2.730	4.460	1.412	6.514	1.803
233	6.931	2.734	4.460	1.412	6.514	1.803
234	6.931	2.753	4.585	1.414	6.514	1.803
235	6.931	2.757	4.585	1.414	6.514	1.803
236	6.931	2.762	4.585	1.418	6.514	1.803
237	6.931	2.768	4.585	1.419	6.514	1.803
238	6.931	2.768	4.585	1.423	6.514	1.803
239	6.931	2.768	4.600	1.423	6.514	1.803
240	6.931	2.768	4.640	1.423	6.514	1.803



ตารางที่ ฎ.1 ข้อมูลคิบ C-input กับ C-emitted ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Dairy cows		Oxen		Buffaloes	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)
241	6.931	2.768	4.640	1.424	6.514	1.803
242	6.931	2.768	4.651	1.427	6.514	1.803
243	6.931	2.768	4.663	1.434	6.514	1.803
244	6.931	2.768	4.679	1.437	6.514	1.803
245	6.931	2.768	4.679	1.443	6.514	1.803
246	6.931	2.772	4.679	1.444	6.514	1.803
247	6.931	2.791	4.679	1.446	6.514	1.803
248	6.931	2.791	4.679	1.454	6.514	1.803
249	6.931	2.791	4.679	1.454	6.514	1.803
250	6.931	2.791	4.679	1.455	6.514	1.803
251	6.931	2.791	4.679	1.457	6.514	1.803
252	6.931	2.791	4.679	1.457	6.514	1.803
253	6.931	2.811	4.679	1.462	6.514	1.803
254	6.931	2.813	4.721	1.464	6.514	1.803
255	6.931	2.853	4.721	1.467	6.514	1.803
256	6.931	2.871	4.721	1.467	6.514	1.803
257	6.931	2.907	4.721	1.467	6.514	1.803
258	6.931	2.907	4.721	1.468	6.514	1.803
259	6.931	2.907	4.721	1.471	6.514	1.803
260	6.931	2.907	4.721	1.471	6.514	1.803
261	6.931	2.907	4.721	1.472	6.514	1.803
262	6.931	2.907	4.721	1.475	6.514	1.803
263	6.931	2.907	4.721	1.476	6.514	1.803
264	6.931	2.907	4.721	1.477	6.514	1.809
265	6.931	2.907	4.721	1.480	6.514	1.824
266	6.931	2.907	4.721	1.482	6.514	1.825
267	6.931	2.907	4.721	1.483	6.514	1.826
268	6.931	2.907	4.721	1.483	6.514	1.830
269	6.931	2.907	4.739	1.487	6.514	1.835
270	6.931	2.907	4.860	1.488	6.514	1.840

ตารางที่ ฎ.1 ข้อมูลคียบ C-input กับ C-emitted ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Dairy cows		Oxen		Buffaloes	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)
271	6.931	2.907	4.864	1.488	6.514	1.840
272	6.931	2.907	4.864	1.490	6.514	1.858
273	6.931	2.907	4.864	1.492	6.514	1.858
274	6.931	2.907	4.864	1.499	6.572	1.859
275	6.931	2.907	4.864	1.503	6.594	1.859
276	6.931	2.907	4.864	1.503	6.626	1.863
277	6.931	2.907	4.864	1.503	6.828	1.865
278	6.931	2.907	4.864	1.504	6.828	1.871
279	6.931	2.907	4.864	1.504	6.828	1.875
280	6.931	2.907	4.967	1.505	6.828	1.884
281	6.931	2.907	4.967	1.513	6.828	1.887
282	6.931	2.907	4.982	1.513	6.828	1.900
283	6.933	2.907	5.018	1.514	7.016	1.901
284	6.933	2.907	5.018	1.521	7.073	1.907
285	6.933	2.907	5.020	1.522	7.101	1.918
286	6.933	2.907	5.020	1.523	7.153	1.942
287	6.933	2.907	5.020	1.526	7.153	1.943
288	6.933	2.907	5.078	1.526	7.159	1.948
289	6.933	2.907	5.099	1.527	7.250	1.949
290	6.933	2.907	5.141	1.529	7.296	1.954
291	6.933	2.907	5.141	1.529	7.400	1.955
292	6.933	2.907	5.141	1.531	7.400	1.958
293	6.933	2.907	5.162	1.532	7.400	1.967
294	6.933	2.907	5.165	1.533	7.491	1.974
295	6.933	2.907	5.193	1.535	7.491	1.975
296	6.933	2.907	5.219	1.536	7.501	1.986
297	6.933	2.907	5.219	1.538	7.510	2.004
298	6.933	2.907	5.386	1.538	7.602	2.007
299	6.933	2.907	5.386	1.541	7.666	2.010
300	6.933	2.907	5.386	1.542	7.702	2.017

ตารางที่ ๑.1 ข้อมูลดิบ C-input กับ C-emitted ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Dairy cows		Oxen		Buffaloes	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)
301	6.933	2.907	5.449	1.542	7.702	2.019
302	6.933	2.907	5.449	1.545	7.803	2.022
303	6.933	2.907	5.537	1.547	7.803	2.025
304	6.933	2.907	5.540	1.547	7.933	2.035
305	6.933	2.914	5.581	1.549	7.982	2.037
306	6.933	2.917	5.587	1.551	7.982	2.037
307	6.933	2.937	5.587	1.553	7.992	2.042
308	6.933	2.983	5.595	1.560	8.047	2.049
309	6.933	2.983	5.623	1.562	8.113	2.058
310	6.933	2.983	5.665	1.562	8.297	2.061
311	6.933	2.983	5.665	1.563	8.376	2.062
312	6.933	2.983	5.665	1.565	8.388	2.067
313	6.933	2.983	5.665	1.571	8.388	2.081
314	6.933	2.983	5.665	1.574	8.388	2.084
315	6.933	2.983	5.665	1.576	8.388	2.090
316	6.933	2.983	5.665	1.577	8.388	2.096
317	6.933	2.983	5.665	1.577	8.388	2.127
318	6.933	2.986	5.665	1.577	8.388	2.127
319	6.933	2.989	5.665	1.579	8.388	2.128
320	6.933	2.989	5.785	1.580	8.388	2.130
321	6.933	2.989	5.785	1.581	8.388	2.138
322	6.933	2.989	5.816	1.583	8.388	2.138
323	6.933	2.989	5.901	1.588	8.388	2.141
324	6.933	2.989	5.901	1.591	8.388	2.162
325	6.933	2.989	5.901	1.593	8.577	2.171
326	6.933	2.989	5.959	1.596	8.577	2.174
327	6.933	2.989	5.959	1.602	8.583	2.184
328	6.933	2.989	5.996	1.608	8.583	2.191
329	6.933	2.989	5.996	1.609	8.583	2.193
330	6.935	2.989	6.012	1.623	8.583	2.195

ตารางที่ ฎ.1 ข้อมูลคิบ C-input กับ C-emitted ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Dairy cows		Oxen		Buffaloes	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)
331	6.935	2.989	6.012	1.635	8.583	2.198
332	6.935	2.989	6.020	1.642	8.583	2.201
333	6.940	2.989	6.020	1.649	8.583	2.203
334	6.959	2.989	6.090	1.653	8.778	2.203
335	6.988	2.995	6.090	1.661	9.065	2.207
336	7.009	2.995	6.137	1.665	9.216	2.217
337	7.033	2.995	6.137	1.668	9.216	2.217
338	7.033	3.013	6.137	1.670	9.251	2.229
339	7.164	3.019	6.186	1.670	9.445	2.281
340	7.226	3.024	6.186	1.672	9.552	2.294
341	7.238	3.024	6.232	1.682	9.754	2.303
342	7.285	3.029	6.232	1.691	9.754	2.323
343	7.307	3.032	6.232	1.691	9.754	2.324
344	7.331	3.032	6.232	1.694	9.754	2.325
345	7.401	3.032	6.232	1.695	9.754	2.340
346	7.437	3.032	6.232	1.703	9.754	2.341
347	7.437	3.032	6.232	1.705	9.754	2.341
348	7.443	3.032	6.232	1.717	9.754	2.343
349	7.677	3.032	6.232	1.721	9.754	2.347
350	7.740	3.033	6.232	1.723	9.754	2.349
351	7.748	3.033	6.232	1.736	9.754	2.353
352	7.748	3.033	6.232	1.737	9.754	2.355
353	7.748	3.033	6.232	1.743	9.754	2.359
354	7.748	3.033	6.232	1.745	9.754	2.364
355	7.748	3.033	6.232	1.751	9.754	2.369
356	7.794	3.033	6.232	1.757	9.754	2.372
357	7.854	3.033	6.232	1.763	10.087	2.386
358	7.895	3.038	6.232	1.774	10.087	2.397
359	8.044	3.038	6.484	1.775	10.131	2.415
360	8.084	3.038	6.522	1.794	10.427	2.426

ตารางที่ ๑.1 ข้อมูลคิพ C-input กับ C-emitted ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Dairy cows		Oxen		Buffaloes	
	C-input พืช	C- emitted	C-input พืช	C- emitted	C-input พืช	C- emitted
	อาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	(กก. C/ตัว/วัน)	อาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	(กก. C/ตัว/วัน)	อาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	(กก. C/ตัว/วัน)
361	8.114	3.038	6.526	1.804	10.427	2.428
362	8.170	3.038	6.526	1.805	10.427	2.430
363	8.220	3.039	6.526	1.819	10.729	2.443
364	8.259	3.039	6.568	1.821	10.729	2.447
365	8.309	3.039	6.652	1.826	10.729	2.460
366	8.493	3.039	6.882	1.856	10.729	2.481
367	8.558	3.039	6.932	1.858	10.729	2.487
368	8.569	3.049	6.978	1.897	10.853	2.495
369	8.865	3.049	6.978	1.901	10.853	2.522
370	8.912	3.059	6.978	1.901	11.092	2.526
371	8.961	3.059	7.162	1.905	11.469	2.558
372	9.173	3.068	7.270	1.910	11.469	2.578
373	9.337	3.068	7.386	1.916	11.615	2.579
374	9.437	3.069	7.386	1.922	11.704	2.639
375	9.467	3.069	7.428	1.941	11.704	2.655
376	9.831	3.069	7.481	1.957	11.704	2.657
377	9.831	3.072	7.489	1.960	12.461	2.675
378	9.831	3.082	7.497	1.985	12.582	2.698
379	9.831	3.089	7.554	2.031	12.875	2.720
380	9.831	3.099	7.554	2.062	12.875	2.728
381	9.831	3.111	7.554	2.072	12.875	2.763
382	9.831	3.119	7.554	2.103	12.875	2.811
383	9.831	3.133	7.554	2.103	12.875	2.832
384	9.831	3.133	7.765	2.108	12.884	2.848
385	9.831	3.139	7.765	2.118	13.152	2.869
386	9.831	3.174	8.309	2.156	13.152	2.945
387	9.831	3.278	8.372	2.165	13.504	2.956
388	9.831	3.314	8.694	2.202	13.504	2.967
389	9.831	3.566	9.274	2.238	14.245	2.996
390	9.831	3.604	9.274	2.245	14.615	3.001

ตารางที่ ๑.1 ข้อมูลคิป C-input กับ C-emitted ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Dairy cows		Oxen		Buffaloes	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)
391	9.831	3.604	9.442	2.254	14.615	3.002
392	9.831	3.660	9.547	2.274	14.630	3.019
393	9.831	3.663	10.004	2.328	14.630	3.046
394	9.948	3.663	10.119	2.332	14.630	3.065
395	10.408	3.927	10.219	2.518	14.801	3.120
396	10.434	3.985	11.456	2.550	14.801	3.129
397	10.908	3.985	13.652	2.742	15.304	3.146
398	12.224	4.085	13.652	2.750	16.179	3.238
399	13.258	4.264	13.652	2.816	18.009	3.545
400	14.446	4.314	14.163	3.053	18.009	3.727
ค่าเฉลี่ย	<b>6.933</b>	<b>2.676</b>	<b>4.455</b>	<b>1.376</b>	<b>6.514</b>	<b>1.801</b>
S.D.	<b>1.282</b>	<b>0.571</b>	<b>1.933</b>	<b>0.360</b>	<b>3.138</b>	<b>0.506</b>

ตารางที่ ๓.2 ข้อมูลคิบ C-input กับ C-emitted ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551

ลำดับ	Pigs		Chickens		Hens	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)
1	0.486	0.147	0.006	0.003	0.032	0.010
2	0.525	0.147	0.006	0.006	0.032	0.010
3	0.525	0.155	0.017	0.006	0.034	0.010
4	0.561	0.158	0.026	0.007	0.034	0.010
5	0.570	0.163	0.026	0.007	0.036	0.011
6	0.574	0.167	0.026	0.007	0.037	0.011
7	0.580	0.175	0.027	0.007	0.037	0.011
8	0.580	0.178	0.029	0.007	0.038	0.011
9	0.595	0.178	0.031	0.007	0.038	0.012
10	0.605	0.180	0.032	0.007	0.038	0.014
11	0.608	0.185	0.032	0.007	0.038	0.015
12	0.615	0.189	0.034	0.008	0.039	0.015
13	0.623	0.190	0.034	0.008	0.039	0.015
14	0.623	0.193	0.034	0.008	0.039	0.015
15	0.631	0.194	0.035	0.008	0.039	0.015
16	0.639	0.194	0.035	0.008	0.039	0.015
17	0.642	0.197	0.035	0.008	0.039	0.016
18	0.643	0.197	0.035	0.008	0.039	0.016
19	0.643	0.198	0.035	0.008	0.042	0.016
20	0.644	0.198	0.035	0.008	0.042	0.016
21	0.645	0.201	0.035	0.008	0.042	0.016
22	0.652	0.202	0.035	0.008	0.042	0.016
23	0.656	0.205	0.036	0.009	0.042	0.016
24	0.658	0.205	0.036	0.009	0.042	0.016
25	0.658	0.206	0.036	0.009	0.042	0.016
26	0.672	0.206	0.036	0.009	0.042	0.016
27	0.679	0.207	0.036	0.009	0.042	0.016
28	0.682	0.208	0.037	0.009	0.042	0.016
29	0.683	0.208	0.037	0.009	0.042	0.016
30	0.683	0.209	0.037	0.009	0.042	0.016

ตารางที่ ๓.2 ข้อมูลคิบ C-input กับ C-emitted ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Pigs		Chickens		Hens	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)
31	0.683	0.209	0.037	0.009	0.042	0.016
32	0.688	0.212	0.037	0.009	0.042	0.016
33	0.689	0.213	0.037	0.009	0.042	0.016
34	0.694	0.214	0.037	0.009	0.042	0.016
35	0.701	0.215	0.037	0.009	0.042	0.016
36	0.702	0.215	0.037	0.009	0.042	0.016
37	0.706	0.215	0.038	0.009	0.042	0.016
38	0.713	0.216	0.038	0.010	0.042	0.016
39	0.722	0.220	0.038	0.010	0.042	0.016
40	0.726	0.220	0.038	0.010	0.042	0.016
41	0.729	0.221	0.038	0.010	0.042	0.016
42	0.731	0.222	0.038	0.010	0.042	0.016
43	0.758	0.225	0.038	0.010	0.042	0.016
44	0.763	0.227	0.038	0.010	0.042	0.016
45	0.769	0.227	0.038	0.010	0.042	0.016
46	0.778	0.227	0.038	0.010	0.042	0.016
47	0.780	0.227	0.039	0.010	0.042	0.016
48	0.780	0.228	0.039	0.010	0.042	0.016
49	0.784	0.228	0.039	0.010	0.042	0.016
50	0.784	0.228	0.039	0.010	0.042	0.016
51	0.784	0.228	0.039	0.010	0.042	0.016
52	0.788	0.230	0.039	0.010	0.042	0.016
53	0.788	0.235	0.040	0.010	0.042	0.016
54	0.788	0.236	0.040	0.010	0.042	0.016
55	0.793	0.238	0.040	0.010	0.042	0.016
56	0.793	0.238	0.040	0.011	0.042	0.016
57	0.793	0.239	0.040	0.011	0.042	0.016
58	0.796	0.240	0.040	0.011	0.042	0.016
59	0.797	0.242	0.041	0.011	0.042	0.016
60	0.803	0.244	0.041	0.011	0.042	0.016



ตารางที่ ๓.2 ข้อมูลคิบ C-input กับ C-emitted ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Pigs		Chickens		Hens	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)
61	0.807	0.246	0.041	0.011	0.042	0.016
62	0.813	0.246	0.041	0.011	0.042	0.016
63	0.814	0.247	0.041	0.011	0.042	0.016
64	0.822	0.247	0.041	0.011	0.042	0.016
65	0.822	0.247	0.041	0.011	0.042	0.016
66	0.824	0.249	0.042	0.011	0.042	0.016
67	0.825	0.252	0.042	0.012	0.042	0.016
68	0.834	0.253	0.042	0.012	0.042	0.016
69	0.840	0.253	0.042	0.012	0.042	0.016
70	0.843	0.253	0.042	0.012	0.042	0.016
71	0.848	0.253	0.043	0.012	0.042	0.016
72	0.870	0.253	0.043	0.012	0.042	0.016
73	0.873	0.253	0.043	0.012	0.042	0.016
74	0.879	0.253	0.043	0.012	0.042	0.016
75	0.879	0.253	0.043	0.012	0.042	0.016
76	0.879	0.253	0.043	0.013	0.042	0.016
77	0.879	0.253	0.043	0.013	0.042	0.016
78	0.879	0.253	0.043	0.013	0.042	0.016
79	0.879	0.253	0.043	0.013	0.042	0.016
80	0.879	0.253	0.043	0.013	0.042	0.016
81	0.879	0.253	0.043	0.014	0.042	0.016
82	0.879	0.253	0.043	0.014	0.042	0.016
83	0.879	0.253	0.043	0.014	0.042	0.016
84	0.879	0.253	0.043	0.014	0.042	0.016
85	0.879	0.253	0.043	0.014	0.042	0.016
86	0.879	0.253	0.043	0.014	0.042	0.016
87	0.879	0.253	0.043	0.014	0.042	0.016
88	0.879	0.253	0.043	0.014	0.042	0.016
89	0.879	0.253	0.043	0.014	0.042	0.016
90	0.879	0.253	0.043	0.015	0.042	0.016

ตารางที่ ๓.2 ข้อมูลคียบ C-input กับ C-emitted ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Pigs		Chickens		Hens	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)
91	0.879	0.253	0.043	0.015	0.042	0.016
92	0.879	0.253	0.043	0.015	0.042	0.016
93	0.879	0.253	0.043	0.015	0.042	0.016
94	0.879	0.253	0.043	0.015	0.042	0.016
95	0.879	0.253	0.043	0.015	0.042	0.016
96	0.879	0.253	0.043	0.016	0.042	0.016
97	0.879	0.253	0.043	0.016	0.042	0.016
98	0.879	0.253	0.043	0.016	0.042	0.016
99	0.879	0.253	0.043	0.016	0.042	0.016
100	0.879	0.253	0.043	0.016	0.042	0.016
101	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
102	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
103	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
104	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
105	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
106	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
107	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
108	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
109	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
110	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
111	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
112	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
113	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
114	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
115	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
116	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
117	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
118	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
119	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
120	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016

ตารางที่ ฎ.2 ข้อมูลคิบ C-input กับ C-emitted ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Pigs		Chickens		Hens	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)
121	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
122	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
123	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
124	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
125	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
126	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
127	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
128	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
129	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
130	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
131	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
132	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
133	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
134	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
135	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
136	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
137	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
138	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
139	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
140	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
141	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
142	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
143	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
144	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
145	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
146	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
147	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
148	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
149	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
150	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016

ตารางที่ ๓.2 ข้อมูลคิบ C-input กับ C-emitted ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Pigs		Chickens		Hens	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)
151	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
152	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
153	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
154	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
155	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
156	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
157	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
158	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
159	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
160	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
161	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
162	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
163	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
164	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
165	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
166	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
167	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
168	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
169	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
170	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
171	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
172	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
173	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
174	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
175	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
176	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
177	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
178	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
179	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
180	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016

ตารางที่ ๒.2 ข้อมูลคิบ C-input กับ C-emitted ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Pigs		Chickens		Hens	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)
181	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
182	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
183	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
184	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
185	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
186	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
187	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
188	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
189	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
190	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
191	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
192	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
193	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
194	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
195	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
196	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
197	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
198	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
199	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
200	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
201	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
202	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
203	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
204	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
205	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
206	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
207	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
208	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
209	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
210	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016

ตารางที่ ๓.2 ข้อมูลคิบ C-input กับ C-emitted ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Pigs		Chickens		Hens	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)
211	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
212	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
213	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
214	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
215	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
216	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
217	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
218	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
219	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
220	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
221	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
222	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
223	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
224	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
225	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
226	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
227	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
228	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
229	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
230	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
231	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
232	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
233	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
234	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
235	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
236	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
237	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
238	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
239	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
240	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016

ตารางที่ ๒.2 ข้อมูลคิบ C-input กับ C-emitted ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Pigs		Chickens		Hens	
	C-input พืช อาหาร	C- emitted	C-input พืช อาหาร	C- emitted	C-input พืช อาหาร	C- emitted
	(กก. C/ตัว/วัน)	(กก. C/ตัว/วัน)	(กก. C/ตัว/วัน)	(กก. C/ตัว/วัน)	(กก. C/ตัว/วัน)	(กก. C/ตัว/ วัน)
241	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
242	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
243	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
244	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
245	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
246	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
247	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
248	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
249	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
250	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
251	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
252	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
253	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
254	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
255	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
256	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
257	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
258	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
259	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
260	0.879	0.253	0.043	0.017	0.042	0.016
261	0.879	0.253	0.043	0.018	0.042	0.016
262	0.879	0.253	0.043	0.018	0.042	0.016
263	0.879	0.253	0.043	0.018	0.042	0.016
264	0.879	0.253	0.043	0.018	0.042	0.016
265	0.879	0.253	0.043	0.018	0.042	0.016
266	0.879	0.253	0.043	0.018	0.042	0.016
267	0.879	0.253	0.043	0.019	0.042	0.016
268	0.879	0.253	0.043	0.019	0.042	0.016
269	0.879	0.253	0.043	0.019	0.042	0.016
270	0.879	0.253	0.043	0.019	0.042	0.016

ตารางที่ ๒.2 ข้อมูลคิบ C-input กับ C-emitted ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Pigs		Chickens		Hens	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/ วัน)
271	0.879	0.253	0.043	0.019	0.042	0.016
272	0.879	0.253	0.043	0.019	0.042	0.016
273	0.879	0.253	0.043	0.019	0.042	0.016
274	0.879	0.253	0.043	0.019	0.042	0.016
275	0.879	0.253	0.043	0.019	0.042	0.016
276	0.879	0.253	0.043	0.019	0.042	0.016
277	0.879	0.253	0.043	0.019	0.042	0.016
278	0.879	0.253	0.043	0.019	0.042	0.016
279	0.879	0.253	0.043	0.019	0.042	0.016
280	0.879	0.253	0.043	0.019	0.042	0.016
281	0.879	0.253	0.043	0.019	0.042	0.016
282	0.879	0.253	0.043	0.019	0.042	0.016
283	0.879	0.253	0.043	0.019	0.042	0.016
284	0.879	0.253	0.043	0.020	0.042	0.016
285	0.879	0.253	0.043	0.021	0.042	0.016
286	0.879	0.253	0.043	0.021	0.042	0.016
287	0.879	0.253	0.043	0.021	0.042	0.016
288	0.879	0.253	0.043	0.021	0.042	0.016
289	0.879	0.253	0.043	0.021	0.042	0.016
290	0.879	0.253	0.043	0.021	0.042	0.016
291	0.879	0.253	0.043	0.021	0.042	0.016
292	0.879	0.253	0.043	0.021	0.042	0.016
293	0.879	0.253	0.043	0.021	0.042	0.016
294	0.879	0.253	0.043	0.021	0.042	0.016
295	0.879	0.253	0.043	0.021	0.042	0.016
296	0.879	0.253	0.043	0.021	0.042	0.016
297	0.879	0.253	0.043	0.021	0.042	0.016
298	0.879	0.253	0.043	0.021	0.042	0.016
299	0.879	0.253	0.043	0.021	0.042	0.016
300	0.879	0.253	0.043	0.021	0.042	0.016



ตารางที่ ๓.๒ ข้อมูลคิบ C-input กับ C-emitted ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Pigs		Chickens		Hens	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)
301	0.879	0.253	0.043	0.021	0.042	0.016
302	0.879	0.253	0.043	0.021	0.042	0.016
303	0.879	0.253	0.043	0.021	0.042	0.016
304	0.879	0.253	0.043	0.021	0.042	0.016
305	0.879	0.253	0.043	0.021	0.042	0.016
306	0.879	0.253	0.043	0.021	0.042	0.016
307	0.879	0.253	0.043	0.021	0.042	0.016
308	0.879	0.253	0.043	0.021	0.042	0.016
309	0.879	0.253	0.043	0.021	0.042	0.016
310	0.879	0.253	0.043	0.021	0.042	0.016
311	0.879	0.253	0.043	0.021	0.042	0.016
312	0.879	0.253	0.043	0.021	0.042	0.016
313	0.879	0.253	0.043	0.021	0.042	0.016
314	0.879	0.253	0.043	0.021	0.042	0.016
315	0.879	0.253	0.043	0.021	0.042	0.016
316	0.879	0.253	0.043	0.022	0.042	0.016
317	0.879	0.253	0.043	0.022	0.042	0.016
318	0.879	0.253	0.043	0.022	0.042	0.016
319	0.879	0.253	0.043	0.022	0.042	0.016
320	0.879	0.253	0.043	0.022	0.042	0.016
321	0.879	0.253	0.043	0.022	0.042	0.016
322	0.879	0.253	0.043	0.022	0.042	0.016
323	0.879	0.253	0.043	0.022	0.042	0.016
324	0.879	0.253	0.043	0.022	0.042	0.016
325	0.879	0.253	0.043	0.022	0.042	0.016
326	0.879	0.253	0.043	0.022	0.042	0.016
327	0.879	0.253	0.043	0.022	0.042	0.016
328	0.879	0.253	0.043	0.022	0.042	0.016
329	0.879	0.253	0.043	0.022	0.042	0.016
330	0.879	0.253	0.043	0.022	0.042	0.016

ตารางที่ ๓.๒ ข้อมูลคิบ C-input กับ C-emitted ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Pigs		Chickens		Hens	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)
331	0.879	0.253	0.043	0.022	0.042	0.016
332	0.879	0.253	0.043	0.022	0.042	0.016
333	0.879	0.253	0.044	0.022	0.042	0.016
334	0.879	0.253	0.044	0.022	0.042	0.016
335	0.879	0.253	0.044	0.022	0.042	0.016
336	0.879	0.253	0.044	0.022	0.042	0.016
337	0.879	0.253	0.044	0.022	0.042	0.016
338	0.879	0.253	0.045	0.022	0.042	0.016
339	0.879	0.253	0.045	0.022	0.042	0.016
340	0.879	0.253	0.045	0.022	0.042	0.016
341	0.879	0.253	0.046	0.022	0.042	0.016
342	0.879	0.253	0.046	0.022	0.042	0.016
343	0.879	0.253	0.046	0.022	0.042	0.016
344	0.879	0.253	0.046	0.022	0.042	0.016
345	0.879	0.253	0.046	0.022	0.042	0.016
346	0.879	0.253	0.046	0.022	0.042	0.016
347	0.879	0.253	0.046	0.022	0.042	0.016
348	0.879	0.254	0.047	0.022	0.042	0.016
349	0.879	0.255	0.047	0.022	0.042	0.016
350	0.879	0.257	0.047	0.022	0.042	0.016
351	0.879	0.258	0.047	0.022	0.042	0.016
352	0.879	0.258	0.047	0.022	0.042	0.016
353	0.883	0.258	0.047	0.022	0.042	0.016
354	0.891	0.259	0.047	0.022	0.042	0.016
355	0.895	0.261	0.047	0.022	0.042	0.016
356	0.906	0.263	0.048	0.022	0.042	0.016
357	0.916	0.263	0.048	0.022	0.042	0.016
358	0.916	0.267	0.048	0.022	0.042	0.016
359	0.925	0.268	0.048	0.023	0.042	0.016
360	0.932	0.270	0.048	0.023	0.042	0.016

ตารางที่ ๒.2 ข้อมูลคิบ C-input กับ C-emitted ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Pigs		Chickens		Hens	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)
361	0.934	0.275	0.048	0.023	0.042	0.016
362	0.948	0.275	0.048	0.023	0.042	0.016
363	0.961	0.277	0.048	0.023	0.042	0.016
364	0.975	0.278	0.049	0.023	0.042	0.016
365	0.975	0.282	0.049	0.023	0.042	0.016
366	0.976	0.286	0.049	0.023	0.042	0.016
367	0.981	0.286	0.049	0.023	0.042	0.016
368	0.987	0.288	0.049	0.023	0.042	0.016
369	0.992	0.289	0.049	0.023	0.042	0.016
370	0.998	0.291	0.049	0.023	0.044	0.016
371	0.999	0.292	0.049	0.023	0.044	0.016
372	1.028	0.294	0.049	0.023	0.044	0.017
373	1.028	0.294	0.049	0.023	0.044	0.017
374	1.028	0.296	0.049	0.023	0.044	0.017
375	1.028	0.297	0.049	0.023	0.044	0.017
376	1.030	0.297	0.049	0.023	0.044	0.017
377	1.038	0.298	0.049	0.023	0.044	0.017
378	1.046	0.299	0.049	0.023	0.044	0.017
379	1.050	0.301	0.051	0.023	0.044	0.017
380	1.069	0.302	0.051	0.023	0.045	0.017
381	1.110	0.306	0.051	0.023	0.045	0.017
382	1.138	0.307	0.051	0.023	0.045	0.017
383	1.142	0.313	0.051	0.023	0.045	0.017
384	1.170	0.314	0.051	0.023	0.045	0.017
385	1.170	0.321	0.051	0.023	0.045	0.017
386	1.190	0.330	0.051	0.023	0.045	0.017
387	1.210	0.335	0.052	0.023	0.045	0.017
388	1.215	0.340	0.052	0.023	0.045	0.017
389	1.233	0.355	0.053	0.023	0.045	0.017
390	1.267	0.356	0.053	0.023	0.045	0.017

ตารางที่ ๓.๒ ข้อมูลคิบั C-input กับ C-emitted ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Pigs		Chickens		Hens	
	C-input ฟืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input ฟืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)	C-input ฟืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- emitted (กก. C/ตัว/วัน)
391	1.267	0.356	0.054	0.023	0.045	0.017
392	1.267	0.366	0.058	0.023	0.046	0.017
393	1.267	0.372	0.058	0.023	0.046	0.018
394	1.267	0.374	0.059	0.023	0.046	0.018
395	1.267	0.375	0.061	0.023	0.046	0.019
396	1.293	0.378	0.061	0.026	0.047	0.020
397	1.336	0.378	0.063	0.028	0.047	0.020
398	1.365	0.383	0.063	0.028	0.048	0.021
399	1.915	0.398	0.068	0.028	0.048	0.021
400	2.918	0.400	0.073	0.028	0.049	0.022
ค่าเฉลี่ย	<b>0.879</b>	<b>0.253</b>	<b>0.043</b>	<b>0.017</b>	<b>0.042</b>	<b>0.016</b>
S.D.	<b>0.297</b>	<b>0.058</b>	<b>0.007</b>	<b>0.006</b>	<b>0.004</b>	<b>0.003</b>

ตารางที่ ๓.3 ข้อมูลดิบ C-input กับ C-fixation ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551

ลำดับ	Dairy cows		Oxen		Buffaloes	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/ วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)
1	5.037	1.859	0.944	0.000	1.626	0.000
2	5.037	1.988	1.453	0.000	1.626	0.000
3	5.037	2.198	1.464	0.000	2.097	0.000
4	5.037	2.209	1.511	0.000	2.146	0.000
5	5.037	2.236	1.556	0.054	2.146	0.000
6	5.037	2.237	1.558	0.088	2.146	0.228
7	5.037	2.271	1.662	0.140	2.254	0.229
8	5.037	2.294	1.662	0.144	2.341	0.271
9	5.037	2.313	1.683	0.185	2.341	0.304
10	5.037	2.335	1.754	0.265	2.436	0.306
11	5.037	2.352	1.787	0.309	2.452	0.401
12	5.037	2.364	1.794	0.335	2.503	0.408
13	5.037	2.446	1.846	0.365	2.503	0.432
14	5.037	2.450	1.865	0.421	2.536	0.476
15	5.037	2.457	1.888	0.451	2.575	0.498
16	5.037	2.457	1.888	0.451	2.621	0.695
17	5.037	2.469	1.888	0.457	2.630	0.711
18	5.037	2.496	1.888	0.469	2.664	0.798
19	5.037	2.525	1.888	0.531	2.682	0.803
20	5.037	2.542	1.888	0.542	2.691	0.832
21	5.037	2.579	1.888	0.597	2.780	0.843
22	5.037	2.610	1.983	0.603	2.859	0.859
23	5.037	2.625	1.983	0.605	2.861	0.968
24	5.037	2.632	2.005	0.613	2.861	0.971
25	5.037	2.685	2.005	0.625	2.865	1.051
26	5.037	2.763	2.028	0.665	2.926	1.054
27	5.037	2.819	2.073	0.684	2.926	1.104
28	5.037	2.824	2.073	0.691	2.926	1.146
29	5.037	2.830	2.077	0.704	2.926	1.155
30	5.037	2.832	2.077	0.776	2.926	1.208

ตารางที่ ๓.3 ข้อมูลดิบ C-input กับ C-fixation ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Dairy cows		Oxen		Buffaloes	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/ วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/ วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)
31	5.037	2.858	2.077	0.778	2.926	1.229
32	5.037	2.858	2.096	0.793	2.926	1.230
33	5.037	2.866	2.096	0.817	2.926	1.277
34	5.037	2.870	2.216	0.882	2.926	1.284
35	5.376	2.891	2.256	0.926	3.028	1.291
36	5.417	2.893	2.256	0.927	3.121	1.301
37	5.466	2.939	2.256	0.956	3.166	1.353
38	5.507	2.949	2.266	0.962	3.219	1.375
39	5.522	3.015	2.266	0.970	3.251	1.408
40	5.608	3.022	2.266	0.982	3.313	1.418
41	5.670	3.146	2.361	0.997	3.313	1.425
42	5.672	3.184	2.361	1.002	3.414	1.452
43	5.722	3.207	2.361	1.007	3.451	1.453
44	5.722	3.210	2.361	1.007	3.451	1.468
45	5.726	3.226	2.463	1.047	3.495	1.583
46	5.741	3.325	2.463	1.053	3.495	1.595
47	5.742	3.325	2.463	1.106	3.495	1.605
48	5.830	3.350	2.463	1.113	3.548	1.616
49	5.878	3.409	2.485	1.115	3.606	1.635
50	5.887	3.433	2.485	1.137	3.609	1.669
51	5.895	3.534	2.493	1.157	3.658	1.732
52	5.937	3.536	2.555	1.165	3.658	1.737
53	5.948	3.559	2.555	1.179	3.658	1.740
54	5.984	3.589	2.555	1.179	3.732	1.772
55	6.032	3.608	2.606	1.240	3.755	1.811
56	6.090	3.608	2.619	1.249	3.758	1.830
57	6.134	3.608	2.631	1.256	3.801	1.831
58	6.141	3.613	2.631	1.271	3.901	1.843
59	6.151	3.716	2.674	1.278	3.901	1.983
60	6.208	3.773	2.707	1.280	3.901	2.035

ตารางที่ ๓.3 ข้อมูลคียบ C-input กับ C-fixation ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Dairy cows		Oxen		Buffaloes	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)
61	6.267	3.782	2.707	1.300	3.901	2.044
62	6.267	3.782	2.742	1.314	3.901	2.091
63	6.333	3.790	2.833	1.315	3.901	2.111
64	6.338	3.791	2.833	1.315	3.901	2.129
65	6.358	3.802	2.833	1.321	3.901	2.132
66	6.358	3.843	2.833	1.324	3.901	2.154
67	6.429	3.844	2.833	1.367	3.901	2.156
68	6.429	3.850	2.833	1.369	3.926	2.224
69	6.436	3.883	2.833	1.373	3.954	2.231
70	6.436	3.915	2.833	1.381	3.954	2.235
71	6.438	3.920	2.833	1.388	3.954	2.249
72	6.438	3.943	2.833	1.401	3.954	2.261
73	6.438	3.950	2.833	1.402	3.954	2.265
74	6.455	3.957	2.849	1.410	4.036	2.315
75	6.455	3.957	2.880	1.419	4.036	2.323
76	6.455	3.965	2.885	1.419	4.047	2.331
77	6.471	3.965	2.902	1.428	4.064	2.334
78	6.478	3.970	2.902	1.430	4.180	2.337
79	6.478	3.994	2.902	1.452	4.180	2.347
80	6.478	4.030	2.911	1.455	4.194	2.380
81	6.491	4.045	2.914	1.464	4.194	2.406
82	6.491	4.097	2.920	1.471	4.276	2.418
83	6.496	4.099	2.920	1.481	4.292	2.433
84	6.503	4.100	2.938	1.536	4.292	2.437
85	6.509	4.127	2.939	1.581	4.292	2.446
86	6.520	4.127	2.939	1.583	4.292	2.452
87	6.527	4.127	2.939	1.588	4.292	2.464
88	6.527	4.127	2.980	1.608	4.292	2.468
89	6.529	4.127	3.009	1.614	4.292	2.472
90	6.540	4.144	3.045	1.620	4.292	2.540

ตารางที่ ๓.3 ข้อมูลดิบ C-input กับ C-fixation ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Dairy cows		Oxen		Buffaloes	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/ วัน)
91	6.547	4.160	3.045	1.621	4.292	2.556
92	6.551	4.179	3.045	1.630	4.292	2.560
93	6.552	4.192	3.056	1.637	4.292	2.610
94	6.556	4.220	3.077	1.644	4.292	2.613
95	6.561	4.220	3.077	1.663	4.292	2.618
96	6.565	4.220	3.077	1.668	4.298	2.631
97	6.570	4.220	3.105	1.670	4.325	2.647
98	6.574	4.220	3.116	1.672	4.335	2.648
99	6.581	4.220	3.116	1.677	4.335	2.658
100	6.584	4.220	3.116	1.686	4.354	2.682
101	6.587	4.220	3.120	1.693	4.357	2.697
102	6.592	4.220	3.124	1.703	4.389	2.721
103	6.592	4.221	3.124	1.709	4.389	2.763
104	6.602	4.221	3.145	1.774	4.389	2.765
105	6.606	4.221	3.160	1.796	4.389	2.784
106	6.606	4.221	3.185	1.806	4.389	2.802
107	6.611	4.222	3.185	1.808	4.389	2.821
108	6.616	4.222	3.193	1.812	4.389	2.832
109	6.620	4.222	3.193	1.816	4.389	2.849
110	6.627	4.222	3.248	1.838	4.389	2.851
111	6.633	4.222	3.248	1.851	4.418	2.870
112	6.638	4.222	3.248	1.863	4.463	2.895
113	6.643	4.225	3.277	1.881	4.463	2.898
114	6.643	4.230	3.284	1.901	4.464	2.925
115	6.653	4.230	3.305	1.905	4.464	2.935
116	6.658	4.235	3.357	1.909	4.584	2.939
117	6.659	4.243	3.357	1.916	4.584	2.953
118	6.661	4.247	3.399	1.949	4.719	2.999
119	6.663	4.247	3.427	1.956	4.765	3.012
120	6.663	4.247	3.427	1.960	4.765	3.027



ตารางที่ ๓.3 ข้อมูลดิบ C-input กับ C-fixation ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Dairy cows		Oxen		Buffaloes	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)
121	6.672	4.247	3.447	1.969	4.776	3.044
122	6.678	4.247	3.447	1.970	4.877	3.056
123	6.684	4.247	3.450	1.976	4.877	3.062
124	6.688	4.247	3.468	1.977	4.877	3.075
125	6.693	4.250	3.494	2.007	4.877	3.081
126	6.698	4.250	3.504	2.018	4.877	3.110
127	6.703	4.250	3.504	2.027	4.877	3.168
128	6.703	4.250	3.504	2.045	4.877	3.181
129	6.703	4.250	3.513	2.046	4.877	3.183
130	6.708	4.250	3.513	2.073	4.877	3.201
131	6.718	4.250	3.513	2.083	4.877	3.214
132	6.723	4.250	3.541	2.092	4.877	3.240
133	6.723	4.250	3.541	2.104	4.877	3.245
134	6.733	4.250	3.541	2.110	4.877	3.248
135	6.738	4.250	3.541	2.119	4.877	3.262
136	6.738	4.250	3.542	2.123	4.877	3.313
137	6.748	4.250	3.542	2.131	4.877	3.327
138	6.753	4.250	3.542	2.148	4.877	3.366
139	6.759	4.250	3.542	2.156	4.877	3.388
140	6.759	4.255	3.542	2.157	4.877	3.406
141	6.769	4.255	3.550	2.184	4.881	3.425
142	6.771	4.255	3.571	2.221	5.012	3.427
143	6.774	4.255	3.571	2.226	5.012	3.433
144	6.776	4.255	3.584	2.233	5.020	3.453
145	6.776	4.255	3.584	2.261	5.029	3.470
146	6.776	4.255	3.588	2.271	5.056	3.481
147	6.779	4.255	3.610	2.281	5.056	3.494
148	6.788	4.255	3.632	2.282	5.364	3.502
149	6.793	4.255	3.682	2.295	5.370	3.508
150	6.798	4.257	3.693	2.300	5.393	3.534

ตารางที่ ๓.3 ข้อมูลดิบ C-input กับ C-fixation ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Dairy cows		Oxen		Buffaloes	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)
151	6.803	4.257	3.777	2.312	5.393	3.561
152	6.808	4.257	3.777	2.313	5.437	3.569
153	6.808	4.257	3.777	2.333	5.459	3.610
154	6.809	4.257	3.777	2.342	5.462	3.628
155	6.814	4.257	3.777	2.348	5.475	3.655
156	6.815	4.257	3.827	2.369	5.524	3.665
157	6.819	4.257	3.827	2.377	5.568	3.678
158	6.824	4.257	3.854	2.383	5.651	3.696
159	6.827	4.257	3.877	2.390	5.651	3.782
160	6.830	4.257	3.877	2.390	5.651	3.804
161	6.835	4.257	3.878	2.410	5.690	3.906
162	6.840	4.257	3.899	2.414	5.722	4.007
163	6.846	4.257	3.899	2.418	5.752	4.011
164	6.851	4.257	3.923	2.421	5.846	4.021
165	6.857	4.257	3.973	2.430	5.852	4.028
166	6.862	4.257	4.013	2.464	5.852	4.053
167	6.864	4.257	4.013	2.469	5.852	4.058
168	6.866	4.257	4.013	2.477	5.852	4.062
169	6.867	4.257	4.014	2.478	5.852	4.088
170	6.870	4.257	4.014	2.490	5.852	4.088
171	6.871	4.257	4.060	2.529	5.852	4.108
172	6.874	4.257	4.060	2.531	5.852	4.144
173	6.875	4.257	4.060	2.535	5.852	4.172
174	6.879	4.257	4.060	2.536	5.947	4.178
175	6.880	4.257	4.060	2.540	5.967	4.184
176	6.881	4.257	4.060	2.553	5.987	4.201
177	6.881	4.257	4.060	2.555	6.291	4.207
178	6.882	4.257	4.060	2.557	6.291	4.238
179	6.884	4.257	4.060	2.576	6.331	4.292
180	6.884	4.257	4.060	2.610	6.331	4.310

ตารางที่ ๓.3 ข้อมูลคียบ C-input กับ C-fixation ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Dairy cows		Oxen		Buffaloes	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)
181	6.887	4.257	4.060	2.612	6.340	4.352
182	6.887	4.257	4.060	2.627	6.340	4.381
183	6.888	4.257	4.060	2.628	6.340	4.386
184	6.889	4.257	4.060	2.636	6.340	4.413
185	6.889	4.257	4.060	2.648	6.340	4.415
186	6.890	4.257	4.155	2.649	6.340	4.433
187	6.890	4.257	4.155	2.667	6.340	4.470
188	6.893	4.257	4.155	2.693	6.437	4.499
189	6.893	4.257	4.155	2.693	6.437	4.505
190	6.894	4.257	4.155	2.707	6.437	4.537
191	6.894	4.257	4.155	2.707	6.437	4.572
192	6.894	4.257	4.155	2.715	6.437	4.579
193	6.894	4.257	4.155	2.728	6.437	4.600
194	6.894	4.257	4.155	2.735	6.437	4.644
195	6.895	4.257	4.155	2.735	6.437	4.656
196	6.897	4.257	4.155	2.747	6.437	4.688
197	6.897	4.257	4.155	2.752	6.437	4.705
198	6.897	4.257	4.155	2.774	6.437	4.715
199	6.897	4.257	4.155	2.796	6.437	4.715
200	6.897	4.257	4.155	2.811	6.437	4.715
201	6.898	4.257	4.190	2.824	6.437	4.715
202	6.899	4.257	4.207	2.837	6.437	4.715
203	6.899	4.257	4.249	2.842	6.437	4.715
204	6.901	4.257	4.249	2.842	6.437	4.715
205	6.903	4.257	4.249	2.847	6.437	4.715
206	6.904	4.257	4.249	2.852	6.437	4.715
207	6.907	4.257	4.249	2.857	6.437	4.715
208	6.909	4.257	4.249	2.858	6.437	4.715
209	6.909	4.257	4.249	2.877	6.437	4.715
210	6.912	4.257	4.249	2.911	6.437	4.715

ตารางที่ ๓.3 ข้อมูลคิบ C-input กับ C-fixation ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Dairy cows		Oxen		Buffaloes	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)
211	6.915	4.257	4.257	2.912	6.437	4.715
212	6.916	4.257	4.287	2.915	6.437	4.715
213	6.918	4.257	4.287	2.920	6.437	4.715
214	6.920	4.257	4.304	2.924	6.437	4.715
215	6.922	4.257	4.304	2.925	6.502	4.715
216	6.923	4.257	4.327	2.929	6.514	4.715
217	6.926	4.257	4.378	2.938	6.514	4.715
218	6.929	4.257	4.402	2.949	6.514	4.715
219	6.931	4.257	4.402	2.956	6.514	4.715
220	6.931	4.257	4.438	2.958	6.514	4.715
221	6.931	4.257	4.438	2.978	6.514	4.715
222	6.931	4.257	4.438	2.989	6.514	4.715
223	6.931	4.257	4.438	2.990	6.514	4.715
224	6.931	4.257	4.455	2.992	6.514	4.715
225	6.931	4.257	4.455	3.026	6.514	4.715
226	6.931	4.257	4.460	3.038	6.514	4.715
227	6.931	4.257	4.460	3.040	6.514	4.715
228	6.931	4.257	4.460	3.062	6.514	4.715
229	6.931	4.257	4.460	3.090	6.514	4.715
230	6.931	4.257	4.460	3.090	6.514	4.715
231	6.931	4.257	4.460	3.117	6.514	4.715
232	6.931	4.257	4.460	3.132	6.514	4.715
233	6.931	4.257	4.460	3.140	6.514	4.715
234	6.931	4.257	4.585	3.144	6.514	4.715
235	6.931	4.257	4.585	3.152	6.514	4.715
236	6.931	4.257	4.585	3.162	6.514	4.715
237	6.931	4.257	4.585	3.163	6.514	4.715
238	6.931	4.257	4.585	3.171	6.514	4.715
239	6.931	4.257	4.600	3.195	6.514	4.715
240	6.931	4.257	4.640	3.196	6.514	4.715

ตารางที่ ๓.3 ข้อมูลคิบ C-input กับ C-fixation ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Dairy cows		Oxen		Buffaloes	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)
241	6.931	4.257	4.640	3.206	6.514	4.715
242	6.931	4.257	4.651	3.216	6.514	4.715
243	6.931	4.257	4.663	3.226	6.514	4.715
244	6.931	4.257	4.679	3.230	6.514	4.715
245	6.931	4.257	4.679	3.232	6.514	4.715
246	6.931	4.257	4.679	3.239	6.514	4.715
247	6.931	4.257	4.679	3.241	6.514	4.715
248	6.931	4.257	4.679	3.241	6.514	4.715
249	6.931	4.257	4.679	3.242	6.514	4.715
250	6.931	4.257	4.679	3.287	6.514	4.715
251	6.931	4.257	4.679	3.293	6.514	4.715
252	6.931	4.257	4.679	3.297	6.514	4.715
253	6.931	4.257	4.679	3.323	6.514	4.715
254	6.931	4.257	4.721	3.324	6.514	4.715
255	6.931	4.257	4.721	3.324	6.514	4.715
256	6.931	4.257	4.721	3.331	6.514	4.733
257	6.931	4.257	4.721	3.350	6.514	4.752
258	6.931	4.257	4.721	3.376	6.514	4.783
259	6.931	4.257	4.721	3.379	6.514	4.784
260	6.931	4.257	4.721	3.405	6.514	4.789
261	6.931	4.257	4.721	3.408	6.514	4.799
262	6.931	4.257	4.721	3.416	6.514	4.833
263	6.931	4.257	4.721	3.436	6.514	4.847
264	6.931	4.257	4.721	3.441	6.514	4.863
265	6.931	4.257	4.721	3.450	6.514	4.879
266	6.931	4.257	4.721	3.458	6.514	4.918
267	6.931	4.257	4.721	3.489	6.514	4.927
268	6.931	4.257	4.721	3.530	6.514	4.943
269	6.931	4.257	4.739	3.583	6.514	4.951
270	6.931	4.257	4.860	3.594	6.514	5.004

ตารางที่ ๓.3 ข้อมูลคียบ C-input กับ C-fixation ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Dairy cows		Oxen		Buffaloes	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)
271	6.931	4.257	4.864	3.627	6.514	5.025
272	6.931	4.257	4.864	3.628	6.514	5.058
273	6.931	4.257	4.864	3.629	6.514	5.072
274	6.931	4.257	4.864	3.634	6.572	5.108
275	6.931	4.257	4.864	3.638	6.594	5.116
276	6.931	4.257	4.864	3.639	6.626	5.137
277	6.931	4.257	4.864	3.648	6.828	5.144
278	6.931	4.257	4.864	3.679	6.828	5.148
279	6.931	4.257	4.864	3.679	6.828	5.170
280	6.931	4.257	4.967	3.696	6.828	5.201
281	6.931	4.257	4.967	3.756	6.828	5.202
282	6.931	4.257	4.982	3.759	6.828	5.233
283	6.933	4.257	5.018	3.766	7.016	5.276
284	6.933	4.257	5.018	3.801	7.073	5.308
285	6.933	4.257	5.020	3.840	7.101	5.311
286	6.933	4.257	5.020	3.845	7.153	5.326
287	6.933	4.257	5.020	3.849	7.153	5.353
288	6.933	4.257	5.078	3.860	7.159	5.388
289	6.933	4.257	5.099	3.872	7.250	5.458
290	6.933	4.257	5.141	3.878	7.296	5.462
291	6.933	4.257	5.141	3.880	7.400	5.544
292	6.933	4.257	5.141	3.925	7.400	5.581
293	6.933	4.257	5.162	3.935	7.400	5.638
294	6.933	4.257	5.165	3.938	7.491	5.749
295	6.933	4.257	5.193	3.991	7.491	5.773
296	6.933	4.257	5.219	4.021	7.501	5.810
297	6.933	4.257	5.219	4.042	7.510	5.866
298	6.933	4.257	5.386	4.056	7.602	5.921
299	6.933	4.257	5.386	4.068	7.666	5.922
300	6.933	4.257	5.386	4.068	7.702	5.934

ตารางที่ ๓.3 ข้อมูลคิบ C-input กับ C-fixation ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Dairy cows		Oxen		Buffaloes	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)
301	6.933	4.257	5.449	4.094	7.702	5.934
302	6.933	4.257	5.449	4.111	7.803	5.963
303	6.933	4.257	5.537	4.138	7.803	5.983
304	6.933	4.257	5.540	4.160	7.933	5.984
305	6.933	4.257	5.581	4.178	7.982	6.005
306	6.933	4.257	5.587	4.209	7.982	6.033
307	6.933	4.257	5.587	4.250	7.992	6.036
308	6.933	4.257	5.595	4.258	8.047	6.047
309	6.933	4.257	5.623	4.261	8.113	6.088
310	6.933	4.257	5.665	4.261	8.297	6.136
311	6.933	4.257	5.665	4.308	8.376	6.174
312	6.933	4.257	5.665	4.317	8.388	6.221
313	6.933	4.257	5.665	4.325	8.388	6.240
314	6.933	4.257	5.665	4.358	8.388	6.249
315	6.933	4.257	5.665	4.371	8.388	6.250
316	6.933	4.257	5.665	4.385	8.388	6.260
317	6.933	4.257	5.665	4.411	8.388	6.367
318	6.933	4.257	5.665	4.437	8.388	6.381
319	6.933	4.257	5.665	4.445	8.388	6.402
320	6.933	4.257	5.785	4.452	8.388	6.440
321	6.933	4.257	5.785	4.457	8.388	6.513
322	6.933	4.257	5.816	4.457	8.388	6.540
323	6.933	4.257	5.901	4.465	8.388	6.576
324	6.933	4.257	5.901	4.480	8.388	6.579
325	6.933	4.257	5.901	4.489	8.577	6.608
326	6.933	4.257	5.959	4.520	8.577	6.634
327	6.933	4.257	5.959	4.523	8.583	6.744
328	6.933	4.257	5.996	4.562	8.583	6.876
329	6.933	4.257	5.996	4.565	8.583	7.021
330	6.935	4.257	6.012	4.602	8.583	7.051

ตารางที่ ๓.3 ข้อมูลคียบ C-input กับ C-fixation ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Dairy cows		Oxen		Buffaloes	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)
331	6.935	4.257	6.012	4.652	8.583	7.055
332	6.935	4.257	6.020	4.683	8.583	7.080
333	6.940	4.257	6.020	4.693	8.583	7.086
334	6.959	4.257	6.090	4.705	8.778	7.098
335	6.988	4.259	6.090	4.715	9.065	7.126
336	7.009	4.264	6.137	4.729	9.216	7.133
337	7.033	4.273	6.137	4.749	9.216	7.152
338	7.033	4.325	6.137	4.751	9.251	7.164
339	7.164	4.335	6.186	4.777	9.445	7.196
340	7.226	4.355	6.186	4.787	9.552	7.353
341	7.238	4.359	6.232	4.800	9.754	7.551
342	7.285	4.402	6.232	4.803	9.754	7.627
343	7.307	4.402	6.232	4.810	9.754	7.664
344	7.331	4.428	6.232	4.818	9.754	7.729
345	7.401	4.428	6.232	4.835	9.754	7.881
346	7.437	4.440	6.232	4.850	9.754	7.977
347	7.437	4.440	6.232	4.874	9.754	7.980
348	7.443	4.440	6.232	4.886	9.754	7.997
349	7.677	4.449	6.232	4.898	9.754	8.011
350	7.740	4.450	6.232	4.933	9.754	8.055
351	7.748	4.453	6.232	5.014	9.754	8.065
352	7.748	4.456	6.232	5.028	9.754	8.103
353	7.748	4.473	6.232	5.065	9.754	8.150
354	7.748	4.538	6.232	5.106	9.754	8.168
355	7.748	4.539	6.232	5.122	9.754	8.202
356	7.794	4.565	6.232	5.164	9.754	8.203
357	7.854	4.565	6.232	5.184	10.087	8.269
358	7.895	4.603	6.232	5.218	10.087	8.336
359	8.044	4.691	6.484	5.243	10.131	8.388
360	8.084	4.803	6.522	5.308	10.427	8.418



ตารางที่ ๓.3 ข้อมูลดิบ C-input กับ C-fixation ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Dairy cows		Oxen		Buffaloes	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)
361	8.114	4.932	6.526	5.312	10.427	8.463
362	8.170	4.935	6.526	5.321	10.427	8.597
363	8.220	4.980	6.526	5.356	10.729	8.614
364	8.259	4.982	6.568	5.423	10.729	8.645
365	8.309	5.000	6.652	5.487	10.729	8.693
366	8.493	5.055	6.882	5.520	10.729	8.780
367	8.558	5.090	6.932	5.528	10.729	8.979
368	8.569	5.169	6.978	5.558	10.853	9.036
369	8.865	5.177	6.978	5.568	10.853	9.093
370	8.912	5.251	6.978	5.572	11.092	9.575
371	8.961	5.369	7.162	5.760	11.469	9.623
372	9.173	5.369	7.270	5.791	11.469	9.625
373	9.337	5.429	7.386	5.911	11.615	9.660
374	9.437	5.611	7.386	5.926	11.704	9.809
375	9.467	5.692	7.428	6.023	11.704	9.892
376	9.831	5.719	7.481	6.030	11.704	9.999
377	9.831	5.778	7.489	6.049	12.461	10.035
378	9.831	5.855	7.497	6.180	12.582	10.266
379	9.831	5.943	7.554	6.181	12.875	10.424
380	9.831	6.001	7.554	6.194	12.875	10.561
381	9.831	6.044	7.554	6.228	12.875	10.724
382	9.831	6.101	7.554	6.231	12.875	10.828
383	9.831	6.267	7.554	6.375	12.875	11.072
384	9.831	6.595	7.765	6.439	12.884	11.277
385	9.831	6.619	7.765	6.572	13.152	11.322
386	9.831	6.624	8.309	6.754	13.152	11.437
387	9.831	6.840	8.372	6.908	13.504	11.463
388	9.831	6.861	8.694	7.568	13.504	11.781
389	9.831	6.941	9.274	8.134	14.245	12.432
390	9.831	7.239	9.274	8.171	14.615	12.825

ตารางที่ ๓.3 ข้อมูลคิพ C-input กับ C-fixation ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Dairy cows		Oxen		Buffaloes	
	C-input พืชอาหาร	C- fixation	C-input พืชอาหาร	C- fixation	C-input พืชอาหาร	C- fixation
	(กก. C/ตัว/วัน)	(กก. C/ตัว/วัน)	(กก. C/ตัว/วัน)	(กก. C/ตัว/วัน)	(กก. C/ตัว/วัน)	(กก. C/ตัว/ วัน)
391	9.831	7.239	9.442	8.276	14.615	12.918
392	9.831	7.304	9.547	8.468	14.630	12.973
393	9.831	7.427	10.004	8.499	14.630	13.141
394	9.948	7.509	10.119	8.647	14.630	13.202
395	10.408	7.545	10.219	8.748	14.801	13.231
396	10.434	7.552	11.456	9.980	14.801	13.724
397	10.908	8.065	13.652	12.292	15.304	13.758
398	12.224	10.013	13.652	12.383	16.179	13.793
399	13.258	10.660	13.652	12.543	18.009	15.960
400	14.446	11.753	14.163	12.941	18.009	16.474
<b>ค่าเฉลี่ย</b>	<b>6.933</b>	<b>4.257</b>	<b>4.455</b>	<b>3.079</b>	<b>6.514</b>	<b>4.715</b>
<b>S.D.</b>	<b>1.282</b>	<b>1.031</b>	<b>1.933</b>	<b>1.969</b>	<b>3.138</b>	<b>3.140</b>

ตารางที่ ๓.๔ ข้อมูลคิบั C-input กับ C-fixation ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551

ลำดับ	Pigs		Chickens		Hens	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)
1	0.486	0.322	0.006	0.000	0.032	0.021
2	0.525	0.334	0.006	0.003	0.032	0.022
3	0.525	0.347	0.017	0.011	0.034	0.022
4	0.561	0.347	0.026	0.019	0.034	0.022
5	0.570	0.375	0.026	0.019	0.036	0.022
6	0.574	0.389	0.026	0.020	0.037	0.023
7	0.580	0.394	0.027	0.020	0.037	0.023
8	0.580	0.419	0.029	0.020	0.038	0.023
9	0.595	0.423	0.031	0.020	0.038	0.023
10	0.605	0.424	0.032	0.020	0.038	0.023
11	0.608	0.425	0.032	0.020	0.038	0.023
12	0.615	0.425	0.034	0.020	0.039	0.024
13	0.623	0.428	0.034	0.020	0.039	0.024
14	0.623	0.433	0.034	0.020	0.039	0.024
15	0.631	0.433	0.035	0.020	0.039	0.024
16	0.639	0.433	0.035	0.020	0.039	0.025
17	0.642	0.435	0.035	0.020	0.039	0.026
18	0.643	0.437	0.035	0.020	0.039	0.026
19	0.643	0.438	0.035	0.020	0.042	0.026
20	0.644	0.438	0.035	0.020	0.042	0.026
21	0.645	0.440	0.035	0.020	0.042	0.026
22	0.652	0.449	0.035	0.020	0.042	0.026
23	0.656	0.452	0.036	0.020	0.042	0.026
24	0.658	0.454	0.036	0.020	0.042	0.026
25	0.658	0.454	0.036	0.020	0.042	0.026
26	0.672	0.456	0.036	0.020	0.042	0.026
27	0.679	0.462	0.036	0.020	0.042	0.026
28	0.682	0.472	0.037	0.020	0.042	0.026
29	0.683	0.473	0.037	0.020	0.042	0.026
30	0.683	0.474	0.037	0.020	0.042	0.026

ตารางที่ ๓.๔ ข้อมูลคิบ C-input กับ C-fixation ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Pigs		Chickens		Hens	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)
31	0.683	0.475	0.037	0.020	0.042	0.026
32	0.688	0.476	0.037	0.020	0.042	0.026
33	0.689	0.478	0.037	0.020	0.042	0.026
34	0.694	0.480	0.037	0.020	0.042	0.026
35	0.701	0.480	0.037	0.020	0.042	0.026
36	0.702	0.486	0.037	0.020	0.042	0.026
37	0.706	0.487	0.038	0.020	0.042	0.026
38	0.713	0.490	0.038	0.020	0.042	0.026
39	0.722	0.498	0.038	0.020	0.042	0.026
40	0.726	0.500	0.038	0.020	0.042	0.026
41	0.729	0.500	0.038	0.020	0.042	0.026
42	0.731	0.508	0.038	0.020	0.042	0.026
43	0.758	0.512	0.038	0.020	0.042	0.026
44	0.763	0.512	0.038	0.020	0.042	0.026
45	0.769	0.512	0.038	0.020	0.042	0.026
46	0.778	0.515	0.038	0.021	0.042	0.026
47	0.780	0.516	0.039	0.021	0.042	0.026
48	0.780	0.524	0.039	0.021	0.042	0.026
49	0.784	0.530	0.039	0.021	0.042	0.026
50	0.784	0.532	0.039	0.021	0.042	0.026
51	0.784	0.536	0.039	0.021	0.042	0.026
52	0.788	0.536	0.039	0.021	0.042	0.026
53	0.788	0.536	0.040	0.021	0.042	0.026
54	0.788	0.540	0.040	0.021	0.042	0.026
55	0.793	0.542	0.040	0.021	0.042	0.026
56	0.793	0.548	0.040	0.021	0.042	0.026
57	0.793	0.555	0.040	0.021	0.042	0.026
58	0.796	0.556	0.040	0.021	0.042	0.026
59	0.797	0.556	0.041	0.021	0.042	0.026
60	0.803	0.559	0.041	0.021	0.042	0.026

ตารางที่ ๓.๔ ข้อมูลคิพ C-input กับ C-fixation ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Pigs		Chickens		Hens	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)
61	0.807	0.561	0.041	0.021	0.042	0.026
62	0.813	0.561	0.041	0.021	0.042	0.026
63	0.814	0.561	0.041	0.021	0.042	0.026
64	0.822	0.567	0.041	0.021	0.042	0.026
65	0.822	0.579	0.041	0.021	0.042	0.026
66	0.824	0.592	0.042	0.021	0.042	0.026
67	0.825	0.593	0.042	0.021	0.042	0.026
68	0.834	0.596	0.042	0.021	0.042	0.026
69	0.840	0.598	0.042	0.021	0.042	0.026
70	0.843	0.604	0.042	0.021	0.042	0.026
71	0.848	0.604	0.043	0.021	0.042	0.026
72	0.870	0.605	0.043	0.021	0.042	0.026
73	0.873	0.615	0.043	0.021	0.042	0.026
74	0.879	0.616	0.043	0.021	0.042	0.026
75	0.879	0.621	0.043	0.021	0.042	0.026
76	0.879	0.626	0.043	0.021	0.042	0.026
77	0.879	0.626	0.043	0.021	0.042	0.026
78	0.879	0.626	0.043	0.021	0.042	0.026
79	0.879	0.626	0.043	0.021	0.042	0.026
80	0.879	0.626	0.043	0.021	0.042	0.026
81	0.879	0.626	0.043	0.021	0.042	0.026
82	0.879	0.626	0.043	0.021	0.042	0.026
83	0.879	0.626	0.043	0.021	0.042	0.026
84	0.879	0.626	0.043	0.022	0.042	0.026
85	0.879	0.626	0.043	0.022	0.042	0.026
86	0.879	0.626	0.043	0.022	0.042	0.026
87	0.879	0.626	0.043	0.022	0.042	0.026
88	0.879	0.626	0.043	0.022	0.042	0.026
89	0.879	0.626	0.043	0.022	0.042	0.026
90	0.879	0.626	0.043	0.022	0.042	0.026

ตารางที่ ๓.๔ ข้อมูลคิบั C-input กับ C-fixation ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Pigs		Chickens		Hens	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)
91	0.879	0.626	0.043	0.022	0.042	0.026
92	0.879	0.626	0.043	0.022	0.042	0.026
93	0.879	0.626	0.043	0.022	0.042	0.026
94	0.879	0.626	0.043	0.022	0.042	0.026
95	0.879	0.626	0.043	0.022	0.042	0.026
96	0.879	0.626	0.043	0.022	0.042	0.026
97	0.879	0.626	0.043	0.022	0.042	0.026
98	0.879	0.626	0.043	0.022	0.042	0.026
99	0.879	0.626	0.043	0.022	0.042	0.026
100	0.879	0.626	0.043	0.022	0.042	0.026
101	0.879	0.626	0.043	0.022	0.042	0.026
102	0.879	0.626	0.043	0.022	0.042	0.026
103	0.879	0.626	0.043	0.022	0.042	0.026
104	0.879	0.626	0.043	0.022	0.042	0.026
105	0.879	0.626	0.043	0.022	0.042	0.026
106	0.879	0.626	0.043	0.022	0.042	0.026
107	0.879	0.626	0.043	0.022	0.042	0.026
108	0.879	0.626	0.043	0.022	0.042	0.026
109	0.879	0.626	0.043	0.022	0.042	0.026
110	0.879	0.626	0.043	0.022	0.042	0.026
111	0.879	0.626	0.043	0.022	0.042	0.026
112	0.879	0.626	0.043	0.022	0.042	0.026
113	0.879	0.626	0.043	0.022	0.042	0.026
114	0.879	0.626	0.043	0.022	0.042	0.026
115	0.879	0.626	0.043	0.022	0.042	0.026
116	0.879	0.626	0.043	0.023	0.042	0.026
117	0.879	0.626	0.043	0.023	0.042	0.026
118	0.879	0.626	0.043	0.023	0.042	0.026
119	0.879	0.626	0.043	0.023	0.042	0.026
120	0.879	0.626	0.043	0.023	0.042	0.026

ตารางที่ ๓.๔ ข้อมูลคิบั C-input กับ C-fixation ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Pigs		Chickens		Hens	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)
121	0.879	0.626	0.043	0.023	0.042	0.026
122	0.879	0.626	0.043	0.023	0.042	0.026
123	0.879	0.626	0.043	0.024	0.042	0.026
124	0.879	0.626	0.043	0.024	0.042	0.026
125	0.879	0.626	0.043	0.024	0.042	0.026
126	0.879	0.626	0.043	0.024	0.042	0.026
127	0.879	0.626	0.043	0.024	0.042	0.026
128	0.879	0.626	0.043	0.025	0.042	0.026
129	0.879	0.626	0.043	0.025	0.042	0.026
130	0.879	0.626	0.043	0.025	0.042	0.026
131	0.879	0.626	0.043	0.025	0.042	0.026
132	0.879	0.626	0.043	0.025	0.042	0.026
133	0.879	0.626	0.043	0.025	0.042	0.026
134	0.879	0.626	0.043	0.025	0.042	0.026
135	0.879	0.626	0.043	0.025	0.042	0.026
136	0.879	0.626	0.043	0.025	0.042	0.026
137	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
138	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
139	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
140	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
141	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
142	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
143	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
144	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
145	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
146	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
147	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
148	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
149	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
150	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026

ตารางที่ ๓.๔ ข้อมูลคิบั C-input กับ C-fixation ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Pigs		Chickens		Hens	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)
151	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
152	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
153	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
154	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
155	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
156	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
157	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
158	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
159	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
160	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
161	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
162	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
163	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
164	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
165	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
166	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
167	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
168	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
169	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
170	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
171	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
172	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
173	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
174	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
175	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
176	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
177	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
178	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
179	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
180	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026



ตารางที่ ๓.๔ ข้อมูลคิบั C-input กับ C-fixation ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Pigs		Chickens		Hens	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)
181	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
182	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
183	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
184	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
185	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
186	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
187	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
188	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
189	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
190	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
191	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
192	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
193	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
194	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
195	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
196	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
197	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
198	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
199	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
200	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
201	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
202	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
203	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
204	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
205	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
206	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
207	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
208	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
209	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
210	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026

ตารางที่ ๓.๔ ข้อมูลคิบ C-input กับ C-fixation ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Pigs		Chickens		Hens	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)
211	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
212	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
213	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
214	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
215	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
216	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
217	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
218	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
219	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
220	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
221	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
222	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
223	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
224	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
225	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
226	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
227	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
228	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
229	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
230	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
231	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
232	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
233	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
234	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
235	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
236	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
237	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
238	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
239	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
240	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026

ตารางที่ ๓.๔ ข้อมูลคิบั C-input กับ C-fixation ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Pigs		Chickens		Hens	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)
241	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
242	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
243	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
244	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
245	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
246	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
247	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
248	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
249	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
250	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
251	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
252	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
253	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
254	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
255	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
256	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
257	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
258	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
259	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
260	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
261	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
262	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
263	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
264	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
265	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
266	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
267	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
268	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
269	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
270	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026

ตารางที่ ๓.๔ ข้อมูลคียบ C-input กับ C-fixation ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Pigs		Chickens		Hens	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)
271	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
272	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
273	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
274	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
275	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
276	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
277	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
278	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
279	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
280	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
281	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
282	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
283	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
284	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
285	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
286	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
287	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
288	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
289	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
290	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
291	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
292	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
293	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
294	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
295	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
296	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
297	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
298	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
299	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026
300	0.879	0.626	0.043	0.026	0.042	0.026

ตารางที่ ๓.๔ ข้อมูลคิบ C-input กับ C-fixation ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Pigs		Chickens		Hens	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)
301	0.879	0.626	0.043	0.027	0.042	0.026
302	0.879	0.626	0.043	0.027	0.042	0.026
303	0.879	0.626	0.043	0.027	0.042	0.026
304	0.879	0.626	0.043	0.027	0.042	0.026
305	0.879	0.626	0.043	0.027	0.042	0.026
306	0.879	0.626	0.043	0.027	0.042	0.026
307	0.879	0.626	0.043	0.027	0.042	0.026
308	0.879	0.626	0.043	0.027	0.042	0.026
309	0.879	0.626	0.043	0.027	0.042	0.026
310	0.879	0.626	0.043	0.027	0.042	0.026
311	0.879	0.626	0.043	0.027	0.042	0.026
312	0.879	0.626	0.043	0.027	0.042	0.026
313	0.879	0.626	0.043	0.027	0.042	0.026
314	0.879	0.626	0.043	0.027	0.042	0.026
315	0.879	0.626	0.043	0.027	0.042	0.026
316	0.879	0.626	0.043	0.027	0.042	0.026
317	0.879	0.626	0.043	0.027	0.042	0.026
318	0.879	0.626	0.043	0.027	0.042	0.026
319	0.879	0.626	0.043	0.027	0.042	0.026
320	0.879	0.626	0.043	0.027	0.042	0.026
321	0.879	0.626	0.043	0.027	0.042	0.026
322	0.879	0.626	0.043	0.027	0.042	0.026
323	0.879	0.626	0.043	0.027	0.042	0.026
324	0.879	0.626	0.043	0.027	0.042	0.026
325	0.879	0.626	0.043	0.027	0.042	0.026
326	0.879	0.626	0.043	0.027	0.042	0.026
327	0.879	0.626	0.043	0.027	0.042	0.026
328	0.879	0.626	0.043	0.027	0.042	0.026
329	0.879	0.626	0.043	0.027	0.042	0.026
330	0.879	0.626	0.043	0.028	0.042	0.026

ตารางที่ ๓.๔ ข้อมูลคียบ C-input กับ C-fixation ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Pigs		Chickens		Hens	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)
331	0.879	0.626	0.043	0.028	0.042	0.026
332	0.879	0.626	0.043	0.028	0.042	0.026
333	0.879	0.626	0.044	0.028	0.042	0.026
334	0.879	0.626	0.044	0.028	0.042	0.026
335	0.879	0.626	0.044	0.028	0.042	0.026
336	0.879	0.626	0.044	0.029	0.042	0.026
337	0.879	0.626	0.044	0.029	0.042	0.026
338	0.879	0.626	0.045	0.029	0.042	0.026
339	0.879	0.626	0.045	0.029	0.042	0.026
340	0.879	0.626	0.045	0.029	0.042	0.026
341	0.879	0.626	0.046	0.029	0.042	0.026
342	0.879	0.626	0.046	0.029	0.042	0.026
343	0.879	0.626	0.046	0.029	0.042	0.026
344	0.879	0.626	0.046	0.029	0.042	0.026
345	0.879	0.626	0.046	0.029	0.042	0.026
346	0.879	0.626	0.046	0.029	0.042	0.026
347	0.879	0.626	0.046	0.030	0.042	0.026
348	0.879	0.626	0.047	0.030	0.042	0.026
349	0.879	0.626	0.047	0.030	0.042	0.026
350	0.879	0.626	0.047	0.030	0.042	0.026
351	0.879	0.626	0.047	0.030	0.042	0.026
352	0.879	0.626	0.047	0.030	0.042	0.026
353	0.883	0.626	0.047	0.030	0.042	0.026
354	0.891	0.626	0.047	0.030	0.042	0.026
355	0.895	0.626	0.047	0.030	0.042	0.026
356	0.906	0.627	0.048	0.030	0.042	0.026
357	0.916	0.631	0.048	0.030	0.042	0.026
358	0.916	0.641	0.048	0.030	0.042	0.026
359	0.925	0.642	0.048	0.030	0.042	0.026
360	0.932	0.656	0.048	0.030	0.042	0.026

ตารางที่ ๓.๔ ข้อมูลคิพ C-input กับ C-fixation ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Pigs		Chickens		Hens	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)
361	0.934	0.657	0.048	0.030	0.042	0.026
362	0.948	0.670	0.048	0.030	0.042	0.026
363	0.961	0.673	0.048	0.031	0.042	0.026
364	0.975	0.677	0.049	0.031	0.042	0.026
365	0.975	0.681	0.049	0.031	0.042	0.026
366	0.976	0.694	0.049	0.032	0.042	0.026
367	0.981	0.698	0.049	0.033	0.042	0.026
368	0.987	0.701	0.049	0.033	0.042	0.026
369	0.992	0.717	0.049	0.033	0.042	0.026
370	0.998	0.722	0.049	0.033	0.044	0.027
371	0.999	0.724	0.049	0.034	0.044	0.027
372	1.028	0.729	0.049	0.034	0.044	0.027
373	1.028	0.731	0.049	0.034	0.044	0.027
374	1.028	0.731	0.049	0.035	0.044	0.027
375	1.028	0.734	0.049	0.035	0.044	0.027
376	1.030	0.736	0.049	0.036	0.044	0.027
377	1.038	0.739	0.049	0.036	0.044	0.027
378	1.046	0.749	0.049	0.037	0.044	0.028
379	1.050	0.759	0.051	0.037	0.044	0.028
380	1.069	0.787	0.051	0.038	0.045	0.028
381	1.110	0.802	0.051	0.038	0.045	0.028
382	1.138	0.811	0.051	0.038	0.045	0.028
383	1.142	0.862	0.051	0.038	0.045	0.028
384	1.170	0.863	0.051	0.038	0.045	0.028
385	1.170	0.889	0.051	0.039	0.045	0.028
386	1.190	0.889	0.051	0.039	0.045	0.028
387	1.210	0.892	0.052	0.039	0.045	0.028
388	1.215	0.901	0.052	0.040	0.045	0.028
389	1.233	0.903	0.053	0.040	0.045	0.028
390	1.267	0.904	0.053	0.042	0.045	0.028

ตารางที่ ๓.๔ ข้อมูลคิบั C-input กับ C-fixation ของสัตว์แต่ละชนิดที่ศึกษาในปี 2550-2551 (ต่อ)

ลำดับ	Pigs		Chickens		Hens	
	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)	C-input พืชอาหาร (กก. C/ตัว/วัน)	C- fixation (กก. C/ตัว/วัน)
391	1.267	0.910	0.054	0.042	0.045	0.028
392	1.267	0.911	0.058	0.043	0.046	0.028
393	1.267	0.911	0.058	0.045	0.046	0.028
394	1.267	0.912	0.059	0.047	0.046	0.029
395	1.267	0.973	0.061	0.048	0.046	0.029
396	1.293	1.035	0.061	0.049	0.047	0.029
397	1.336	1.052	0.063	0.051	0.047	0.029
398	1.365	1.083	0.063	0.051	0.048	0.029
399	1.915	1.515	0.068	0.051	0.048	0.033
400	2.918	2.520	0.073	0.051	0.049	0.034
<b>ค่าเฉลี่ย</b>	<b>0.879</b>	<b>0.626</b>	<b>0.043</b>	<b>0.026</b>	<b>0.042</b>	<b>0.0264</b>
<b>S.D.</b>	<b>0.297</b>	<b>0.256</b>	<b>0.007</b>	<b>0.007</b>	<b>0.004</b>	<b>0.0029</b>



### ภาคผนวก ฎ

ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตั้งคาร์บอนกับ  
คาร์บอนที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวไปฯที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ตารางที่ ฎ.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการตรึงคาร์บอนกับคาร์บอนที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวโคนม

SUMMARY OUTPUT				C-fixed & input of Dairies				
<i>Regression Statistics</i>				Observations	400			
Multiple R	0.968943406			R Square	0.938851324			
<b>Adjusted R Square</b>	<b>0.938697684</b>			Standard Error	0.255351514			
ANOVA	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>			
Regression	1	398.4462214	398.4462214	6110.726	<b>1.2776E-243 &lt; 0.05 (OK)</b>			
Residual	398	25.95134952	0.065204396					
Total	399	424.397571						
	<i>Coefficient</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	<b>-1.611730</b>	0.076147283	-21.166	<b>3.71E-67</b> <b>&lt; 0.05</b> <b>(OK)</b>	-1.76143	-1.4620295	-1.7614318	-1.4620295
X Variable 1	<b>0.8466263</b>	0.010830421	78.1711	<b>1.3E-243</b> <b>&lt; 0.05</b> <b>(OK)</b>	0.825334	0.86791826	0.8253343	0.8679183

ตารางที่ ฎ.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการตรึงคาร์บอนกับคาร์บอนที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวโคนเนื้อ

SUMMARY OUTPUT				C-fixed & input of Oxen				
<i>Regression Statistics</i>				Observations	400			
Multiple R	0.998858355			R Square	0.997718014			
<b>Adjusted R Square</b>	<b>0.997712281</b>			Standard Error	0.093924313			
ANOVA	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>			
Regression	1	1535.0905	1535.090547	174011.5	<b>0 &lt; 0.05 (OK)</b>			
Residual	398	3.511067	0.008821777					
Total	399	1538.6016						
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	<b>-1.4537363</b>	0.0118368	-122.814	<b>0 &lt; 0.05</b> <b>(OK)</b>	-1.4770	-1.4304658	-1.4770069	-1.4304658
X Variable 1	<b>1.017390822</b>	0.0024389	417.147	<b>0 &lt; 0.05</b> <b>(OK)</b>	1.0126	1.02218561	1.012596	1.0221856

ตารางที่ ๓.3 ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตรึงคาร์บอนกับคาร์บอนที่ถ่ายเทเข้าสู่  
ตัวกระบือที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

SUMMARY OUTPUT				C-fixed & input of Buffaloes				
<i>Regression Statistics</i>				Observations	400			
Multiple R		0.998186393		R Square	0.996376075			
<b>Adjusted R Square</b>		<b>0.99636697</b>		Standard Error	0.174408349			
ANOVA	df	SS	MS	F	<b>Significance F</b>			
Regression	1	3328.6007	3328.600694	109427.7	<b>0 &lt; 0.05 (OK)</b>			
Residual	398	12.106472	0.030418272					
Total	399	3340.7072						
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	<b>-1.7698254</b>	0.0214555	-82.48801	<b>2.3E-252 &lt; 0.05 (OK)</b>	-1.812006	-1.7276	-1.8120057	-1.727645
X Variable 1	<b>0.995563863</b>	0.0030096	330.79853	<b>0 &lt; 0.05 (OK)</b>	0.989647	1.00148	0.9896472	1.0014805

ตารางที่ ๓.4 ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตรึงคาร์บอนกับคาร์บอนที่ถ่ายเทเข้าสู่  
ตัวสุกรที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

SUMMARY OUTPUT				C-fixed & input of Pigs				
<i>Regression Statistics</i>				Observations	400			
Multiple R		0.995359796		R Square	0.990741124			
<b>Adjusted R Square</b>		<b>0.990717861</b>		Standard Error	0.013532769			
ANOVA	df	SS	MS	F	<b>Significance F</b>			
Regression	1	7.7993492	7.799349186	42587.78	<b>0 &lt; 0.05 (OK)</b>			
Residual	398	0.0728881	0.000183136					
Total	399	7.8722372						
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	<b>-0.1301437</b>	0.003724	-34.945	<b>2.5E-123 &lt; 0.05 (OK)</b>	-0.13747	-0.122822	-0.1374653	0.122822
X Variable 1	<b>0.859829419</b>	0.004166	206.368	<b>0 &lt; 0.05 (OK)</b>	0.851638	0.8680205	0.8516384	0.868020

ตารางที่ ๕.5 ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตรึงคาร์บอนกับคาร์บอนที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวไก่เนื้อที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

SUMMARY OUTPUT				C-fixed & input of Chickens				
<i>Regression Statistics</i>				Observations	400			
Multiple R		0.896899489		R Square	0.804428694			
<b>Adjusted R Square</b>		<b>0.803937309</b>		Standard Error	0.002477538			
ANOVA	df	SS	MS	F	<i>Significance F</i>			
Regression	1	0.0100486	0.010048611	1637.063	<b>4.1538E-143 &lt; 0.05 (OK)</b>			
Residual	398	0.0024430	6.13819E-06					
Total	399	0.0124916						
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	<b>-0.012805629</b>	0.0009654	-13.263954	<b>1.66E-33</b> <b>&lt; 0.05</b> <b>(OK)</b>	-0.0147	-0.0109076	-0.0147036	-0.010908
X Variable 1	<b>0.900020869</b>	0.022244	40.46064	<b>4.2E-143</b> <b>&lt; 0.05</b> <b>(OK)</b>	0.8563	0.943752	0.8562897	0.943752

ตารางที่ ๕.6 ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตรึงคาร์บอนกับคาร์บอนที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวไก่ไข่ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

SUMMARY OUTPUT				C-fixed & input of Hens				
<i>Regression Statistics</i>				Observations	400			
Multiple R		0.951240131		R Square	0.904857787			
<b>Adjusted R Square</b>		<b>0.904618736</b>		Standard Error	0.000308562			
ANOVA	df	SS	MS	F	<i>Significance F</i>			
Regression	1	0.000360	0.000360391	3785.211	<b>2.0874E-205 &lt; 0.05 (OK)</b>			
Residual	398	3.78937E-05	9.52103E-08					
Total	399	0.000398285						
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	<b>0.000302115</b>	0.000424774	0.71124	<b>0.477354</b> <b>&gt; 0.05 (no good)</b>	-0.00053	0.001137	-0.000533	0.0011372
X Variable 1	<b>0.618961501</b>	0.010060477	61.5241	<b>2.1E-205</b> <b>&lt; 0.05</b> <b>(OK)</b>	0.599183	0.6387398	0.5991832	0.6387398

ภาคผนวก ฐ

จำนวนฟาร์มและตัวสัตว์แต่ละชนิดในปี 2548  
แยกเป็นรายอำเภอและกิ่งอำเภอของจังหวัดนครราชสีมา

ตารางที่ ๑.1 จำนวนฟาร์มและจำนวนสัตว์แยกเป็นรายอำเภอและกิ่งอำเภอในจังหวัดนครราชสีมาของปี 2548

ลำดับ	อำเภอ	โคนม		โคน้อย		กระบือ		สุกร		ไก่ไข่		ไก่เนื้อ	
		จำนวน (ตัว)	เกษตรกร (ครัวเรือน)	จำนวน (ตัว)	เกษตรกร (ครัวเรือน)	จำนวน (ตัว)	เกษตรกร (ครัวเรือน)	จำนวน (ตัว)	เกษตรกร (ครัวเรือน)	จำนวน (ตัว)	เกษตรกร (ครัวเรือน)	จำนวน (ตัว)	เกษตรกร (ครัวเรือน)
1	เมือง	985	54	9,652	521	1,632	324	8,017	68	1,431	53	14,596	736
2	ขามทะเลสอ	1,530	104	6,403	284	683	63	540	101	2,140	25	89,847	28
3	ขามสะแกแสง	182	19	13,213	2,200	1,131	247	1,766	183	346	48	9,530	1
4	คง	5	1	19,443	4,554	6,773	1,402	2,831	316	15,846	43	93,500	8
5	ครบุรี	1,700	91	5,220	387	2,590	205	7,432	389	123,715	32	210,500	20
6	จักราช	-	-	17,495	2,814	865	174	4,427	506	400	1	89,880	10
7	ชุมพวง	775	37	19,365	3,032	3,025	684	2,085	445	1,479	112	186,319	129
8	โชคชัย	30	2	4,892	387	1,545	192	3,394	88	-	-	2,693,600	14
9	ด่านขุนทด	-	-	31,636	1,881	2,593	220	4,430	684	79,984	253	337,754	236
10	โนนสูง	-	-	21,626	7,165	2,729	487	2,660	464	6,240	256	713	38
11	โนนไทย	-	-	13,562	2,130	2,365	264	9,528	712	36,603	45	724,700	74
12	โนนแดง	30	2	8,925	2,285	3,602	1,240	3,153	321	568	42	115	7
13	บัวใหญ่	-	-	6,559	1,843	6,613	1,476	5,803	417	341	50	50,841	47
14	บ้านเหลื่อม	-	-	6,665	587	3,077	431	1,638	271	514	15	122,282	66
15	ปักธงชัย	3,257	72	17,544	1,546	3,878	519	12,385	780	936,909	68	2,130,674	68
16	ปากช่อง	39,059	1,559	7,162	536	545	102	114,209	196	52,000	3	611,800	24
17	ประทาย	192	2	23,656	5,269	3,471	723	4,182	518	600	2	23,000	3

ตารางที่ ฐ.1 จำนวนฟาร์มและจำนวนสัตว์แยกเป็นรายอำเภอและกิ่งอำเภอในจังหวัดนครราชสีมาของปี 2548 (ต่อ)

ลำดับ	อำเภอ	โคนม		โคเนื้อ		กระบือ		สุกร		ไก่ไข่		ไก่เนื้อ	
		จำนวน (ตัว)	เกษตรกร (ครัวเรือน)	จำนวน (ตัว)	เกษตรกร (ครัวเรือน)	จำนวน (ตัว)	เกษตรกร (ครัวเรือน)	จำนวน (ตัว)	เกษตรกร (ครัวเรือน)	จำนวน (ตัว)	เกษตรกร (ครัวเรือน)	จำนวน (ตัว)	เกษตรกร (ครัวเรือน)
18	พิมาย	3,564	151	22,090	2,741	690	143	4,211	577	1,216	80	27,720	72
19	สูงเนิน	3,152	128	11,700	859	1,394	166	20,749	1,009	70,205	43	5,974,640	52
20	เสิงสาง	690	40	4,932	708	854	87	1,256	273	-	-	-	-
21	สีคิ้ว	2,518	127	17,458	981	2,442	363	4,735	216	129,501	50	177,369	165
22	ห้วยแถลง	9	2	19,535	3,954	2,301	459	12,101	748	10,000	3	422,326	35
23	หนองบุญมาก	-	-	6,996	551	1,023	114	5,760	570	28	1	1,743,000	23
24	แก่งสนามนาง	-	-	12,505	1,559	2,213	328	2,237	241	288	25	43	4
25	วังน้ำเขียว	350	13	11,566	436	355	19	1,809	160	937	15	173,267	48
26	กิ่ง อ.เมืองยาง	72	5	11,475	1,736	1,986	362	2,028	252	94	3	-	-
27	กิ่ง อ.เทพารักษ์	-	-	13,195	725	592	63	1,101	116	1,252	21	108,000	4
28	กิ่ง อ.พระทองคำ	33	3	1,045	1,333	1,127	239	1,127	72	31	4	148,503	67
29	กิ่ง อ.ลำทะเมนชัย	6	2	9,057	203	997	57	1,328	189	592	36	10,999	18
30	เฉลิมพระเกียรติ	-	-	3,831	344	349	42	2,373	376	162,633	25	251	16
31	กิ่ง อ.สีดา	-	-	7,889	1,960	2,717	718	996	76	453	16	305	17
32	กิ่ง อ.บัวลาย	-	-	4,323	875	2,421	705	1,543	212	177	13	18,000	9
	รวม	58,139	2,414	390,615	56,386	68,578	12,618	251,834	11,546	1,636,523	1,383	16,194,074	2,039
	จำนวนตัวอย่าง	398	343	400	398	398	390	400	390	400	310	400	340

### ภาคผนวก ๓

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย  
ของโคเนื้อและกระบือที่อายุต่าง ๆ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%



ตารางที่ ๗.1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยของโคเนื้อ และกระบือที่อายุต่าง ๆ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

SUMMARY OUTPUT				Buffaloes (Confidence level = 95%)				
<i>Regression Statistics</i>					Observations		400	
<b>Multiple R</b>		<b>0.804488152</b>			R Square		0.647201186	
<b>Adjusted R Square</b>		<b>0.646314757</b>			Standard Error		32.02115717	
ANOVA		<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>		<b>Significance F</b>	
Regression		1	748633.6	748633.6	730.1217		<b>4.5E-92 &lt; 0.05 (OK)</b>	
Residual		398	408091.1	1025.355				
Total		399	1156725					
	<b>Coefficients</b>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<b>P-value</b>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	<b>194.246113</b>	3.143665	61.78971	<b>4.4E-206 &lt; 0.05 (OK)</b>	188.0658	200.4264	188.0658	200.4264
X Variable 1	<b>-16.2268755</b>	0.600534	-27.0208	<b>4.5E-92 &lt; 0.05 (OK)</b>	-17.4075	-15.0463	-17.4075	-15.0463
SUMMARY OUTPUT				Oxen (Confidence level = 95%)				
<i>Regression Statistics</i>					Observations		400	
<b>Multiple R</b>		<b>0.727822</b>			R Square		0.529725	
<b>Adjusted R Square</b>		<b>0.528544</b>			Standard Error		55.98974	
ANOVA		<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>		<b>Significance F</b>	
Regression		1	1405396	1405396.3	448.31359		<b>3.4415E-67 &lt; 0.05 (OK)</b>	
Residual		398	1247671	3134.851				
Total		399	2653067					
	<b>Coefficients</b>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<b>P-value</b>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	<b>218.4393</b>	4.054188	53.87991	<b>6.23E-185 &lt; 0.05 (OK)</b>	210.4690	226.4096	210.4690	226.40956
X Variable 1	<b>-21.8353</b>	1.03126	-21.1734	<b>3.441E-67 &lt; 0.05 (OK)</b>	-23.8627	-19.8079	-23.8627	-19.80790

**ภาคผนวก ข**

**การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นเพื่อคาดการณ์  
จำนวนการเลี้ยงโคเนื้อ และกระบือ ในปี 2009 - 2010**

ตารางที่ ๓.1 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นจำนวนโคนเนื้อและกระบือที่เลี้ยงในปี 2009-2010

SUMMARY OUTPUT				สมการคาดการณ์จำนวนโคนเนื้อ+กระบือ = 55015.171 (ปี) – 109798061.8				
<i>Regression Statistics</i>				Observations	6			
Multiple R	0.886537594			R Square	0.785948906			
<b>Adjusted R Square</b>	<b>0.732436132</b>			Standard Error	60052.77333			
ANOVA	df	SS	MS	F	<i>Significance F</i>			
Regression	1	5.297E+10	5296670902	14.68712708	<b>0.018580235</b>			
Residual	4	1.443E+10	3606335585		<b>&lt; 0.05 (OK)</b>			
Total	5	6.739E+10						
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	-109798061.8	28760971	-3.81760618	<b>0.0188169</b> <b>&lt; 0.05 (OK)</b>	-189651319.8	-29944803.79	-189651319.8	-29944803.9
X Variable 1	55015.171	14355.359	3.832378	<b>0.0185802</b> <b>&lt; 0.05 (OK)</b>	15158.306	94872.036	15158.306	94872.036

ตารางที่ ๓.2 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นจำนวนกระบือที่เลี้ยงในปี 2009-2010

SUMMARY OUTPUT				สมการคาดการณ์จำนวนกระบือ = 1845.57(ปี) – 3631223.52				
<i>Regression Statistics</i>				Observations	6			
Multiple R	0.9613602			R Square	0.924213623			
<b>Adjusted R Square</b>	<b>0.905267028</b>			Standard Error	1105.424988			
ANOVA	df	SS	MS	F	<i>Significance F</i>			
Regression	1	59607343.21	59607343.21	48.77993416	<b>0.002210695</b>			
Residual	4	1221964.405	305491.101		<b>&lt; 0.05 (OK)</b>			
Total	5	64495200.615						
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	-3631223.52	529419.2858	-6.85888	<b>0.0023657</b> <b>&lt; 0.05 (OK)</b>	-5101127.11	-2161319.94	-5101127.11	-2161319.9
X Variable 1	1845.5714	264.247114	6.984263	<b>0.002210</b> <b>&lt; 0.05 (OK)</b>	1111.9038	2579.2390	1111.904	2579.239

ตารางที่ ๓.3 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นจำนวน โคน้ำที่เลี้ยงในปี 2009-2010

SUMMARY OUTPUT				สมการถดถอยจำนวนโคน้ำ = 53169.6(ปี) - 106166838.3				
<i>Regression Statistics</i>				Observations	6			
Multiple R	0.881364908			R Square	0.776804101			
<b>Adjusted R Square</b>	<b>0.721005126</b>			Standard Error	59612.83446			
ANOVA	df	SS	MS	F	<b>Significance F</b>			
Regression	1	4.947E+10	49472611373	13.92147625	<b>0.020276576</b>			
Residual	4	1.421E+10	3553690032		<b>&lt; 0.05 (OK)</b>			
Total	5	6.369E+10						
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	-	2855027	-3.71859	<b>0.020499671</b>	-185435101.6	-26898574.94	-185435101.6	-26898574.94
X Variable 1	53169.6	14250.19	3.731149	<b>0.020276576</b>	13604.72127	92734.47873	13604.72127	92734.47873

### ภาคผนวก ฅ

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอน  
จากจำนวนการเลี้ยงโคเนื้อตามปกติ 10% 50% 60% 70% และ 80% ในปีต่าง ๆ

ตารางที่ ฅ.1 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจากจำนวนการเลี้ยง  
โคเนื้อตามปกติในปีต่าง ๆ

SUMMARY OUTPUT					C-emitted โคนเนื้อปกติ				
<i>Regression Statistics</i>					Observations	10			
Multiple R					0.970851866	R Square	0.942553345		
<b>Adjusted R Square</b>					<b>0.935372513</b>	Standard Error	101.6042481		
ANOVA	df	SS	MS	F	<i>Significance F</i>				
Regression	1	1355048.721	1355048.721	131.2596308	<b>3.04894E-06</b>				
Residual	8	82587.38578	10323.42322		<b>&lt; 0.05 (OK)</b>				
Total	9	1437636.107							
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>	
Intercept	-	22434.066	-11.4069	<b>3.15167E-06 &lt; 0.05 (OK)</b>	-307636.40	-204170.30	-307636.40	-204170.30	
X Variable 1	128.159	11.18626	11.45686	<b>3.04894E-06 &lt; 0.05 (OK)</b>	102.363843	153.954965	102.363843	153.954965	
	4046				8	3	8	3	

ตารางที่ ฅ.2 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจากจำนวนการเลี้ยง  
โคเนื้อ 10% ในปีต่าง ๆ

SUMMARY OUTPUT					C-emitted จำนวนโคเนื้อ 10%		ไม่มีนัยสำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%		
<i>Regression Statistics</i>					Observations	10			
Multiple R					0.536919045	R Square	0.288282061		
<b>Adjusted R Square</b>					<b>0.199317319</b>	Standard Error	369.0839707		
ANOVA	df	SS	MS	F	<i>Significance F</i>				
Regression	1	441418.0233	441418.0233	3.240407981	<b>0.109534</b>				
Residual	8	1089783.82	136222.9775	Total	9	1531201.843			
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>	
Intercept	147282.7	81493.19064	1.807300	<b>0.108337</b>	-	335206.354	-	335206.354	
	198		937	<b>&gt; 0.05 (no good)</b>	40640.91	3	40640.91463	3	
X Variable 1	-73.1472	40.63480781	-1.80011	<b>0.109534</b>	-				
				<b>&gt; 0.05 (no good)</b>	166.8512	20.556776	-166.85129	20.556776	
					9				

ตารางที่ ๓.3 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจากจำนวนการเลี้ยง  
โคเนื้อ 50% ในปีต่าง ๆ

SUMMARY OUTPUT		C-emitted จำนวนโคเนื้อ 50%			ไม่มีนัยสำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%			
<i>Regression Statistics</i>					Observations	10		
Multiple R		0.408910373			R Square	0.167207693		
<b>Adjusted R Square</b>		<b>0.063108654</b>			Standard Error	202.2672951		
ANOVA	df	SS	MS	F	<i>Significance F</i>			
Regression	1	65714.4489	65714.4489	1.60623667	<b>0.240666648</b>			
Residual	8	327296.4695	40912.05868	Total	9	393010.9184		
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	-	-	-	<b>0.247247 &gt;</b>	-	47241.4323	-	47241.4323
	55745.44	44660.3173	1.248209	<b>0.05</b>	158732.3202	2	158732.3202	2
	396		761	<b>(no good)</b>				
				<b>0.2406666</b>				
X Variable 1	28.2230	22.26889628	1.26737	<b>&gt; 0.05</b>	-23.129148	79.575185	-23.129148	79.575185
				<b>(no good)</b>				

ตารางที่ ๓.4 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจากจำนวนการเลี้ยง  
โคเนื้อ 60% ในปีต่าง ๆ

SUMMARY OUTPUT		C-emitted จำนวนโคเนื้อ 60%						
<i>Regression Statistics</i>					Observations	10		
Multiple R		0.72176523			R Square	0.520945048		
<b>Adjusted R Square</b>		<b>0.461063179</b>			Standard Error	164.9546515		
ANOVA	df	SS	MS	F	<i>Significance F</i>			
Regression	1	236714.957	236714.957	8.699545558	<b>0.018439803 &lt; 0.05 (OK)</b>			
Residual	8	217680.2965	27210.03706					
Total	9	454395.2536						
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	-	-	-	<b>0.019169182 &lt;</b>	-	-	-	-
	106502.	36421.7412	2.924145	<b>0.05 (OK)</b>	190491.17	22513.79915	190491.1707	22513.79915
	4849		892		07			
X Variable 1	53.565	18.16090942	2.9495	<b>0.0184398</b>	11.6865	95.444720	11.686456	95.444720
				<b>&lt; 0.05 (OK)</b>				

ตารางที่ ฅ.5 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจากจำนวนการเลี้ยง  
โคเนื้อ 70% ในปีต่าง ๆ

SUMMARY OUTPUT				C-emitted จำนวนโคเนื้อ 70%				
<i>Regression Statistics</i>				Observations	10			
Multiple R	0.886154406			R Square	0.785269631			
<b>Adjusted R Square</b>	<b>0.758428335</b>			Standard Error	132.5077306			
ANOVA	df	SS	MS	F	<i>Significance F</i>			
Regression	1	513686.0259	513686.0259	29.25602506	<b>0.000639209 &lt; 0.05 (OK)</b>			
Residual	8	140466.3894	17558.29867					
Total	9	654152.4152						
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	-	-	-	<b>0.000665596 &lt; 0.05 (OK)</b>	-	-	-	-
	157259.5	29257.50942	5.375014		224727.4	89791.5882	224727.4635	-89791.5882
	258		106		635			
X Variable 1	78.9081	14.588621	5.40888	<b>0.0006392 &lt; 0.05 (OK)</b>	45.26673	112.54958	45.266737	112.54958
					7			

ตารางที่ ฅ.6 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจากจำนวนการเลี้ยง  
โคเนื้อ 80% ในปีต่าง ๆ

SUMMARY OUTPUT				C-emitted จำนวนโคเนื้อ 80%				
<i>Regression Statistics</i>				Observations	10			
Multiple R	0.950579447			R Square	0.903601286			
<b>Adjusted R Square</b>	<b>0.891551446</b>			Standard Error	109.3473525			
ANOVA	df	SS	MS	F	<i>Significance F</i>			
Regression	1	896627.6554	896627.6554	74.9886586	<b>2.4582E-05 &lt; 0.05 (OK)</b>			
Residual	8	95654.74802	11956.8435					
Total	9	992282.4035						
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	-	-	-	<b>2.55101E-05 &lt; 0.05 (OK)</b>	-	-	-	-
	208016.5	24143.73246	8.61575844		263692.1	152341.0199	263692.1136	152341.0199
	668		3		136			
X Variable 1	104.251	12.03874729	8.659592	<b>2.4582E-05 &lt; 0.05 (OK)</b>	76.48932	132.01213	76.489326	132.01213
					6			



### ภาคผนวก ด

การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจากจำนวนการเลี้ยง  
กระบือตามปกติ 20% 30% และ 40% ในปีต่าง ๆ

ตารางที่ ด.1 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจากจำนวนการเลี้ยง  
กระบือตามปกติในปีต่าง ๆ

SUMMARY OUTPUT					C-emitted กระบือปกติ			
<i>Regression Statistics</i>					Observations	10		
Multiple R	0.991410931				R Square	0.982895634		
<b>Adjusted R Square</b>	<b>0.980757588</b>				Standard Error	1.451852347		
ANOVA	df	SS	MS	F	<i>Significance F</i>			
Regression	1	969.0257299	969.0257299	459.7168336	<b>2.35656E-08 &lt; 0.05 (OK)</b>			
Residual	8	16.8630019	2.107875238					
Total	9	985.8887318						
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	-		-	<b>2.73942E-08 &lt; 0.05 (OK)</b>	-	-	-	-
	6743.12	320.5668343	21.0349972		7482.350	6003.894045	7482.350935	6003.894045
	249		9		935			
X Variable 1	3.42720	0.159843683	21.4410082	<b>2.35656E-08 &lt; 0.05 (OK)</b>	3.058609	3.795809907	3.058609521	3.795809907
	9714		2		521			

ตารางที่ ด.2 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจากจำนวนการเลี้ยง  
กระบือ 20% ในปีต่าง ๆ

SUMMARY OUTPUT					C-emitted จำนวนกระบือ 20%			
<i>Regression Statistics</i>					Observations	10		
Multiple R	0.913862557				R Square	0.835144773		
<b>Adjusted R Square</b>	<b>0.81453787</b>				Standard Error	31.1760867		
ANOVA	df	SS	MS	F	<i>Significance F</i>			
Regression	1	39390.567	39390.56712	40.52742703	<b>0.000216837 &lt; 0.05 (OK)</b>			
Residual	8	7775.5870	971.9483817					
Total	9	47166.154						
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	-		-	<b>0.000222928 &lt; 0.05 (OK)</b>	-	-	-	-
	43643.98	6883.63347	6.34025393		59517.6	27770.29698	59517.67148	27770.29698
	423	6	4		7148			
X Variable 1	21.8509	3.4323742	6.3661155	<b>0.0002168 &lt; 0.05 (OK)</b>	13.9358	29.76596	13.93582	29.76596
					2			

ตารางที่ ค.3 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจากจำนวนการเลี้ยง  
กระบือ 30% ในปีต่าง ๆ

SUMMARY OUTPUT					C-emitted จำนวนกระบือ 30%			
<i>Regression Statistics</i>					Observations	10		
Multiple R	0.89679559				R Square	0.80424233		
<b>Adjusted R Square</b>	<b>0.779772621</b>				Standard Error	65.55913693		
ANOVA	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>		<i>F</i>	<i>Significance F</i>		
Regression	1	141261.75	141261.75		32.86685336	<b>0.000437467</b>		
Residual	8	34384.00348	4298.000435			< 0.05 (OK)		
Total	9	175645.7535						
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	-	-	-	<b>0.000445534 &lt;</b>	-	-	-	-
	82756.62	14475.35972	5.71706861	<b>0.05 (OK)</b>	116136.8	49376.38539	116136.8641	49376.38539
	473		4		641			
X Variable 1	41.3795	7.217823423	5.7329620	<b>0.0004375 &lt;</b>	24.73517	58.023838	24.735177	58.023838
				<b>&lt; 0.05 (OK)</b>	7			

ตารางที่ ค.4 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจากจำนวนการเลี้ยง  
กระบือ 40% ในปีต่าง ๆ

SUMMARY OUTPUT					C-emitted จำนวนกระบือ 40%			
<i>Regression Statistics</i>					Observations	10		
Multiple R	0.890112027				R Square	0.792299421		
<b>Adjusted R Square</b>	<b>0.766336849</b>				Standard Error	100.1454887		
ANOVA	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>		<i>F</i>	<i>Significance F</i>		
Regression	1	306058.4675	306058.4675		30.51698462	<b>0.000557607 &lt; 0.05 (OK)</b>		
Residual	8	80232.95128	10029.11891					
Total	9	386291.4188						
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	-	-	-	<b>0.000566045 &lt;</b>	-	-	-	-
	121869	22111.97465	5.5114600	<b>0.05 (OK)</b>	172859.	70878.96031	172859.5702	70878.96031
	.2652		66		5702			
X Variable 1	60.908	11.02565543	5.524218	<b>0.0005576 &lt;</b>	35.4829	86.333331	35.482917	86.333331
				<b>&lt; 0.05 (OK)</b>	17			

ภาคผนวก ต

การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจากจำนวนโคเนื้อ  
และกระบือที่เลี้ยงในปีต่าง ๆ

ตารางที่ ต.1 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจากจำนวนโคเนื้อ และกระบือที่เลี้ยงตามปกติในปีต่าง ๆ

SUMMARY OUTPUT		รวม C-emitted โคเนื้อ : กระบือ = ปกติ (ไม่มีการปรับสัดส่วนจำนวนการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ)						
<i>Regression Statistics</i>				Observations	10			
Multiple R	0.971987			R Square	0.944759			
<b>Adjusted R Square</b>	<b>0.937854</b>			Standard Error	102.1795			
ANOVA	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>			
Regression	1	1428491	1428491	136.8201	<b>2.6E-06 &lt; 0.05 (OK)</b>			
Residual	8	83525.16	10440.64					
Total	9	1512016						
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	-262646	22561.08	-11.6416	<b>2.7E-06 &lt; 0.05 (OK)</b>	-314672	-210621	-314672	-210620.539
X Variable 1	131.586	11.24959	11.6970	<b>2.6E-06 &lt; 0.05 (OK)</b>	105.645	157.5282	105.645	157.5282149

ตารางที่ ต.2 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจากการทดลองปรับสัดส่วนจำนวนโคเนื้อ : กระบือ = 80 : 20 ที่เลี้ยงในปีต่าง ๆ

SUMMARY OUTPUT		รวม C-emitted โคเนื้อ:กระบือ = 80 : 20						
<i>Regression Statistics</i>				Observations	10			
Multiple R	0.969370719			R Square	0.939679591			
<b>Adjusted R Square</b>	<b>0.93213954</b>			Standard Error	102.5994132			
ANOVA	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>			
Regression	1	1311883.47	1311883.474	124.6250965	<b>3.71084E-06 &lt; 0.05 (OK)</b>			
Residual	8	84213.1167	10526.63959					
Total	9	1396096.59						
	<i>Coefficient</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	-251660.6	22653.7975	-11.1089	<b>3.85098E-06 &lt; 0.05 (OK)</b>	-303900.3	-199420.8	-303900.3	199420.8
X Variable 1	126.1016	11.2958236	11.163561	<b>3.71084E-06 &lt; 0.05 (OK)</b>	100.053401	152.149833	100.053401	152.1498

ตารางที่ ต.3 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจากการทดลองปรับ  
สัดส่วนจำนวนโคเนื้อ : กระบือ = 70 : 30 ที่เลี้ยงในปีต่าง ๆ

SUMMARY OUTPUT				รวม C-emitted โคเนื้อ : กระบือ = 70 : 30				
<i>Regression Statistics</i>				Observations	10			
Multiple R	0.965598386			R Square	0.932380244			
<b>Adjusted R Square</b>	<b>0.923927774</b>			Standard Error	104.0263457			
ANOVA	df	SS	MS	F	<i>Significance F</i>			
Regression	1	1193702.588	1193702.588	110.3086197	<b>5.87829E-06</b>			
Residual	8	86571.84481	10821.4806		<b>&lt; 0.05 (OK)</b>			
Total	9	1280274.433						
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
	-		-	<b>6.10663E-06 &lt;</b>	-	-	-	-
Intercept	240016.1	22968.86209	10.4496317	<b>0.05</b>	292982.4	187049.8597	292982.4415	187049.8597
	506		5	<b>(OK)</b>	415			
X Variable 1	120.288	11.45292372	10.502791	<b>5.87829E-06 &lt;</b>	93.87717	146.69815	93.877175	146.69815
				<b>0.05</b>	5			
				<b>(OK)</b>				

ตารางที่ ต.4 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจากการทดลองปรับ  
สัดส่วนจำนวนโคเนื้อ : กระบือ = 60 : 40 ที่เลี้ยงในปีต่าง ๆ

SUMMARY OUTPUT				รวม C-emitted โคเนื้อ : กระบือ = 60 : 40				
<i>Regression Statistics</i>				Observations	10			
Multiple R	0.960545726			R Square	0.922648091			
<b>Adjusted R Square</b>	<b>0.912979103</b>			Standard Error	106.4400869			
ANOVA	df	SS	MS	F	<i>Significance F</i>			
Regression	1	1081099.04	1081099.04	95.42343387	<b>1.01075E-05 &lt; 0.05</b>			
Residual	8	90635.9367	11329.49209		<b>(OK)</b>			
Total	9	1171734.98						
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
	-		-	<b>1.05112E-05</b>	-	-	-	-
Intercept	228371.7	23501.81254	9.71719	<b>&lt; 0.05 (OK)</b>	28256	-174176.47	282567.03	-174176.47
	501		7334		7.027			
X Variable 1	114.4737	11.71866788	9.76849	<b>1.01075E-05</b>	87.45	141.4970	87.4504	141.4970
	122		1894	<b>&lt; 0.05 (OK)</b>	04156	141.4970	87.4504	141.4970
					3			

ภาคผนวก ก

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

## รายชื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติขณะศึกษา

1. Thanee, N., Dankittikul, W., and Keeratiurai, P. (2007). The Study of Carbon Mass Flow in Milk Production from Dairy Farms: A Case Study in Nakhon Ratchasima Province. Proceedings of the Second GMSARN International Conference 2007 on Sustainable Development: Challenges and Opportunities for the Greater Mekong Subregion; December 12-14, 2007; Ambassador City Jomtien Hotel, Pattaya, Thailand.

2. Thanee, N., Dankittikul, W., and Keeratiurai, P. (2008). Comparison of Carbon Massflow and Emission Factors from Ox and Buffalo Farms in Meat Production. Proceedings of the 4<sup>th</sup> International Conference on Knowledge Networks and Regional Development in the Greater Mekong Sub region and Asia-Pacific; June 22-27, 2008; Kunming, Yunnan Province, People's Republic of China.

3. Thanee, N., Dankittikul, W., and Keeratiurai, P. (2008). Comparison of Carbon Emission Factors from Ox and Buffalo Farms and Slaughterhouses in Meat Production. Proceedings of the International Conference on Energy Security and Climate Change: Issues, Strategies, and Options; August 6-8, 2008; Sofitel Centara Grand, Bangkok, Thailand.

4. ณัฐวุฒิ ธานี, วุฒิ ด้านกิตติกุล และประยงค์ กิรติอุไร (2009). การเปรียบเทียบการปลดปล่อยคาร์บอนของการผลิตเนื้อจากโคเนื้อ กระบือ สุกร และไก่เนื้อ, การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2552, สหุสัมมนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา



รายชื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ และโครงการสัมมนา  
บัณฑิตศึกษาในขณะศึกษา

1. Thanee, N., Dankittikul, W., and Keeratiurai, P. (2007). THE STUDY OF CARBON MASSFLOW IN MILK PRODUCTION FROM DAIRY FARMS: A CASE STUDY IN NAKHON RATCHASIMA PROVINCE. โครงการสัมมนาบัณฑิตศึกษา สัมมนาไตรภาคี : มข-มทส-มอบ ครั้งที่ 2; 28 กรกฎาคม 2550; สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา, ประเทศไทย, หน้า 11.

2. Thanee, N., Dankittikul, W., and Keeratiurai, P. (2007). THE STUDY OF CARBON MASSFLOW IN MILK PRODUCTION FROM DAIRY FARMS: A CASE STUDY IN NAKHON RATCHASIMA PROVINCE. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3. ประยงค์ กิรติอุไร, ณัฐวุฒิ ธานี และวุฒิ ด่านกิตติกุล (2008). การเปรียบเทียบ สัมประสิทธิ์การปลดปล่อยคาร์บอนจากฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ, The Proceeding of the 3<sup>rd</sup> Seminar “UBU-KKU-SUT Environmental Tripartite”; 30 August 2008; Graduate Program in Environmental Engineering, Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering Ubon Ratchathani University, หน้า 158-168.

4. P. Keeratiurai, N. Thanee, and W. Dankittikul (2009). Comparison of carbon emitted for meat production from ox buffalo pig and chicken. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2552 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, EN-II-4

5. ณัฐวุฒิ ธานี, วุฒิ ด่านกิตติกุล และประยงค์ กิรติอุไร (2009). การเปรียบเทียบการปลดปล่อยคาร์บอนของการผลิตเนื้อจากโคเนื้อ กระบือ สุกร และไก่เนื้อ, การประชุมวิชาการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2552, สุรสัมมนาการ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

## The Study of Carbon Mass Flow in Milk Production from Dairy Farms: A Case Study in Nakhon Ratchasima Province

Nathawut Thanee, Wut Dankittikul, and Prayong Keeraturai

**Abstract**— The carbon budget of dairy cows during milk production was studied to develop C emission factors from animal husbandry, to study the rate of carbon fixation by producers and its transfer to first consumers in the food chain and to study the changing carbon content in energy patterns used in food products like milk from animal husbandry in Nakhon Ratchasima province, Thailand. The sampling numbers were 309 dairy farms, 9 dairy farm co-operatives, and 400 dairy cows. Grass and foods for dairy cows, milk and faeces of dairy cows were collected and transferred to the laboratory at Suranaree University of Technology. Dairy cows on farms and the energy sectors of farm activities and dairy farm co-operative activities emitted 3.221 kg C/head-day and the fixed factor was 4.257 kg C/head-day from milk and the growth of dairy cows. The rate of change of carbon contents of dairy production was 7.544 kg C/head-day. It was also found that the efficiency of dairy cows that transfer carbon from producers and fixed to milk was 10.33% and the ratio of C emission factor was changed from producers and energy sectors of dairy production by 0.427. The ratio of carbon contents that were emitted to carbon contents fixed in milk and the growth of dairy cows was 0.757. The future trends in the net carbon emission per year from dairy farms, dairy farm co-operatives and the decreasing trend of milk per head per day of the dairy cows in Nakhon Ratchasima province can be forecasted by using the equations as follow:  $Y = 2 \times 10^6 X - 4 \times 10^9$  ( $R^2 = 0.8969$ ) and  $Y = -9.1934X + 399.39$  ( $R^2 = 0.8748$ ), respectively.

**Keywords**— Carbon massflow, milk production, dairy farm, Nakhon Ratchasima.

### 1. INTRODUCTION

One of the environmental threats our planet faces today is the long-term change in the Earth's climate and temperature patterns due to global climate change or the greenhouse effect. The CO<sub>2</sub> and CH<sub>4</sub> from human activities are important greenhouse gases that are contributing to global climate change. Global climate change is due largely to the increased production of greenhouse anthropogenic sources such as the burning of fossil fuels, agriculture and livestock, disposal of solid waste and wastewater, and deforestation [5].

Carbon is important to life because it is the primary element that makes up the body [7]. CO<sub>2</sub> is an important greenhouse gas and has the potential to cause changes in the Earth's climate and temperature patterns [6].

One product of carbon fixation is the protein in meat and animal products. One of the key processes we studied was carbon which was transferred to the food chain and fixed in milk and meat. Net carbon production is the rate

that carbon is collected during growth. The net carbon production can be used to explain the time averaged C stocks by carbon weight per time [11], [12]. Increasing carbon fixation rates will decrease CO<sub>2</sub> emissions to the atmosphere. Producers are the animal foods and are fixed in meat or other animal products.

So it is important to study and understand about the relationship of carbon emission from animal husbandry and carbon transfer to herbivores using energy for food production. This study was aimed to develop C emission factors from animal husbandry, to study the rate of carbon fixation by producers and its transfer to first consumers in the food chain and to study the changing carbon content in energy patterns used in food products like milk from animal husbandry in the Nakhon Ratchasima province.

### 2. METHODS

#### Study Area

The study area is located at dairy farms and dairy farm co-operatives, in Si Kheu, Khon Buri, Sung Noen, Kham Thale So, Phimai, Chumphuang, Soeng Saeng, and Pak Chong districts of Nakhon Ratchasima province (Figure 1.). Nakhon Ratchasima province has an agricultural area of 12,469.46 square kilometers which is the biggest area for dairy farms in Thailand [3]. The map of dairy farm area in the Nakhon Ratchasima province is shown in Figure 1.

#### Scope of the Study

To study the transference of carbon contents in producers to dairy cows in milk and meat patterns minus the carbon contents in faeces and to study the transference of the carbon contents in the electricity and engine energy sectors for livestock to keep cool milk, and the

Nathawut Thanee (corresponding author) is with the School of Biology, Institute of Science, Suranaree University of Technology, 111 University Avenue, Suranaree, Muang, Nakhon Ratchasima Province 30000, Thailand. Phone: 66-4422-4192; Fax:66-4422-4633; E-mail: [nathawut@sut.ac.th](mailto:nathawut@sut.ac.th).

Wut Dankittikul is with the School of Environmental Engineering, Institute of Engineering, Suranaree University of Technology, 111 University Avenue, Suranaree, Muang, Nakhon Ratchasima Province 30000, Thailand. Phone: 66-4422-4218; E-mail: [wut@sut.ac.th](mailto:wut@sut.ac.th).

Prayong Keeraturai is with the School of Environmental Engineering of study, Institute of Engineering, Suranaree University of Technology, 111 University Avenue, Suranaree, Muang, Nakhon Ratchasima Province 30000, Thailand. Phone: 0-8147-0018-3; E-mail: [prayong\\_kee@hotmail.com](mailto:prayong_kee@hotmail.com).

transference of transportation energy sector for transporting milk from dairy farms to dairy farm co-operatives in the province and to transport milk from dairy farm co-operatives to dairy manufacturers.




Fig. 1. The districts of Nakhon Ratchasima province map [4]

**Size of Samples, Site Sampling Methods and Analytical Methods**

The numbers of dairy farms and dairy cows in any district were calculated by determining the number of dairy farms and the number of dairy cows in the province (adapted from [2], [13]). The sampling numbers were 309 dairy farms, 9 dairy farm co-operatives, and 400 dairy cows. Grass and foods for dairy cows were collected and transferred to the laboratory at Suranaree University of Technology. The analytical methods are shown in Table 1.

Table 1. The methods for property analysis of animal foods, milk, and faeces from dairy cows

Properties	Analytical methods	References
Moisture	By weighing the known weight sample after oven drying at 103-105 °C for 24 hours	Manlay et al. (2004)
Carbon content (C)	By CNS-2000 ELEMENTAL ANALYZER	Manlay et al. (2004)
Volatile & fixed solids	By weighing the known weight sample after burning at 550 °C for 30 minutes	APTA, AWWA, WEF. (1992)

**3. RESULTS AND DISCUSSION**

**The C Emission Factor and the Rate of Change in Carbon Contents**

This study showed that the carbon contents was transferred and emitted from activities in livestock sectors. The C emission factor was 2.676 kg.C/head-day, the C fixation factor was 4.257 kg.C/head-day, and the rate of transference of carbon contents from producers was 6.933 kg.C/head-day as shown in Table 2. The CO<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, and CH<sub>4</sub> gases which were emitted from faeces, and enteric fermentation and respiration of dairy cows are shown in Table 3.

Figure 2. showed the ratio of the carbon contents in milk, faeces, the growth of dairy cows and the CO<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub> and CH<sub>4</sub> from faeces, enteric fermentation and respiration to carbon contents in the producers, that were transferred to dairy cows by feeding. Figure 2. showed the carbon content was fixed in milk and in the growth of the dairy

cows. It was calculated that the carbon contents by mass balance, was 61.40% and that the carbon contents emitted, to influence the environmental problem, was 38.60%.

Table 2. The average of C<sub>input</sub>, C-fixation, C<sub>output</sub> and C-emission of CO, CO<sub>2</sub> and CH<sub>4</sub> from dairy farms that were the member of the dairy farm co-operatives in Nakhon Ratchasima

Average	C <sub>input</sub> (kgC/head-day)	C-fixation (kgC/head-day)			C <sub>output</sub> (kgC/head-day)	
	Grass and foods for dairy cows	Milk from dairy cows	The growth of dairy cows (mass balance)	Faeces of dairy cows	C-emission of CO, CO <sub>2</sub> &CH <sub>4</sub>	
Carbon contents	6933	0.716	3.541	1.917	0.033	0.896

Table 3. The CO, CO<sub>2</sub> and CH<sub>4</sub> from faeces, enteric fermentation and respiration of dairy cows on dairy farms in Nakhon Ratchasima

Average of gases from	CO ± S.D (kg/head-day)	CH <sub>4</sub> ± SD (kg/head-day)	CO <sub>2</sub> ± 3 D (kg/head-day)
Faeces of dairy cows	0.0018 ± 0.00015	0.002 ± 0.00128	0.136 ± 0.02197
Enteric fermentation and respiration	0.00 0 ± 0.00006	0.1281 ± 0.03696	2.2107 ± 0.49932

S.D = standard deviation




Fig. 2. The percentage of C was transferred from producers to any sectors

**The Carbon Contents of Energy Sectors for Milk Production**

The dairy farms, that are members of dairy farm co-operatives, used 3 energy sectors for milk production. The first sector was the electricity energy for lighting and pumping of milk. The second sector was petrol used for transporting milk to dairy farm co-operatives daily. The last was petrol used for cutting grass and transferring it to the farms for feeding. The C<sub>input</sub> and C emission per unit of 3 energy sectors of dairy farms were 0.229 kg.C/head-day and 0.206 kg.C/head-day, respectively. The dairy farm co-operatives used electricity for milk cooling and for transporting milk from dairy farm co-operatives to dairy manufacturers. The C<sub>input</sub> and C emission per unit of electricity and petrol used by dairy farm co-operatives were 0.382 kg.C/head-day and 0.339 kg.C/head-day, respectively. The result of the carbon contents per unit in the energy sectors for milk production are shown in Table 4.

**Table 4. The averages of  $C_{input}$  and C-emission from energy sectors of dairy farms and dairy farm co-operatives**

Average carbon contents from energy sectors		$C_{input}$ (kg.C/head-day)	CO <sub>2</sub> emission (kg.CO <sub>2</sub> /head-day)	C emission (kg.C/head-day)
Dairy farms	Electricity for light and pump	0.08	0.294	0.080
	Transportation energy	0.012	0.036	0.010
	Engine energy	0.137	0.425	0.116
Dairy farm co-operatives	Electricity for milk cooling	0.097	0.357	0.097
	Transportation energy	0.285	0.887	0.242

The transportation energy and the engine energy of the dairy farms had C emission of 83.33% and 84.67% of  $C_{input}$ , respectively. The transportation energy of the dairy farm co-operatives had C emission of 84.91% of  $C_{input}$ . The sum of the total C emissions per unit and the total  $C_{input}$  per unit from the electricity energy and the transportation and engine energy of dairy farms and dairy farm co-operatives was 0.545 kg.C/head-day and 0.611 kg.C/head-day, respectively. The transportation and engine energy had carbon losses of 0.066 kg.C/head-day. This C emission showed the environmental problems known as global climate changes from the energy sectors in milk production.

**The Relation of the Percentage of Carbon Contents and the Physical Properties of Animal Foods, Milk and Faeces of Dairy Cows.**

The average of milk, faeces weight and weight of dairy cows and the food properties are shown in Table 5. The ratio of faeces of dairy cow to weight of dairy cow was 4.2% and the ratio of milk to weight of dairy cow was 2.48%. The percentage of moisture, total solids, volatile solids, ash, and the carbon contents of animal foods, milk, and faeces of dairy cows, respectively are shown in Table 6.

**Table 5. The average weight and standard deviation of milk, faeces, dairy cow and the percentages of fat, protein, and total solid in milk from dairy farms in Nakhon Ratchasima**

Average weight of milk (kg./head-day)	Average weight of faeces (kg./head-day)	Average weight of dairy cow (kg./head)	Percentages <sup>a</sup>		
			Fat	Protein	Total solids
11.144 ± 2.70	18.845 ± 3.41	449.186 ± 53.99	3.75 ± 0.33	3.02 ± 0.06	11.65 ± 1.33

<sup>a</sup> Northeastern Veterinary Research and Development Center (Lower Zone)


**The Forecasting Trends of Milk and C Emission from Dairy Farms and Dairy Farm Co-operatives**

The results showed that the average milk production from dairy cows was 11.144 kg./head-day in 2007, and showed a decline compared with earlier year. This decreasing trend in the rate of milk per head of dairy cow was forecast from the livestock statistics in 1999 – 2007 and shown in Figure 3. The future trend of the C emission from dairy farms and dairy farm co-operatives for milk production forecasted from the C emission factor was 3.221 kg.C/head-day and the number of dairy cows statistics in 1997 – 2006 in Nakhon Ratchasima is shown in Figure 4.


**Table 6. Physical properties, carbon contents, and the ratio of the carbon contents to the volatile solids of animal foods, feeded to dairy cows on dairy farms**

Type	Moisture ± S.D. (%)	Total solids ± S.D. (%)	Volatile solids ± S.D. (%)	Ash ± S.D. (%)	Carbon contents ± S.D. (%)	Carbon contents/ Volatile solids (%)
Grass	68.10 ± 7.40	31.90 ± 7.40	82.26 ± 5.47	17.74 ± 5.47	42.05 ± 1.85	52.45
Rice straw	7.57 ± 1.78	92.43 ± 1.78	69.94 ± 3.15	30.06 ± 3.15	40.23 ± 1.44	57.50
Concub. Cenhusk	9.00 ± 1.09	91.00 ± 1.09	79.72 ± 1.58	20.28 ± 1.58	42.86 ± 2.06	52.26
Consmilk	70.51 ± 6.99	29.49 ± 6.99	76.96 ± 2.52	23.04 ± 2.52	43.57 ± 0.20	55.56
Cassava meal residue	75.10 ± 1.96	24.90 ± 1.96	86.90 ± 2.15	13.10 ± 2.15	41.78 ± 1.00	47.58
Animal food	9.51 ± 0.94	90.49 ± 0.94	71.06 ± 0.44	28.94 ± 0.44	45.01 ± 1.42	63.34
Milk from dairy cow	88.35 ± 0.31	11.65 ± 0.31	85.21 ± 3.3	14.79 ± 3.3	53.93 ± 1.52	62.92
Faeces	76.96 ± 12.92	23.04 ± 12.92	71.89 ± 2.98	28.11 ± 2.98	44.24 ± 2.61	61.71

S.D. = standard deviation



**Fig. 3. The decreasing trend of the milk production from dairy cows in Nakhon Ratchasima**



**Fig. 4. The future trend of the carbon contents emitted from milk production of dairy farms and dairy farm co-operatives in Nakhon Ratchasima province**

**4. CONCLUSION OF THE STUDY**

The dairy farms and dairy farm co-operatives have the C emission factor which can be derived from the sum of carbon content per head per day of dry faeces of dairy cow, gas emission from wet faeces of dairy cow, enteric

fermentation, respiration of dairy cow and the energy sector in dairy production was 3.221 kg.C/head-day. The C emission factor showed that one of the environmental threats in global warming results from overall dairy production. The C fixation factor was 4.257 kg.C/head-day from milk and the growth of dairy cows. It showed the ability of dairy cows to transfer carbon from producers and fix it on milk and meat. The carbon different contents per unit between  $C_{\text{output}}$  from the faeces and C were fixed in milk and the growth of dairy cows are shown in Figure 5. The rate of change carbon content in dairy production was due to the carbon contents fed per day in animal foods and the carbon contents per unit of energy consumption in the electricity, transport and engine sectors for dairy production. This was shown to be 7.544 kg.C/head-day. The  $C_{\text{input}}$  different contents per unit between producers and energy sectors from the dairy farms and dairy farm co-operatives are shown in Figure 5. And the Figure 5. showed the C emitted in faeces form and C emission different contents per unit between dairy cows and energy sectors.




Fig. 5. The carbon different contents are generated from  $C_{\text{input}}$ , C emitted, C fixation and C emission of dairy cows and energy sector

Figure 6 shows the conclusion of the study carbon budget of dairy cows, dairy farms and dairy farm co-operatives during milk production in the Nakhon Ratchasima Province.




Fig. 6. The carbon contents are generated from  $C_{\text{input}}$ , C emitted, C fixation and C emission of dairy cows and energy sectors

The results showed that the efficiency of dairy cows in transferring carbon from producers and fixed in milk was

10.33%. Also the ratio of C emission factor emitted to carbon contents was changed from producers and energy sectors of dairy production was 0.427 and the ratio of carbon contents were emitted to carbon contents were fixed in milk and the growth of dairy cow was 0.757.

The results also showed that the changing carbon contents emitted and milk obtained from a dairy cow per day can forecast the future trends in the net carbon emission per year from dairy farms and dairy farm co-operatives and the decreasing trend of milk production per head per day from the dairy cows in Nakhon Ratchasima province by using the equations as follow:  $Y = 2 \times 10^6 X - 4 \times 10^9$  ( $R^2 = 0.8969$ ) and  $Y = -0.1934X + 399.39$  ( $R^2 = 0.8748$ ), respectively.

#### ACKNOWLEDGMENT

The researchers acknowledge the centre for Scientific and Technological Equipment, Suranaree University of Technology for providing laboratory analyses. This work received financial support from Vongchavalitkul University and National Research Council of Thailand. The researchers acknowledge critical and helpful comments by Professor B.R. Watkin, Professor Emeritus, Massey University, New Zealand.

#### REFERENCES

- [1] APHA, AWWA, WEF. 1992. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. 18<sup>th</sup> Edition. Wash. D.C., USA: American Public Health Association.
- [2] Cavana, R. Y.; Delahaye, B. L.; and Sekaran, U. 2000. *Applied Business Research: Qualitative and Quantitative Methods*. New York: John Wiley and Sons.
- [3] Center for Agricultural Information, Office of Agricultural Economics. 2004. *Agricultural Statistics of Thailand 2004*. Agricultural Statistics No.410. Ministry of Agriculture and Co-operatives. Bangkok.
- [4] Department of Livestock Development. (2005). *Livestock Statistics Data*. [On-line]. Available: <http://www.dld.go.th/index.html>
- [5] Intergovernmental Panel on Climate Change. 1995. *Climate Change 1995, The Science of Climate Change*. Contribution of Working Group I to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, U.K.: Press Syndicate of the University of Cambridge.
- [6] Jintavaet, U. 2004. *Carbon Collection*. Faculty of Agriculture. Chiangmai University.
- [7] Lauhajinda, N. 2006. *Ecology: Fundamentals of Environmental*. 2<sup>nd</sup> ed. Bangkok: Kasetsart University.
- [8] Manlay, Raphaël J.; Ickowicz, Alexandre; Masse, Dominique; Floret, Christian; Richard, Didier; and Feller, Christian. 2004. Spatial carbon, nitrogen and phosphorus budget of a village in the West African savanna-I. Element pools and structure of a mixed-farming system. *Agricultural Systems*. (79): 55-81.
- [9] Manlay, Raphaël J.; Ickowicz, Alexandre; Masse, Dominique; Feller, Christian; and Richard, Didier. 2004. Spatial carbon, nitrogen and phosphorus budget in a village of the West African savanna-II. Element flows and functioning of a mixed-farming system. *Agricultural Systems*. (79): 83-107.

- [10] UNECE TFEIP. (2004). *Task Force on Emission Inventories and Projections*. [On-line]. Available: <http://tfeip-secretariat.org/unece.htm>
- [11] van Noordwijk, M.; Cerri, C.; Woomer, P. L.; Nugroho, K.; and Bernoux, M. 1997. Soil carbon dynamics in the humid tropical forest zone. *Geoderma*. (79): 187-225.
- [12] van Noordwijk, M.; Murdiyarso, D.; Hairiah, K.; Wasrin, U. R.; Rachman, A.; and Tomich, T. P. 1998. Forest soil under alternatives to slash and burn agriculture in Sumatra, Indonesia. In A. Schulte and D. Ruhiyat (eds.). *Soils of Tropical Forest Ecosystems: Characteristics, Ecology and Management*. (pp175-185). Berlin: Springer-Verlag.
- [13] Yamane, Taro. 1973. *Mathematics for Economists: An Elementary Survey*. 2<sup>nd</sup> ed. New Delhi: Prentice-Hall.

## COMPARISON OF CARBON MASSFLOW AND EMISSION FACTORS FROM OX AND BUFFALO FARMS IN MEAT PRODUCTION

Nathawut Thanee  
Wut Dankittikul  
Prayong Keeratiurai  
Suranaree University of Technology, Thailand.

### Abstract

The carbon budget of oxen and buffaloes during meat production were studied to develop carbon emission factors from ox and buffalo farms, to investigate the rate of carbon fixation by plants and their transfer to oxen and buffaloes in food chain and to study the carbon content changing in energy patterns from electric energy and petrol that were used in meat production in Nakhon Ratchasima province. The study showed that the carbon emission factors per unit from ox and buffalo farms and slaughterhouses in ox and buffalo meat production were 2.00 and 2.32 kg.C/head/day, respectively. The carbon fixation factor in meat and organs, of oxen and buffaloes were 3.09 and 4.72 kg.C/head/day, respectively and the rate of carbon massflow from grass and energy used for electricity, and petroleum of oxen and buffaloes were 5.15 and 7.10 kg.C/head/day, respectively. This study also showed the ratio of the carbon fixation in ox or buffalo meat and organs to the sum of carbon contents in grass, that humans cannot use the carbon in grass but herbivores can, and carbon contents from electric energy and petrol used in ox and buffalo meat production were 0.60 and 0.66, respectively. The ratio of total carbon emitted per unit to total carbon contents per unit in grass and energy used in ox and buffalo meat production were 0.39 and 0.33, respectively. The ratio of total carbon emitted per day to carbon fixation per day in meat and organs of an ox and a buffalo was 0.65 and 0.49, respectively. Ox production produced more environmentally harmful carbon than buffalo production. The carbon contents changing emitted in meat production in ton C. per year from ox and buffalo farms and slaughterhouses in Nakhon Ratchasima province can be predicted by using the equation as follow;  $C\text{-emission}_{\text{oxen}} = 10054(\text{year})^2 - 4 \times 10^7(\text{year}) + 4 \times 10^{10}$  ( $R^2 = 0.9528$ ) and  $C\text{-emission}_{\text{buffaloes}} = 72.28(\text{year})^2 - 288042(\text{year}) + 3 \times 10^8$  ( $R^2 = 0.9522$ ). The results also showed that the ratio of  $\text{CH}_4 : \text{CO}_2$  emitted from faeces, enteric fermentation and respiration of ox was 1.48 times higher than the value from buffalo. For the same quantity of meat production it can be suggested that decreasing ox meat production and increasing buffalo meat production can decrease of the environmental problems.

**Keywords** - carbon massflow, carbon emission, meat production, ox, buffalo

Nathawut Thanee: School of Biology, Institute of Science, Suranaree University of Technology, 111 University Avenue, Suranaree, Muang, Nakhon Ratchasima Province 30000, Thailand (corresponding author) phone: 66-4422-4192; Fax:66-4422-4633; e-mail: [biology@sut.ac.th](mailto:biology@sut.ac.th)

Wut Dankittikul: School of Environmental Engineering, Institute of Engineering, Suranaree University of Technology, 111 University Avenue, Suranaree, Muang, Nakhon Ratchasima Province 30000, Thailand, phone: 66-4422-4218; e-mail: [wut@sut.ac.th](mailto:wut@sut.ac.th)

Prayong Keeratiurai: School of Environmental Engineering, Institute of Engineering, Suranaree University of Technology, 111 University Avenue, Suranaree, Muang, Nakhon Ratchasima Province 30000, Thailand, phone: 0-8147-0018-5; e-mail: [prayong\\_kee@hotmail.com](mailto:prayong_kee@hotmail.com)

### 1. INTRODUCTION

One of the environmental threats that our planet faces today is the long-term change in Earth's climate and temperature patterns due to global climate change, or the greenhouse effect. CO<sub>2</sub> and CH<sub>4</sub> from human activities are the most important greenhouse gases that are contributing to global climate change [5]. CH<sub>4</sub> is 23 times more potent a greenhouse gas than CO<sub>2</sub> [6]. Ox and buffalo are herbivores that are raised for their meat, however, production of ox and buffalo produce emission of both CO<sub>2</sub> and CH<sub>4</sub>.

Carbon is an important element for humans because it is the primary element of both plants and animals and it cycles through living and non-living components [8]. One product of carbon fixation is the protein in meat and animal products. The focus of this study is carbon which is transferred to the food chain and fixed in meat. The net carbon production is the rate at which carbon is fixed during growth. The net carbon production can be used to explain the time averaged C stocks by carbon weight per time [11], [12]. Therefore it is important to study and understand the relationship between the carbon emissions and carbon transfer to herbivores' energy use for meat production.

### 2. METHODS

#### Objectives of Study

The primary objective of this study was to develop carbon emission factors for ox and buffalo farms. To accomplish this we studied the rate of carbon fixation by plants which is then transferred to ox and buffalo, and the included the carbon emissions from electricity and petroleum used during meat production in Nakhon Ratchasima.

#### Study Area

We studied ox and buffalo farms and slaughterhouses, in 32 districts of Nakhon Ratchasima province (Figures 1 and 2, respectively). Nakhon Ratchasima province has an agricultural area of 12,469.46 square kilometers which is the largest area of ox and buffalo farms in Thailand [3].



Figure 1. Ox farm areas in Nakhon Ratchasima province [4]






Figure 2. Buffalo farm areas in Nakhon Ratchasima province [4]

### *Size of Samples, Site Sampling Methods and Analytical Methods*

The numbers of farms, oxen and buffaloes in each district were calculated by determining the number of ox and buffalo farms and the number of oxen and buffaloes in the province [2], [13]. The sampling numbers were 398 ox farms, 390 buffalo farms, 17 slaughterhouses, 400 oxen, and 398 buffaloes. Grass and food for oxen and buffaloes, meat and faeces of oxen and buffaloes were collected and transferred to the laboratory at Suranaree University of Technology. The analytical methods were shown in Table 1.

Table 1. Methods for property analysis of animal food, meat, entrails, gases, and faeces from oxen and buffaloes

Properties	Analytical methods	References
Moisture content	By weighing sample after oven drying at 103-105 °C for 24 hours	Manlay et al. (2004)
Carbon content (C)	By CNS-2000 ELEMENTAL ANALYZER and GAS ANALYZER	Manlay et al. (2004)
Volatile & fixed solids	By weighing the known weight of the sample after burning at 550 °C for 30 minutes	APHA, AWWA, WEF. (1992)

## 3. RESULTS AND DISCUSSION

### *The Rate of Change in Carbon Contents and the C Emission Factors*

This study determined that the rate of carbon massflow from grass for feeding to the biomass and faeces of oxen and buffaloes ( $C_{input}$ ). The rate of transference of carbon contents from plants to ox and buffalo were  $4.46 \pm 1.93$  and  $6.51 \pm 3.14$  kg.C/head/day, (average  $\pm$  standard deviation) respectively (Table 2). Table 2 shows the carbon fixation factors of ox and buffalo were  $3.09 \pm 1.97$  and  $4.72 \pm 3.14$  kg.C/head/day, respectively. Carbon contents were calculated by mass balance. The transference of carbon contents ( $C_{input}$ ) minus the carbon contents emitted in faeces, enteric fermentation, and respiration ( $C_{emitted}$ ) were the carbon mass fixed in the body ( $C_{fixation}$ ). The carbon emission factors for ox and buffalo were  $1.38 \pm 0.36$  and  $1.80 \pm 0.51$  kg.C/head/day, respectively.

**Table 2. The average of  $C_{input}$ ,  $C_{fixation}$ ,  $C_{emitted}$ ,  $C_{output}$ , and  $C_{emission}$  of CO, CO<sub>2</sub> and CH<sub>4</sub> from ox and buffalo in farms**

Kind of Animal	$C_{input}$ (transferred from plant by feeding) (kg C/head/day)	$C_{fixation}$ (mass balance) (kg C/head/day)				$C_{emitted}$ (kg C/head/day)			
		Total $C_{fixation}$	Meat	Entrails	Bone, skin, blood and etc.	Total $C_{emitted}$ from animal	Dried Faeces	$C_{emission}$ of CO, CO <sub>2</sub> and CH <sub>4</sub> gases	
								Faeces	Enteric fermentation and respiration
Ox	4.46 ± 1.93	3.09 ± 1.97	1.44	0.26	1.39	1.38 ± 0.36	0.89 ± 0.31	0.01 ± 0.01	0.47 ± 0.19
Buffalo	6.51 ± 3.14	4.72 ± 3.14	1.64	0.39	2.69	1.80 ± 0.51	1.12 ± 0.44	0.02 ± 0.01	0.66 ± 0.28

**Table 3. The percentage ratio of meat and entrails of ox and buffalo that were killed in slaughterhouses**

Kind of Animal	Weight before killing (kg/head)	Ratio of meat to weight before killing (%)	Ratio of entrails to weight before killing (%)	Ratio of skin, blood, bone, and etc. to weight before killing (%)
Ox	268.74±101.38	46.55±11.96	8.52±2.61	44.93
Buffalo	337.73±66.91	34.65±7.14	8.32±1.06	57.03

Table 2 also shows the ratio of  $C_{emitted}$  per day from ox and buffalo to  $C_{input}$  per day of ox and buffalo by feeding were 30.94% and 27.65%, respectively. This ratio of  $C_{emitted}$  to  $C_{input}$  shows the contribution to global climate changes from buffalo is lower than for ox. Table 3 shows the ratio of meat, entrails, skin, blood, and bone to weight of ox and buffalo that were killed in slaughterhouses. The CO, CO<sub>2</sub>, and CH<sub>4</sub> gases which were emitted from faeces, enteric fermentation and respiration of ox and buffalo are shown in Table 4.

**Table 4. The average of CO, CH<sub>4</sub>, and CO<sub>2</sub> gases from ox and buffalo in farms in Nakhon Ratchasima province**

Kind of Animal	Average of gases	CO (kg/head/day)	CH <sub>4</sub> (kg/head/day)	CO <sub>2</sub> (kg/head/day)
Ox	Faeces	0.000 ± 0.000	0.004 ± 0.002	0.031 ± 0.015
	Enteric fermentation and respiration	0.001 ± 0.001	0.104 ± 0.063	1.440 ± 0.618
Buffalo	Faeces	0.000 ± 0.000	0.005 ± 0.003	0.062 ± 0.035
	Enteric fermentation and respiration	0.001 ± 0.001	0.127 ± 0.068	2.069 ± 0.942

Figures 3 and 4 show the percentages of CH<sub>4</sub> and CO<sub>2</sub> emitted from ox and buffalo. Comparison of the ratio of CH<sub>4</sub> to CO<sub>2</sub> emitted from ox was 1.48 times greater than the value for buffalo. Therefore ox was contributing more global climate change than buffalo.

## c Greenhouse Gas Emissions from Faeces




Figure 3. The percentages of CO, CH<sub>4</sub>, and CO<sub>2</sub> gases from faeces of ox and buffalo

## G Greenhouse Gas Emissions from Enteric Fermentation and Respiration




Figure 4. The percentages of CO, CH<sub>4</sub>, and CO<sub>2</sub> gases from enteric fermentation and respiration of ox and buffalo

Figures 5 and 6 show the ratio of the carbon contents transferred to ox and buffalo by feeding. The carbon mass fixed in the biomass of ox and buffalo were 69.18% and 72.38%, respectively, and emitted from faeces, enteric fermentation and respiration of ox and buffalo were 30.82% and 27.62%, respectively. Carbon emissions which contribute to environmental problems that buffalo encourage global climate change lower than ox because buffalo fixed the carbon contents in its body more efficiently than ox.




Figure 5. The percentages of carbon contents were transferred from grass to ox's parts




Figure 6. The percentages of carbon contents were transferred from grass to buffalo's parts

### *Carbon Contents of Energy Sectors for Meat Production*


The ox and buffalo farms in Nakhon Ratchasima province used little energy for feeding. The first sector was electric light energy. The second sector was petrol used for animal transport. The third sector was petroleum for cutting grass and transferring it to farms for feeding. The  $C_{input}$  and  $C_{emission}$  per unit of all 3 energy sectors at ox farms were  $0.12 \pm 0.16$  and  $0.10 \pm 0.14$  kg.C/head/day, respectively. The  $C_{input}$  and  $C_{emission}$  per unit of all 3 energy sectors at buffalo farms were  $0.10 \pm 0.19$  and  $0.08 \pm 0.16$  kg.C/head/day, respectively. On the other hand, the slaughterhouses in Nakhon Ratchasima used energy for electric light and delivering meat from slaughterhouses to markets with  $C_{input}$  and  $C_{emission}$  per unit of energy used by slaughterhouses for ox meat production were  $0.57 \pm 0.47$  and  $0.52 \pm 0.44$  kg.C/head/day, respectively. The  $C_{input}$  and  $C_{emission}$  per unit of energy used for buffalo meat production by slaughterhouses were  $0.49 \pm 0.47$  and  $0.44 \pm 0.40$  kg.C/head/day, respectively. The result of carbon contents per unit in meat production are shown in Table 5.

**Table 5. The average of  $C_{input}$  and  $C_{emission}$  from energy sectors of ox and buffalo farms and slaughterhouses**

Average carbon contents from energy sectors (kg.C/head/day)		$C_{input}$		$C_{emission}$	
		Ox	Buffalo	Ox	Buffalo
Farms	Electricity	0.00 ± 0.01	0.00 ± 0.00	0.00 ± 0.01	0.00 ± 0.00
	Transportation energy	0.00 ± 0.00	0.01 ± 0.01	0.00 ± 0.00	0.01 ± 0.01
	Engine energy	0.11 ± 0.16	0.09 ± 0.19	0.09 ± 0.13	0.07 ± 0.16
	Total carbon contents	0.12 ± 0.16	0.10 ± 0.19	0.10 ± 0.14	0.08 ± 0.16
Slaughterhouses	Electricity	0.22 ± 0.37	0.12 ± 0.04	0.22 ± 0.37	0.12 ± 0.04
	Transportation energy	0.35 ± 0.30	0.38 ± 0.46	0.30 ± 0.26	0.32 ± 0.39
	Total carbon contents	0.57 ± 0.47	0.49 ± 0.47	0.52 ± 0.44	0.44 ± 0.40
Total carbon contents of farms and slaughterhouses		0.69	0.59	0.62	0.52

***Carbon Contents and Physical Properties of Animal Food, Meat, Entrails, and Faeces from Ox and Buffalo***

The weight measurements of ox and buffalo at farms found that oxen were 61 - 608 kg/head at 0.17 - 14.84 years old and buffaloes were 63 - 861 kg/head at 0.17 - 20 years old. Figure 7 showed the relation of the weight of oxen and buffaloes with age that the equation as follow:  $weight_{ox} = 93.231 \ln(age_{ox}) + 239.87$  ( $R^2 = 0.7223$ ) and  $weight_{buffalo} = 154.8 \ln(age_{buffalo}) + 254.4$  ( $R^2 = 0.6904$ ). They showed that oxen fixed carbon contents more than buffaloes in first year but buffaloes fixed carbon more than oxen after one year of age.



**Figure 7. The relation of ox and buffalo weights with their age**

Table 6 shows the average weights for animal food, faeces and animals at farms. The ratio of ox's faeces weight to ox weight and the ratio of buffalo's faeces weight to buffalo weight were 4.72% and 4.56%, respectively.

The percentages of moisture, total solids, volatile solids, ash, and carbon contents of animal food, meat, entrails, and faeces are shown in Table 7. The percentages of carbon contents of buffalo's faeces were 30.14% lower than the value of ox's faeces that were 33.47%. This percentages of carbon contents from faeces, entrails, and meat showed that buffalo fixed carbon in its body more efficiently than ox.

**Table 6. The average weight of oxen and buffaloes, faeces, and animal food from farms in Nakhon Ratchasima**

Kind of Animal	Animal weights (kg/head)	Faeces weights (kg/head/day)	Animal food weights (kg/head/day)
Ox	302.25 ± 100.72	14.27 ± 4.94	11.06 ± 5.07
Buffalo	456.10 ± 134.38	20.79 ± 8.08	16.01 ± 7.77

**Table 7. Physical properties, carbon contents, and the ratio of the carbon contents to volatile solids of animal food, meat, entrails, and faeces from ox and buffalo farms**

Type	Moisture (%)	Total solids (%)	Volatile solids (%)	Ash (%)	Carbon contents (%)	Ratio of Carbon contents to Volatile solids
Grass	76.64 ± 7.99	23.36 ± 7.99	75.20 ± 3.45	24.80 ± 3.45	40.42 ± 1.33	0.54
Rice straw	7.79 ± 1.39	92.21 ± 1.39	70.91 ± 1.53	29.09 ± 1.53	40.05 ± 1.54	0.56
Ox meat	73.05 ± 5.59	26.95 ± 5.59	83.34 ± 4.20	16.65 ± 4.20	58.99 ± 0.25	0.71
Ox's faeces	81.12 ± 3.78	18.88 ± 3.78	62.18 ± 10.48	37.82 ± 10.48	33.47 ± 5.08	0.54
Ox's entrails	80.44 ± 3.44	19.56 ± 3.44	85.24 ± 1.79	14.76 ± 1.79	56.02 ± 6.45	0.66
Buffalo meat	76.71 ± 1.85	23.29 ± 1.85	86.61 ± 3.29	13.39 ± 3.29	68.67 ± 0.21	0.79
Buffalo's faeces	81.98 ± 4.42	18.02 ± 4.42	54.45 ± 11.23	45.55 ± 11.23	30.14 ± 6.07	0.55
Buffalo's entrails	79.46 ± 3.28	20.54 ± 3.28	85.70 ± 2.05	14.30 ± 2.05	63.61 ± 9.36	0.74

\*The average of each entrails of ox and buffalo

### ***Forecasting Trends of Carbon Emission from Meat Production***

The future trend of carbon emissions from meat production at ox and buffalo farms and slaughterhouses is shown in Figure 8. The graph predicts from carbon emissions from ox meat production to be 2.00 kg.C/head/day or 0.73 Ton C./head/year and buffalo meat production to be 2.32 kg.C/head/day or 0.85 Ton C./head/year, respectively. These values are based on oxen and buffaloes statistics for 2000 - 2006 in Nakhon Ratchasima province.




Figure 8. The future trend of carbon contents emitted from oxen and buffaloes meat production in Nakhon Ratchasima

4. CONCLUSION

The study showed that carbon emission factors for ox and buffalo farms, and slaughterhouses were 2.00 and 2.32 kg.C/head/day, respectively. Buffalo emitted more carbon than ox but the carbon contents per unit in the energy sectors for buffalo meat production were lower than the values for ox meat production. The ratio of CH<sub>4</sub> : CO<sub>2</sub> emitted from faeces, enteric fermentation and respiration of ox was 1.48 times greater than the value for buffalo. Carbon fixation factors in meat and organs of ox and buffalo were 3.09 and 4.72 kg C./head/day, respectively. Carbon content values were calculated by mass balance. The rate of carbon massflow from grass, and energy used in transportation and killing ox and buffalo were 5.15 and 7.10 kg.C/head/day, respectively. The conclusion of the carbon massflow from oxen and buffaloes is shown in Figures 9 and 10, respectively. The comparison of C<sub>input</sub> and C<sub>emission</sub> from energy sectors, C<sub>input</sub> from plant by feeding, C<sub>output</sub> and C<sub>emission</sub> (gases) from animals, and the different carbon contents per unit between C<sub>output</sub> from the faeces and C<sub>fixation</sub> of ox and buffalo are shown in Figure 11. Figure 11 showed the differences between carbon contents transferred to animals by feeding and from animals to environment and carbon contents from energy used in electricity and petrol. The results showed that the carbon contents in energy pattern are less important for meat production.




Figure 9. The conclusion of carbon mass balance for ox meat production




Figure 10. The conclusion of carbon mass balance for buffalo meat production




Figure 11. The comparison of the different carbon contents in each pattern of meat production

Furthermore, this study showed the ratio of the carbon fixed in meat and organs to the sum of carbon contents in grass, that humans cannot use but are useful for herbivores feed, and carbon contents in electricity and petrol used were 0.60 and 0.66, respectively. The ratio of the total carbon emitted per unit to the total carbon contents per unit in grass and energy used for meat production were 0.39 and 0.33, respectively. The ratio of the total carbon emitted per unit to the carbon fixation of ox and buffalo were 0.65 and 0.49, respectively. The results showed that the carbon contents emitted from ox increases environmental problems more than buffalo (Table 8).

Table 8. The ratio of  $C_{input}(plant+energy)$ ,  $C_{fixation}$ ,  $C_{emitted}(animal+energy)$  from meat production

Kind of Animal	$C_{input}(plant+energy)$ (kg.C/head/day)	$C_{emitted}(animal+energy)$ (kg.C/head/day)	Ratio of $C_{meat}/C_{plant}$	Ratio of $C_{fixation}/C_{input}$	Ratio of $C_{emitted}/C_{input}$	Ratio of $C_{emitted}/C_{fixation}$
Ox	5.15	2.0	0.32	0.60	0.39	0.65
Buffalo	7.10	2.32	0.25	0.66	0.33	0.49



The results also showed that the changing of carbon contents emitted in meat production can predict future trends in net carbon emission per year from ox and buffalo farms and slaughterhouses in Nakhon Ratchasima province by using the following equation;  $C\text{-emission}_{\text{ox}} = 10054(\text{year})^2 - 4 \times 10^7(\text{year}) + 4 \times 10^{10}$  ( $R^2 = 0.9528$ ) and  $C\text{-emission}_{\text{buffalo}} = 72.28(\text{year})^2 - 288042(\text{year}) + 3 \times 10^8$  ( $R^2 = 0.9522$ ). Environmental problems could be decreased by decreasing ox meat production and increasing buffalo meat production.

#### ACKNOWLEDGMENT

The researchers acknowledge the Centre for Scientific and Technological Equipment, Suranaree University of Technology for providing laboratory analyses. This work received financial support from National Research Council of Thailand. We thank our advisor, teacher, consulting person and our families for critical and helpful comments to this project.

#### REFERENCES

- [1] APHA, AWWA, WEF. 1992. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. 18<sup>th</sup> Edition. Wash. D.C., USA: American Public Health Association.
- [2] Cavana, R. Y.; Delahaye, B. L.; and Sekaran, U. 2000. *Applied Business Research: Qualitative and Quantitative Methods*. New York: John Wiley and Sons.
- [3] Center for Agricultural Information, Office of Agricultural Economics. 2004. *Agricultural Statistics of Thailand 2004*. Agricultural Statistics No.410. Ministry of Agriculture and Co-operatives. Bangkok.
- [4] Department of Livestock Development. (2005). *Livestock Statistics Data*. [On-line]. Available: <http://www.dld.go.th/index.html>
- [5] Intergovernmental Panel on Climate Change. 1995. *Climate Change 1995, The Science of Climate Change*. Contribution of Working Group I to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, U.K.: Press Syndicate of the University of Cambridge.
- [6] Intergovernmental Panel on Climate Change. 2001. *Climate Change 2001, The Scientific Basis*. The Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, U.K.: Press Syndicate of the University of Cambridge.
- [7] Jintavaet, U. 2004. *Carbon Collection*. Faculty of Agriculture. Chiangmai University.
- [8] Lauhajinda, N. 2006. *Ecology: Fundamentals of Environmental*. 2<sup>nd</sup> ed. Bangkok: Kasetsart University.
- [9] Manlay, Raphaël J.; Ickowicz, Alexandre; Masse, Dominique; Floret, Christian; Richard, Didier; and Feller, Christian. 2004. Spatial carbon, nitrogen and phosphorus budget of a village in the West African savanna-I. Element pools and structure of a mixed-farming system. *Agricultural Systems*. (79): 55-81.
- [10] Manlay, Raphaël J.; Ickowicz, Alexandre; Masse, Dominique; Feller, Christian; and Richard, Didier. 2004. Spatial carbon, nitrogen and phosphorus budget in a village of the West African savanna-II. Element flows and functioning of a mixed-farming system. *Agricultural Systems*. (79): 83-107.
- [11] van Noordwijk, M.; Cerri, C.; Wooster, P. L.; Nugroho, K.; and Bernoux, M. 1997. Soil carbon dynamics in the humid tropical forest zone. *Geoderma*. (79): 187-225.
- [12] van Noordwijk, M.; Murdiyarso, D.; Hairiah, K.; Wasrin, U. R.; Rachman, A.; and Tomich, T. P. 1998. Forest soil under alternatives to slash and burn agriculture in Sumatra, Indonesia. In A. Schulte and D. Ruhayat (eds.). *Soils of Tropical Forest Ecosystems: Characteristics, Ecology and Management*. (pp175-185). Berlin: Springer-Verlag.
- [13] Yamane, Taro. 1973. *Mathematics for Economists: An Elementary Survey*. 2<sup>nd</sup> ed. New Delhi: Prentice-Hall.



www.serd.ait.ac.th/eric

## Comparison of Carbon Emission Factors from Ox and Buffalo Farms and Slaughterhouses in Meat Production

Nathawut Thanee\*<sup>1</sup>, Wut Dankittikul<sup>†</sup>, and Prayong Keeratiurai<sup>‡</sup>



**Abstract** – The carbon budget of oxen and buffaloes during meat production were studied to develop carbon emission factors from ox and buffalo farms, to investigate the rate of carbon fixation and their transfer to oxen and buffaloes in food chain and to study the carbon content changing in energy patterns from electric energy and petrol that were used in meat production in Nakhon Ratchasima province. The study showed that the carbon emission factors per unit from ox and buffalo farms and slaughterhouses in ox and buffalo meat production were 2.00 and 2.32 kg C/head/day, respectively. The carbon fixation factor in meat and organs, of oxen and buffaloes were 3.09 and 4.72 kg C/head/day, respectively and the rate of carbon massflow from grass and energy used for electricity, and petroleum of oxen and buffaloes were 5.15 and 7.10 kg C/head/day, respectively. This study also showed the ratio of the carbon fixation in ox or buffalo meat and organs to the sum of carbon contents in grass, humans cannot use the carbon in grass but herbivores can, and carbon contents from electric energy and petrol used in ox and buffalo meat production were 0.60 and 0.66, respectively. The ratio of total carbon emitted per unit to total carbon contents per unit in grass and energy used in ox and buffalo meat production were 0.39 and 0.33, respectively. The ratio of total carbon emitted per day to carbon fixation per day in meat and organs of an ox and a buffalo was 0.65 and 0.49, respectively. Ox production produced more environmentally harmful carbon than buffalo production. The carbon contents changing emitted in meat production in ton C. per year from ox and buffalo farms and slaughterhouses in Nakhon Ratchasima province can be predicted by using the equation as follow;  $C\text{-emission}_{\text{oxen}} = 10054(\text{year})^2 - 4 \times 10^7(\text{year}) + 4 \times 10^{10}$  ( $R^2 = 0.9528$ ) and  $C\text{-emission}_{\text{buffaloes}} = 72.357(\text{year})^2 - 288350(\text{year}) + 3 \times 10^6$  ( $R^2 = 0.9522$ ). The results also showed that the ratio of  $\text{CH}_4$  :  $\text{CO}_2$  emitted from faeces, enteric fermentation and respiration of ox was 1.48 times higher than the value from buffalo. For the same quantity of meat production it can be suggested that decreasing ox meat production and increasing buffalo meat production can decrease of the environmental problems.

**Keywords** – Carbon massflow, carbon emission, meat production, ox, buffalo.

### 1. INTRODUCTION

One of the environmental threats that our planet faces today is the long-term change in Earth's climate and temperature patterns due to global climate change, or the greenhouse effect.  $\text{CO}_2$  and  $\text{CH}_4$  from human activities are the most important greenhouse gases that are contributing to global climate change [1].  $\text{CH}_4$  is 23 times more potent a greenhouse gas than  $\text{CO}_2$  [2]. Ox and buffalo are herbivores that are raised for their meat, however, production of ox and buffalo produce emission of both  $\text{CO}_2$  and  $\text{CH}_4$ .

Carbon is an important element for humans because it is the primary element of both plants and animals and it cycles through living and non-living

components [3]. One product of carbon fixation is the protein in meat and animal products. The focus of this study is carbon which is transferred to the food chain and fixed in meat. The net carbon production is the rate at which carbon is fixed during growth. The net carbon production can be used to explain the time averaged C stocks by carbon weight per time [4], [5]. Therefore it is important to study and understand the relationship between the carbon emissions and carbon transfer to herbivores' energy use for meat production.

### 2. METHODS

#### Objectives of Study

The primary objective of this study was to develop carbon emission factors for ox and buffalo farms. To accomplish this we studied the rate of carbon fixation which is transferred to ox and buffalo, and the included the carbon emissions from electricity and petroleum used during meat production in Nakhon Ratchasima.

#### Study Area

We studied ox and buffalo farms and slaughterhouses, in 32 districts of Nakhon Ratchasima province (Figures 1 and 2, respectively). Nakhon Ratchasima province has an agricultural area of 12,469.46 square kilometers which is the largest area of ox and buffalo farms in Thailand [6].

\* School of Biology, Institute of Science, Suranaree University of Technology, 111 University Avenue, Suranaree, Muang, Nakhon Ratchasima Province 30000, Thailand.

<sup>†</sup> School of Environmental Engineering, Institute of Engineering, Suranaree University of Technology, 111 University Avenue, Suranaree, Muang, Nakhon Ratchasima Province 30000, Thailand, phone: 66-4422-4218. E-mail: [wut@sut.ac.th](mailto:wut@sut.ac.th)

<sup>‡</sup> School of Environmental Engineering, Institute of Engineering, Suranaree University of Technology, 111 University Avenue, Suranaree, Muang, Nakhon Ratchasima Province 30000, Thailand, phone: 0-8147-0018-5. E-mail: [prayong\\_kee@hotmail.com](mailto:prayong_kee@hotmail.com)

<sup>1</sup> Corresponding author;  
Tel: 66-4422-4192, Fax: 66-4422-4633  
E-mail: [biology@sut.ac.th](mailto:biology@sut.ac.th)




Fig. 1. Ox farm areas in Nakhon Ratchasima province [7]




Fig. 2. Buffalo farm areas in Nakhon Ratchasima province [7]

**Size of Samples, Site Sampling Methods and Analytical Methods**

The numbers of farms, oxen and buffaloes in each district were calculated by determining the number of ox and buffalo farms and the number of oxen and buffaloes in the province [8], [9]. The sampling numbers were 398 ox farms, 390 buffalo farms, 17 slaughterhouses, 400 oxen, and 398 buffaloes. Grass and food for oxen and buffaloes, meat and faeces of oxen and buffaloes were collected and transferred to the laboratory at Suranaree University of Technology. The analytical methods were shown in Table 1.

**Table 1. Methods for property analysis of animal food, meat, entrails, gases, and faeces from animals**

Properties	Analytical methods
Moisture content	By weighing sample after oven drying at 103-105 °C for 24 hours [10], [11]
Carbon content (C)	By CNS-2000 ELEMENTAL ANALYZER and GAS ANALYZER [10], [11]
Volatile & fixed solids	By weighing the known weight of the sample after burning at 550 °C for 30 minutes [12]

### 3. RESULTS AND DISCUSSION

#### The Rate of Change in Carbon Contents and the C Emission Factors

This study determined that the rate of carbon massflow from grass for feeding to the biomass and faeces of oxen and buffaloes ( $C_{input}$ ). The rate of transference of carbon contents from plants to ox and buffalo were  $4.46 \pm 1.93$  and  $6.51 \pm 3.14$  kg.C/head/day, (average  $\pm$  standard deviation) respectively (Table 2). Table 2 shows the carbon fixation factors of ox and buffalo were  $3.09 \pm 1.97$  and  $4.72 \pm 3.14$  kg.C/head/day, respectively.

Carbon contents were calculated by mass balance. The transference of carbon contents ( $C_{input}$ ) minus the carbon contents emitted in faeces, enteric fermentation, and respiration ( $C_{emitted}$ ) were the carbon mass fixed in the body ( $C_{fixation}$ ). The carbon emitted factors for ox and buffalo were  $1.38 \pm 0.36$  and  $1.80 \pm 0.51$  kg.C/head/day, respectively. Table 2 also shows the ratio of  $C_{emitted}$  per day from ox and buffalo to  $C_{input}$  per day of ox and buffalo by feeding were 30.94% and 27.65%, respectively. This ratio of  $C_{emitted}$  to  $C_{input}$  shows the contribution to global climate changes from buffalo is lower than for ox.

Table 2. The average of  $C_{input}$ ,  $C_{fixation}$ ,  $C_{emitted}$ ,  $C_{output}$ , and  $C_{emission}$  of CO, CO<sub>2</sub> and CH<sub>4</sub> from ox and buffalo

Kind of Animal		Ox	Buffalo
$C_{input}$ transferred from plant by feeding (kgC/head/day)		$4.46 \pm 1.93$	$6.51 \pm 3.14$
$C_{fixation}$ (massbalance) (kgC/head/day)	Meat	1.438	1.635
	Entrails	0.263	0.393
	Bone, skin, blood and etc.	1.389	2.692
Total $C_{fixation}$		$3.09 \pm 1.97$	$4.72 \pm 3.14$
Dried Faeces		$0.894 \pm 0.31$	$1.12 \pm 0.44$
$C_{emitted}$ (kgC/head/day)	Faeces	$0.011 \pm 0.005$	$0.021 \pm 0.012$
	Enteric fermentation and respiration	$0.471 \pm 0.188$	$0.66 \pm 0.277$
	Total $C_{emitted}$ from animal	$1.38 \pm 0.36$	$1.80 \pm 0.51$
$C_{emission}$ of CO, CO <sub>2</sub> and CH <sub>4</sub> gases			




Fig. 3. The percentages of CH<sub>4</sub>, and CO<sub>2</sub> gases from faeces of ox and buffalo




Fig. 4. The percentages of CH<sub>4</sub>, and CO<sub>2</sub> gases from enteric fermentation and respiration of ox and buffalo

Figures 3 and 4 show the percentages of CH<sub>4</sub> and CO<sub>2</sub> emitted from ox and buffalo. Comparison of the ratio of CH<sub>4</sub> to CO<sub>2</sub> emitted from ox was 1.48 times greater than the value for buffalo. Therefore ox was contributing more global climate change than buffalo.

CO<sub>2</sub>, and CH<sub>4</sub> gases which were emitted from faeces, enteric fermentation and respiration of ox and buffalo are shown in Table 3.

Table 3. The average of CH<sub>4</sub>, and CO<sub>2</sub> gases from ox and buffalo in farms in Nakhon Ratchasima province


Kind of Animal	Average of gases (kg/head/day)	CH <sub>4</sub>	CO <sub>2</sub>
Ox	Faeces	$0.00 \pm 0.00$	$0.03 \pm 0.01$
	Enteric fermentation and respiration	$0.10 \pm 0.06$	$1.44 \pm 0.62$
	Faeces	$0.01 \pm 0.00$	$0.06 \pm 0.03$
Buffalo	Enteric fermentation and respiration	$0.13 \pm 0.07$	$2.07 \pm 0.94$

Table 4 shows the ratio of meat, entrails, skin, blood, and bone to weight of ox and buffalo that were killed in slaughterhouses.


**Table 4. The percentage ratio of meat and entrails of ox and buffalo that were killed in slaughterhouses in Nakhon Ratchasima province**

Kind of Animal	Ox	Buffalo
Weight before killing (kg/head)	268.74 ± 101.38	337.73 ± 66.91
Ratio of meat to weight before killing (%)	46.55 ± 11.96	34.65 ± 7.14
Ratio of entrails to weight before killing (%)	8.52 ± 2.61	8.32 ± 1.06
Ratio of skin, blood, bone, and etc. to weight before killing (%)	44.93	57.03

Figures 5 and 6 show the ratio of the carbon contents transferred to ox and buffalo by feeding. The carbon mass fixed in the biomass of ox and buffalo were 69.18% and 72.38%, respectively, and emitted from faeces, enteric fermentation and respiration of ox and buffalo were 30.82% and 27.62%, respectively. Carbon emissions which contribute to environmental problems that buffalo encourage global climate change lower than ox because buffalo fixed the carbon contents in its body more efficiently than ox.



**Fig. 5. The percentages of carbon contents were transferred from grass to ox's parts**



**Fig. 6. The percentages of carbon contents were transferred from grass to buffalo's parts**

*International Conference on Energy Security and Climate Change: Issues, Strategies, and Options (ESCC 2008)*  
Sofitel Centara Grand, Bangkok, Thailand. 6-8 August 2008.

### **Carbon Contents of Energy Sectors for Meat Production**

The ox and buffalo farms in Nakhon Ratchasima province used little energy for feeding. The first sector was electric light energy. The second sector was petrol used for animal transport. The third sector was petroleum for cutting grass and transferring it to farms for feeding. The  $C_{input}$  and  $C_{emission}$  per unit of all 3 energy sectors at ox farms were  $0.12 \pm 0.16$  and  $0.10 \pm 0.14$  kg.C/head/day, respectively. The  $C_{input}$  and  $C_{emission}$  per unit of all 3 energy sectors at buffalo farms were  $0.10 \pm 0.19$  and  $0.08 \pm 0.16$  kg.C/head/day, respectively.

On the other hand, the slaughterhouses in Nakhon Ratchasima used energy for electric light and delivering meat from slaughterhouses to markets with  $C_{input}$  and  $C_{emission}$  per unit of energy used by slaughterhouses for ox meat production were  $0.57 \pm 0.47$  and  $0.52 \pm 0.44$  kg.C/head/day, respectively. The  $C_{input}$  and  $C_{emission}$  per unit of energy used for buffalo meat production by slaughterhouses were  $0.49 \pm 0.47$  and  $0.44 \pm 0.40$  kg.C/head/day, respectively. The result of carbon contents per unit in meat production are shown in Table 5.

**Table 5. The average of  $C_{input}$  and  $C_{emission}$  from energy sectors of ox and buffalo farms and slaughterhouses**

Average carbon contents from energy sectors (kg.C/head/day)		$C_{input}$		$C_{emission}$	
		Ox	Buffalo	Ox	Buffalo
Farms	Electricity	$0.00 \pm 0.01$	$0.00 \pm 0.00$	$0.00 \pm 0.01$	$0.00 \pm 0.00$
	Transportation energy	$0.00 \pm 0.00$	$0.01 \pm 0.01$	$0.00 \pm 0.00$	$0.01 \pm 0.01$
	Engine energy	$0.11 \pm 0.16$	$0.09 \pm 0.19$	$0.09 \pm 0.13$	$0.07 \pm 0.16$
	Total carbon contents	$0.12 \pm 0.16$	$0.10 \pm 0.19$	$0.10 \pm 0.14$	$0.08 \pm 0.16$
Slaughterhouses	Electricity	$0.22 \pm 0.37$	$0.12 \pm 0.04$	$0.22 \pm 0.37$	$0.12 \pm 0.04$
	Transportation energy	$0.35 \pm 0.30$	$0.38 \pm 0.46$	$0.30 \pm 0.26$	$0.32 \pm 0.39$
	Total carbon contents	$0.57 \pm 0.47$	$0.49 \pm 0.47$	$0.52 \pm 0.44$	$0.44 \pm 0.40$
Total carbon contents of farms and slaughterhouses		0.69	0.59	0.62	0.52

**Table 6. The average weight of oxen and buffaloes, faeces, and animal food from farms in Nakhon Ratchasima**

Kind of Animal	Animal weights	Faeces weights	Animal food weights
	(kg/head)	(kg/head/day)	(kg/head/day)
Ox	$302.25 \pm 100.72$	$14.27 \pm 4.94$	$11.06 \pm 5.07$
Buffalo	$456.10 \pm 134.38$	$20.79 \pm 8.08$	$16.01 \pm 7.77$

### **Carbon Contents and Physical Properties of Animal Food, Meat, Entrails, and Faeces from Ox and Buffalo**

The weight measurements of ox and buffalo at farms found that oxen were 61 - 608 kg/head at 0.17 - 14.84 years old and buffaloes were 63 - 861 kg/head at 0.17 - 20 years old. Figure 7 showed the relation of the weight of oxen and buffaloes with age that the equation as follow:  $weight_{ox} = 93.231 \ln(age_{ox}) + 239.87$  ( $R^2 = 0.7223$ ) and  $weight_{buffalo} = 154.8 \ln(age_{buffalo}) + 254.4$  ( $R^2 = 0.6904$ ). They showed that oxen fixed carbon contents more than buffaloes in first year but buffaloes fixed carbon more than oxen after one year of age.

Table 6 shows the average weights for animal food, faeces and animals at farms. The ratio of ox's

faeces weight to ox weight and the ratio of buffalo's faeces weight to buffalo weight were 4.72% and 4.56%, respectively.

The percentages of moisture, total solids, volatile solids, ash, and carbon contents of animal food, meat, entrails, and faeces are shown in Table 7. The percentages of carbon contents of buffalo's faeces were 30.14% lower than the value of ox's faeces that were 33.47%. This percentages of carbon contents from faeces, entrails, and meat showed that buffalo fixed carbon in its body more efficiently than ox.




Fig. 7. The relation of ox and buffalo weights with their age

Table 7. Physical properties, carbon contents, and the ratio of the carbon contents to volatile solids of animal food, meat, entrails, and faeces from ox and buffalo farms

Type	Moisture (%)	Total solids (%)	Volatile solids (%)	Ash (%)	Carbon contents (%)	Ratio of Carbon contents to Volatile solids
Grass	76.64 ± 7.99	23.36 ± 7.99	75.20 ± 3.45	24.80 ± 3.45	40.42 ± 1.33	0.54
Rice straw	7.79 ± 1.39	92.21 ± 1.39	70.91 ± 1.53	29.09 ± 1.53	40.05 ± 1.54	0.56
Ox meat	73.05 ± 5.59	26.95 ± 5.59	83.34 ± 4.20	16.65 ± 4.20	58.99 ± 0.25	0.71
Ox's faeces	81.12 ± 3.78	18.88 ± 3.78	62.18 ± 10.48	37.82 ± 10.48	33.47 ± 5.08	0.54
Ox's entrails	80.44 ± 3.44	19.56 ± 3.44	85.24 ± 1.79	14.76 ± 1.79	56.02 ± 6.45	0.66
Buffalo meat	76.71 ± 1.85	23.29 ± 1.85	86.61 ± 3.29	13.39 ± 3.29	68.67 ± 0.21	0.79
Buffalo's faeces	81.98 ± 4.42	18.02 ± 4.42	54.45 ± 11.23	45.55 ± 11.23	30.14 ± 6.07	0.55
Buffalo's entrails	79.46 ± 3.28	20.54 ± 3.28	85.70 ± 2.05	14.30 ± 2.05	63.61 ± 9.36	0.74

\*The average of each entrails of ox and buffalo

#### Forecasting Trends of Carbon Emission from Meat Production

The future trend of carbon emissions from meat production at ox and buffalo farms and slaughterhouses is shown in Figure 8. The graph predicts from carbon emissions from ox meat production to be 2.00 kg.C/head/day or 0.73 Ton C./head/year and buffalo meat production to be 2.32 kg.C/head/day or 0.85 Ton C./head/year, respectively. These values are based on oxen and buffaloes statistics for 2000 - 2006 in Nakhon Ratchasima province.

#### 4. CONCLUSION

The study showed that carbon emission factors for ox and buffalo farms, and slaughterhouses were 2.00 and 2.32 kg.C/head/day, respectively. Buffalo emitted more carbon than ox but the carbon contents per unit in the energy sectors for buffalo meat production were lower

than the values for ox meat production. The ratio of CH<sub>4</sub> : CO<sub>2</sub> emitted from faeces, enteric fermentation and respiration of ox was 1.48 times greater than the value for buffalo. Carbon fixation factors in meat and organs of ox and buffalo were 3.09 and 4.72 kg C./head/day, respectively. Carbon content values were calculated by mass balance. The rate of carbon massflow from grass, and energy used in transportation and killing ox and buffalo were 5.15 and 7.10 kg.C/head/day, respectively. The conclusion of the carbon massflow from oxen and buffaloes is shown in Figures 9 and 10, respectively. The comparison of C<sub>input</sub> and C<sub>emission</sub> from energy sectors, C<sub>input</sub> from plant by feeding, C<sub>output</sub> and C<sub>emission</sub> (gases) from animals, and the different carbon contents per unit between C<sub>output</sub> from the faeces and C<sub>fixation</sub> of ox and buffalo are shown in Figure 11. Figure 11 showed the differences between carbon contents transferred to animals by feeding and from animals to environment and carbon contents from energy used in

International Conference on Energy Security and Climate Change: Issues, Strategies, and Options (ESCC 2008)  
 Sofitel Centara Grand, Bangkok, Thailand. 6-8 August 2008.

electricity and petrol. The results showed that the carbon contents in energy pattern are less important for meat production.




Fig. 8. The future trend of carbon contents emitted from oxen and buffaloes meat production in Nakhon Ratchasima



Fig. 9. The conclusion of carbon mass balance for ox meat production




Fig. 10. The conclusion of carbon mass balance for buffalo meat production






Fig. 11. The comparison of the different carbon contents in each pattern of meat production

Furthermore, this study showed the ratio of the carbon fixed in meat and organs to the sum of carbon contents in grass, that humans cannot use but are useful for herbivores feed, and the carbon contents in electricity and petrol used were 0.60 and 0.66, respectively. The ratio of the total carbon emitted per unit to the total carbon contents per unit in grass and energy used for meat production were 0.39 and 0.33, respectively. The ratio of the total carbon emitted per unit to the carbon fixation of ox and buffalo were 0.65 and 0.49, respectively. The results showed that the carbon contents emitted from ox increases environmental problems more

than buffalo (Table 8).

The results also showed that the changing of carbon contents emitted in meat production can predict future trends in net carbon emission per year from ox and buffalo farms and slaughterhouses in Nakhon Ratchasima province by using the following equation:  $C\text{-emission}_{ox} = 10054(\text{year})^2 - 4 \times 10^7(\text{year}) + 4 \times 10^{10}$  ( $R^2 = 0.9528$ ) and  $C\text{-emission}_{buffalo} = 72.357(\text{year})^2 - 288350(\text{year}) + 3 \times 10^8$  ( $R^2 = 0.9522$ ). Environmental problems could be decreased by decreasing ox meat production and increasing buffalo meat production

Table 8. The ratio of  $C_{input}(\text{plant}+\text{energy})$ ,  $C_{fixation}$ ,  $C_{emitted}(\text{animal}+\text{energy})$  from meat production

Kind of Animal	$C_{input}(\text{plant}+\text{energy})$ (kg.C/head/day)	$C_{emitted}(\text{animal}+\text{energy})$ (kg.C/head/day)	Ratio of $C_{meat}/C_{plant}$	Ratio of $C_{fixation}/C_{input}$	Ratio of $C_{emitted}/C_{input}$	Ratio of $C_{emitted}/C_{fixation}$
Ox	5.15	2.0	0.32	0.60	0.39	0.65
Buffalo	7.10	2.32	0.25	0.66	0.33	0.49

ACKNOWLEDGMENT

The researchers acknowledge the Centre for Scientific and Technological Equipment, Suranaree University of Technology for providing laboratory analyses. This work received financial support from National Research Council of Thailand. We thank our advisor, teacher, consulting person and our families for critical and helpful comments to this project.

REFERENCES

[1] Intergovernmental Panel on Climate Change. 1995. Climate Change 1995, The Science of Climate Change. Contribution of Working Group I to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, U.K.: Press Syndicate of the University of Cambridge.  
[2] Intergovernmental Panel on Climate Change. 2001.

Climate Change 2001, The Scientific Basis. The Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, U.K.: Press Syndicate of the University of Cambridge.  
[3] Lauhajinda, N. 2006. Ecology: Fundamentals of Environmental. 2<sup>nd</sup> ed. Bangkok: Kasetsart University.  
[4] van Noordwijk, M.; Cerri, C.; Woomer, P. L.; Nugroho, K.; and Bernoux, M. 1997. Soil carbon dynamics in the humid tropical forest zone. Geoderma. (79): 187-225.  
[5] van Noordwijk, M.; Murdiyarso, D.; Hairiah, K.; Wasrin, U. R.; Rachman, A.; and Tomich, T. P. 1998. Forest soil under alternatives to slash and burn agriculture in Sumatra, Indonesia. In: A. Schulte and D. Ruhiyat (eds.). Soils of Tropical Forest Ecosystems: Characteristics, Ecology and Management. (pp175-185). Berlin: Springer-Veriag.  
[6] Center for Agricultural Information, Office of

*International Conference on Energy Security and Climate Change: Issues, Strategies, and Options (ESCC 2008)*  
Sofitel Centara Grand, Bangkok, Thailand. 6-8 August 2008.

- Agricultural Economics. 2004. Agricultural Statistics of Thailand 2004. Agricultural Statistics No.410. Ministry of Agriculture and Co-operatives. Bangkok.
- [7] Department of Livestock Development. (2005). Livestock Statistics Data. [On-line]. Available: <http://www.dld.go.th/index.html>
- [8] Cavana, R. Y.; Delahaye, B. L.; and Sekaran, U. 2000. Applied Business Research: Qualitative and Quantitative Methods. New York: John Wiley and Sons.
- [9] Yamane, Taro. 1973. Mathematics for Economists: An Elementary Survey. 2<sup>nd</sup> ed. New Delhi: Prentice-Hall.
- [10] Manlay, Raphaël J.; Ickowicz, Alexandre; Masse, Dominique; Floret, Christian; Richard, Didier; and Feller, Christian. 2004. Spatial carbon, nitrogen and phosphorus budget of a village in the West African savanna-I. Element pools and structure of a mixed - farming system. Agricultural Systems. (79): 55- 81.
- [11] Manlay, Raphaël J.; Ickowicz, Alexandre; Masse, Dominique; Feller, Christian; and Richard, Didier. 2004. Spatial carbon, nitrogen and phosphorus budget in a village of the West African savanna-II. Element flows and functioning of a mixed-farming system. Agricultural Systems. (79): 83-107.
- [12] APHA, AWWA, WEF. 1992. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 18<sup>th</sup> Edition. Wash. D.C., USA: American Public Health Association.
- [13] Jintavaet, U. 2004. Carbon Collection. Faculty of Agriculture. Chiangmai University

## การเปรียบเทียบการปลดปล่อยคาร์บอนของการผลิตเนื้อ จากโคเนื้อ กระบือ สุกร และไก่เนื้อ

### Comparison of Carbon Emitted for Meat Production from Ox, Buffalo, Pig, and Chicken

ณัฐวุฒิ ธานี<sup>1\*</sup> วุฒิ คำนกิตติกุล<sup>2</sup> และ ประยงค์ กิระติไธโร<sup>3</sup>

Nathawut Thanee<sup>1\*</sup> Wut Dankittikul<sup>2</sup> and Prayong Keeratitai<sup>3</sup>

<sup>1</sup>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 30000

<sup>2</sup>อาจารย์; <sup>3</sup>นักศึกษาระดับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสัตวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 30000

\*โทรศัพท์: 0-4422-4192, 081-470-0185, โทรสาร: 0-4422-4633, E-mail: biology@su.ac.th, keeratitai\_pray@windowslive.com

#### บทคัดย่อ

สภาวะเรือนกระจกเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งซึ่งตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนคือก๊าซ CO<sub>2</sub> และ CH<sub>4</sub> การทำปศุสัตว์โดยเฉพาะ โคเนื้อและกระบือและการใช้พลังงานสำหรับเลี้ยงสุกรและไก่เนื้อ เพื่อการผลิตเนื้อเป็นสาเหตุหนึ่งของการเพิ่มปริมาณ CO<sub>2</sub> และ CH<sub>4</sub> ในชั้นบรรยากาศสิ่งนี้จึงควรศึกษาเพื่อพัฒนาการปลดปล่อยคาร์บอนจากการทำฟาร์ม โคเนื้อ กระบือ สุกร และไก่เนื้อ และเพื่อศึกษาอัตราการถ่ายเทมวลคาร์บอนจากในพืชอาหารสัตว์ไปสู่สัตว์ชนิดต่างๆ โดยการกิน รวมทั้งศึกษาอัตราการปลดปล่อยปริมาณคาร์บอนจากการใช้พลังงานที่มีส่วนสำคัญในระบบการผลิตเนื้อสัตว์ โดยสำรวจเก็บข้อมูลจากฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์ใน 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา จำนวนตัวอย่างของฟาร์มในแต่ละอำเภอและตัวสัตว์แต่ละชนิดจะคำนวณจากการประมาณค่าเฉลี่ยประชากรที่ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% และวิเคราะห์ตัวอย่างพืชอาหาร มูลสัตว์ และเนื้อสัตว์ในห้องปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบว่าค่าการปลดปล่อยคาร์บอนที่น้ำหนักของสัตว์เท่ากับจากการใช้พลังงานของฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ และตัวของโคเนื้อ กระบือ สุกร ไก่เนื้อมีค่าเท่ากับ 0.0066, 0.0051, 0.0339, และ 0.0851 กิโลกรัมคาร์บอนกิโลกรัมน้ำหนักสัตว์/วัน ตามลำดับ และยังพบอีกว่ากระบือสามารถปลดปล่อยคาร์บอนออกมาได้สูงเพียง 27.67% ของปริมาณคาร์บอนจากพืชที่ถ่ายเทเข้าสู่กระบือโดยการกิน ในขณะที่ ไก่เนื้อ โคนเนื้อ และสุกรจะปลดปล่อยคาร์บอนออกมาเท่ากับ 39.53%, 30.85%, และ 28.78% ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าคาร์บอนที่ถูกปลดปล่อยออกจากการผลิตเนื้อไก่มีส่วนในการก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมมากกว่าการผลิตเนื้อโค สุกร และกระบือ ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับประสิทธิภาพในการตรึงคาร์บอนของกระบือเท่ากับ 72.33% สุกร 71.22% โคนเนื้อ 69.15% และไก่เนื้อ 60.47% ดังนั้นการเลี้ยงกระบือและสุกรควรถูกส่งเสริมมากกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ผลการศึกษาสามารถแสดงสมการความสัมพันธ์ระหว่างการปลดปล่อยคาร์บอนกับปริมาณคาร์บอนที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวสัตว์โดยการกินพืชอาหารต่อตัวต่อวัน (Sig. F < 0.05) ดังสมการ  $C_{\text{emitted, โคเนื้อ}} = 0.1853(C_{\text{กิน}}) + 0.5515$  ที่ Adj. R<sup>2</sup> = 0.98, สมการ  $C_{\text{emitted, กระบือ}} = 0.1607(C_{\text{กิน}}) + 0.7559$  ที่ Adj. R<sup>2</sup> = 0.99, สมการ  $C_{\text{emitted, สุกร}} = 0.1737(C_{\text{กิน}}) + 0.1007$  ที่ Adj. R<sup>2</sup> = 0.78, และสมการ  $C_{\text{emitted, ไก่เนื้อ}} = 0.6572(C_{\text{กิน}}) - 0.0112$  ที่ Adj. R<sup>2</sup> = 0.63 ตามลำดับ

คำสำคัญ : การปลดปล่อยคาร์บอน; การผลิตเนื้อสัตว์; โคนเนื้อ; กระบือ; สุกร; ไก่เนื้อ



### Abstract

One of the environmental threats that our planet faces today is the greenhouse effect. The global warming problem is caused by livestock of activities which releasing  $\text{CO}_2$  and  $\text{CH}_4$  to the atmosphere. Ox and buffalo are herbivores while pig and chicken are energy-using that are raised for their meat, and produce emissions of both  $\text{CO}_2$  and  $\text{CH}_4$ . Therefore it is important to determine carbon emitted factors, to investigate the rate of carbon massflow from plants to ox, buffalo, pig, and chicken, and to study the carbon emission in energy patterns that was used in meat production from ox, buffalo, pig, and chicken farms and slaughterhouses, in 32 districts of Nakhon Ratchasima province. The numbers of farms in each district were calculated by determining the numbers of farms and the numbers of oxen, buffaloes, pigs, and chickens in the province. Grass and food for feeding, meat, and faces were collected and transferred to the laboratory. The study showed that the carbon emitted per living weight from ox, buffalo, pig, and chicken and emission from farms, and slaughterhouses in meat production were 0.0066, 0.0051, 0.0339, and 0.0851 kg.C/living weight/day, respectively. The results also showed that emitted carbon from buffalo was 27.67% of the carbon contents that were transferred to buffalo by feeding. On the other hand, emitted carbon from chicken, ox, and pig were 39.53%, 30.85%, and 28.78%, respectively, which were higher than that from buffalo. The carbon emitted from chicken meat production increase environmental problems than from ox, pig, and buffalo in meat production, respectively. The results also showed that carbon fixation in buffalo were 72.33%, pig 71.22%, ox 69.15%, and chicken 60.47%. For the same quantity of meat production it can be suggested that decreasing ox and chicken in meat production and increasing buffalo and pig meat production can decrease the environmental problems. The carbon contents emitted from ox, buffalo, pig, and chicken can find with the rate of carbon massflow from plants (Sig.  $F < 0.05$ ) by using the equation as follow;  $C\text{-emitted}_{ox} = 0.1853(C_{plant}) + 0.5515$ , Adj.  $R^2 = 0.98$ ,  $C\text{-emitted}_{buffalo} = 0.1607(C_{plant}) + 0.7559$ , Adj.  $R^2 = 0.99$ ,  $C\text{-emitted}_{pig} = 0.1737(C_{plant}) + 0.1007$ , Adj.  $R^2 = 0.78$ , and  $C\text{-emitted}_{chicken} = 0.6572(C_{plant}) - 0.0112$ , Adj.  $R^2 = 0.63$ , respectively.

**Keywords :** Carbon emission; meat production; ox; buffalo; pig; chicken

### บทนำ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเกิดจากก๊าซเรือนกระจกซึ่งได้รับการยอมรับแล้วว่าตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนจากการทำปศุสัตว์เพื่อผลิตเนื้อคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( $\text{CO}_2$ ) และก๊าซมีเทน ( $\text{CH}_4$ ) [1] โดยเฉพาะ โคเนื้อ และกระบือที่เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องและจากการใช้พลังงานในการเลี้ยงสุกรและไก่เนื้อ รวมทั้งในการฆ่าสัตว์เป็นสาเหตุหนึ่งของการเพิ่มปริมาณก๊าซ  $\text{CH}_4$  และ  $\text{CO}_2$  ในบรรยากาศ นอกจากนี้มูลที่สัตว์ถ่ายออกมาซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ดังนั้นจึงควรศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจากการทำฟาร์ม โคเนื้อ กระบือ สุกร และไก่เนื้อ และเพื่อศึกษาอัตราการถ่ายเทปริมาณคาร์บอนจากพืชอาหาร ไปสู่ตัวสัตว์โดยการกิน รวมทั้งศึกษาปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนจากการใช้พลังงานที่มีส่วนสำคัญในการผลิตเนื้อ

### แผนการวิจัย

การวิจัยจะสำรวจและเก็บข้อมูลปศุสัตว์ของโคเนื้อ กระบือ สุกร และไก่เนื้อในจังหวัดนครราชสีมา [2,3] โดยจำนวนตัวอย่างของฟาร์มและตัวสัตว์ในแต่ละชนิดจะกำหนดจากการประมาณค่าเฉลี่ยประชากรที่นิยมให้ควมมาศเคลื่อนสูงสุดไม่เกิน 5% [4] ส่วนการเลือกฟาร์ม จำนวนตัวสัตว์ในแต่ละฟาร์มจะใช้วิธีการจับสลาก [5] ซึ่งได้สำรวจจำนวนตัวอย่างฟาร์มโค

เนื้อ 398 แห่ง ฟาร์มกระบือและสุกรอย่างละ 390 แห่ง และฟาร์มไก่เนื้อ 340 แห่งตามลำดับ โรงฆ่าโคเนื้อหรือกระบือ 17 แห่ง โรงฆ่าสุกร 7 แห่งและโรงฆ่าไก่ 18 แห่ง ทั้งที่มีใบอนุญาตและอยู่ในท้องที่ทุรกันดาร โดยมีจำนวนตัวอย่างโคเนื้อ กระบือ สุกร และไก่เนื้ออย่างละ 400 ตัว ซึ่งจะหาน้ำหนักโดยการชั่งตัวสัตว์ มูล เนื้อ เครื่องใน กระดูกของสัตว์ และอาหารแต่ละชนิดที่กินในแต่ละวัน [6] รวมทั้งวิเคราะห์ปริมาณก๊าซ  $\text{CO}_2$  และ  $\text{CH}_4$  จากลมหายใจและการย่อยอาหารของสัตว์ [7] จากนั้นก็นำตัวอย่างพืชอาหารสัตว์ เนื้อสัตว์ มูลสัตว์ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์หาค่าความชื้น ของแข็งระเหยและไขมัน [8] รวมทั้งปริมาณคาร์บอน [9] ในห้องปฏิบัติการตามวิธีและเครื่องมือมาตรฐาน

### ผลการวิจัยและวิจารณ์

การศึกษาเปรียบเทียบค่าการปลดปล่อยคาร์บอนต่อวัน ( $\text{C-emitted}$ ) จากสัตว์ดังกล่าวที่น้ำหนักตัวเท่ากัน ในหน่วยกิโลกรัมคาร์บอนต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวสัตว์ต่อวัน ( $\text{กก.C/กก.น้ำหนักสัตว์/วัน}$ ) พบว่าสุกรจะมีค่าการปลดปล่อยคาร์บอนต่อวันต่ำสุดเท่ากับ  $2.48 \times 10^{-3}$  กก.C/กก.น้ำหนักสัตว์/วัน เพราะสุกรรับคาร์บอนจากพืชอาหารโดยการกินค่าสุดเพียง  $8.71 \times 10^{-3}$  กก.C/กก.น้ำหนักสัตว์/วัน ในขณะที่มีความสามารถในการตรึงคาร์บอนไว้ในร่างกาย ( $\text{C-fixation}$ ) ได้มากถึง 71.22% นับเป็นอันดับสองรองจากกระบือ และเมื่อนำค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจากสัตว์ชนิดดังกล่าวที่น้ำหนักตัวเท่ากันมาเปรียบเทียบกันพบว่า จะสามารถเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้โดย ไก่เนื้อ > โคเนื้อ > กระบือ > สุกร ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งปริมาณคาร์บอนส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปมูลสัตว์เป็นหลัก ส่วนการศึกษาอัตราการถ่ายเทมวลคาร์บอนทั้งหมดจากพืชอาหารไปสู่สัตว์ชนิดต่างๆดังกล่าวด้วยการกิน ( $\text{C}_{\text{กิน}}$ ) แล้วมาสะสมเป็นร่างกายและอวัยวะต่างๆ ตลอดจนสิ่งขับถ่ายของสัตว์ในช่วงระยะเวลาของการเลี้ยงได้ถูกแสดงไว้ในตารางที่ 1 เช่นกัน ซึ่งจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรึงคาร์บอน ( $\text{C}_{\text{ตรึง}} - \text{C}_{\text{emitted}}$ ) /  $\text{C}_{\text{กิน}}$  พบว่ากระบือมีประสิทธิภาพการตรึงปริมาณคาร์บอนจากในพืชอาหารมาสะสมไว้ในร่างกายได้มากที่สุดถึง 72.33% ในขณะที่ ไก่เนื้อมีประสิทธิภาพในการตรึงคาร์บอนต่ำที่สุดเพียงแค่ 60.47% นอกจากนี้เมื่อเทียบร้อยละของสัดส่วน  $\text{C-emitted} / \text{C}_{\text{กิน}}$  จะเห็นได้ว่าปริมาณคาร์บอนในพืชอาหารสัตว์บางส่วนที่เหลือจากการตรึงจะถูกปลดปล่อยออกมาจากตัวไก่เนื้อ โคเนื้อ สุกร และกระบือเท่ากับ 39.53%, 30.85%, 28.78%, และ 27.67% ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับความสัมพันธ์ของ  $\text{C-emitted}$  กับ  $\text{C}_{\text{กิน}}$  ดังกราฟและ “สมการ(1) - (4)” และ  $\text{C-fixed}$  กับ  $\text{C}_{\text{กิน}}$  ดังกราฟในรูปที่ 1 (Sig.  $F < 0.05$ )

$$\text{C-emitted}_{\text{ไก่เนื้อ}} = 0.1853(\text{C}_{\text{กิน}}) + 0.5515 \quad (1)$$

$$\text{C-emitted}_{\text{กระบือ}} = 0.1607(\text{C}_{\text{กิน}}) + 0.7559 \quad (2)$$



$$\text{C-emitted}_{\text{สุกร}} = 0.1737(\text{C}_{\text{กิน}}) + 0.1007 \quad (3)$$

$$\text{C-emitted}_{\text{โคเนื้อ}} = 0.6572(\text{C}_{\text{กิน}}) - 0.0112 \quad (4)$$

จะเห็นว่าเส้นกราฟ  $\text{C-emitted}_{\text{กระบือ}}$  มีความชันต่ำสุด ดังนั้นในแต่ละวันกระบือ 1 ตัวจึงมีส่วนทำให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมจากการปลดปล่อยคาร์บอนน้อยกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆ ที่ทำการศึกษาในขณะที่ไก่เนื้อ 1 ตัวจะมีร้อยละของการปลดปล่อยคาร์บอนสูงสุดถึง 65.38% เทียบจากปริมาณคาร์บอนที่ถูกตรึงไว้ในตัวไก่เนื้อเองดังตารางที่ 1 ดังนั้นการเลี้ยงไก่เพื่อผลิตเนื้อจึงมีส่วนในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูงมากกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นๆ ดังกล่าวซึ่งจากหลักการอนุรักษ์มวล [10] และผลจากการศึกษาอัตราการถ่ายเท ( $\text{C}_{\text{กิน}}$ ) ในหน่วยตันคาร์บอนต่อปี และการตรึงมวลคาร์บอนจากพืช

ตารางที่ 1 อัตราการถ่ายเท การตรึง และการปลดปล่อยปริมาณคาร์บอนจากสัตว์ชนิดต่างๆ (ค่าเฉลี่ย ± S.D.)

ชนิดสัตว์	น้ำหนักสัตว์มีชีวิตเฉลี่ย	C <sub>สัตว์</sub>	C <sub>fixation</sub>	C <sub>emitted</sub>	C <sub>สัตว์</sub>	C <sub>fixation</sub>	C <sub>emitted</sub>	C <sub>emitted</sub> / C <sub>สัตว์</sub>	C <sub>emitted</sub> / C <sub>fixation</sub>	(C <sub>สัตว์</sub> - C <sub>emitted</sub> ) / C <sub>สัตว์</sub>
	(กก./ตัว)	(กก.C/ตัว/วัน)			(กก.C/กก.น้ำหนัก/วัน) × 10 <sup>3</sup>			(%)		
โคเนื้อ	302.25 ± 100.72	4.46 ± 1.93	3.09	1.376 ± 0.36	14.76	10.22	4.57	30.85	44.53	69.15
กระบือ	456.10 ± 134.38	6.51 ± 3.14	4.72	1.801 ± 0.51	14.27	10.35	3.95	27.67	38.16	72.33
สุกร	100.91 ± 6.31	0.879 ± 0.30	0.626	0.253 ± 0.058	8.71	6.20	2.48	28.78	40.42	71.22
ไก่เนื้อ	2.34 ± 0.34	0.043 ± 0.007	0.026	0.017 ± 0.006	18.38	11.11	7.27	39.53	65.38	60.47



รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ของ C-emitted กับ C<sub>สัตว์</sub> และ C-fixed กับ C<sub>สัตว์</sub> ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

อาหารสัตว์ไปสู่สัตว์โดยการกิน (C-fixation) ในหน่วยตันคาร์บอนต่อปีที่สัมพันธ์กับจำนวนตัวของการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดนั้น จะทำให้สามารถบ่งบอกถึงการถ่ายเทและการตรึงคาร์บอนจากปริมาณการกินอาหารของสัตว์แต่ละชนิดที่ทำการศึกษาโดย  $C_{สัตว์} = (1.63)Oxen + (2.38)Buffaloes + (0.32)Pigs + (0.016)Chickens$  และ  $C_{fixation} = (1.13)Oxen + (1.72)Buffaloes + (0.23)Pigs + (0.0095)Chickens$  ตามลำดับและจากการสำรวจฟาร์มเลี้ยงสัตว์และ โรงฆ่าสัตว์ต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมาพบว่ามี การใช้พลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและฆ่าโคเนื้อ และกระบือน้อยมากซึ่งการปลดปล่อยคาร์บอนส่วนใหญ่จะเกิดจากการใช้น้ำมันขนส่ง ในขณะที่สุกร และไก่เนื้อจะมีการปลดปล่อยคาร์บอนส่วนใหญ่จากการใช้ฟืนหรือแกลบเพื่อคัมน์น้ำร้อนลวกขูดหรือถอนขนซึ่งส่วนใหญ่เกิดที่โรงฆ่าสัตว์มากกว่าจากฟาร์มและเมื่อเทียบกับน้ำหนักสัตว์เท่ากันพบว่าไก่เนื้อปลดปล่อยคาร์บอนจากการใช้พลังงานรวมของฟาร์มและ โรงเชือดไก่ที่เกี่ยวข้องในการผลิตเนื้อมากที่สุดเท่ากับ  $77.86 \times 10^3$  กก.C/กก.น้ำหนักสัตว์/วัน ดังแสดงในตารางที่ 2 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าการใช้พลังงานเพื่อการผลิตเนื้อไก่มีส่วนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดที่น้ำหนักสัตว์เฉลี่ยเท่ากันซึ่งผลการศึกษานี้จะทำให้สามารถบ่งบอกถึงปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนจากการใช้พลังงานของฟาร์มและ โรงฆ่าสัตว์สำหรับการผลิตเนื้อ (C-emission<sub>พลังงาน</sub>) ในหน่วยตันคาร์บอนต่อปีที่สัมพันธ์กับจำนวนตัว

ตารางที่ 2 การปลดปล่อยคาร์บอนเฉลี่ยจากการใช้พลังงานของฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์ (ค่าเฉลี่ย ± S.D.)

ค่าเฉลี่ยปริมาณ C-emission จากพลังงาน (กก. C/ตัว/วัน)	โคเนื้อ	กระบือ	สุกร	ไก่เนื้อ	
ฟาร์ม	ไฟฟ้า *	0.00 ± 0.01	0.00 ± 0.00	0.02 ± 0.02	0.002 ± 0.00
	น้ำมันขนส่ง **	0.00 ± 0.00	0.01 ± 0.01	0.81 ± 0.85	0.044 ± 0.03
	น้ำมันที่เครื่องจักรกลใช้*** หรือ LPG *	0.09 ± 0.13	0.07 ± 0.16	N.D.	0.003 ± 0.00
โรงฆ่าสัตว์	ไฟฟ้า *	0.22 ± 0.37	0.12 ± 0.04	0.05 ± 0.04	0.009 ± 0.004
	น้ำมันขนส่ง **	0.30 ± 0.26	0.32 ± 0.39	0.01 ± 0.00	0.0015 ± 0.0016
	ฟีน แกลบลหรือก๊าซ LPG *	N.D.	N.D.	2.28 ± 1.02	0.1227 ± 0.1708
รวม C <sub>emission</sub> จากการใช้พลังงานทั้ง 2 แห่ง	กก. C/ตัว/วัน	0.62	0.52	3.17	0.1822
	กก. C/น้ำหนักสัตว์/วัน	2.05 × 10 <sup>-3</sup>	1.14 × 10 <sup>-3</sup>	31.41 × 10 <sup>-3</sup>	77.86 × 10 <sup>-3</sup>

\* CO<sub>2</sub>-emission จากการใช้พลังงานไฟฟ้า = 0.18 กก. C/kWh และการใช้ก๊าซ LPG 1 กิโลกรัม จะเกิด CO<sub>2</sub>-emission = 3.0102 กก. CO<sub>2</sub>/kg. LPG (0.821 กก. C/kg. LPG) ส่วนการเผาไหม้ของธาตุคาร์บอน 1 kg ที่เผาไหม้ได้ในเชื้อเพลิงจะได้ CO<sub>2</sub> หนัก 3.667 kg [11]  
 \*\* CO<sub>2</sub>emission จากการใช้น้ำมันขนส่ง = 74.5 กก. CO<sub>2</sub>/ตันน้ำมันบรรทุกทุกๆ 500 กิโลเมตร [12]  
 \*\*\* CO<sub>2</sub>-emission จากการใช้น้ำมันดีเซล = 0.61 กก. C/L (2.24 กก. CO<sub>2</sub>/L) และจากน้ำมันเบนซิน = 0.57 กก. C/L (2.10 กก. CO<sub>2</sub>/L)[13]

ของการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ โดย C-emission<sub>(พลังงาน)</sub> = (0.23)Oxen + (0.19)Buffaloes + (1.16)Pigs + (0.0665)Chickens นอกจากนี้ผลการศึกษารปลดปล่อยคาร์บอนจากตัวสัตว์และจากการใช้พลังงาน การตรึงคาร์บอน รวมทั้งการถ่ายเทปริมาณคาร์บอนจากพืชอาหารโดยการกินจะสามารถสรุปภาพรวมสำหรับการผลิตเนื้อได้ดังรูปที่ 2 และ 3 หรือถ้าคิดเทียบที่น้ำหนักสัตว์เท่ากันสำหรับการผลิตเนื้อ โค เนื้อกระบือ เนื้อสุกร เนื้อไก่ จะพบว่าค่าการปลดปล่อยคาร์บอนรวมจะเท่ากับ 2.41, 1.86, 12.38, 31.07 ตัน C./ตัน<sub>เนื้อสัตว์</sub>ปี ตามลำดับ และจากหลักการอนุรักษ์มวล[10] จะทำให้สามารถบ่งบอกถึงการปลดปล่อยคาร์บอนรวมทั้งหมดสำหรับการผลิตเนื้อสัตว์ (C-emitted<sub>(ตัวสัตว์-พลังงานทั้ง)</sub>) ในหน่วยตันคาร์บอนต่อปีที่สัมพันธ์กับจำนวนตัวของการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ โดย C-emitted<sub>(ตัวสัตว์-พลังงานทั้ง)</sub> = (0.73)Oxen + (0.85)Buffaloes + (1.25)Pigs + (0.07)Chickens และผลการศึกษาเปรียบเทียบสัดส่วนคาร์บอนที่ถูกปลดปล่อยระหว่างจากการใช้พลังงานและจากตัวสัตว์ทำให้ทราบว่าคาร์บอนเนื้อสุกร เนื้อไก่ เนื้อโค และเนื้อกระบือมีสัดส่วนการปลดปล่อยคาร์บอนจากการใช้พลังงาน คิดเป็น 92.60%, 91.54%, 30.72%, และ 22.40%



รูปที่ 2 ภาพรวมของการถ่ายเท คาร์บอน และปลดปล่อยคาร์บอนสำหรับการผลิตเนื้อโคและเนื้อกระบือ



รูปที่ 3 ภาพรวมของการถ่ายเทตรง และปลดปล่อยคาร์บอนสำหรับการผลิตเนื้อสุกรและเนื้อไก่

ตามลำดับ ดังนั้นการพิจารณาเพื่อลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนจากการผลิตเนื้อสุกรและเนื้อไก่ควรสนใจที่ประเด็นของการเปลี่ยนแนวทางการใช้เชื้อเพลิงเช่นใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) เพื่อต้มน้ำร้อนแลกเนื้อแทนการใช้ฟืนหรือแกลบ เนื่องจากก๊าซ LPG มีประสิทธิภาพการเผาไหม้สูงเกิดเขม่าน้อยและให้ค่าความร้อนเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า 13.70 kWh/kg ในขณะที่แกลบ และเศษไม้หรือฟืน 1 kg ให้ค่าความร้อนเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุด 0.49 kWh และ 0.21 kWh ตามลำดับ [11] ในขณะที่การผลิตเนื้อจากโค และกระบือจะมีการปลดปล่อยคาร์บอนส่วนใหญ่จากตัวสัตว์คิดเป็น 69.28% และ 77.60% ตามลำดับในรูปของมูลสัตว์ การย่อยอาหารและการหายใจซึ่งมากกว่าจากการใช้พลังงาน ดังนั้นแนวทางการลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนจึงควรพิจารณาที่ลักษณะของอาหารที่ใช้โดยการลดปริมาณอาหารหยาบจำพวกฟางหรือหญ้าแห้งลงและเพิ่มปริมาณอาหารข้นหรืออาหารจำพวกแป้งแทน โดยMoe and Tyrell (1979) กล่าวว่าอาหารข้นหรืออาหารกลุ่มพวกแป้งจะมีส่วนสนับสนุนการผลิตก๊าซ CH<sub>4</sub> น้อยกว่าอาหารกลุ่มที่มีเซลลูโลสเช่นหญ้าแห้งหรือฟาง ประกอบกับอาหารข้นเมื่อถูกหมักในกระเพาะรูเมนแล้วจะได้กรดอะซิเตทต่ำกว่าอาหารหยาบซึ่งจะทำให้เกิดปริมาณก๊าซ CH<sub>4</sub> ต่ำตามไปด้วย [15] หรือใช้การแปรรูปอาหารหยาบเช่นการสับหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายแทนการใช้อาหารข้น [15, 16] นอกจากนี้แนวทางในการลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถทำได้โดยการจัดลำดับความสำคัญเลือกชนิดของสัตว์ที่ควรส่งเสริมให้มีการเลี้ยงเพื่อการผลิตเนื้อที่สามารถทดแทนกันได้เช่นส่งเสริมให้มีการเลี้ยงกระบือแทนการเลี้ยงโคเนื้อ เพราะว่าการปลดปล่อยคาร์บอนจากตัวกระบือรวมกับการใช้พลังงานมีค่าต่ำสุดตามผลการศึกษาที่ได้จัดตารางที่ 1 และ 2 ด้วยการปรับลดจำนวนการเลี้ยงโคเนื้อลงแล้วเพิ่มจำนวนการเลี้ยงกระบือทดแทน โดยจากผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นพบว่ามีความเป็นไปได้ (Sig. F < 0.05) สำหรับสัดส่วนจำนวนการเลี้ยงโคเนื้อต่อกระบือที่ 60 : 40 โดยในปี 2010 ควรจะมีจำนวนการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือโดยประมาณเท่ากับ 469,000 และ 313,000 ตัวตามลำดับ จะทำให้สามารถลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอน (CER) ได้สูงกว่าสัดส่วนที่ 80 : 20 และ 70 : 30 ซึ่งมีความเป็นไปได้เช่นกัน (Sig.F < 0.05) เมื่อเทียบกับค่า C-emitted ที่ไม่มีการปรับสัดส่วนจำนวนการเลี้ยงโคเนื้อต่อกระบือ 90 : 10 ในปีเดียวกัน และกระบือยังเป็นสัตว์ชนิดที่มีความสามารถในการย่อยสลายอาหารและใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบกลุ่มเซลลูโลสได้ดีกว่าโคเนื้อด้วย[17] และหรือคำนึงถึงระยะเวลาที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ และกระบือที่เหมาะสมกับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกษตรกรส่วนมากจะขายโคเนื้อและกระบือเข้าโรงฆ่าสัตว์เมื่อต้องการใช้เงินจึงไม่มีกำหนดเวลาในการเลี้ยงที่แน่นอน[18] ซึ่งผลจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักเฉลี่ยของโคเนื้อและกระบือที่อายุต่างๆพบว่าโคเนื้อที่เลี้ยงเพื่อการผลิตเนื้อไม่ควรเลี้ยงปล่อยทิ้งไว้จนอายุมากกว่า 1.5 - 2 ปีส่วนกระบือไม่ควรเกิน 3.5 - 4 ปี เพราะหลังจากนี้อัตรการเพิ่มน้ำหนักจะลดลง





## สรุปผล

ผลการศึกษาพบว่าค่าการปลดปล่อยคาร์บอนที่น้ำหนักตัวของสัตว์เท่ากับจากการใช้พลังงานของฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ และตัวของโคเนื้อ กระบือ สุกร ไก่เนื้อมีค่าเท่ากับ 0.0066, 0.0051, 0.0339, และ 0.0851 กก.C/กก.น้ำหนักสัตว์/วัน ตามลำดับ และยังพบอีกว่ากระบือสามารถปลดปล่อยคาร์บอนออกมาได้สูงสุดเพียง 27.67% ของปริมาณคาร์บอนจากพืชที่ถ่ายเทเข้าสู่กระบือโดยการกิน ในขณะที่ไก่เนื้อ โคเนื้อ และสุกรจะปลดปล่อยคาร์บอนออกมาเท่ากับ 39.53%, 30.85%, และ 28.78% ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าคาร์บอนที่ถูกปลดปล่อยจากการผลิตเนื้อไก่มีส่วนในการก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมมากกว่าการผลิตเนื้อโค สุกร และกระบือตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับประสิทธิภาพในการตรึงคาร์บอนของกระบือเท่ากับ 72.33% สุกร 71.22% โคเนื้อ 69.15% และไก่เนื้อ 60.47% ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบการปลดปล่อยและการตรึงคาร์บอนจะมองเห็นได้ว่าการเลี้ยงกระบือและสุกรควรถูกส่งเสริมมากกว่าการเลี้ยงโคและไก่เนื้อเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และผลการศึกษาข้างต้นยังสามารถบ่งบอกถึงปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนที่สัมพันธ์กับปริมาณการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ สำหรับการผลิตเนื้อสัตว์โดย  $C_{\text{emitted}}(\text{สัตว์-พลังงานที่ใช้}) = (0.73)\text{Oxen} + (0.85)\text{Buffaloes} + (1.25)\text{Pigs} + (0.07)\text{Chickens}$  และการถ่ายเทมวลคาร์บอนทั้งหมดจากปริมาณการกินอาหารของสัตว์ที่ทำการศึกษาโดย  $C_{\text{net}} = (1.63)\text{Oxen} + (2.38)\text{Buffaloes} + (0.32)\text{Pigs} + (0.016)\text{Chickens}$  นอกจากนี้ผลของการศึกษายังสามารถแสดงสมการความสัมพันธ์ระหว่างการปลดปล่อยคาร์บอนกับปริมาณคาร์บอนที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวสัตว์โดยการกินต่อตัวต่อวัน (Sig.  $F < 0.05$ ) ของการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ สุกร และไก่เนื้อ ได้ดังสมการ  $C_{\text{emitted}}(\text{โคเนื้อ}) = 0.1853(C_{\text{net}}) + 0.5515$  ที่ Adj.  $R^2 = 0.98$ , สมการ  $C_{\text{emitted}}(\text{กระบือ}) = 0.1607(C_{\text{net}}) + 0.7559$  ที่ Adj.  $R^2 = 0.99$ , สมการ  $C_{\text{emitted}}(\text{สุกร}) = 0.1737(C_{\text{net}}) + 0.1007$  ที่ Adj.  $R^2 = 0.78$ , และสมการ  $C_{\text{emitted}}(\text{ไก่เนื้อ}) = 0.6572(C_{\text{net}}) - 0.0112$  ที่ Adj.  $R^2 = 0.63$  ตามลำดับ และผลการศึกษาสามารถทำให้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนโดยควรส่งเสริมการผลิตเนื้อสุกรมากกว่าเนื้อไก่เพราะว่าการผลิตเนื้อสุกรจะมีการปลดปล่อยคาร์บอนต่ำกว่าและควรลดการใช้พลังงานหรือใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) แทนการใช้ฟืนหรือแกลบ ในขณะที่การผลิตเนื้อโคหรือเนื้อกระบือจะใช้การลดปริมาณอาหารหยาบลงแล้วเพิ่มปริมาณอาหารข้นแทน หรือใช้การแปรรูปอาหารหยาบ เช่นการสับหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ และควรส่งเสริมให้มีการเลี้ยงกระบือเพื่อการผลิตเนื้อแทนการเลี้ยงโคเนื้อโดยมีสัดส่วนจำนวนการเลี้ยงโคเนื้อต่อกระบือเท่ากับ 60 : 40 จากสัดส่วนเดิมที่ 90 : 10 และหรือคำนึงถึงระยะเวลาที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ และกระบือให้เหมาะสมกับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนั้นคือโคเนื้อไม่ควรเลี้ยงจนอายุมากกว่า 1.5 - 2 ปี ส่วนกระบือไม่ควรเกิน 3.5 - 4 ปี

## กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณบุคคลต่างๆ ที่ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง ทั้งด้านวิชาการและด้านการทำวิจัย โดยเฉพาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ ธาณี และอ. ดร. วุฒิ คำนาคิตกุล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทาง อันเป็นประโยชน์ รวมถึงได้ช่วยตรวจทานและแก้ไขบทความฉบับนี้จนทำให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และขอขอบคุณศูนย์เครื่องมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่อนุเคราะห์ให้ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เพื่อการวิจัย รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ผู้ให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยนี้



26R4-08

## ทำเนียบวิทยากร

ชื่อบทความ	การเปรียบเทียบการปลดปล่อยคาร์บอนของการผลิตเนื้อจาก โคเนื้อ กระบือ สุกร และ ไก่เนื้อ Comparison of Carbon Emitted for Meat Production from Ox, Buffalo, Pig, and Chicken
ผู้นำเสนอบทความ	นายประยงค์ กิระดิษฐ์
สถานที่ทำงาน	สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (กำลังศึกษาอยู่) และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์	081-470-0185
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) - ปริญญาโท (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) - ปริญญาเอก (ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ใน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และอาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ประวัติการทำงาน	- วิศวกรสนาม, วิศวกร โครงการ, และผู้จัดการ โครงการ - อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล - ผู้อำนวยการสำนักทะเบียน และผู้บริหารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล - อนุกรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประสบการณ์	ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูงและอาคารต่างๆ, บริหารงาน, ออกแบบอาคารและร่วมออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียรวมทั้งประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย คสล., ออกแบบระบบท่อในอาคารต่างๆ, สอนนักศึกษาวิศวกรรมโยธา และให้การอบรมผู้อบรมตรวจสอบอาคาร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, บริหารงานสำนักทะเบียนและมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ผลงาน	- อาคารที่จอดรถ 21 ชั้น วิทยาศาสตร์ชีวภาพจุฬาฯ, หมู่บ้านจัดสรร, อาคารที่พักอาศัยและออฟท์ฟิศต่างๆ และอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล - เอกสารประกอบการสอนวิชาการประจำและการควบคุมมลภาวะ, เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม, ชลศาสตร์, ปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร์, คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่องและพีลิกส์สำหรับวิทยากรคอมพิวเตอร์ รวมทั้งบทความวิชาการต่างๆ



## เอกสารอ้างอิง

- [1] Intergovernmental Panel on Climate Change. The Scientific Basis, The Third Assessment Report of the IPCC, Cambridge, U.K., Press Syndicate of the University of Cambridge, 2001, 944p.
- [2] ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2547. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี ๒๕๔๗, เอกสารสถิติการเกษตร เลขที่ ๔๑๐, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
- [3] กรมปศุสัตว์. 2548. ข้อมูลสถิติปศุสัตว์ [ออนไลน์]. ได้จาก: [http:// www.dld.go.th](http://www.dld.go.th). Accessed date: March 2007.
- [4] Yamane, T. 1973. Mathematics for Economists: An Elementary Survey, 2<sup>nd</sup> ed., Prentice-Hall, New Delhi, 714p.
- [5] Cavana, R.Y., Delahaye, B.L. and Sekaran, U. 2001. Applied Business Research: Qualitative and Quantitative Methods, 3<sup>rd</sup> ed., John Wiley and Sons, New York, 472p.
- [6] Bunyavejchewin, P., Rompopak, W., Vechabusakorn, O., et. al. 1985. Comparative Efficiency of Tapes for Estimation of Weight of Swamp Buffaloes and Cattle. Annual Report 1985. The National Buffalo Research and Development Center Project. Bangkok, Thailand.
- [7] Kawashima, T., Terada, F., and Shibata, M. Respiration experimental system. In: Japan International Research Center for Agricultural Sciences, Japan and Department of Livestock Development, Thailand (eds.). Improvement of Cattle Production with Locally Available Feed Resources in Northeast Thailand, 2000; 1-21.
- [8] APHA, AWWA, WEF., 1998. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18<sup>th</sup> ed., American Public Health Association, Wash. D.C., USA, 445p.
- [9] Manlay, Raphaël J., Ickowicz, Alexandre, Masse, Dominique, Floret, Christian, Richard, Didier and Feller, Christian. 2004. Spatial carbon, nitrogen and phosphorus budget of a village in the West African savanna-I. Element pools and structure of a mixed-farming system. Agricultural Systems, 79: 55-81.
- [10] UNECE TFEIP. 2004. Task Force on Emission Inventories and Projections. [On-line]. Available: <http://tfeip-secretariat.org/unece.htm>. Accessed date: March 2007.
- [11] นพภาพร พานิช และคณะ. 2547. ตำราระบบบำบัดมลพิษอากาศ. ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- [12] National Transportation Statistics. 2000. C-emission from petrol used for transporting. [On-line]. Available: <http://www.gdrc.org/uem/CO2-Cal/CO2-Calculator.html>. Accessed date: March 2007.
- [13] U.S. EPA, AP-42. 1995. Compilation of Air Pollutant Emission Factors. [On-line]. Available: <http://www.epa.gov/ttn/chieff/ap42/index.htm> อ้างถึงใน นพภาพร พานิช และคณะ. 2547. ตำราระบบบำบัดมลพิษอากาศ: การจัดทำบัญชีแหล่งกำเนิดมลพิษอากาศ. กรุงเทพฯ, 8-11.
- [14] Moe, P.W., and Tyrell, H.F. 1979. J. Dairy Sci. 62: 1583.
- [15] เมธา วรณพัฒน์. 2533. โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ ฟีนีქซ์ปับลิชชิ่ง.
- [16] Minson, D.J. 1980. In: Grazing Animals (Ed. F.H.W. Morky). Elsevier Pub. Comp., The Netherlands: Amsterdam.
- [17] Ichhponani, J.S., Makkar, G.S., and Sidu, G.S. 1971. Indian Vet. 1: 809.
- [18] ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ. ระบบการผลิตโคเนื้อของประเทศไทย. ใน: วุฒิพงศ์ เศษะดำรงสิน. ประชาคมวิจัย, 2551; 13 (78): 4-9.



**สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย**  
**Environmental Engineering Association of Thailand**

เลขที่ 1-10555  
 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษคดี  
 ศ.ดร.อภัย พรหมศรีสวัสดิ์

นายก  
 ดร.เกษมสันต์ สุวรรณจิต

อุปนายก  
 ดร.ประเสริฐ สอนิยาบุตร  
 ดร.สรณพัฒน์ กาญจนวงศ์

เลขาธิการ  
 มีนา พิชัยโสภณกิจ

ที่ปรึกษาภาคพื้นภาคี  
 ศ.ดร.สุรินทร์ เศรษฐวานิชย์  
 คุณหญิงเชษฐาภรณ์ ทวีสิน  
 แพร่มศักดิ์ วาณิชชานนท์  
 อธิสละ ไชยสุภากร  
 ประณี พันธุเมธีชัย  
 ดร.อนุสรณ์ แลตนิมิต

ตั้งแต่ สมัชชา  
 ครุศักดิ์สิงห์ สวีและ  
 นิศาภา ไชยพันธ์  
 ดร.มณฑิลา ศรีวัฒนา หาญกานจน  
 ดร.ณัฏฐ์ ทองธรรมชาติ

กรรมการทรง  
 อดิศรภูษิน อดุลสุข  
 ประธานฝ่ายการเงิน  
 ดร.วราเชน ฝอย

ดร.ศร.วราวุธ เมธี  
 บรรณาธิการ  
 ศ.ดร.วันเพ็ญ วิจิตรบุญ

เมธิดาเด็ดยี่ สุโรจน์ภรทอง  
 ประธานฝ่ายกิจกรรม  
 ดร.ดร.เพชรพร เขียวทองใหญ่

ที่ สวสท./peer review/S09-02/2552

**วารสารวิชาการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย**  
**สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย**

30 มิถุนายน 2552

เรื่อง ตอบรับตีพิมพ์บทความ

เรียน คุณประยงค์ กิรดิอุไร

อ้างถึง บทความรหัส S09-02

ด้วยกองบรรณาธิการ ได้รับบทความวิจัยเรื่อง "การศึกษาการถ่ายเทมวลสารบ่อนของการผลิตเนื้อไก่ กระบือ และ สุนัขจากฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์" โดยมีผู้เขียน คือ ฉวีรัฐวุฒิ ธาณี วุฒิ ตำนกิตติกุล และประยงค์ กิรดิอุไร ซึ่งผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว และยินดีจะแจ้งให้ทราบว่าบทความของท่านมีกำหนดตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย (Thai Environmental Engineering Journal) Vol.23 No.2, 2009 ซึ่งกำหนดออกในเดือนสิงหาคม 2552 นี้

จึงใคร่ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจเสนอบทความตีพิมพ์ในวารสาร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ตีพิมพ์บทความของท่านอีกในโอกาสต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

รองศาสตราจารย์ ดร.เจติมราช วันทวิน  
 บรรณาธิการ



## The Study of Carbon Massflow in Ox, Buffalo, and Pig Meat Production from Farms and Slaughterhouses in Thailand

### การศึกษาการถ่ายเทมวลคาร์บอนของการผลิตเนื้อโค กระบือ และสุกรจากฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์ในประเทศไทย

ณัฐวุฒิ ธานี\* วุฒิ ด่านกิตติกุล\*\* และ ประยงค์ กี่วดีอุไร\*\*

Nathawut Thane\*, Wut Dankittikul\*\* and Prayong Keeratiurai\*\*

\*School of Biology, Institute of Science, Suranaree University of Technology,  
Nakhon Ratchasima Province 30000

\*\*School of Environmental Engineering, Institute of Engineering, Suranaree University of Technology,  
Nakhon Ratchasima Province 30000

E-mail: keeratiurai\_pray@windowslive.com, biology@sut.ac.th.

#### Abstract

Carbon is an important element of plants, animals, and humans. CO<sub>2</sub> and CH<sub>4</sub> from human activities are the most important greenhouse gases contributing to global climate change. Ox and buffalos are ruminants while pigs are energy-using that are raised for their meat, and produce emissions of both CO<sub>2</sub> and CH<sub>4</sub>. The carbon budget of ox, buffalos, and pigs during meat production were studied to determine carbon emitted from farms, to investigate the rate of carbon massflow from plants to ox, buffalo, and pig in the food chain and to study the carbon emission in energy patterns that was used in meat production in Nakhon Ratchasima province. The study showed that the carbon emitted per unit from farms and slaughterhouses in ox, buffalo, and pig meat production was 0.0066, 0.0051, and 0.0339 kg.C/living weight/day, respectively. The carbon fixation in meat and organs of ox, buffalos, and pigs was 0.0102, 0.0104, and 0.0062 kg.C/living weight/day, respectively and the rate of carbon massflow from grass and animal feed was 0.0148, 0.0143, and 0.0087 kg.C/living weight/day, respectively. This study also showed the percentage of carbon fixation in meat and organs of ox, buffalos, and pigs to the sum of carbon contents in grass and animal feed used for feeding was 69.24%, 72.53%, and 71.18%, respectively. The ratio of total carbon emitted to total carbon contents in grass and feed used for ox, buffalo, and pig feeding was

0.31, 0.28, and 0.28, respectively. The ratio of total carbon emitted per day to carbon fixation per day in meat and organs of ox, buffalos, and pigs was 0.45, 0.38, and 0.40, respectively. Ox production produced more environmentally harmful carbon than pig and buffalo production. For the same quantity of meat production it can be suggested that decreasing ox meat production and increasing buffalo meat production can decrease the environmental problems.

**Keywords :** Carbon massflow, carbon emission, meat production, ox, buffalo, pig

### บทคัดย่อ

คาร์บอนเป็นธาตุพื้นฐานสำคัญของพืช สัตว์และมนุษย์ ก๊าซ CO<sub>2</sub> และ CH<sub>4</sub> ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก การทำปศุสัตว์ โดยเฉพาะ โคเนื้อและกระบือซึ่งเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องและการใช้พลังงานสำหรับการเลี้ยงสุกรเพื่อการผลิตเนื้อเป็นสาเหตุหนึ่งของการเพิ่มปริมาณ CO<sub>2</sub> และ CH<sub>4</sub> ในชั้นบรรยากาศ ดังนั้นจึงควรศึกษาการปลดปล่อยคาร์บอนจากการทำฟาร์มและอัตราการถ่ายเทมวลคาร์บอนจากพืชอาหารสัตว์ไปสู่โคเนื้อ กระบือ และสุกร โดยการกิน รวมทั้งศึกษาอัตราการปลดปล่อยคาร์บอนจากการใช้พลังงานที่มีส่วนสำคัญในการผลิตเนื้อสัตว์จากฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่าค่าการปลดปล่อยคาร์บอนที่น้ำหนักตัวของสัตว์เท่ากับจากการใช้พลังงานของฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ และตัวของโคเนื้อ กระบือ และสุกรมีค่าเท่ากับ 0.0066, 0.0051, และ 0.0339 กิโลกรัมคาร์บอน/กิโลกรัมน้ำหนักตัวสัตว์/วัน ตามลำดับ ค่าการตรึงคาร์บอนไว้ในรูปของเนื้อและอวัยวะของโคเนื้อ กระบือ และสุกรมีค่าเท่ากับ 0.0102, 0.0104, และ 0.0062 กิโลกรัมคาร์บอน/กิโลกรัมน้ำหนักตัวสัตว์/วัน และอัตราการถ่ายเทมวลคาร์บอนจากพืชอาหารสัตว์ไปสู่สัตว์โดยการกินเท่ากับ 0.0148, 0.0143, และ 0.0087 กิโลกรัมคาร์บอน/กิโลกรัมน้ำหนักตัวสัตว์/วันตามลำดับ และยังพบอีกว่าประสิทธิภาพในการตรึงคาร์บอนไว้ในร่างกายจากพืชอาหารสัตว์ที่โคเนื้อ กระบือ และสุกรกินเท่ากับ 69.24%, 72.53%, และ 71.18% ตามลำดับและสัดส่วนของการปลดปล่อยคาร์บอนต่อปริมาณคาร์บอนจากพืชที่ถ่ายเทเข้าสู่สัตว์เท่ากับ 0.31, 0.28, และ 0.28 ตามลำดับ ในขณะที่สัดส่วนของการปลดปล่อยคาร์บอนต่อปริมาณคาร์บอนที่ถูกตรึงไว้ในตัวสัตว์เท่ากับ 0.45, 0.38, และ 0.40 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าคาร์บอนที่ถูกปลดปล่อยออกจากการเลี้ยงโคเนื้อมีส่วนในการก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมมากกว่าการเลี้ยงสุกรและกระบือ ดังนั้นถ้าพิจารณาจากชนิดของเนื้อที่คนนิยมบริโภคทดแทนกันได้การเลี้ยงกระบือควรถูกส่งเสริมมากกว่าการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

**คำสำคัญ :** การถ่ายเทมวลคาร์บอน การปลดปล่อยคาร์บอน การผลิตเนื้อสัตว์ โคเนื้อ กระบือ สุกร

## Introduction

Air pollution has resulted in adverse effects, which urgently require emission reductions. One of the environmental threats that our planet faces today is the long-term change in Earth's climate and temperature patterns due to global climate change, or the greenhouse effect. CO<sub>2</sub> and CH<sub>4</sub> from human activities are the most important greenhouse gases contributing to global climate change with CH<sub>4</sub> being 23 times more potent than CO<sub>2</sub> [1]. Ox and buffalos are ruminants while pigs are energy-using that are raised for their meat, and produce emissions of both CO<sub>2</sub> and CH<sub>4</sub>. It is therefore necessary to identify reduction potentials and evaluate them with respect to feasibility, affordability and accomplishment. In any case, the initial step is the quantification of emissions in a way that allows to meet these goals. In agriculture, this stresses the need for methods, which go beyond simple calculations of the type:

$$\text{emission rate} = \text{animal number} \times \text{emission factor} \quad (1)$$

The reduction of emissions of air pollutions is subject of international conventions, which include reporting of emissions in accordance with guidelines or guidebooks provided. With respect to emissions from agricultural sources, in particular from animal husbandry, the calculation procedure making use of partial emission factors for the various sources of emissions (animal house, storage, manure application, etc.) is being replaced by a mass flow concept for carbon species. The way to describe emissions from animal husbandry was to apply a mass flow approach, which depicts the pathways of C species strictly under the aspect of mass conservation [2].

Simpler methodologies calculate overall emissions in animal husbandry using fixed amounts per animal or animal place such as illustrated in Figure 1 where; E is the emission (kg. × area<sup>-1</sup>).

$$E_{\text{total}} = E_{\text{metabolic}} + E_{\text{grazing}} + E_{\text{housing}} + E_{\text{storage}} + E_{\text{spreading}} \quad (2)$$




Figure 1 Losses from animal excreta due to metabolic processes, during grazing, housing, storage and spreading according to the approach using “classical” partial emission factors for parallel flows. F denotes fluxes and E denotes emissions. [2]

For a given number of animals, total emissions are calculated using the sum of the partial emission factors where; n is the number of animals considered and EF is the emission factor ( $\text{kg.} \times \text{animal}^{-1} \times \text{area}^{-1}$ ).

$$E_{\text{total}} = n_{\text{animal}} \times (EF_{\text{metabolic}} + EF_{\text{grazing}} + EF_{\text{housing}} + EF_{\text{storage}} + EF_{\text{spreading}}) \quad (3)$$

Crops produced can serve as animal feed. They are inputs into the animal subsystem. In the animal subsystem, direct metabolic emissions will occur, in particular of CH<sub>4</sub> from enteric fermentation. C excreted are then stored and eventually spread. These flows and the respective emissions are dealt with in the manure management subsystem. Slurry and manure treatments are important measures to reduce emissions [3].

Carbon is an important element for humans because it is the primary element of both plants and animals and cycles through living and non-living components [4]. The focus of this study is on carbon which is transferred to the food chain and fixed in meat. Therefore it is important to study the relationship between the carbon emissions, carbon massflow, and energy use for meat production.

The primary objective of this study was to determine carbon emitted from ox, buffalo, and pig farms. To accomplish this we studied the rate of carbon massflow from plants to an ox, a buffalo, and a pig, and included the carbon emissions from electricity, wood or paddy husk, and petroleum used during meat production in Nakhon Ratchasima.

## Materials and Methods

### Study Area

We studied ox, buffalo, and pig farms and slaughterhouses, in 32 districts of Nakhon Ratchasima province which are shown in Figures 2 [5]. Nakhon Ratchasima province has an agricultural area of 12,469 square kilometers and has the largest area of ox farms in Thailand [6].

### Size of Samples, Site Sampling Methods and Analytical Methods

The numbers of farms and the numbers of ox, buffalos, and pigs on farms in each district were calculated by determining the numbers of ox, buffalo, and pig farms and the numbers of ox, buffalos, and pigs in the province are shown in Table 1 [7, 8].






Figure 2 Ox, buffalo, and pig farm areas in Nakhon Ratchasima province [5]

**Table 1** Numbers of farms, slaughterhouses, and animals

Kind of animal	Animal age (day)	Farms	Slaughterhouses	Animals
Ox	711.75 ± 121.55	398	17	400
Buffalo	1277.50 ± 226.48	390		398
Pig	131.24 ± 22.64	390	7	400

Grass and feed, plus their meat and faeces were collected and transferred to the laboratory at Suranaree University of Technology for measurements. The analytical methods for moisture content of animal feed, meat, entrails, and faeces from animals is weighing sample after oven drying at 103-105 °C for 24 h [9], carbon content of animal feed, meat, entrails, and faeces from animals is using CNS-2000 ELEMENTAL ANALYZER [9] and carbon content of gases from faeces and animals is using GAS ANALYZER [10], volatile solids and ash of animal feed, meat, entrails, and faeces from animals are weighing the known weight of the sample after burning at 550 °C for 30 min [11], weight of animal feed, meat, entrails, and faeces from animals is weighing and animal weight is using cattle weighing tape [12].

## Results and Discussion

### The Rate of Carbon Contents Massflow and the Carbon Emitted

This study determined that the rate of carbon massflow from animal feed for feeding to the biomass of ox, buffalo, and pig ( $C_{input}$ ) was  $4.46 \pm 1.93$ ,  $6.51 \pm 3.14$ , and  $0.879 \pm 0.30$  kg.C/head/day, respectively

are shown in Table 2.  $C_{input}$  are the carbon contents transferred from plants and animal feed to ox, buffalo, and pig by feeding.  $C_{fixation}$  are the carbon contents fixed in meat and organs of ox, buffalo, and pig.  $C_{output}$  are the carbon contents in faeces excreted from animals.  $C_{emission}$  are the sum of the carbon contents of  $CO_2$  and  $CH_4$  gases from faeces and enteric fermentation, and respiration.  $C_{emitted}$  are the carbon contents in faeces ( $C_{output}$ ) and carbon emission ( $CO_2$  and  $CH_4$ ) from enteric fermentation, respiration, and faeces ( $C_{emission}$ ) of ox, buffalo, and pig ( $C_{emitted} = C_{output} + C_{emission}$ ).

Table 2 also shows that the carbon fixation of ox, buffalos, and pigs was  $3.09 \pm 1.97$ ,  $4.72 \pm 3.14$ , and  $0.626 \pm 0.256$  kg.C/head/day, respectively. Carbon was calculated by mass balance. According to Thanee *et al.* (2008), the  $C_{input}$  minus the carbon contents emitted in faeces, enteric fermentation, and respiration ( $C_{emitted}$ ) was the carbon mass fixed in the body ( $C_{fixation}$ ). Ox production produced more environmentally harmful carbon than buffalo production [13]. The carbon emitted for ox, buffalos, and pigs was  $1.38 \pm 0.36$ ,  $1.80 \pm 0.51$ , and  $0.253 \pm 0.058$  kg.C/head/day, respectively.  $CO_2$  and  $CH_4$  gases which were emitted from faeces, enteric fermentation and respiration of animals are shown in Table 3. Figure 3 shows the ratio of the carbon massflow


**Table 2** The average of  $C_{input}$ ,  $C_{fixation}$ ,  $C_{emitted}$ ,  $C_{output}$ , and  $C_{emission}$  of  $CO_2$  and  $CH_4$  from animals on farms (Average  $\pm$  standard deviation)

Kind of animal		Ox	Buffalo	Pig	
Living weight (kg./head)		302.25 $\pm$ 100.72	456.10 $\pm$ 134.38	100.91 $\pm$ 6.31	
$C_{input}$ massflow from plant by feeding (kg.C/head/day)		4.46 $\pm$ 1.93	6.51 $\pm$ 3.14	0.879 $\pm$ 0.30	
$C_{fixation}$ (mass balance) (kg.C/head/day)	Meat	0.031	0.0198	0.047	
	Entrails	0.004	0.0039	0.007	
	Bone, skin, blood, etc.	3.055	4.696	0.572	
	<b>Total <math>C_{fixation}</math></b>	<b>3.09 <math>\pm</math> 1.97</b>	<b>4.72 <math>\pm</math> 3.14</b>	<b>0.626 <math>\pm</math> 0.256</b>	
$C_{emitted}^*$ (kg.C/head/day)	Dried faeces ( $C_{output}$ )		0.894 $\pm$ 0.31	1.12 $\pm$ 0.44	0.178 $\pm$ 0.044
	$C_{emission}$ of $CO_2$ and $CH_4$ gases	Faeces	0.011 $\pm$ 0.005	0.021 $\pm$ 0.012	0.0004 $\pm$ 0.0001
		Enteric fermentation and respiration	0.471 $\pm$ 0.188	0.66 $\pm$ 0.277	0.075 $\pm$ 0.037
	<b>Total <math>C_{emitted}</math></b>		<b>1.38 <math>\pm</math> 0.36</b>	<b>1.80 <math>\pm</math> 0.51</b>	<b>0.253 <math>\pm</math> 0.058</b>

$$*C_{emitted} = C_{output} + C_{emission}$$

**Table 3** Gas emission from animals (Average  $\pm$  standard deviation)

Average of gases	Kind of animal	$CH_4$ (kg. $CH_4$ /head/day)	$CO_2$ (kg. $CO_2$ /head/day)
Faeces	Ox	0.004 $\pm$ 0.002	0.031 $\pm$ 0.015
	Buffalo	0.005 $\pm$ 0.003	0.062 $\pm$ 0.035
	Pig	0.0001 $\pm$ 0.0000	0.0010 $\pm$ 0.0003
Enteric fermentation and respiration	Ox	0.104 $\pm$ 0.063	1.440 $\pm$ 0.618
	Buffalo	0.127 $\pm$ 0.068	2.069 $\pm$ 0.942
	Pig	0.0071 $\pm$ 0.0074	0.2536 $\pm$ 0.1286



**Figure 3 Carbon contents transferred from grass to ox's parts, buffalo's parts, and pig's parts (kg.C/head/day)**

by feeding. The carbon mass fixed in the biomass of ox, buffalo, and pig was 69.18%, 72.38%, and 71.14%, respectively and that emitted from faeces, enteric fermentation and respiration was 30.82%, 27.62%, and 28.86%, respectively. Carbon emitted which contributes to environmental problems show that buffalos encourage less global climate change than pigs and ox because buffalos fixed the carbon contents in its body more efficiently than pigs and ox.

#### Carbon Contents Emission from Energy Sectors for Meat Production

Ox, buffalo, and pig farms and slaughterhouses are energy-using that are raised for their meat, and produce emissions of both CO<sub>2</sub> and

CH<sub>4</sub>. The first sector was electric light and heat energy. The second sector was petrol used for animals and animal feed transport. The third sector was petroleum for cutting grass and transferring it to farms for feeding. C-emission<sub>(energy)</sub> are the carbon contents emission from energy-using electricity, wood or paddy husk, and petroleum of farms and slaughterhouses in meat production.

The C-emission<sub>(energy)</sub> per unit of all 3 energy sectors at ox, buffalo, and pig farms were 0.09, 0.08, and 0.83 kg.C/head/day, respectively. The slaughterhouses in Nakhon Ratchasima used energy for electric light, boiling the water for pig skin cleaning, and delivering meat from slaughterhouses to markets with C-emission<sub>(energy)</sub> per unit of energy used for ox,

buffalo, and pig meat production being 0.52, 0.44, and 2.34 kg.C/head/day, respectively. On the other hand, the C-emission<sub>(energy)</sub> of energy used for meat production by farms and slaughterhouses were  $2.05 \times 10^{-3}$ ,  $1.14 \times 10^{-3}$ , and  $31.41 \times 10^{-3}$  kg.C/living weight/day, respectively are shown in Table 4.

The pig farms in Nakhon Ratchasima province used more energy than ox and buffalo farms for feeding. A buffalo and an ox emitted more carbon than a pig but the carbon contents per unit in the energy sectors for buffalo and ox meat production were lower than the values for pig meat production are shown in Figure 4.


**Table 4** The average of C-emission<sub>(energy)</sub> from energy sectors at farms and slaughterhouses (Average  $\pm$  standard deviation)

Average carbon contents from energy sectors (kg.C/head/day)		C-emission <sub>(energy)</sub>		
		Ox	Buffalo	Pig
Farms	Electricity <sup>*</sup>	0.00 $\pm$ 0.01	0.00 $\pm$ 0.00	0.02 $\pm$ 0.02
	Transportation energy <sup>**</sup>	0.00 $\pm$ 0.00	0.01 $\pm$ 0.01	0.81 $\pm$ 0.85
	Engine energy <sup>***</sup>	0.09 $\pm$ 0.13	0.07 $\pm$ 0.16	N.D.
	<b>Total carbon contents</b>	<b>0.10</b>	<b>0.08</b>	<b>0.83</b>
Slaughterhouses	Electricity <sup>*</sup>	0.22 $\pm$ 0.37	0.12 $\pm$ 0.04	0.05 $\pm$ 0.04
	Transportation energy <sup>**</sup>	0.30 $\pm$ 0.26	0.32 $\pm$ 0.39	0.01 $\pm$ 0.00
	Wood and paddy husk	N.D.	N.D.	2.28 $\pm$ 1.02
	<b>Total carbon contents</b>	<b>0.52</b>	<b>0.44</b>	<b>2.34</b>
<b>Total carbon emission from farms and slaughterhouses</b>	<b>(kg.C/head/day)</b>	<b>0.62</b>	<b>0.52</b>	<b>3.17</b>
	<b>(kg.C/living weight/day)</b>	<b><math>2.05 \times 10^{-3}</math></b>	<b><math>1.14 \times 10^{-3}</math></b>	<b><math>31.41 \times 10^{-3}</math></b>

<sup>\*</sup>CO<sub>2</sub> emission = 0.18 kg.C/kWh [14]

<sup>\*\*</sup>CO<sub>2</sub> emission = 74.5 kg.CO<sub>2</sub>/1 Ton/500 km [15]

<sup>\*\*\*</sup>CO<sub>2</sub> emission from diesel oil = 2.24 kg.CO<sub>2</sub>/L and CO<sub>2</sub> emission from gasoline = 2.10 kg.CO<sub>2</sub>/L [16], [17]



**Figure 4 Percentages of  $C_{emitted}$  from animals and  $C_{emission}$  from energy sectors in meat production**

#### Relation of Carbon Contents and Physical Properties of Animal Feed, Meat, and Faeces from Ox, Buffalo, and Pig


The percentages of moisture, volatile solids, ash, and carbon contents of animal feed, meat, and faeces of animals are shown in Table 5. The lowest percentage of carbon content was in buffalo's faeces ( $30.14 \pm 6.07\%$ ) and highest in buffalo's meat ( $68.67 \pm 0.21\%$ ). These percentages of carbon

contents from faeces and meat showed that the buffalo fixed highest level of carbon in its body. The conclusion of the carbon massflow for ox, buffalos, and pigs are shown in Figure 5. The ratio of  $CH_4$  to  $CO_2$  emitted from faeces, enteric fermentation and respiration of ox was greater than the value for buffalos [18]. This study also showed the relation of  $C_{emitted}$  and  $C_{input}$  (Sig.  $F < 0.05$ ) and  $C_{fixation}$  and  $C_{input}$  (Sig.  $F < 0.05$ ) are shown in Figure 6(a) and 6(b), respectively.

**Table 5 Physical properties, carbon contents, and the relation of C and VS of animal feed, meat, and faeces (Average  $\pm$  standard deviation)**


Type	Moisture (%)	Volatile solids (%)	Ash (%)	Carbon Contents (%)	Linear regression equations	Coefficient of determination ( $R^2$ )
Grass	76.64 $\pm$ 7.99	75.20 $\pm$ 3.45	24.80 $\pm$ 3.45	40.42 $\pm$ 1.33	%VS = 3.54 (%C) - 68.59	0.89
Rice straw	7.79 $\pm$ 1.39	70.91 $\pm$ 2.74	29.81 $\pm$ 2.74	40.13 $\pm$ 1.47	%VS = 1.54 (%C) + 8.26	0.69
Ox meat	73.05 $\pm$ 5.59	83.34 $\pm$ 4.20	16.65 $\pm$ 4.20	58.99 $\pm$ 0.25	%VS = 16.40 (%C) - 884.11	0.94
Ox's faeces	81.12 $\pm$ 3.78	62.18 $\pm$ 10.48	37.82 $\pm$ 10.48	33.47 $\pm$ 5.08	%VS = 2.65 (%C) - 26.35	0.89
Buffalo meat	76.71 $\pm$ 1.85	86.61 $\pm$ 3.29	13.39 $\pm$ 3.29	68.67 $\pm$ 0.21	%VS = 14.90 (%C) - 936.50	0.88
Buffalo's faeces	81.98 $\pm$ 4.42	54.45 $\pm$ 11.23	45.55 $\pm$ 11.23	30.14 $\pm$ 6.07	%VS = -2.31 (%C) - 14.93	0.95
Pig's feed	10.48 $\pm$ 2.22	70.28 $\pm$ 2.42	29.72 $\pm$ 2.42	45.02 $\pm$ 2.05	%VS = 0.93 (%C) + 28.43	0.62
Pig meat	68.74 $\pm$ 5.63	82.62 $\pm$ 3.67	17.38 $\pm$ 3.67	48.00 $\pm$ 5.09	%VS = 0.70 (%C) + 48.97	0.94
Pig's faeces	67.71 $\pm$ 5.54	61.30 $\pm$ 3.40	38.7 $\pm$ 3.4	35.98 $\pm$ 1.83	%VS = 1.78 (%C) - 2.78	0.92
Paddy husk	11.12 $\pm$ 1.01	60.67 $\pm$ 5.45	39.33 $\pm$ 5.45	35.56 $\pm$ 3.33	%VS = 1.64 (%C) + 2.99	0.95

### Ox meat production in Nakhon Ratchasimaa



(a) Carbon massflow of ox


### Buffalo meat production in Nakhon Ratchasimaa



### (b) Carbon massflow of buffalo

### Pig meat production in Nakhon Ratchasimaa

$$\text{Total } C\text{-emitted}_{\text{animal}} = (C\text{-output}) + (C\text{-emission}_{\text{animal}}) = 0.253 \pm 0.058 \quad \text{unit : kg C/head/day}$$



### (c) Carbon massflow of pig

Figure 5 Carbon massflow for ox, buffalo, and pig meat production






Figure 6 Relation of  $C_{emitted}$  to  $C_{input}$ , and  $C_{fixation}$  to  $C_{input}$  at 95% confidence

## Conclusions

The study showed that carbon emitted from ox, buffalo, and pig farms and slaughterhouses was 0.0066, 0.0051, and 0.0339 kg.C/living weight/day, respectively. Carbon fixation in meat and organs of

ox, buffalos, and pigs was 0.0102, 0.0104, and 0.0062 kg.C/living weight/day, respectively. The rate of carbon massflow from grass and animal feed to ox, buffalos, and pigs was 0.0148, 0.0143, and 0.0087 kg.C/living weight/day, respectively.

Furthermore, this study showed that the ratio of the carbon fixed in meat and organs of ox, buffalos, and pigs to the carbon contents in grass and feed was 0.69, 0.72, and 0.71, respectively. The ratio of the total carbon emitted per head per day to the total carbon contents per head per day in grass and feed used for ox, buffalos, and pigs feeding was 0.31, 0.28, and 0.28, respectively. This ratio of  $C_{\text{emitted}}$  to  $C_{\text{input}}$  shows that the contribution to environmental problems from ox is the highest. The ratio of the total carbon emitted to the carbon fixation of ox, buffalos, and pigs was 0.45, 0.38, and 0.40, respectively. Ox production produced more environmentally harmful carbon than pig and buffalo production, respectively. For the same quantity of meat production it can be suggested that decreasing ox meat production and increasing buffalo meat production can decrease the environmental problems.

#### Acknowledgements

The researchers acknowledge the Centre for Scientific and Technological Equipment, Suranaree University of Technology for providing laboratory analyses. This work received financial support from National Research Council of Thailand. We thank our advisor, teachers, consulting persons and our families for critical and helpful comments to this research.

#### References

- [1] Intergovernmental Panel on Climate Change. 2001. Climate Change 2001, The Scientific Basis. The Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Press Syndicate of the University of Cambridge, Cambridge, U.K., 944p.
- [2] Dämmgen, U., Webb, J. 2006. The development of the EMEP/CORINAIR Guidebook with respect to the emissions of different nitrogen and carbon species from animal production. *Agriculture, Ecosystems and Environment*. 112: 241-248.
- [3] Dämmgen, U., Menzi, H., Webb, J. 2003. Background on ammonia (and other gaseous) emissions from agriculture: UNECE CLRTAP Task Force on Emission Inventories and Projections Agriculture and Nature Panel [On-line]. Available: [http://air-climate.eionet.eu.int/docs/meetings/030227\\_AgricE-miss/3\\_Backgrnd\\_Agric\\_Em\\_NH3\\_Ulrich\\_Daemmgen.pdf](http://air-climate.eionet.eu.int/docs/meetings/030227_AgricE-miss/3_Backgrnd_Agric_Em_NH3_Ulrich_Daemmgen.pdf). Accessed date: March 2007.
- [4] Lauhajinda, N. 2006. Ecology: Fundamentals of Environmental. 2<sup>nd</sup> ed. Kasetsart University, Bangkok, 292p.
- [5] Department of Livestock Development. 2005. Livestock Statistics Data. [On-line]. Available: <http://www.dld.go.th/index.html>. Accessed date: December 2006.
- [6] Center for Agricultural Information, Office of Agricultural Economics. 2004. Agricultural Statistics of Thailand 2004. Agricultural Statistics No.410. Ministry of Agriculture and Co-operatives. Bangkok.
- [7] Yamane, T. 1973. Mathematics for Economists: An Elementary Survey. 2<sup>nd</sup> ed. Prentice-Hall, New Delhi, India, 714p.

- [8] Cavana, R.Y., Delahaye, B.L., and Sekaran, U. 2001. *Applied Business Research: Qualitative and Quantitative Methods*. 3<sup>rd</sup> ed. John Wiley and Sons, NY, 472p.
- [9] Manlay, R.J., Ickowicz, A., Masse, D., Floret, C., Richard, D. and Feller, C. 2004. Spatial carbon, nitrogen and phosphorus budget of a village in the West African savanna-I. Element pools and structure of a mixed - farming system. *Agricultural Systems*, 79:55-81.
- [10] Kawashima, T., Terada, F. and Shibata, M. 2000. Respiration experimental system. In: *Improvement of Cattle Production with Locally Available Feed Resources in Northeast Thailand*. Edited by Japan International Research Center for Agricultural Sciences, Japan and Department of Livestock Development, Thailand, p. 1-21.
- [11] APHA, AWWA, WEF. 1998. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. 20<sup>th</sup> ed. American Public Health Association, Wash. D.C., USA, 445p.
- [12] Vudhipanee, P., Lortae, K. and Imvatana, S. 2002. Comparative efficiency of weight prediction equations of swamp buffalo. *Animal Husbandry Division. DLD*. Available from: [www.dld.go.th/research-AHD/ Webpage/2545/45\(3\)-0406-147.pdf](http://www.dld.go.th/research-AHD/ Webpage/2545/45(3)-0406-147.pdf). Accessed date: June 2007.
- [13] Thanee, N., Dankittikul, W., and Keeratiurai, P. 2008. Comparison of carbon emission factors from ox and buffalo farms and slaughterhouses in meat production. *Proceedings of the International Conference on Energy Security and Climate Change: Issues, Strategies, and Options; August 6-8, 2008; Sofitel Centara Grand, Bangkok, Thailand*, p. 52-53.
- [14] Pollution Control Department. 2003. *Acid Deposition Control Strategy in the Kingdom of Thailand*. Japan International Cooperation Agency.
- [15] National Transportation Statistics. 2000. C-emission from petrol used for transporting. [On-line]. Available: <http://www.vcacarfueldata.org.uk/downloads>, [http://www.gdrc.org/uem/CO<sub>2</sub>-Cal/CO<sub>2</sub>-Calculator.html](http://www.gdrc.org/uem/CO2-Cal/CO2-Calculator.html). Accessed date: March 2007.
- [16] U.S. EPA, AP-42 1995. *Compilation of Air Pollutant Emission Factors*. [On-line]. Available: <http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/index.htm>. Accessed date: March 2007.
- [17] World Health Organization. 1993. *Assessment of Source of Air, Water and Land Pollution*. [On-line]. Available: [http://www.who.int/environmental\\_information/Information\\_resources/on-line\\_general.htm](http://www.who.int/environmental_information/Information_resources/on-line_general.htm), [http://whqlibdoc.who.int/hq/1993/WHO\\_PEP\\_GETNET\\_93.1-A.pdf](http://whqlibdoc.who.int/hq/1993/WHO_PEP_GETNET_93.1-A.pdf). Accessed date: March 2007.
- [18] Dankittikul, W. and Keeratiurai, P. 2008. Comparison of carbon massflow and emission factors from ox and buffalo farms in beef production. *Proceedings of the 4<sup>th</sup> International Conference on Knowledge Networks and Regional Development in the Greater Mekong Sub region and Asia-Pacific; June 22-27, 2008; Kunming, Yunnan Province, People's Republic of China*, p. 60.

13 August 2009


Dear Dr. P. Keeratiurai,

Now I am pleased to inform you that the paper entitled "Comparison of Carbon Emitted Factors from Ox and Buffalo Farms and Slaughterhouses in Meat Production" by N. Thanee, W. Dankittikul, and P. Keeratiurai is accepted for publication in Thai Journal of Agricultural Science.

The details on Volume and Issue including proofs will be sent to you very soon.

Thank you very much for submitting your paper to our journal.

Very sincerely yours,



\*\*\*\*\*

Irb Kheoruenromne, Ph.D. Professor

Editor in Chief of Thai J. Agric. Science

Department of Soil Science

Faculty of Agriculture, Kasetsart University

Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

Tel: 662-942-8546, Fax: 662-942-8545

E-mail: [irbs@ku.ac.th](mailto:irbs@ku.ac.th)

[irbs@thaiagj.org](mailto:irbs@thaiagj.org)

Suphicha Thanachit, Ph.D

Managing Secretary

Email: [g4381015@ku.ac.th](mailto:g4381015@ku.ac.th)

[suphicha@thaiagj.org](mailto:suphicha@thaiagj.org)

## Comparison of Carbon Emitted Factors from Ox and Buffalo Farms and Slaughterhouses in Meat Production

N. Thanee<sup>1</sup>, W. Dankittikul<sup>2</sup>, and P. Keeratiurai<sup>2,\*</sup>

<sup>1</sup>*School of Biology, Institute of Science, Suranaree University of Technology  
Nakhon Ratchasima, 30000, Thailand*

<sup>2</sup>*School of Environmental Engineering, Institute of Engineering  
Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, 30000, Thailand*

\*Corresponding author. Email: keeratiurai\_pray@windowslive.com

### Abstract

The carbon budget of oxen and buffaloes during meat production were studied to develop carbon emitted factors from ox and buffalo farms and slaughterhouses in ox and buffalo meat production; to investigate the rate of carbon massflow from plants to oxen and buffaloes in the food chain and to study the carbon emission in energy patterns from electric energy and petrol that was used in meat production in Nakhon Ratchasima province. The study showed that the carbon emitted per unit from ox and buffalo farms and slaughterhouses in ox and buffalo meat production were 2.00 and 2.32 kg C head<sup>-1</sup> d<sup>-1</sup>, respectively. The carbon fixation in meat and organs, of oxen and buffaloes was 3.09 and 4.72 kg C head<sup>-1</sup> d<sup>-1</sup>, respectively and the rate of carbon massflow from grass, and the energy used for electricity, and petroleum was 5.15 and 7.10 kg C head<sup>-1</sup> d<sup>-1</sup>, respectively. This study also showed the ratio of the carbon fixation in ox or buffalo meat and organs to the sum of carbon contents in grass, and carbon contents from electric energy and petrol used in ox and buffalo meat production was 0.60 and 0.66, respectively. The ratio of total carbon emitted per unit to total carbon contents per unit in grass and energy used in ox and buffalo meat production was 0.39 and 0.33, respectively. The ratio of total carbon emitted per day to carbon fixation per day in meat and organs of an ox and a buffalo was 0.65 and 0.49, respectively. Ox production produced more environmentally harmful carbon than buffalo production. For the same quantity of meat production it can be suggested that decreasing ox meat production and increasing buffalo meat production can decrease the environmental problems. The carbon contents changes emitted in meat production in ton C per year from ox and buffalo farms and slaughterhouses in Nakhon Ratchasima province can be predicted by using the equation from simple linear regression analysis and least square method as follow; C-emitted<sub>ox meat</sub> = 38814(year) + 125824 (R<sup>2</sup> = 0.78) and C-emitted<sub>buffalo meat</sub> = 1568.7(year) + 50931 (R<sup>2</sup> = 0.92) where; year is year of our Lord in 2001-2010.

**Keywords:** carbon massflow, carbon emission, ox, buffalo

### Introduction

One of the environmental threats that our planet faces today is the long-term change in Earth's climate and temperature patterns due to global climate change, or the greenhouse effect. CO<sub>2</sub> and CH<sub>4</sub> from human activities are the most important

greenhouse gases contributing to global climate change (Intergovernmental Panel on Climate Change, 1995) with CH<sub>4</sub> being 23 times more potent than CO<sub>2</sub> (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2001). Ox and buffalo are herbivores that are raised for their meat, and produce emissions of both CO<sub>2</sub> and CH<sub>4</sub>.

Carbon is an important element for humans because it is the primary element of both plants and animals and it cycles through living and non-living components (Lauhajinda, 2006). One product of carbon fixation is the protein in meat and animal products. The focus of this study is on carbon which is transferred to the food chain and fixed in meat. The net carbon production is the rate at which carbon is fixed during growth, and can be used to explain the time averaged C stocks by carbon weight per time (van Noordwijk et al., 1997, 1998). Therefore it is important to study and understand the relationship between the carbon emissions and carbon transfer to herbivores' energy use for meat production.

#### Materials and Methods

The primary objective of this study was to develop carbon emitted factors for ox and buffalo farms and slaughterhouses in ox and buffalo meat production. To accomplish this we studied the rate of carbon massflow from plants to ox and buffalo, and included the carbon emissions from electricity and petroleum used during meat production in Nakhon Ratchasima.

We studied ox and buffalo farms and slaughterhouses, in 32 districts of Nakhon Ratchasima province (Figures 1 and 2, respectively). Nakhon Ratchasima province has an agricultural area of 12,469.46 square kilometers and is the largest area of ox and buffalo farms in Thailand (Center for Agricultural Information,

Office of Agricultural Economics, 2004). Grass and feed for oxen and buffaloes, plus their meat and faeces were collected and transferred to the laboratory at Suranaree University of Technology for measurements. The analytical methods are shown in Table 1.

#### Size of Samples

The numbers of farms, of oxen and buffaloes, in each district were calculated by determining the number of ox and buffalo farms and the number of oxen and buffaloes in the province at 95% confidence level (Yamane, 1973; Cavana et al., 2001). According to the population of the study, the totals of population study of the ox farms and buffalo farms were 56,386 and 12,618 farms, respectively. Therefore, the researcher calculated the sample group by Taro Yamane's formula (Yamane, 1973) as follows:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad (1)$$

Where,

n = Sample size

N = Population size

e = The error of sampling

So, the example of the sample size of ox farms for the study has been calculated according to the recommendation as follows:

$$n = 56386 / \{1 + 56386 * (0.05)^2\} = 398 \text{ ox farms}$$

**Table 1** Methods for property analysis of animal feed, meat, entrails, gases, and faeces from animals

Property	Analytical method
Moisture content	By weighing sample after oven drying at 103-105°C for 24 h (Manlay et al., 2004).
Carbon content (C)	By CNS-2000 ELEMENTAL ANALYZER (Manlay et al., 2004) and GAS ANALYZER (Kawashima et al., 2000).
Volatile solids and ash	By weighing the known weight of the sample after burning at 550°C for 30 min (APHA, AWWA, WEF., 1998).
Weight	By weighing or using cattle weighing tape (Vudhipanee et al., 2002).




Figure 1 Ox farm areas in Nakhon Ratchasima (Department of Livestock Development, 2005).




Figure 2 Buffalo farm areas in Nakhon Ratchasima (Department of Livestock Development, 2005).

With  $N = 56386$ ,  $e = 5\%$  (at 95% confidence level), hence the sample size is 398 respondents. The results showed that sample size were 398 ox farms, 390 buffalo farms, and 17 slaughterhouses which calculated by Taro Yamane formula. Taro Yamane's formula also used to obtain the sample size of oxen, and buffaloes to be totalled 400 oxen from ox farms, and totalled 398 buffaloes from buffalo farms.

## Results and Discussion

### The Rate of Carbon Contents Massflow and the Carbon Emitted Factors

This study determined that the rate of carbon massflow from grass for feeding to the biomass and the faeces of oxen and buffaloes ( $C_{input}$ ). The rate of transference of carbon contents from plants to ox and buffalo were  $4.46 \pm 1.93$  and  $6.51 \pm 3.14$  kg C

head<sup>-1</sup> d<sup>-1</sup>, (average  $\pm$  standard deviation) respectively (Table 2). Table 2 also shows the carbon fixation factors of ox and buffalo were  $3.09 \pm 1.97$  and  $4.72 \pm 3.14$  kg C head<sup>-1</sup> d<sup>-1</sup>, respectively. Carbon contents were calculated by mass balance. The transference of carbon contents ( $C_{input}$ ) minus the carbon contents emitted in faeces, enteric fermentation, and respiration ( $C_{emitted}$ ) were the carbon mass fixed in the body ( $C_{fixation}$ ). The carbon emitted factors for ox and buffalo were  $1.38 \pm 0.36$  and  $1.80 \pm 0.51$  kg C head<sup>-1</sup> d<sup>-1</sup>, respectively. Table 2 also shows the ratio of  $C_{emitted}$  per day from ox and buffalo to  $C_{input}$  per day of ox and buffalo by feeding was 30.94% and 27.65%, respectively. This ratio of  $C_{emitted}$  to  $C_{input}$  shows that the contribution to environmental problems from buffalo is lower than for ox.

Figures 3 and 4 show the percentages of CH<sub>4</sub> and CO<sub>2</sub> emitted from ox and buffalo. Comparison of the ratio of CH<sub>4</sub> to CO<sub>2</sub> emitted from faeces, enteric fermentation and respiration of ox was

greater than the value for buffalo. Therefore ox was contributing more to global climate change than buffalo.

CO<sub>2</sub> and CH<sub>4</sub> gases which were emitted from faeces, enteric fermentation and respiration of ox and buffalo are shown in Table 3.

Table 4 shows the ratio of meat, entrails, skin, blood, and bone to weight of ox and buffalo that were killed in slaughterhouses.

Figures 5 and 6 show the ratio of the carbon contents transferred to ox and buffalo by feeding. The carbon mass fixed in the biomass of ox and buffalo was 69.18% and 72.38%, respectively, and that emitted from faeces, enteric fermentation and respiration of ox and buffalo was 30.82% and 27.62%, respectively. Carbon emitted which contribute to environmental problems show that buffalo encourage less global climate change than ox because buffalo fixed the carbon contents in its body more efficiently than ox.

**Table 2** The average of  $C_{input}$ ,  $C_{fixation}$ ,  $C_{emitted}$ ,  $C_{output}$ , and  $C_{emission}$  of CO<sub>2</sub> and CH<sub>4</sub> from ox and buffalo on farms (average  $\pm$  standard deviation).

Kind of animal	Ox	Buffalo
$C_{input}$ transferred from plant by feeding (kg C head <sup>-1</sup> d <sup>-1</sup> )	4.46 $\pm$ 1.93	6.51 $\pm$ 3.14
$C_{fixation}$ Meat	0.031	0.0198
(mass balance) Entrails	0.004	0.0039
Bone, skin, blood and etc.	3.055	4.696
(kg C head <sup>-1</sup> d <sup>-1</sup> ) Total $C_{fixation}$	3.09 $\pm$ 1.97	4.72 $\pm$ 3.14
$C_{emitted}$ Dried Faeces ( $C_{output}$ )	0.894 $\pm$ 0.31	1.12 $\pm$ 0.44
(kg C head <sup>-1</sup> d <sup>-1</sup> ) $C_{emission}$ of CO <sub>2</sub> and CH <sub>4</sub> gases		
Faeces	0.011 $\pm$ 0.005	0.021 $\pm$ 0.012
Enteric fermentation and respiration	0.471 $\pm$ 0.188	0.66 $\pm$ 0.277
Total $C_{emitted}$ from animal	1.38 $\pm$ 0.36	1.80 $\pm$ 0.51

**Table 3** The average of CH<sub>4</sub> and CO<sub>2</sub> emission from ox and buffalo in farms in Nakhon Ratchasima (average  $\pm$  standard deviation).

Kind of animal	Average of gases (kg head <sup>-1</sup> d <sup>-1</sup> )	CH <sub>4</sub>	CO <sub>2</sub>
Ox	Faeces	0.00 $\pm$ 0.00	0.03 $\pm$ 0.01
	Enteric fermentation and respiration	0.10 $\pm$ 0.06	1.44 $\pm$ 0.62
Buffalo	Faeces	0.01 $\pm$ 0.00	0.06 $\pm$ 0.03
	Enteric fermentation and respiration	0.13 $\pm$ 0.07	2.07 $\pm$ 0.94






Figure 3 The percentages of CH<sub>4</sub> and CO<sub>2</sub> gases from faeces of ox and buffalo.




Figure 4 The percentages of CH<sub>4</sub> and CO<sub>2</sub> gases from enteric fermentation and respiration of ox and buffalo

#### Carbon Contents Emission from Energy Sectors for Meat Production

The ox and buffalo farms in Nakhon Ratchasima province used little energy for feeding. The first sector was electric light energy. The second sector was petrol used for animal transport. The third sector was petroleum for cutting grass and transferring it to farms for feeding. The  $C_{input}$  and  $C_{emission}$  per unit of all 3 energy sectors at ox farms were  $0.12 \pm 0.16$  and  $0.10 \pm 0.14$  kg C head<sup>-1</sup> d<sup>-1</sup>, respectively. The  $C_{input}$  and  $C_{emission}$  per unit of all 3 energy sectors, at buffalo farms were  $0.10 \pm 0.19$  and  $0.08 \pm 0.16$  kg C head<sup>-1</sup> d<sup>-1</sup>, respectively. On the other hand, the slaughterhouses in Nakhon Ratchasima used energy for electric light and delivering meat from slaughterhouses to markets with  $C_{input}$  and  $C_{emission}$  per unit of energy used by slaughterhouses being  $0.57 \pm 0.47$  and  $0.52 \pm 0.44$  kg C head<sup>-1</sup> d<sup>-1</sup>, respectively. The  $C_{input}$  and  $C_{emission}$  per unit of energy used for buffalo meat production




Figure 5 The percentages of carbon contents were transferred from grass to ox's parts.




Figure 6 The percentages of carbon contents were transferred from grass to buffalo's parts.

by slaughterhouses was  $0.49 \pm 0.47$  and  $0.44 \pm 0.40$  kg C head<sup>-1</sup> d<sup>-1</sup>, respectively. The result of carbon contents per unit in meat production are shown in Table 5.

#### Carbon Massflow of Animals and Energy Sectors in Meat Production

The result of the carbon massflow from oxen and buffaloes is shown in Figures 7 and 8, respectively. The results also showed that the carbon contents emitted from ox increases environmental problems more than buffalo (Table 6).

The comparison of  $C_{input}$  and  $C_{emission}$  from energy sectors,  $C_{input}$  from plant by feeding,  $C_{output}$  and  $C_{emission}$  (gases) from animals, and the different carbon contents per unit between  $C_{output}$  from the faeces and  $C_{fixation}$  of ox and buffalo are shown in Figure 9. Figure 9 shows the differences between carbon contents transferred to animals by feeding

**Table 4** The percentage ratio of meat and entrails of ox and buffalo that were killed in slaughterhouses in Nakhon Ratchasima (average  $\pm$  standard deviation).

Kind of animal	Ox	Buffalo
Weight before killing (kg head <sup>-1</sup> )	268.74 $\pm$ 101.38	337.73 $\pm$ 66.91
Ratio of meat to weight before killing (%)	46.55 $\pm$ 11.96	34.65 $\pm$ 7.14
Ratio of entrails to weight before killing (%)	8.52 $\pm$ 2.61	8.32 $\pm$ 1.06
Ratio of skin, blood, bone, and etc. to weight before killing (%)	44.93	57.03

**Table 5** The average of  $C_{input}$  and  $C_{emission}$  from energy sectors of ox and buffalo farms and slaughterhouses (average  $\pm$  standard deviation).

Average carbon contents from energy sectors (kg C head <sup>-1</sup> d <sup>-1</sup> )		$C_{input}$		$C_{emission}$	
		Ox	Buffalo	Ox	Buffalo
Farms	Electricity <sup>1/</sup>	0.00 $\pm$ 0.01	0.00 $\pm$ 0.00	0.00 $\pm$ 0.01	0.00 $\pm$ 0.00
	Transportation energy <sup>2/</sup>	0.00 $\pm$ 0.00	0.01 $\pm$ 0.01	0.00 $\pm$ 0.00	0.01 $\pm$ 0.01
	Engine energy <sup>3/</sup>	0.11 $\pm$ 0.16	0.09 $\pm$ 0.19	0.09 $\pm$ 0.13	0.07 $\pm$ 0.16
	Total carbon contents	0.12 $\pm$ 0.16	0.10 $\pm$ 0.19	0.10 $\pm$ 0.14	0.08 $\pm$ 0.16
Slaughterhouses	Electricity	0.22 $\pm$ 0.37	0.12 $\pm$ 0.04	0.22 $\pm$ 0.37	0.12 $\pm$ 0.04
	Transportation energy	0.35 $\pm$ 0.30	0.38 $\pm$ 0.46	0.30 $\pm$ 0.26	0.32 $\pm$ 0.39
	Total carbon contents	0.57 $\pm$ 0.47	0.49 $\pm$ 0.47	0.52 $\pm$ 0.44	0.44 $\pm$ 0.40
Total carbon contents of farms and slaughterhouses		0.69	0.59	0.62	0.52

<sup>1/</sup> Pollution Control Department (2003) CO<sub>2</sub> emission = 0.18 kg C/kWh.

<sup>2/</sup> National Transportation Statistics (2000) CO<sub>2</sub> emission = 74.5 kg CO<sub>2</sub> t<sup>-1</sup>500 km<sup>-1</sup>.

<sup>3/</sup> U.S. EPA, AP-42 (1995) and WHO (1993) CO<sub>2</sub> emission from diesel oil = 0.61 kg C L<sup>-1</sup> and CO<sub>2</sub> emission from gasoline = 0.57 kg C L<sup>-1</sup>.

**Table 6** The ratio of  $C_{input}$ (plant+energy),  $C_{fixation}$ ,  $C_{emitted}$ (animal+energy) from meat production.

Kind of animal	$C_{input}$ (plant+energy) (----- kg C head <sup>-1</sup> d <sup>-1</sup> -----)	$C_{emitted}$ (animal+energy)	Ratio				
			$C_{meat}$ / $C_{plant}$	$C_{fixation}$ / $C_{input}$	$C_{emitted}$ / $C_{input}$	$C_{emitted}$ / $C_{fixation}$	$C_{fixation}$ / $C_{plant}$
Ox	5.15	2.00					
Buffalo	7.10	2.32	0.25	0.66	0.33	0.49	0.725




Figure 7 The conclusion of carbon mass balance for ox meat production.




Figure 8 The conclusion of carbon mass balance for buffalo meat production.




Figure 9 The comparison of the different carbon contents in each pattern of meat production.

and from animals to environment and carbon contents from energy used in electricity and petrol. The results show that the carbon contents in energy pattern are less important for meat production.

#### Carbon Contents and Physical Properties of Animal Feed, Meat, Entrails, and Faeces from Ox and Buffalo

The weight measurements of ox and buffalo on farms found that oxen were 61-608 kg head<sup>-1</sup> at 0.17-14.84 years old and buffalo 63-861 kg head<sup>-1</sup> at 0.29-20 years old. Figure 10 showed the relationship of the weight of oxen and buffaloes with age, as follows:  $\text{weight}_{\text{ox}} = 93.231 \ln(\text{age}_{\text{ox}}) + 239.87$  ( $R^2 = 0.72$ ) and  $\text{weight}_{\text{buffalo}} = 154.8 \ln(\text{age}_{\text{buffalo}}) + 254.4$  ( $R^2 = 0.69$ ). The results

showed that oxen fixed carbon contents more than buffaloes in the first year but buffaloes fixed carbon more than oxen after one year of age.

Table 7 shows the average weights for animal food, faeces and animals at farms. The ratio of ox's faeces weight to ox weight and the ratio of buffalo's faeces weight to buffalo weight were 4.72% and 4.56%, respectively.

The percentages of moisture, volatile solids, ash, and carbon contents of animal feed, meat, entrails, and faeces are shown in Table 8. The percentages of carbon contents of buffalo's faeces were 30.14% lower than the value of ox's faeces. These percentages of carbon contents from faeces, entrails, and meat showed that the buffalo fixed carbon in its body more efficiently than the ox.

Table 7 The average weight of oxen and buffaloes, faeces, and animal food from farms in Nakhon Ratchasima (average  $\pm$  standard deviation).

Kind of animal	Animal weight (kg head <sup>-1</sup> )	Faeces weight (kg head <sup>-1</sup> d <sup>-1</sup> )	Animal food weight (kg head <sup>-1</sup> d <sup>-1</sup> )
Ox	302.25 $\pm$ 100.72	14.27 $\pm$ 4.94	11.06 $\pm$ 5.07
Buffalo	456.10 $\pm$ 134.38	20.79 $\pm$ 8.08	16.01 $\pm$ 7.77

**Table 8** Physical properties, carbon contents, and the linear equations of the carbon contents to volatile solids of animal feed, meat, entrails, and faeces from ox and buffalo farms (average  $\pm$  standard deviation).

Type	Moisture (----- % -----)	Volatile solid (----- % -----)	Ash	Carbon content	Linear regression equation	R <sup>2</sup>
Grass	76.64 $\pm$ 7.99	75.20 $\pm$ 3.45	24.80 $\pm$ 3.45	40.42 $\pm$ 1.33	%VS = 3.54(%C) - 68.59	0.89
Rice straw	7.79 $\pm$ 1.39	70.91 $\pm$ 2.74	29.81 $\pm$ 2.74	40.13 $\pm$ 1.47	%VS = 1.54(%C) + 8.26	0.69
Ox meat	73.05 $\pm$ 5.59	83.34 $\pm$ 4.20	16.65 $\pm$ 4.20	58.99 $\pm$ 0.25	%VS = 16.40(%C) - 884.11	0.94
Ox's faeces	81.12 $\pm$ 3.78	62.18 $\pm$ 10.48	37.82 $\pm$ 10.48	33.47 $\pm$ 5.08	%VS = 2.65(%C) - 26.35	0.89
Ox's entrails <sup>1</sup>	80.44 $\pm$ 3.44	85.24 $\pm$ 1.79	14.76 $\pm$ 1.79	56.02 $\pm$ 6.45	%VS = 0.03(%C) + 83.52	0.30
Buffalo meat	76.71 $\pm$ 1.85	86.61 $\pm$ 3.29	13.39 $\pm$ 3.29	68.67 $\pm$ 0.21	%VS = 14.90(%C) - 936.50	0.88
Buffalo's faeces	81.98 $\pm$ 4.42	54.45 $\pm$ 11.23	45.55 $\pm$ 11.23	30.14 $\pm$ 6.07	%VS = 2.31(%C) - 14.933	0.95
<sup>1</sup> Buffalo's entrails	79.46 $\pm$ 3.28	85.70 $\pm$ 2.05	14.30 $\pm$ 2.05	63.61 $\pm$ 9.36	%VS = -0.08(%C) + 90.63	0.34

<sup>1</sup> The average of each entrails of ox and buffalo.

#### Forecasting Trends of Carbon Emission from Meat Production

The future trend of carbon emitted from meat production at ox and buffalo farms and slaughterhouses is shown in Figure 11. The graph predicts from carbon emitted for ox meat production to be 2.00 kg C head<sup>-1</sup> d<sup>-1</sup> or 0.73 t C head<sup>-1</sup> y<sup>-1</sup> and for buffalo meat production to be 2.32 kg C head<sup>-1</sup> d<sup>-1</sup> or 0.85 t C head<sup>-1</sup> y<sup>-1</sup>, respectively. These values are based on oxen and buffaloes statistics from 2001-2006 in Nakhon Ratchasima province. The results showed that the changes in carbon contents emitted in meat production (ton C per year) from ox and buffalo farms and slaughterhouses in Nakhon Ratchasima province. The results can be predicted by using the equation from simple linear regression analysis and least square method in net carbon emitted per year by using the following equation; C-emitted<sub>ox meat</sub> = 38814(year) + 125824 (R<sup>2</sup> = 0.78) and C-emitted<sub>buffalo meat</sub> = 1568.7(year) + 50931 (R<sup>2</sup> = 0.92) where year is year of our Lord in 2001-2010. Environmental problems could be decreased by decreasing ox meat production and increasing buffalo meat production (Thanee et al., 2008).

#### Conclusions

The study showed that carbon emitted factors for ox and buffalo farms, and for slaughterhouses were 2.00 and 2.32 kg C head<sup>-1</sup> d<sup>-1</sup>, respectively. Buffalo emitted more carbon than ox but the carbon contents per unit in the energy sectors for buffalo meat production were lower than the values for ox meat production. Carbon fixation factors in meat and organs of ox and buffalo were 3.09 and 4.72 kg C head<sup>-1</sup> d<sup>-1</sup>, respectively. The rate of carbon massflow from grass, and from energy used in transportation and killing of ox and buffalo were 5.15 and 7.10 kg C head<sup>-1</sup> d<sup>-1</sup>, respectively.

Furthermore, this study showed that the ratio of the carbon fixed in meat and organs to the sum of carbon contents in grass, and carbon contents in electricity and petrol used were 0.60 and 0.66, respectively. The ratio of the total carbon emitted per unit to the total carbon contents per unit in grass and energy used for meat production were 0.39 and 0.33, respectively. The ratio of the total carbon emitted per unit to the carbon fixation of ox and buffalo were 0.65 and 0.49, respectively.




Figure 10 The relation of ox and buffalo weights with their age.




Figure 11 The future trend of carbon contents emitted from oxen and buffaloes meat Production in Nakhon Ratchasima.

### Acknowledgments

The researchers acknowledge the Centre for Scientific and Technological Equipment, Suranaree University of Technology for providing laboratory analyses. This work received financial support from National Research Council of Thailand. We thank our advisor, teacher, consulting person and our families for critical and helpful comments to this project.

### References

- APHA, AWWA, WEF. 1998. Standard Methods for the Examinations of Water and Wastewater. 20<sup>th</sup> ed. American Public Health Association, Wash. D.C., USA.
- Cavana, R.Y., B.L. Delahaye and U. Sekaran. 2001. Applied Business Research: Qualitative and Quantitative Methods. 3<sup>rd</sup> ed. John Wiley and Sons, NY.
- Center for Agricultural Information, Office of Agricultural Economics. 2004. Agricultural Statistics of Thailand 2004. Agricultural Statistics No.410. Ministry of Agriculture and Co-operatives, Bangkok.
- Department of Livestock Development. 2005. Livestock Statistics Data. Available: <http://www.dld.go.th/index.html>. Accessed date: December 2006.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. 1995. Climate Change 1995, The Science of Climate Change. Contribution of Working Group I to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Syndicate of the University of Cambridge, Cambridge, UK.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. 2001. Climate Change 2001, The Scientific Basis. The Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Syndicate of the University of Cambridge, Cambridge, UK.
- Kawashima, T., F. Terada and M. Shibata. 2000. Respiration experimental system, pp. 1-21. *In* Japan International Research Center for Agricultural Sciences, Japan and Department of Livestock Development, Thailand, (eds.), Improvement of Cattle Production with Locally Available Feed Resources in Northeast Thailand, Thailand.
- Lauhajinda, N. 2006. Ecology: Fundamentals of Environmental. 2<sup>nd</sup> ed. Kasetsart University, Bangkok.
- Manlay, R.J., I. Alexandre, M. Dominique, F. Christian, R. Didier and F. Christian. 2004. Spatial carbon, nitrogen and phosphorus budget of a village in the West African savanna-I. Element pools and structure of a mixed-farming system. *Agricultural Systems* 79: 55-81.
- Manlay, R.J., I. Alexandre, M. Dominique, F. Christian, and R. Didier 2004. Spatial carbon, nitrogen and phosphorus budget in a village of the West African savanna-II. Element flows and functioning of a mixed-farming system. *Agricultural Systems* 79: 83-107.
- National Transportation Statistics. 2000. C-emission from petrol used for transporting. Available: <http://www.vcacarfueldata.org.uk/downloads>, <http://www.gdrc.org/uem/CO2-Cal/CO2-Calculator.html>. Accessed date: March 2007.
- Pollution Control Department. 2003. Acid Deposition Control Strategy in the Kingdom of Thailand. Japan International Cooperation Agency.
- Thanee, N., W. Dankittikul P. and Keeratiurai. 2008. Comparison of carbon emission factors from ox and buffalo farms and slaughterhouses in meat production, pp. 52-53. Proceedings of the International Conference on Energy Security and Climate Change: Issues, Strategies, and Options. August 6-8, 2008, Bangkok, Thailand.
- U.S. EPA, AP-42. 1995. Compilation of air pollutant emission factors. Available: <http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/index.htm>. Accessed date: March 2007.
- van Noordwijk, M., C. Cerri, P.L. Wooster, K. Nugroho, and M. Bernoux. 1997. Soil carbon dynamics in the humid tropical forest zone. *Geoderma*. 79: 187-225.
- van Noordwijk, M., D. Murdiyarso, K. Hairiah, U.R. Wasrin, A. Rachman, and T.P. Tomich, 1998. Forest soil under alternatives to slash and burn agriculture in Sumatra, Indonesia, pp. 175-185. *In* A. Schulte and D. Ruhiyat, eds., Soils of Tropical Forest Ecosystems: Characteristics, Ecology and Management, Springer-Verlag, Berlin.
- Vudhipanee, P., K. Lortae and S. Imvatana. 2002. Comparative efficiency of weight reduction equations of swamp buffalo. *Anim 13* sbandry Division.: DLD. Available: [www.dld.go.th/research-AHD/Webpage/2545/45\(3\)-0406-147.pdf](http://www.dld.go.th/research-AHD/Webpage/2545/45(3)-0406-147.pdf). Accessed date: June 2007.
- World Health Organization. 1993. Assessment of Source of Air, Water and Land Pollution. Available: [http://www.who.int/environmental\\_information/Information\\_resources/online\\_general.htm](http://www.who.int/environmental_information/Information_resources/online_general.htm), [http://whqlibdoc.who.int/hq/1993/WHO\\_PEP\\_GETNET\\_93.1-A.pdf](http://whqlibdoc.who.int/hq/1993/WHO_PEP_GETNET_93.1-A.pdf). Accessed date: March 2007.
- Yamane, T. 1973. Mathematics for Economists: An Elementary Survey. 2<sup>nd</sup> ed. Prentice-Hall, New Delhi, India.

Manuscript received 25 February 2009, accepted 13 August 2009



บันทึกข้อความ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงาน.....Suranaree Journal of Science and Technology; IRD: Tel.4756.....

ที่.....No.5624/.....<sup>201</sup>.....วันที่ 2.0 FEB 2009.....

เรื่อง Receiving article.....

Dear Mr. Prayong Keeratiurai,

This is to acknowledge the receipt of your article "COMPARISON OF CARBON EMITTED FROM OX, BUFFALO, PIG, AND CHICKEN FARMS AND SLAUGHTERHOUSES IN MEAT RPRODUCTION". The article will be reviewed by the experts in the field prior to the publication. The comment and correction will be sent to you after the reviewing process.

Thank you very much for your contribution.

Sincerely,

Suksun Horpibulsuk, Ph.D.

Associate Professor

Editor of Engineering



## COMPARISON OF CARBON EMITTED FROM OX, BUFFALO, PIG, AND CHICKEN FARMS AND SLAUGHTERHOUSES IN MEAT PRODUCTION

(Running head): Carbon Emitted in Ox, Buffalo, Pig, and Chicken Meat Production

Nathawut Thane<sup>1\*</sup>, Wut Dankittikul<sup>2</sup> and Prayong Keeratiurai<sup>2</sup>

### Abstract

The carbon budget of oxen, buffaloes, pigs, and chickens during meat production were studied to determine carbon emitted from farms, to investigate the rate of carbon massflow from plants to ox, buffalo, pig, and chicken in the food chain and to study the carbon emission in energy patterns that was used in meat production in Nakhon Ratchasima province. The study showed that the carbon emitted per unit from farms and slaughterhouses in ox, buffalo, pig, and chicken meat production was 0.0066, 0.0051, 0.0339, and 0.0851 kg.C/kg. living weight/day, respectively. The carbon fixation in meat and organs of ox, buffalo, pig, and chicken was 0.0102, 0.0104, 0.0062, and 0.0111 kg.C/kg. living weight/day, respectively, and the rate of carbon massflow from grass and animal feed was 0.0148, 0.0143, 0.0087, and 0.0184 kg.C/kg. living weight/day, respectively. This study also showed that the percentage of carbon fixation in meat and organs of ox, buffalo, pig, and chicken to the sum of carbon contents in grass and feed used for feeding was 69.24%, 72.53%, 71.18%, and 60.45%, respectively. The ratio of total carbon emitted to total carbon contents in grass and feed used for ox, buffalo, pig, and chicken feeding was 0.31, 0.28, 0.28, and 0.39, respectively. The ratio of total carbon emitted per day to carbon fixation per day in meat and organs of ox, buffalo, pig, and chicken was 0.45, 0.38, 0.40, and 0.65, respectively. Ox production produced more environmentally harmful carbon than buffalo production. The results also showed that the ratio of CH<sub>4</sub> to CO<sub>2</sub> emitted from faeces, enteric fermentation and respiration of ox was higher than the value from buffalo. For the equal quantity of meat production, it is suggested that ox meat production should be reduced while the buffalo meat production should be increased to lessen the environmental impact. Moreover, of the four animals, carbon emitted from buffalo and pig will give less environmental problems and farming/slaughterhouses should be more encouraged than ox and chicken farming/slaughterhouses. The carbon contents emitted in meat production in ton C per year from ox, buffalo, pig, and chicken farms and slaughterhouses in Nakhon Ratchasima province can be shown by using the equation from mass conservation and the numbers of animals as follows;  $C_{\text{emitted}} = (0.73) \text{ Oxen} + (0.85) \text{ Buffaloes} + (1.25) \text{ Pigs} + (0.07) \text{ Chickens}$ .

**Keywords:** Carbon emission, meat production, ox, buffalo, pig, chicken

<sup>1</sup> School of Biology, Institute of Science, Suranaree University of Technology, 111 University Avenue, Suranaree, Muang, Nakhon Ratchasima Province 30000, Thailand. Tel.: 0-4422-4192, 08-1470-0185, Fax.: 0-4422-4633, E-mail: [biology@sut.ac.th](mailto:biology@sut.ac.th), [keeratiurai\\_pray@windowslive.com](mailto:keeratiurai_pray@windowslive.com)

<sup>2</sup> School of Environmental Engineering, Institute of Engineering, Suranaree University of Technology, 111 University Avenue, Suranaree, Muang, Nakhon Ratchasima Province 30000, Thailand. Tel.: 0-4422-4218, E-mail: [wut@sut.ac.th](mailto:wut@sut.ac.th)

\* Corresponding author

### Introduction

One of the environmental threats that our planet faces today is the long-term change in Earth's climate and temperature patterns due to global climate change, or the greenhouse effect. CO<sub>2</sub> and CH<sub>4</sub> from human activities are the most important greenhouse gases contributing to global climate change (IPCC, 1995) with CH<sub>4</sub> being 23 times more potent than CO<sub>2</sub> (IPCC, 2001). Ox and buffalo are herbivores while pig and chicken are energy-using animals that are raised for their meat, and produce emissions of both CO<sub>2</sub> and CH<sub>4</sub>.

Carbon is an important element for humans because it is the primary element of both plants and animals and cycles through living and non-living components (Lauhajinda, 2006). One product of carbon fixation is the protein in meat and animal products. The focus of this study is on carbon which is transferred to the food chain and fixed in meat. The net carbon production is the rate at which carbon is fixed during growth, and can be used to explain the time averaged C stocks by carbon weight per time (van Noordwijk *et al.*, 1997, 1998).

Therefore, it is important to study and understand the relationship between the carbon emissions, carbon massflow, and energy used for meat production.

The primary objective of this study was to determine carbon emitted factors for ox, buffalo, pig, and chicken farms. To accomplish this, we studied the rate of carbon massflow from plants to an ox, a buffalo, a pig, and a chicken, and included the carbon emissions from electricity, LPG, wood or paddy husk, and petroleum used during meat production in Nakhon Ratchasima.

### Materials and Methods

#### Study Area

Ox, buffalo, pig, and chicken farms and slaughterhouses were studied in 26 districts and 6 subdistricts of Nakhon Ratchasima province which are shown in Figures 1 and 2, respectively.




Figure 1. Ox and buffalo farm areas in Nakhon Ratchasima province (Department of Livestock Development, 2005)




Figure 2. Pig and chicken farm areas in Nakhon Ratchasima province (Department of Livestock Development, 2005)

Nakhon Ratchasima province has an agricultural area of 12,469 square kilometers and is the largest area of ox farms in Thailand (Center for Agricultural Information, Office of Agricultural Economics, 2004).

#### Size of Samples and Sampling Methods

The numbers of farms, and numbers of oxen, buffaloes, pigs, and chickens, in each district and subdistrict were calculated by determining the numbers of ox, buffalo, pig, and chicken farms and the numbers of oxen, buffaloes, pigs, and chickens in the province (Yamane, 1973; Cavana *et al.*, 2001). The results showed that there were 398 ox farms, 390 buffalo farms, 390 pig farms, and 340 chicken farms, 17 ox and buffalo slaughterhouses, 7 pig slaughterhouses, and 18 chicken slaughterhouses, totalling 400 oxen, 398 buffaloes, 400 pigs, and 400 chickens from farms. Grass and feed, plus their meat and faeces were collected and transferred to the laboratory at Suranaree University of Technology for measurements. Results from analytical methods are as shown in Table 1.

#### Previous Researches and Calculating Methodology for $C_{emitted}$ , $C_{fixation}$ , and $C_{input}$

According to Thanee *et al.* (2008), ox production produced more environmentally harmful carbon than buffalo production. For the equal quantity of meat production, it is suggested that decreasing ox meat production and increasing buffalo meat production can decrease the environmental problems. The ratio of  $CH_4$  to  $CO_2$  emitted from faeces, enteric fermentation and respiration of ox was greater than the value for buffalo (Dankittikul and Keeratiurai, 2008). Carbon was calculated by a mass balance method.  $C_{input}$  was the carbon contents transferred from plant and animal feed to animals by feeding (kg.C/head/day).  $C_{emitted}$  was the carbon contents emitted from animal faeces

( $C_{output}$ ), enteric fermentation and respiration ( $C_{emission}$ ). Thus,  $C_{output}$  plus  $C_{emission}$  make for  $C_{emitted}$  (kg.C/head/day). The  $C_{input}$  minus the carbon contents emitted from animal faeces, enteric fermentation, and respiration ( $C_{emitted}$ ) was the carbon mass fixed in the body ( $C_{fixation}$ ). Whereas the  $C_{fixation}$  (kg.C/head/day) was the carbon contents fixed in meat and organs of animals (Thanee *et al.*, 2008).

## Results and Discussion

### The Rate of Carbon Contents Massflow and the Carbon Emitted

The rate of carbon massflow from animal feed for feeding to the biomass of ox, buffalo, pig, and chicken ( $C_{input}$ ) was determined and found to be  $4.46 \pm 1.93$ ,  $6.51 \pm 3.14$ ,  $0.879 \pm 0.30$ , and  $0.043 \pm 0.007$  kg.C/head/day, respectively are shown in Table 2.

Table 2 also shows that the carbon fixation of ox, buffalo, pig, and chicken was  $3.09 \pm 1.97$ ,  $4.72 \pm 3.14$ ,  $0.626 \pm 0.256$ , and  $0.026 \pm 0.007$  kg.C/head/day, respectively. The carbon emitted for ox, buffalo, pig, and chicken was  $1.38 \pm 0.36$ ,  $1.80 \pm 0.51$ ,  $0.253 \pm 0.058$ , and  $0.017 \pm 0.006$  kg.C/head/day, respectively.  $CO_2$  and  $CH_4$  gases which were emitted from faeces, enteric fermentation and respiration of animals are shown in Table 3. Figures 3 and 4 show the ratio of the carbon massflow by feeding. The carbon mass fixed in the biomass of ox, buffalo, pig, and chicken was 69.18%, 72.38%, 71.14%, and 60.70%, respectively and that emitted from faeces, enteric fermentation and respiration was 30.82%, 27.62%, 28.86%, and 39.30%, respectively. Carbon emitted which contributes to environmental problems show that buffalo and pig encourage less global climate change than ox and chicken because buffalo and pig fixed the carbon contents in their bodies more efficiently than ox and chicken.

**Table 1. Methods for property analysis of animal feed, meat, entrails, gases, and faeces from animals**

Properties	Analytical methods
Moisture content	By weighing sample after oven drying at 103-105 C for 24 h (Manlay <i>et al.</i> , 2004).
Carbon content	By CNS-2000 ELEMENTAL ANALYZER (Manlay <i>et al.</i> , 2004) and GAS ANALYZER (Kawashima <i>et al.</i> , 2000).
Volatile solids and ash	By weighing the known weight of the sample after burning at 550 C for 30 min (APHA, AWWA, WEF., 1998).
Weight	By weighing or using cattle weighing tape (Vudhipanee <i>et al.</i> , 2002).

### Carbon Contents Emission from Energy Sectors for Meat Production

The pig and chicken farms in Nakhon Ratchasima province used more energy in kg.C/kg. living weight/day than ox and buffalo farms for feeding. The first sector was electric light and heat energy. The second sector was petrol used for animal transport. The third sector was petroleum for cutting grass and transferring it to farms for feeding. The fourth sector was liquefied petroleum gas (LPG) used for heating. The  $C_{\text{emission}}$  per unit of all 3 energy sectors at ox, buffalo, and chicken farms were 0.09, 0.08, and 0.049 kg.C/head/day, respectively. The  $C_{\text{emission}}$  per unit of all 2 energy sectors at pig

farms were 0.83 kg.C/head/day, respectively. The slaughterhouses in Nakhon Ratchasima used energy for electric light, boiling the water for animal skin cleaning, and delivering meat from slaughterhouses to markets with  $C_{\text{emission}}$  per unit of energy used for ox, buffalo, pig, and chicken meat production being 0.52, 0.44, 2.34, and 0.1332 kg.C/head/day, respectively. On the other hand, the  $C_{\text{emission}}$  of energy used for meat production by farms and slaughterhouses was  $2.05 \times 10^{-3}$ ,  $1.14 \times 10^{-3}$ ,  $31.41 \times 10^{-3}$ , and  $77.86 \times 10^{-3}$  kg.C/kg. living weight/day, respectively. The average of  $C_{\text{emission}}$  from energy sectors at farms and slaughterhouses are shown in Table 4.

**Table 2.** The average of  $C_{\text{input}}$ ,  $C_{\text{fixation}}$ ,  $C_{\text{emitted}}$ ,  $C_{\text{output}}$ , and  $C_{\text{emission}}$  of CO<sub>2</sub> and CH<sub>4</sub> from animals on farms (average  $\pm$  standard deviation)

Kind of animal		Ox	Buffalo	Pig	Chicken	
$C_{\text{input}}$ massflow from plant by feeding (kg.C/head/day)		4.46 $\pm$ 1.93	6.51 $\pm$ 3.14	0.879 $\pm$ 0.30	0.043 $\pm$ 0.007	
$C_{\text{input}}$ (kg.C/kg. living weight/day) $\times 10^{-3}$		14.76	14.27	8.71	18.38	
$C_{\text{fixation}}$ (massbalance) (kg.C/head/day)	Meat	0.031	0.0198	0.047	0.0046	
	Entrails	0.004	0.0039	0.007	0.0008	
	Bone, skin, blood, etc.	3.055	4.696	0.572	0.021	
	Total $C_{\text{fixation}}$	3.09 $\pm$ 1.97	4.72 $\pm$ 3.14	0.626 $\pm$ 0.256	0.026 $\pm$ 0.007	
$C_{\text{fixation}}$ (kg.C/kg. living weight/day) $\times 10^{-3}$		10.22	10.35	6.20	11.11	
$C_{\text{emitted}}$ * (kg.C/head/day)	Dried faeces ( $C_{\text{output}}$ )	0.894 $\pm$ 0.31	1.12 $\pm$ 0.44	0.178 $\pm$ 0.044	0.015 $\pm$ 0.006	
	$C_{\text{emission}}$ of CO <sub>2</sub> and CH <sub>4</sub> gases	Faeces	0.011 $\pm$ 0.005	0.021 $\pm$ 0.012	0.0004 $\pm$ 0.0001	0.00004 $\pm$ 0.00004
		Enteric fermentation and respiration	0.471 $\pm$ 0.188	0.66 $\pm$ 0.277	0.075 $\pm$ 0.037	0.0018 $\pm$ 0.0000
	Total $C_{\text{emitted}}$	1.38 $\pm$ 0.36	1.80 $\pm$ 0.51	0.253 $\pm$ 0.058	0.017 $\pm$ 0.006	
$C_{\text{emitted}}$ (kg.C/kg. living weight/day) $\times 10^{-3}$		4.57	3.95	2.48	7.27	
Living weight (kg./head)		302.25 $\pm$ 100.72	456.10 $\pm$ 134.38	100.91 $\pm$ 6.31	2.34 $\pm$ 0.34	

$$*C_{\text{emitted}} = C_{\text{output}} + C_{\text{emission}}$$

**Table 3.** The gas emission from animals (average  $\pm$  standard deviation)

Average of gases	Kind of animal	CH <sub>4</sub> (kg.CH <sub>4</sub> /head/day)	CO <sub>2</sub> (kg.CO <sub>2</sub> /head/day)
Faeces	Ox	0.004 $\pm$ 0.002	0.031 $\pm$ 0.015
	Buffalo	0.005 $\pm$ 0.003	0.062 $\pm$ 0.035
	Pig	0.0001 $\pm$ 0.0000	0.0010 $\pm$ 0.0003
	Chicken	0.000003 $\pm$ 0.000002	0.000148 $\pm$ 0.000156
Enteric fermentation and respiration	Ox	0.104 $\pm$ 0.063	1.440 $\pm$ 0.618
	Buffalo	0.127 $\pm$ 0.068	2.069 $\pm$ 0.942
	Pig	0.0071 $\pm$ 0.0074	0.2536 $\pm$ 0.1286
	Chicken	0.0000 $\pm$ 0.0000	0.0067 $\pm$ 0.0000




Figure 3. The percentages of carbon contents transferred from grass to ox's parts and buffalo's parts




Figure 4. The percentages of carbon contents transferred from animal feed to pig's parts and chicken's parts

Table 4. The average of  $C_{\text{emission}}$  from energy sectors at farms and slaughterhouses (average  $\pm$  standard deviation)

Average carbon contents from energy sectors (kg.C/head/day)		$C_{\text{emission}}$			
		Ox	Buffalo	Pig	Chicken
Farms	Electricity*	0.00 $\pm$ 0.01	0.00 $\pm$ 0.00	0.02 $\pm$ 0.02	0.002 $\pm$ 0.00
	Transportation energy**	0.00 $\pm$ 0.00	0.01 $\pm$ 0.01	0.81 $\pm$ 0.85	0.044 $\pm$ 0.03
	Engine energy***	0.09 $\pm$ 0.13	0.07 $\pm$ 0.16	N.D.	N.D.
	LPG*	N.D.	N.D.	N.D.	0.003 $\pm$ 0.00
	<b>Total carbon contents</b>	<b>0.10</b>	<b>0.08</b>	<b>0.83</b>	<b>0.049</b>
Slaughterhouses	Electricity*	0.22 $\pm$ 0.37	0.12 $\pm$ 0.04	0.05 $\pm$ 0.04	0.009 $\pm$ 0.004
	Transportation energy**	0.30 $\pm$ 0.26	0.32 $\pm$ 0.39	0.01 $\pm$ 0.00	0.0015 $\pm$ 0.0016
	Wood and paddy husk	N.D.	N.D.	2.28 $\pm$ 1.02	0.1227 $\pm$ 0.1708
	<b>Total carbon contents</b>	<b>0.52</b>	<b>0.44</b>	<b>2.34</b>	<b>0.1332</b>
Total carbon emission from farms and slaughterhouses	(kg.C/head/day)	<b>0.62</b>	<b>0.52</b>	<b>3.17</b>	<b>0.1822</b>
	(kg.C/kg. living weight/day)	<b><math>2.05 \times 10^{-2}</math></b>	<b><math>1.14 \times 10^{-2}</math></b>	<b><math>31.41 \times 10^{-2}</math></b>	<b><math>77.86 \times 10^{-2}</math></b>

\* IPCC (1996)  $\text{CO}_2$  emission = 0.18 kg.C/kWh and  $\text{CO}_2$  emission from LPG = 3.0102 kg. $\text{CO}_2$ /1kg.LPG

\*\* National Transportation Statistics (2000)  $\text{CO}_2$  emission = 74.5 kg  $\text{CO}_2$ /1 Ton/500 km

\*\*\*U.S. EPA, AP-42 (1995) and WHO (1993)  $\text{CO}_2$  emission from diesel oil = 2.24 kg. $\text{CO}_2$ /L and  $\text{CO}_2$  emission from gasoline = 2.10 kg. $\text{CO}_2$ /L

### The Relation of Carbon Contents Massflow and Physical Properties of Animal Feed, Meat, and Faeces from Ox, Buffalo, Pig, and Chicken

The carbon contents massflow of ox and buffalo are shown in Figures 5(a) and 5(b) and the carbon contents massflow of pig and chicken are shown in Figures 6(a) and 6(b), respectively. The relation of  $C_{\text{emitted}}$  and  $C_{\text{input}}$  (Sig.  $F < 0.05$ ) and  $C_{\text{fixation}}$  and  $C_{\text{input}}$  (Sig.  $F < 0.05$ ) are shown in Figures 7(a) and 7(b), respectively. The results showed that the carbon emitted from chicken increased the most environmental problems.

The results also showed that the changes in carbon contents emitted, fixed, input, and emitted from energy used in ton C per year can be illustrated by using the equation from the mass conservation and the numbers of animals as follows:

$$C\text{-emitted}_{(\text{animals+energy})} = (0.73) \text{Oxen} + (0.85) \text{Buffaloes} + (1.25) \text{Pigs} + (0.07) \text{Chickens} \quad (1)$$

$$C\text{-input} = (1.63) \text{Oxen} + (2.38) \text{Buffaloes} + (0.32) \text{Pigs} + (0.016) \text{Chickens} \quad (2)$$

$$C\text{-fixation} = (1.13) \text{Oxen} + (1.72) \text{Buffaloes} + (0.23) \text{Pigs} + (0.0095) \text{Chickens} \quad (3)$$

$$C\text{-emission}_{(\text{energy})} = (0.23) \text{Oxen} + (0.19) \text{Buffaloes} + (1.16) \text{Pigs} + (0.0665) \text{Chickens} \quad (4)$$


where;  $C\text{-emitted}_{(\text{animals+energy})}$  is the carbon contents emitted from ox, buffalo, pig, and chicken and the emission from energy used in meat production (ton C/year),  $C\text{-input}$  is the carbon contents transferred from plants

and feed to ox, buffalo, pig, and chicken by feeding (ton C/year),  $C\text{-fixation}$  is the carbon contents fixed in meat and organs of ox, buffalo, pig, and chicken (ton C/year),  $C\text{-emission}_{(\text{energy})}$  is the carbon contents emitted from energy using as electricity, LPG, wood or paddy husk, and petroleum of farms and slaughterhouses in meat production (ton C/year). Oxen, Buffaloes, Pigs, and Chickens are the numbers of oxen, buffaloes, pigs, and chickens on farms, respectively (head).

The percentages of moisture, volatile solids, ash, and carbon contents of animal feed, meat, and faeces of animals are shown in Table 5. The lowest percentage of carbon content was in buffalo's faeces ( $30.14 \pm 6.07\%$ ) and the highest in buffalo's meat ( $68.67 \pm 0.21\%$ ). These percentages of carbon contents from faeces, and meat showed that the buffalo fixed the highest level of carbon in its body.

### Conclusions

The study showed that carbon emitted from ox, buffalo, pig, and chicken farms and slaughterhouses was 0.0066, 0.0051, 0.0339, and 0.0851 kg.C/kg. living weight/day, respectively. A buffalo and an ox emitted more carbon than a pig and a chicken but the carbon contents per unit in the energy sectors for buffalo and ox meat production were lower than the values for pig and chicken meat production. On the other hand, the  $C_{\text{emission}}$  of energy used for ox, buffalo, pig, and chicken meat production by farms and slaughterhouses was 30.72%, 22.40%, 92.60%, and 91.54% of the total carbon emitted from animal and energy sectors in meat production.



(a) Carbon massflow of ox



(b) Carbon massflow of buffalo

Figure 5. The carbon mass balance for ox and buffalo meat production

Carbon fixation in meat and organs of ox, buffalo, pig, and chicken was 0.0102, 0.0104, 0.0062, and 0.0111 kg C/kg living weight/day, respectively. Carbon content values were calculated by mass balance. The rate of carbon massflow from grass and feed to ox, buffalo, pig, and chicken was 0.0148, 0.0143, 0.0087, and 0.0184 kg C/kg living weight/day, respectively.

Furthermore, this study showed that the ratio of the carbon fixed in meat and organs of ox, buffalo, pig, and chicken to the carbon contents in grass and feed was 0.69, 0.72, 0.71, and 0.60, respectively. The ratio of the total carbon emitted per head per day to the total carbon contents per head per day in grass and feed used for feeding was 0.31, 0.28, 0.28, and 0.39, respectively. The ratio of  $C_{emitted}$  to  $C_{input}$  shows that the contribution to environmental problems from buffalo is the lowest. The ratio of the total carbon

emitted to the carbon fixation of ox, buffalo, pig, and chicken was 0.45, 0.38, 0.40, and 0.65, respectively. It can be concluded that the carbon contents emitted from chicken increases the most environmental problems (Table 6).

### Acknowledgements


The researchers acknowledge the Centre for Scientific and Technological Equipment, Suranaree University of Technology for providing laboratory analyses. This work received financial support from National Research Council of Thailand and Suranaree University of Technology. We thank our advisor, teachers, consulting persons and our families for critical and helpful comments to this research.



(a) Carbon massflow of pig

(b) Carbon massflow of chicken

Figure 6. The carbon mass balance for pig and chicken meat production



(a) The relation of  $C_{emitted}$  and  $C_{input}$

(b) The relation of  $C_{fixation}$  and  $C_{input}$

Figure 7. The relation of  $C_{emitted}$  and  $C_{fixation}$  to  $C_{input}$  at 95% confidence

**Table 5. Physical properties, carbon contents, and the relation of C and VS of feed, meat, and faeces (average  $\pm$  standard deviation)**

Type	Moisture (%)	Volatile solids (%)	Ash (%)	Carbon Contents (%)	Linear regression equations	Coefficient of determination (R <sup>2</sup> )
Grass	76.64 $\pm$ 7.99	75.20 $\pm$ 3.45	24.80 $\pm$ 3.45	40.42 $\pm$ 1.33	%VS = 3.54 (%C) - 68.59	0.89
Rice straw	7.79 $\pm$ 1.39	70.91 $\pm$ 2.74	29.81 $\pm$ 2.74	40.13 $\pm$ 1.47	%VS = 1.54 (%C) + 8.26	0.69
Ox meat	73.05 $\pm$ 5.59	83.34 $\pm$ 4.20	16.65 $\pm$ 4.20	58.99 $\pm$ 0.25	%VS = 16.40 (%C) - 884.11	0.94
Ox's faeces	81.12 $\pm$ 3.78	62.18 $\pm$ 10.48	37.82 $\pm$ 10.48	33.47 $\pm$ 5.08	%VS = 2.65 (%C) - 26.35	0.89
Buffalo meat	76.71 $\pm$ 1.85	86.61 $\pm$ 3.29	13.39 $\pm$ 3.29	68.67 $\pm$ 0.21	%VS = 14.90 (%C) - 936.50	0.88
Buffalo's faeces	81.98 $\pm$ 4.42	54.45 $\pm$ 11.23	45.55 $\pm$ 11.23	30.14 $\pm$ 6.07	%VS = 2.31 (%C) - 14.93	0.95
Pig's feed	10.48 $\pm$ 2.22	70.28 $\pm$ 2.42	29.72 $\pm$ 2.42	45.02 $\pm$ 2.05	%VS = 0.93 (%C) + 28.43	0.62
Pig meat	68.74 $\pm$ 5.63	82.62 $\pm$ 3.67	17.38 $\pm$ 3.67	48.00 $\pm$ 5.09	%VS = 0.70 (%C) + 48.97	0.94
Pig's faeces	67.71 $\pm$ 5.54	61.30 $\pm$ 3.40	38.7 $\pm$ 3.4	35.98 $\pm$ 1.83	%VS = 1.78 (%C) - 2.78	0.92
Paddy husk	11.12 $\pm$ 1.01	60.67 $\pm$ 5.45	39.33 $\pm$ 5.45	35.56 $\pm$ 3.33	%VS = 1.64 (%C) + 2.99	0.95
Chicken's feed	10.45 $\pm$ 1.25	72.82 $\pm$ 2.07	27.18 $\pm$ 2.07	44.06 $\pm$ 4.52	%VS = 0.40 (%C) + 55.01	0.78
Chicken meat	65.71 $\pm$ 6.57	84.37 $\pm$ 4.01	15.63 $\pm$ 4.01	48.40 $\pm$ 6.21	%VS = 0.59 (%C) + 55.97	0.83
Chicken's faeces	61.51 $\pm$ 22.31	66.39 $\pm$ 9.16	33.61 $\pm$ 9.16	34.07 $\pm$ 6.13	%VS = 0.97 (%C) + 33.23	0.42

**Table 6. The ratio of C<sub>input</sub>, C<sub>fixation</sub>, C<sub>emitted</sub> from feeding in meat production**

Kind of animal	C <sub>input</sub>	C <sub>fixation</sub>	C <sub>emitted</sub>	The percentage of			
	(kg.C/kg. living weight/day) $\times 10^{-3}$			C <sub>fixation</sub> / C <sub>input</sub>	C <sub>emitted</sub> / C <sub>input</sub>	C <sub>emitted</sub> / C <sub>fixation</sub>	(C <sub>input</sub> - C <sub>emitted</sub> ) / C <sub>input</sub>
Ox	14.76	10.22	4.57	69.24	30.96	44.72	69.04
Buffalo	14.27	10.35	3.95	72.53	27.68	38.16	72.32
Pig	8.71	6.20	2.48	71.18	28.47	40.00	71.53
Chicken	18.38	11.11	7.27	60.45	39.55	65.44	60.45

## References

- APHA, AWWA, WEF. (1998). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 20<sup>th</sup> ed. American Public Health Association, Wash. D.C., USA, 445p.
- Cavana, R.Y., Delahaye, B.L., and Sekaran, U. (2001). Applied Business Research: Qualitative and Quantitative Methods. 3<sup>rd</sup> ed. John Wiley and Sons, NY, 472p.
- Center for Agricultural Information, Office of Agricultural Economics. (2004). Agricultural Statistics of Thailand 2004. Agricultural Statistics No.410.
- Ministry of Agriculture and Cooperatives. Bangkok, 122p.
- Dankittikul, W. and Keeratiurai, P. (2008). Comparison of carbon massflow and emission factors from ox and buffalo farms in beef production. Proceedings of the 4<sup>th</sup> International Conference on Knowledge Networks and Regional Development in the Greater Mekong Subregion and Asia-Pacific; June 22-27, 2008; Kunming, Yunnan Province, People's Republic of China, p. 60.
- Department of Livestock Development. (2005). Livestock Statistics Data. [Online]. Available: <http://>



- [www.dld.go.th/index.html](http://www.dld.go.th/index.html). Accessed date: December 2006.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (1995). *Climate Change 1995, The Science of Climate Change*. Contribution of Working Group I to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Press Syndicate of the University of Cambridge, Cambridge, U.K., 572p.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (1996). *IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventory*. [On-line]. Available: <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/invs1.htm>. Accessed date: March 2008.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2001). *Climate Change 2001, The Scientific Basis. The Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Press Syndicate of the University of Cambridge, Cambridge, U.K., 944p.
- Kawashima, T., Terada, F., and Shibata, M. (2000). Respiration experimental system. In: *Improvement of Cattle Production with Locally Available Feed Resources in Northeast Thailand*. Edited by Japan International Research Center for Agricultural Sciences, Japan and Department of Livestock Development, Thailand, p. 1-21.
- Lauhajinda, N. (2006). *Ecology: Fundamentals of Environmental*. 2<sup>nd</sup> ed. Kasetsart University, Bangkok, 292p.
- Manlay, R.J., Ickowicz, A., Masse, D., Floret, C., Richard, D., and Feller, C. (2004). Spatial carbon, nitrogen and phosphorus budget of a village in the West African savanna-I. Element pools and structure of a mixed - farming system. *Agricultural Systems, USA*, 79:55-81.
- Manlay, R.J., Ickowicz, A., Masse, D., Feller, C., and Richard, D. (2004). Spatial carbon, nitrogen and phosphorus budget in a village of the West African savanna-II. Element flows and functioning of a mixed-farming system. *Agricultural Systems, USA*, 79:83-107.
- National Transportation Statistics. (2000). *C-emission from petrol used for transporting*. [On-line]. Available: <http://www.vcarfueldata.org.uk/downloads>, <http://www.gdrc.org/uem/CO2-Cal/CO2-Calculator.html>. Accessed date: March 2007.
- Thanee, N., Dankittikul, W., and Keeratiurai, P. (2008). Comparison of carbon emission factors from ox and buffalo farms and slaughterhouses in meat production. *Proceedings of the International Conference on Energy Security and Climate Change: Issues, Strategies, and Options*; August 6-8, 2008; Sofitel Centara Grand, Bangkok, Thailand, p. 52-53.
- U.S. EPA, AP-42 (1995). *Compilation of Air Pollutant Emission Factors*. [On-line]. Available: <http://www.epa.gov/ttn/chieff/ap42/index.htm>. Accessed date: March 2007.
- van Noordwijk, M., Cerri, C., Woomer, P.L., Nugroho, K., and Bernoux, M. (1997). Soil carbon dynamics in the humid tropical forest zone. *Geoderma, Netherlands*, 79:187-225.
- van Noordwijk, M., Murdiyarso, D., Hairiah, K., Wasrin, U.R., Rachman, A., and Tomich, T.P. (1998). Forest soil under alternatives to slash and burn agriculture in Sumatra, Indonesia. In: *Soils of Tropical Forest Ecosystems: Characteristics, Ecology and Management*. Schulte, A. and Ruhayat, D. (eds.), Springer-Verlag, Berlin, p. 175-185.
- Vudhipanee, P., Lortae, K., and Imvatana, S. (2002). Comparative efficiency of weight prediction equations of swamp buffalo. *Animal Husbandry Division: DLD*. Available from: [www.dld.go.th/research-AHD/Webpage/2545/45\(3\)-0406-147.pdf](http://www.dld.go.th/research-AHD/Webpage/2545/45(3)-0406-147.pdf). Accessed date: June 2007.
- World Health Organization. (1993). *Assessment of Source of Air, Water and Land Pollution*. [On-line]. Available: [http://www.who.int/environmental/information/Information\\_resources/online\\_general.htm](http://www.who.int/environmental/information/Information_resources/online_general.htm), [http://whqlibdoc.who.int/hq/1993/WHO\\_PEP\\_GETNET\\_93.1-A.pdf](http://whqlibdoc.who.int/hq/1993/WHO_PEP_GETNET_93.1-A.pdf). Accessed date: March 2007.
- Yamane, T. (1973). *Mathematics for Economists: An Elementary Survey*. 2<sup>nd</sup> ed. Prentice-Hall, New Delhi, India, 714p.

## ประวัติผู้เขียน

นายประยงค์ กิระดิอุไร เกิดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2515 ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อ พ.ศ. 2537 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อ พ.ศ. 2542 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อ พ.ศ. 2545 หลังจบปริญญาโทวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้เข้าทำงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจนถึงปัจจุบัน ตำแหน่งสุดท้ายที่ได้รับก่อนลาศึกษาต่อคือผู้อำนวยการสำนักทะเบียนมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และในขณะที่ศึกษามีบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติจำนวน 3 บทความ และบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ และโครงการสัมมนาบัณฑิตศึกษา จำนวน 5 บทความ ดังรายชื่อที่ปรากฏในภาคผนวก ญ. มีความสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากแหล่งกำเนิดแก๊สเรือนกระจกต่าง ๆ และคาร์บอนเครดิตจากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมทั้งวิศวกรรมพลังงานจากของเสียหรือผลิตผลทางการเกษตร