วีนาวรรณ สมผล : การศึกษาโครงสร้างผลึกที่มีองค์ประกอบซึ่งมีอันตรกิริยาต่อกัน (STRUCTURAL STUDIES OF CRYSTALS WITH INTERACTING COMPONENTS) อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ คร. เค็นเนท เจ. แฮลเลอร์, 262 หน้า, ISBN 974-533-422-7

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้รวบรวมการขอมรับและการสืบสาวของโครงสร้างผลึกที่มีปัญหาซึ่ง ต้องการแบบจำลองนวัตกรรม เพื่อสามารถพอที่จะนำมาอธิบายโครงสร้าง และทำให้สละสลวยขึ้น โครงสร้างที่ศึกษา ได้แก่ ความสมมาตรเทียม ความไม่เป็นระเบียบของผลึก ผลึกเชิงคู่ โครงสร้าง สารผลึก โครงสร้างที่มีการกล้ำ การแพร่กระเจิง และสถานภาคเฟส การแยกปัญหาให้ชัดเจนขึ้นอยู่ กับความยากของปัญหา ที่ต้องการความพึงพอใจของวิธีข้อมูลทางโครงสร้างคือการกระจายตัวใน ข้อมูลการกระเจิงเลี้ยวเบน และใช้วิธีการทำให้สละสลวยซึ่งตัวแปรเสริมต้องเป็นที่ยอมรับเป็น ความสำคัญ และสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งเล็กน้อยที่ทำให้เกิดผลสำเร็จบนแบบรูปการเลี้ยวเบนแสง

โครงสร้างผลึกที่มีพฤติกรรมของปรากฏการณ์ชนิตที่น่าสนใจศึกษา ในการหาโครงสร้างที่ น่าเชื่อถือในระหว่างผลเฉลยโครงสร้างและการทำให้ชัดเจนและเชื่อถือได้ ได้แก่ (i) โครงสร้างสาร ผลึก $[SnCl_2(C_2H_4COOH)(C_2H_4COO)]^- [C_{12}H_9N_2]^+$, (ii) ความสมมาตรเทียมและระบบการ สะท้อนที่ไม่คมชัดใน $[Mg(H_2O)_6](NO_3)_2 \cdot 2HMT \cdot 4H_2O$, (iii) การสะท้อนที่พิเศษของ $PS(C_2H_5)_3$, (v) โครงสร้างเชิงคู่รวมไปถึงการเหลื่อมล้ำบางส่วนและอย่างสมบูรณ์ของความเข้ม ในการเลี้ยวเบนแสงใน $[M(H_2O)_6]I_2 \cdot 2HMT \cdot 4H_2O]$, เมื่อ M=Ni และ Mn, (v) โครงสร้างการ กล้ำที่ได้สัดส่วนกันของ $\{[Cu(bipy)]_2SO_4 \cdot TPA\}_n$, และ (vi) โครงสร้างที่อุณหภูมิสูง ค่ำ ซึ่ง เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงอันดับที่เป็นระเบียบ-ไม่เป็นระเบียบของผลึกของ $[Ag(bipy)NO_3]_n$ และเหตุผลสำหรับการสังเกตการแพร่กระเจิงของรูปแบบที่ไม่เป็นระเบียบ

สาขาวิชาเคมี ปีการศึกษา 2547 ลายมือชื่อนักศึกษา <u>(N. Samplion</u> ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา **Lamed 9. Halle** WEENAWAN SOMPHON: STRUCTURAL STUDIES OF CRYSTALS

WITH INTERACTING COMPONENTS. THESIS ADVISOR: ASSOC.

PROF. KENNETH J. HALLER, Ph.D. 262 PP. ISBN 974-533-422-7

STRUCTURE MODULATION/POLYMORPHISM/POLYTYPISM/ TWINNING

PHASE TRANSITION/SUPRAMOLECULAR STRUCTURE

This thesis is focused on the recognition and investigation of problem crystal

structures that require innovative modeling for adequate structure description and

refinement. The structures studied were associated with pseudo symmetry, disorder,

twinning, polytypes, structure modulation, diffuse scattering, and phase transitions.

Resolution of the inherent difficulties required an appreciation of how structural

information is distributed in diffraction data and used refinement techniques that

recognized which parameters are important and those that had little effect on the

diffraction pattern.

Crystal structures that exhibited phenomena which posed particular challenges

during structure solution and refinement were (i) the polytypism of [SnCl₂(C₂H₄CO₂H)

 $(C_2H_4CO_2)]^{-}(C_{12}H_9N_2)^{+}$, (ii) the pseudo symmetry and systematically weak

reflections in [Mg(H₂O)₆](NO₃)₂·2HMT·4H₂O, (iii) the extra reflections of PS(C₂H₅)₃,

(iv) the twinning including partial and perfect overlap of diffraction intensities in

 $[M(H_2O)_6]I_2 \cdot 2HMT \cdot 4H_2O]$, where M = Ni and Mn, (v) the commensurately

modulated structure of $\{[Cu(bipy)]_4(SO_4)_2 \cdot 2(TPA)\}_n$, and (vi) the high and low

temperature structures involved in an order-disorder transformation of crystallized

 $[Ag(bipy)NO_3]_n$ and the reason for the observed diffuse scattering of the disordered

form.

School of Chemistry

Academic Year 2004

Student's Signature W. Somphon

Advisor's Signature Kenneth Heller